

# Remarques sur un article récent de B. Poonen

J-L. Colliot-Thélène

22 novembre 2018

*Résumé* : B. Poonen a récemment exhibé des exemples de variétés projectives et lisses de dimension 3 sur un corps de nombres qui n'ont pas de point rationnel et pour lesquelles il n'y a pas d'obstruction de Brauer–Manin après revêtement fini étale. Dans cette note, je montre que les variétés qu'il construit possèdent des zéro-cycles de degré 1.

*Summary* : B. Poonen recently produced smooth threefolds over a number field which do not have a rational point but have no Brauer–Manin obstruction even after descent to a finite étale cover. In this note I show that the varieties he produces have zero-cycles of degree 1.

*Mots-clés* : points rationnels, zéro-cycles, principe de Hasse, obstruction de Brauer–Manin

*Keywords* : rational points, zero-cycles, Hasse principle, Brauer–Manin obstruction

Mathematical Subject Classification (MSC 2000) Primary : 14G05, 14G25 11G35. Secondary : 14J20, 14F22.

## 1 Introduction

Soit  $k$  un corps de nombres. Dans son article [10], B. Poonen construit des exemples de variétés projectives et lisses de dimension 3 sur  $k$  qui ont les propriétés suivantes : elles ont des points dans tous les complétés de  $k$ , il n'y a pas d'obstruction de Brauer–Manin à l'existence d'un point rationnel, mieux, il n'y a pas d'obstruction de Brauer–Manin après descente par revêtements finis étales, et cependant les variétés ne possèdent pas de point  $k$ -rationnel. C. Demarche [5] vient de montrer que ceci implique qu'aucune obstruction de

descente sous un groupe algébrique ne saurait rendre compte de l'inexistence de point rationnel. La situation est donc tout à fait différente de celle de l'exemple historique de Skorobogatov ([12], [9]).

Dans [3] j'ai conjecturé que pour toute variété projective, lisse, géométriquement connexe sur un corps de nombres, l'obstruction de Brauer-Manin à l'existence d'un zéro-cycle de degré 1 est la seule obstruction.

Dans cette note je montre que la conjecture vaut pour les variétés construites par Poonen : elles ont toutes un zéro-cycle de degré 1. La question reste entière pour l'exemple de Skorobogatov.

Au paragraphe 1 je rappelle brièvement la construction des variétés. Au paragraphe 2 je donne une démonstration alternative du calcul du groupe de Brauer de ces variétés. Le résultat de ce calcul permet de montrer ([10]) qu'il n'y a pas d'obstruction de Brauer-Manin à l'existence d'un point rationnel, et *a fortiori* pas d'obstruction de Brauer-Manin à l'existence de zéro-cycles de degré 1. Au paragraphe 3, logiquement indépendant du précédent, j'établis l'existence de zéro-cycles de degré 1.

Cet article a été conçu à l'occasion d'exposés donnés en avril 2008 à l'université Emory (Atlanta, Géorgie).

## 2 Les variétés

Soit  $k$  un corps de caractéristique nulle. Les variétés considérées dans [10] s'insèrent dans le diagramme suivant, que nous allons détailler.

$$\begin{array}{ccc} X & \rightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ C \times \mathbb{P}^1 & \rightarrow & \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ C & \rightarrow & \mathbb{P}^1 \end{array}$$

Dans ce diagramme, toutes les variétés sont des  $k$ -variétés projectives, lisses, géométriquement connexes. La variété  $C$  est une courbe. Les flèches verticales inférieures sont données par la projection sur le premier facteur. La variété  $V$  est de dimension 3, elle est fibrée en coniques sur  $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ . Le lieu de ramification de cette fibration (le lieu où la conique fibre est singulière) est une  $k$ -courbe projective, lisse, géométriquement intègre  $Z_1 \subset \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ . La projection sur le premier facteur  $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$  induit un revêtement ramifié  $Z_1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ , le lieu de ramification dans  $\mathbb{P}^1$  ne contient pas le point  $\infty \in \mathbb{P}^1(k)$ .

Le morphisme  $C \rightarrow \mathbb{P}^1$  est un revêtement ramifié, son lieu de ramification dans  $\mathbb{P}^1$  ne rencontre pas le lieu de ramification de  $Z_1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ .

La partie verticale gauche du diagramme est obtenue par rétro-tirette à partir de la partie verticale droite (produits fibrés via le morphisme  $C \rightarrow \mathbb{P}^1$ ).

Pour tout point schématique  $w \in \mathbb{P}^1$ , de corps résiduel  $k(w)$ , la fibre  $V_w$  est une surface géométriquement intègre sur  $k(w)$  qui contient un ouvert affine d'équation

$$y^2 - az^2 = P_w(x)$$

avec  $a \in k \setminus k^2$  et  $P_w(x) \in k(w)[x]$  un polynôme non nul, de degré 4 en la variable  $x$ , séparable pour  $w$  non dans le lieu de ramification de  $Z_1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ .

Le lieu de dégénérescence de la fibration en coniques  $X \rightarrow C \times \mathbb{P}^1$  est l'image inverse  $Z$  de  $Z_1$  par  $C \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ . Il est montré dans [10] (Lemma 8.1) que  $Z \subset C \times \mathbb{P}^1$  est une  $k$ -courbe projective, lisse, géométriquement intègre.

La description des fibres de l'application composée  $V \rightarrow \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$  (première projection) montre que l'on a :

**Proposition 2.1.** *Sous les hypothèses faites ci-dessus, pour tout point schématique  $P$  de  $C$ , la fibre  $X_P/k(P)$  du morphisme  $X \rightarrow C$  au point  $P$  est une  $k(P)$ -variété géométriquement intègre.*

### 3 Leur groupe de Brauer

Le résultat suivant est établi dans [10] au moyen d'une étude de l'action du groupe de Galois sur le groupe de Picard géométrique de  $X$ . Nous proposons une démonstration un peu plus courte. La différence entre la démonstration de [10] et la présente démonstration est essentiellement la même que celle entre les propositions 7.1.1 et 7.1.2 de [13].

**Proposition 3.1.** *Sous les hypothèses ci-dessus, la flèche naturelle de groupes de Brauer  $\text{Br } C \rightarrow \text{Br } X$  est un isomorphisme.*

*Démonstration.* Notons  $B = C \times \mathbb{P}^1$ . La fibration en coniques  $X \rightarrow B$  est dégénérée en un seul point de codimension 1 de  $B$ , correspondant à la courbe géométriquement intègre  $Z$ .

Soit  $\eta$  le point générique de  $B$  et  $X_\eta$  la fibre générique de  $X \rightarrow B$ . C'est une conique lisse.

De façon générale, étant donné un  $k$ -morphisme plat  $X \rightarrow B$  de  $k$ -variétés lisses géométriquement intègres, on dispose d'un diagramme commutatif de suites exactes de groupes de cohomologie étale :

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \rightarrow & \mathrm{Br} B & \rightarrow & \mathrm{Br} k(B) & \xrightarrow{\oplus_x \partial_x} & \bigoplus_{x \in B^{(1)}} H^1(k(x), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow e_{y/x} \cdot \mathrm{Res}_{k(x)/k(y)} \\
0 & \rightarrow & \mathrm{Br} X & \rightarrow & \mathrm{Br} X_\eta & \xrightarrow{\oplus_x \partial_y} & \bigoplus_{x \in B^{(1)}} \bigoplus_{y \in X^{(1)}, y \rightarrow x} H^1(k(y), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).
\end{array}$$

Dans ce diagramme,  $x$  parcourt les points de codimension 1 de  $B$ , et  $y$  parcourt les points de codimension 1 de  $X$  qui ne sont pas situés sur  $X_\eta$ . Pour  $y \in X$  d'image  $x \in B$ , on a l'inclusion des corps résiduels  $k(x) \subset k(y)$ . L'entier  $e_{y/x}$  est l'indice de ramification. Les flèches  $\partial$  sont les flèches de résidu.

On peut extraire un tel diagramme des exposés de Grothendieck sur le groupe de Brauer ([7], voir GB II, Cor. 1.10, GB III, Prop. 2.1, GB III, Thm. 6.1). Pour plus de détails, voir par exemple [2, §3] et [6, Chapter 6]. La démonstration combine les suites de localisation, leur functorialité et le théorème de pureté pour le groupe de Brauer.

Dans la présente situation, la fibre générique est une conique sur  $k(B)$ . Soit  $\beta \in \mathrm{Br} k(B)$  la classe de l'algèbre de quaternions associée à cette conique. Cette classe  $\beta$  est non triviale, elle admet un unique résidu non trivial, au point générique de  $Z$ , et la classe correspondante est la classe de  $a \in k^*/k^{*2} = H^1(k, \mathbb{Z}/2) \subset H^1(k(Z), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ .

Pour la conique  $X_\eta$  sur  $k(B)$  sans point rationnel, on dispose de la suite exacte classique (cf. [12] p. 138)

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/2 \cdot \beta \rightarrow \mathrm{Br} k(B) \rightarrow \mathrm{Br} X_\eta \rightarrow 0.$$

Le diagramme ci-dessus montre alors que l'application  $\mathrm{Br} B \rightarrow \mathrm{Br} X$  est injective.

Soit  $\alpha \in \mathrm{Br} X$ . L'image de  $\alpha$  dans  $\mathrm{Br} X_\eta$  est l'image d'un élément  $\gamma \in \mathrm{Br} k(B)$ , défini à addition près de  $\beta$ .

Le lieu de ramification de  $X \rightarrow B$  est réduit à l'unique courbe  $Z \subset B$ . Ceci implique que pour  $x \in B^{(1)}$  différent du point générique de  $Z$ , et  $y$  l'unique point de  $X^{(1)}$  au-dessus de  $x$ , qui définit une conique lisse donc géométriquement intègre sur le corps  $k(x)$ , la flèche  $e_{y/x} \cdot \mathrm{Res}_{k(x)/k(y)} = \mathrm{Res}_{k(x)/k(y)} : H^1(k(x), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rightarrow H^1(k(y), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$  est une injection. Quant à la flèche  $e_{y/x} \cdot \mathrm{Res}_{k(x)/k(y)} = \mathrm{Res}_{k(x)/k(y)}$  associée au point générique de  $Z$  et à l'unique  $y$  au-dessus de ce point, son noyau est le noyau de la flèche de

restriction  $H^1(k(Z), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rightarrow H^1(k(Z)(\sqrt{a}), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ . Ce noyau est d'ordre 2, engendré par la classe de  $a$  dans  $k^*/k^{*2} = H^1(k, \mathbb{Z}/2)$ .

Du diagramme ci-dessus on conclut que les résidus de  $\gamma$  aux points autres que le point générique de  $Z$  sont nuls, et qu'au point générique de  $Z$  le résidu est soit trivial soit égal au résidu de  $\beta$ . Quitte à remplacer éventuellement  $\gamma$  par  $\gamma + \beta$ , ce qui est loisible, on voit que  $\gamma \in \text{Br } k(B)$  est dans l'image de  $\text{Br } B$ . Comme l'application  $\text{Br } X \rightarrow \text{Br } X_\eta$  est injective, ceci achève de montrer que l'application  $\text{Br } B \rightarrow \text{Br } X$  est un isomorphisme.

Le groupe de Brauer de la droite projective sur un corps est égal à l'image du groupe de Brauer de ce corps. De  $B = C \times \mathbb{P}^1$  on déduit que  $\text{Br } C \rightarrow \text{Br } B$  est un isomorphisme. Ceci achève la démonstration de la proposition.  $\square$

## 4 Existence de zéro-cycles de degré 1

**Théorème 4.1.** *Soit  $k$  un corps de nombres. Soient  $V \rightarrow \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ ,  $C \rightarrow \mathbb{P}^1$  et  $X \rightarrow C \times \mathbb{P}^1$  comme ci-dessus. Faisons les deux hypothèses :*

(i) *la fibre (lisse)  $V_\infty$  de la fibration composée  $V \rightarrow \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$  (première projection) a des points dans tous les complétés de  $k$  ;*

(ii) *il existe un  $k$ -point  $P$  de  $C$  dont l'image par  $C \rightarrow \mathbb{P}^1$  est le point  $\infty$ . Alors pour tout entier  $n \geq 2g + 1$ , où  $g$  désigne le genre de  $C$ , la  $k$ -variété  $X$  possède un point dans un corps extension de  $k$  de degré  $n$ . En particulier  $X$  possède un zéro-cycle de degré 1.*

*Démonstration.* Soit  $n$  comme dans l'énoncé. Le système linéaire associé au diviseur  $nP$  de  $C$  est alors très ample. Soit  $C \hookrightarrow \mathbb{P}^N$  le plongement associé, et soit  $\check{\mathbb{P}}^N$  l'espace projectif dual de  $\mathbb{P}^N$ .

La variété d'incidence  $W \subset \mathbb{P}^N \times \check{\mathbb{P}}^N$  définie par l'annulation de la forme bihomogène  $\sum_{i=0}^N X_i Y_i$  est un diviseur très ample. La projection  $W \rightarrow \check{\mathbb{P}}^N$  définit un fibré (lisse) en espaces projectifs  $\mathbb{P}^{N-1}$ .

Soit  $W_Z \subset Z \times \check{\mathbb{P}}^N$  l'image inverse de la correspondance d'incidence via le morphisme composé

$$Z \times \check{\mathbb{P}}^N \rightarrow C \times \check{\mathbb{P}}^N \rightarrow \mathbb{P}^N \times \check{\mathbb{P}}^N.$$

C'est un fibré (lisse) en espaces projectifs  $\mathbb{P}^{N-1}$  au-dessus de la courbe  $Z$ , qui est projective, lisse et géométriquement intègre. Ainsi  $W_Z$  est projectif, lisse et géométriquement intègre.

Le même argument montre que l'image inverse  $W_C \subset C \times \check{\mathbb{P}}^N$  de la correspondance d'incidence est une  $k$ -variété projective, lisse, géométriquement intègre.

Les morphismes naturels  $W_Z \rightarrow W_C \rightarrow \check{\mathbb{P}}^N$  sont des morphismes propres dominants et finis – ils sont quasi-finis car la courbe  $C$  engendre  $\mathbb{P}^N$  projectivement.

La proposition 2.1 et un énoncé bien connu ([4, I, p. 43], [11, Thm. 1], [1, §3.2]) impliquent l'existence d'un ensemble fini  $S$  de places de  $k$  tel que pour toute extension finie  $L$  de  $k$  et toute place  $w$  de  $L$  non située au-dessus d'une place de  $S$ , l'application  $X(L_w) \rightarrow C(L_w)$  est surjective.

Pour toute place  $v$  de  $k$ , la fibre (lisse)  $X_P$  du morphisme  $X \rightarrow C$  au-dessus du  $k$ -point  $P$  possède un  $k_v$ -point lisse. Ceci implique que pour toute extension finie  $L/k_v$ , l'image de l'application induite  $X(L) \rightarrow C(L)$  contient un voisinage ouvert de  $P \times_{k_v} L$  pour la topologie  $v$ -adique sur  $C(L)$ .

Il existe un hyperplan  $H_0 \in \check{\mathbb{P}}^N(k)$  qui découpe exactement le diviseur  $nP$  sur  $C$ . Soit  $v$  une place de  $k$ . Tout hyperplan  $H \in \check{\mathbb{P}}^N(k)$  qui est suffisamment proche de  $H_0$  pour la topologie  $v$ -adique découpe sur la courbe  $C$  une somme de points fermés qui lorsque l'on passe de  $k$  à un complété  $k_v$  donnent des points sur diverses extensions finies  $L$  de  $k_v$  de degré au plus  $n$ , points qui sont proches de  $P \times_k L$  pour la topologie  $v$ -adique sur  $C(L)$ . Rappelons qu'un tel corps local  $k_v$  (de caractéristique nulle) n'admet qu'un nombre fini d'extensions  $L/k_v$  de degré au plus  $n$ .

Le théorème d'irréductibilité de Hilbert avec approximation faible (cf. [8], Prop. 3.2.1), appliqué à l'ensemble fini  $S$  de places et au revêtement fini de variétés géométriquement intègres  $W_Z \rightarrow \check{\mathbb{P}}^N$ , composé de  $W_Z \rightarrow W_C \rightarrow \check{\mathbb{P}}^N$ , permet alors de trouver un point fermé  $M \in C$ , de degré  $n$  sur  $k$ , tel que la fibre  $X_M/k(M)$  soit une surface de Châtelet lisse, possède des points dans tous les complétés de  $k(M)$  (ceci par combinaison des trois paragraphes précédents) et que de plus le schéma  $Z_M = Z \times_C M$  soit intègre. Mais ceci signifie que la surface de Châtelet correspondante admet une équation affine  $y^2 - az^2 = P(x)$  avec  $P(x) \in k(M)[x]$  irréductible de degré 4. L'un des principaux résultats de [4], le théorème 8.11, assure que le principe de Hasse vaut pour une telle surface. Ainsi  $X_M(k(M)) \neq \emptyset$ , *a fortiori*  $X(k(M)) \neq \emptyset$ .  $\square$

**Remarque 4.2.** Supposons  $C = \mathbb{P}^1$ . Dans ce cas on peut prendre  $n = 1$ , et on obtient  $X(k) \neq \emptyset$ . On a mieux. Comme les surfaces de Châtelet d'équation affine  $y^2 - az^2 = P(x)$  avec  $P(x)$  irréductible satisfont l'approximation faible ([4, Thm. 8.11]), une variante immédiate de l'argument établit l'approximation faible pour  $X$  : l'ensemble  $X(k)$  est dense dans le produit des  $X(k_v)$ . L'argument est un cas particulier d'un théorème général (Harari, [8], Thm. 4.2.1).

**Remarque 4.3.** Dans [3], outre la conjecture sur l'existence de zéro-cycles de degré 1, j'ai proposé une conjecture sur l'application diagonale de groupes de Chow de zéro-cycles  $CH_0(X) \rightarrow \prod_v CH_0(X_v)$ . Dans une série d'articles (voir la bibliographie de [3]), des versions de cette conjecture ont été établies pour des variétés fibrées en variétés de Severi-Brauer au-dessus d'une courbe. Il serait intéressant de voir si l'on peut pousser les arguments ci-dessus et établir la conjecture pour les familles  $X \rightarrow C$  de surfaces de Châtelet considérées ici.

## Références

- [1] J-L. Colliot-Thélène, L'arithmétique des variétés rationnelles, Ann. Fac. Sci. Toulouse Math. (6) **1** (1992), no. 3, 295–336.
- [2] J-L. Colliot-Thélène, Birational invariants, purity and the Gersten conjecture, in *K-Theory and Algebraic Geometry : Connections with Quadratic Forms and Division Algebras*, Bill Jacob and Alex Rosenberg ed., Proceedings of Symposia in Pure Mathematics **58.1**, Amer. Math. Soc. (1995), 1–64.
- [3] J-L. Colliot-Thélène, Conjectures de type local-global sur l'image des groupes de Chow dans la cohomologie étale, in *Algebraic K-Theory* (1997), W. Raskind and C. Weibel ed., Proceedings of Symposia in Pure Mathematics **67**, Amer. Math. Soc. (1999) 1–12.
- [4] J-L. Colliot-Thélène, J-J. Sansuc et Sir Peter Swinnerton-Dyer, Intersections of two quadrics and Châtelet surfaces, I, J. für die reine und angew. Math. (Crelle) **373** (1987) 37-107 ; II, ibid. **374** (1987) 72-168.
- [5] C. Demarche, Obstruction de descente et obstruction de Brauer–Manin, prépublication, 2008.
- [6] P. Gille et T. Szamuely, *Central Simple Algebras and Galois Cohomology*, Cambridge studies in advanced mathematics **101** (2006).

- [7] A. Grothendieck, Le groupe de Brauer, I, II, III, in *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, Advanced Studies in Pure Mathematics, Masson, Paris et North-Holland, Amsterdam, 1968.
- [8] D. Harari, Méthode des fibrations et obstruction de Manin, *Duke Math. J.* **75** (1994) 221–260.
- [9] D. Harari et A. N. Skorobogatov, Non-abelian descent cohomology and rational points, *Compositio Math.* **130** (2002) 241–273.
- [10] B. Poonen, Insufficiency of the Brauer-Manin obstruction applied to étale covers, prépublication, arXiv : 08061312.
- [11] A. N. Skorobogatov, On the fibration method for proving the Hasse principle and weak approximation, in *Séminaire de théorie des nombres de Paris 1988–1989*, éd.C. Goldstein, *Prog. Math.* **91**, Birkhäuser, Boston, 1990, 205–219.
- [12] A. N. Skorobogatov, Beyond the Manin obstruction, *Invent. math.* **135** (1999) (2) 399–424.
- [13] A. Skorobogatov, *Torsors and rational points*, Cambridge tracts in Mathematics **144**, Cambridge University Press, 2001.

Jean-Louis Colliot-Thélène  
C.N.R.S., UMR 8628,  
Mathématiques, Bâtiment 425,  
Université Paris-Sud,  
F-91405 Orsay,  
France  
courriel : jlct à math.u-psud.fr