

# Introduction into Geometry over Division Ring

Aleks Kleyn

*E-mail address:* [Aleks\\_Kleyn@mailAPS.org](mailto:Aleks_Kleyn@mailAPS.org)

*URL:* <http://sites.google.com/site/alekskleyn/>

*URL:* [http://arxiv.org/a/kleyn\\_a\\_1](http://arxiv.org/a/kleyn_a_1)

*URL:* <http://AleksKleyn.blogspot.com/>

ABSTRACT. Theory of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra is a natural development of the theory of  $\mathfrak{F}$ -algebra. Exploring of morphisms of the representation leads to the concepts of generating set and basis of representation. In the book I considered the notion of tower of  $T\star$ -representations of  $\mathfrak{F}_i$ -algebras,  $i = 1, \dots, n$ , as the set of coordinated  $T\star$ -representations of  $\mathfrak{F}_i$ -algebras.

I explore the geometry of affine space as example of tower of representations. Exploration of curvilinear coordinates allows us to see how look at the main structures of the manifold with affine connection. I explore Euclidean space over division ring.

# Contents

Chapter 1. Preface . . . . .	5
1.1. Tower of Representations . . . . .	5
1.2. Morphism and Basis of Representation . . . . .	5
1.3. $D$ -Affine space . . . . .	5
1.4. Conventions . . . . .	6
Chapter 2. Representation of $\mathfrak{F}$ -Algebra . . . . .	9
2.1. Representation of $\mathfrak{F}$ -Algebra . . . . .	9
2.2. Morphism of Representations of $\mathfrak{F}$ -Algebra . . . . .	11
2.3. Representation of Group . . . . .	21
2.4. Single Transitive $T\star$ -Representation of Group . . . . .	25
2.5. Basis of $T\star$ -representation . . . . .	28
2.6. Few Applications of Basis of Representation . . . . .	32
Chapter 3. Tower of Representations of $\mathfrak{F}$ -Algebras . . . . .	33
3.1. Tower of Representations of $\mathfrak{F}$ -Algebras . . . . .	33
3.2. Morphism of Tower of $T\star$ -Representations . . . . .	35
3.3. Basis of Tower of Representations . . . . .	37
3.4. Examples of Basis of Tower of Representation . . . . .	40
3.5. Representations in Category . . . . .	41
Chapter 4. Geometry of Division Ring . . . . .	43
4.1. Center of Division Ring . . . . .	43
4.2. Geometry of Division Ring over Field . . . . .	44
Chapter 5. Quadratic Map of Division Ring . . . . .	47
5.1. Bilinear Map of Division Ring . . . . .	47
5.2. Quadratic Map of Division Ring . . . . .	48
Chapter 6. $D$ -Affine Space . . . . .	53
6.1. $D$ -Affine Space . . . . .	53
6.2. Basis in $D$ -Affine Space . . . . .	55
Chapter 7. Euclidean Space . . . . .	57
7.1. Euclidean Space . . . . .	57
7.2. Basis in Euclidean Space . . . . .	58
Chapter 8. Calculus in $D$ -Affine Space . . . . .	59
8.1. Curvilinear Coordinates in $D$ -Affine Space . . . . .	59
8.2. Paralel Transfer . . . . .	61
Chapter 9. Manifolds with $D$ -Affine Connections . . . . .	65

9.1. Manifolds with $D$ -Affine Connections . . . . .	65
Chapter 10. References . . . . .	67
Chapter 11. Index . . . . .	68
Chapter 12. Special Symbols and Notations . . . . .	70

## CHAPTER 1

# Preface

### 1.1. Tower of Representations

The main goal of this book is considering of simple geometry over division ring.

However I decided not to bind this book by description of affine and Euclidean geometry. During description of affine geometry I discovered interesting structure. At first I define  $D^*_{*}$ -vector space  $\overline{V}$ . This is  $T\star$ -representation of the division ring  $D$  in additive group. Then I consider a set of points where the representation of  $D^*_{*}$ -vector space  $\overline{V}$  is defined. This many-tier structure stimulate my interest and I returned to exploration of  $T\star$ -representations of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra.

Thus the concept of tower of  $T\star$ -representations emerged. As soon as I began draw diagrams related to the tower of  $T\star$ -representations, I discovered pattern similar to diagrams in paper [9]. Although I did not succeed to carry this analogy to its logical conclusion, I hope that this analogy can bring to interesting results.

### 1.2. Morphism and Basis of Representation

Exploring of the theory of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra shows that this theory has a lot of common with theory of  $\mathfrak{F}$ -algebra. In [5, 6, 7], I explored morphisms of representation. They are maps that preserve the structure of representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra (or of tower of representations).

Linear maps of vector spaces are examples of morphism of representations. The definition of basis is important structure in the theory of linear spaces. Concept of basis is directly linked to statement that the group of morphisms of linear space has two single transitive representations. The main function of basis is to form linear space.

The natural question arises. Can we generalize this structure to arbitrary representation? The basis is not the only set that forms the vector space. This statement is initial point where I started exploring of generating set of representation. Generating set of representation is one more interesting parallel between theory of representations and theory of universal algebra.

For some representations, the possibility to find generating set is not equivalent to the possibility to build basis. The problem to find the set of representations that allow to construct basis is interesting and important problem. I wonder is it possible to find effective algorithm of construction of basis of quantum geometry.

### 1.3. $D$ -Affine space

Like in the case of  $D$ -vector space, I can start from considering of  $D^*_{*}$ -affine space and then move to exploring of  $D$ -affine space. However I do not expect something new on this way. Because I explore operations related to differentiation, I start immediately from exploring of  $D$ -affine space.

From the moment when I realized that affine space is tower of representations and linear maps of affine space are morphisms of tower of representations, I realized what form the connection has in manifold with  $D$ -affine connection. However, I decided to explore curvilinear coordinates in the affine space before I explore the manifold with affine connections.

Although it was clear in my mind what happens when I change coordinates, the picture that I saw appears more interesting than I expected. I have met two very important ideas.

I started from construction of affine space as tower of representations. It turned out, that there exists one more model where we represent vector fields as sets of maps.<sup>1.1</sup> However these two models do not contradict one to another, but rather are complementary.

Second observation did not come as a surprise for me. When I started to explore  $D$ -vector space, I was ready to consider linear combination of vectors as polylinear form; however I got the conclusion that this does not change dimension of space, and for this reason I did not go beyond exploration of  $D^*$ -basis.

It is interesting to observe how new concept appears during writing of book. Construction that I made in chapter 8 again returned me to a linear combination as sum of linear forms. However at this time I have linear dependence of 1-forms. And coefficients of linear dependence are not outside of 1-form, but inside. If we consider 1-forms over field, then 1-form is transparent for scalars of the field, and there is no difference for us whether coefficients are outside or inside the form.

Linear dependence is not subject of this book. I will explore this question in following papers. In this book I use this definition assuming that its properties are clear from written equations.

Exploring of curvilinear coordinates also gave opportunity to see transformation rule of coordinates of  $D$ -affine connection when we change coordinates. However, I think it was luck that I was able to write the explicit transformation law, and this luck was associated with the fact that the connection has only one contravariant index. I have reason to believe that such an operation, like raising or lowering the index of the tensor in Riemannian space can have only an implicit form of record.

I see one more unexplored field of research, though. I hope that theory of representation of fibered  $\mathfrak{F}$ -algebra will give key to solution of this problem.

For years affine geometry was symbol for me of the most simple geometry. I am glad to see that I was wrong. At the right moment affine geometry turned out to be a source of inspiration. Affine geometry is the gate of differential geometry. Although, in order to plunge deeply into the differential geometry, I need good knowledge about differential equations, I conclude the book with very brief excursion into the manifold with affine connections. It can give to reader the taste of the new geometry.

#### 1.4. Conventions

- (1) Function and map are synonyms. However according to tradition, correspondence between either rings or vector spaces is called map and map of either real field or quaternion algebra is called function. I also follow this tradition.

---

<sup>1.1</sup>At this time it is not clear whether this model leads me to geometry that Alain Connes explores in [12]. Answer on this question requires further research.

- (2) We can consider division ring  $D$  as  $D$ -vector space of dimension 1. According to this statement, we can explore not only homomorphisms of division ring  $D_1$  into division ring  $D_2$ , but also linear maps of division rings. This means that map is multiplicative over maximum possible field. In particular, linear map of division ring  $D$  is multiplicative over center  $Z(D)$ . This statement does not contradict with definition of linear map of field because for field  $F$  is true  $Z(F) = F$ . When field  $F$  is different from maximum possible, I explicit tell about this in text.
- (3) In spite of noncommutativity of product a lot of statements remain to be true if we substitute, for instance, right representation by left representation or right vector space by left vector space. To keep this symmetry in statements of theorems I use symmetric notation. For instance, I consider  $D\star$ -vector space and  $\star D$ -vector space. We can read notation  $D\star$ -vector space as either  $D$ -star-vector space or left vector space. We can read notation  $D\star$ -linear dependent vectors as either  $D$ -star-linear dependent vectors or vectors that are linearly dependent from left.
- (4) When we consider free algebra we identify the vector of basis  $\textcolor{red}{o}\bar{e}$  with unit of algebra.



## CHAPTER 2

# Representation of $\mathfrak{F}$ -Algebra

### 2.1. Representation of $\mathfrak{F}$ -Algebra

**Definition 2.1.1.** We call the map

$$t : M \rightarrow M$$

transformation of set  $M$ .  $\square$

**Definition 2.1.2.** Transformations is left-side transformation or  $T\star$ -transformation if it acts from left

$$u' = tu$$

We denote  ${}^*M$  the set of  $T\star$ -transformations of set  $M$ .

Suppose we defined the structure of  $\mathfrak{H}$ -algebra on the set  $M$  ([2]). Then the set  ${}^*M$  consists from  $T\star$ -transformations which are homomorphisms of  $\mathfrak{H}$ -algebra.  $\square$

**Definition 2.1.3.** Transformations is right-side transformations or  $\star T$ -transformation if it acts from right

$$u' = ut$$

We denote  $M^*$  the set of nonsingular  $\star T$ -transformations of set  $M$ .

Suppose we defined the structure of  $\mathfrak{H}$ -algebra on the set  $M$  ([2]). Then the set  $M^*$  consists from  $\star T$ -transformations which are homomorphisms of  $\mathfrak{H}$ -algebra.  $\square$

We denote  $\delta$  identical transformation.

**Definition 2.1.4.** Suppose we defined the structure of  $\mathfrak{F}$ -algebra on the set  ${}^*M$  ([2]). Let  $A$  be  $\mathfrak{F}$ -algebra. We call homomorphism

$$(2.1.1) \quad f : A \rightarrow {}^*M$$

left-side or  $T\star$ -representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in set  $M$ .  $\square$

**Definition 2.1.5.** Suppose we defined the structure of  $\mathfrak{F}$ -algebra on the set  $M^*$  ([2]). Let  $A$  be  $\mathfrak{F}$ -algebra. We call homomorphism

$$f : A \rightarrow M^*$$

right-side or  $\star T$ -representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in set  $M$ .  $\square$

We extend to representation theory convention described in remark [5]-2.2.14.  
We can write duality principle in the following form

**Theorem 2.1.6** (duality principle). *Any statement which holds for  $T\star$ -representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  holds also for  $\star T$ -representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$ .*

**Remark 2.1.7.** There exist two forms of notation for transformation of set  $M$ . In operational notation, we write the transformation  $A$  as either  $Aa$  which corresponds to the  $T\star$ -transformation or  $aA$  which corresponds to the  $\star T$ -transformation. In functional notation, we write the transformation  $A$  as  $A(a)$  regardless of the fact whether this is  $T\star$ -transformation or this is  $\star T$ -transformation. This notation is in agreement with duality principle.

This remark serves as a basis for the following convention. When we use functional notation we do not make a distinction whether this is  $T\star$ -transformation or this is  $\star T$ -transformation. We denote  ${}^*M$  the set of transformations of set  $M$ . Suppose we defined the structure of  $\mathfrak{F}$ -algebra on the set  ${}^*M$ . Let  $A$  be  $\mathfrak{F}$ -algebra. We call homomorphism

$$(2.1.2) \quad f : A \rightarrow {}^*M$$

**representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in set  $M$ .**

Correspondence between operational notation and functional notation is unambiguous. We can select any form of notation which is convenient for presentation of particular subject.  $\square$

Diagram

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f(a)} & M \\ & \uparrow f & \\ & A & \end{array}$$

means that we consider the representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$ . The map  $f(a)$  is image of  $a \in A$ .

**Definition 2.1.8.** Suppose map (2.1.2) is an isomorphism of the  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  into  ${}^*M$ . Then the representation of the  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  is called **effective**.  $\square$

**Remark 2.1.9.** Suppose the  $T\star$ -representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra is effective. Then we identify an element of  $\mathfrak{F}$ -algebra and its image and write  $T\star$ -transformation caused by element  $a \in A$  as

$$v' = av$$

Suppose the  $\star T$ -representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra is effective. Then we identify an element of  $\mathfrak{F}$ -algebra and its image and write  $\star T$ -transformation caused by element  $a \in A$  as

$$v' = va$$

$\square$

**Definition 2.1.10.** We call a representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra **transitive** if for any  $a, b \in V$  exists such  $g$  that

$$a = f(g)(b)$$

We call a representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra **single transitive** if it is transitive and effective.  $\square$

**Theorem 2.1.11.**  $T\star$ -representation is single transitive if and only if for any  $a, b \in M$  exists one and only one  $g \in A$  such that  $a = f(g)(b)$

PROOF. Corollary of definitions 2.1.8 and 2.1.10.  $\square$

Suppose we introduce additional structure on set  $M$ . Then we create an additional requirement for the representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra.

Since we defined the structure of algebra of type  $\mathfrak{H}$  on the set  $M$ , we suppose that transformation

$$u' = f(a)(u)$$

is automorphism of algebra of type  $\mathfrak{H}$ . We also study representations which reflects symmetry of algebra of type  $\mathfrak{H}$ .

Since we introduce continuity on set  $M$ , we suppose that transformation

$$u' = f(a)(u)$$

is continuous in  $u$ . Therefore, we get

$$\left| \frac{\partial u'}{\partial u} \right| \neq 0$$

## 2.2. Morphism of Representations of $\mathfrak{F}$ -Algebra

**Theorem 2.2.1.** Let  $A$  and  $B$  be  $\mathfrak{F}$ -algebras. Representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $B$

$$g : B \rightarrow {}^*M$$

and homomorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra

$$(2.2.1) \quad h : A \rightarrow B$$

define representation  $f$  of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & {}^*M \\ & \searrow h & \nearrow g \\ & B & \end{array}$$

PROOF. Since mapping  $g$  is homomorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $B$  into  $\mathfrak{F}$ -algebra  ${}^*M$ , the mapping  $f$  is homomorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  into  $\mathfrak{F}$ -algebra  ${}^*M$ .  $\square$

Considering representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra in sets  $M$  and  $N$ , we are interested in a mapping that preserves the structure of representation.

**Definition 2.2.2.** Let us consider representation

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in  $M$  and representation

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $B$  in  $N$ . Tuple of mapping  $(r, R)$

$$(2.2.2) \quad r : A \longrightarrow B \quad R : M \longrightarrow N$$

such, that  $r$  is homomorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra and

$$(2.2.3) \quad R \circ f(a) = g(r(a)) \circ R$$

is called **morphism of representations from  $f$  into  $g$** . We also say that **morphism of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra** is defined.  $\square$

For any  $m \in M$  equation (2.2.3) has form

$$(2.2.4) \quad R(f(a)(m)) = g(r(a))(R(m))$$


**Remark 2.2.3.** Let us consider morphism of representations (2.2.2). We denote elements of the set  $B$  by letter using pattern  $b \in B$ . However if we want to show that  $b$  is image of element  $a \in A$ , we use notation  $r(a)$ . Thus equation

$$r(a) = r(a)$$

means that  $r(a)$  (in left part of equation) is image  $a \in A$  (in right part of equation). Using such considerations, we denote element of set  $N$  as  $R(m)$ . We will follow this convention when we consider correspondences between homomorphisms of  $\mathfrak{F}$ -algebra and mappings between sets where we defined corresponding representations.

There are two ways to interpret (2.2.4)

- Let transformation  $f(a)$  map  $m \in M$  into  $f(a)(m)$ . Then transformation  $g(r(a))$  maps  $R(m) \in N$  into  $R(f(a)(m))$ .
- We represent morphism of representations from  $f$  into  $g$  using diagram



From (2.2.3) it follows that diagram (1) is commutative. □

**Definition 2.2.4.** Let us consider representation

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in  $M$ . Tuple of mapping  $(r, R)$

$$(2.2.5) \quad r : A \longrightarrow A \quad R : M \longrightarrow M$$

such, that  $r$  is automorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra and

$$(2.2.6) \quad R \circ f(a) = f(r(a)) \circ R$$

is called **automorphism of representation  $f$** . □

**Theorem 2.2.5.** Let us consider representation

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  and representation

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $B$ . Morphism

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

of representations from  $f$  into  $g$  satisfies equation

$$(2.2.7) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = \omega(g(h(a_1)), \dots, g(h(a_n))) \circ H$$

for any  $n$ -ary operation  $\omega$  of  $\mathfrak{F}$ -algebra.

PROOF. Since  $f$  is homomorphism, we have

$$(2.2.8) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = H \circ f(\omega(a_1, \dots, a_n))$$

From (2.2.3) and (2.2.8) it follows that

$$(2.2.9) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = g(h(\omega(a_1, \dots, a_n))) \circ H$$

Since  $h$  is homomorphism, from (2.2.9) it follows that

$$(2.2.10) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = g(\omega(h(a_1), \dots, h(a_n))) \circ H$$

Since  $g$  is homomorphism, (2.2.7) follows from (2.2.10).  $\square$

**Theorem 2.2.6.** *Let the map*

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

*be morphism from representation*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

*of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  into representation*

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

*of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $B$ . If representation  $f$  is effective, then the map*

$${}^*H : {}^*M \rightarrow {}^*N$$

*defined by equation*

$$(2.2.11) \quad {}^*H(f(a)) = g(h(a))$$

*is homomorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra.*

PROOF. Because representation  $f$  is effective, then for given transformation  $f(a)$  element  $a$  is determined uniquely. Therefore, transformation  $g(h(a))$  is properly defined in equation (2.2.11).

Since  $f$  is homomorphism, we have

$$(2.2.12) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = {}^*H(f(\omega(a_1, \dots, a_n)))$$

From (2.2.11) and (2.2.12) it follows that

$$(2.2.13) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = g(h(\omega(a_1, \dots, a_n)))$$

Since  $h$  is homomorphism, from (2.2.13) it follows that

$$(2.2.14) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = g(\omega(h(a_1), \dots, h(a_n)))$$

Since  $g$  is homomorphism,

$${}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = \omega(g(h(a_1)), \dots, g(h(a_n))) = \omega({}^*H(f(a_1)), \dots, {}^*H(f(a_n)))$$

follows from (2.2.14). Therefore, the map  ${}^*H$  is homomorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra.  $\square$

**Theorem 2.2.7.** *Given single transitive representation*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

*of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  and single transitive  $T\star$ -representation*

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

*of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $B$ , there exists morphism*

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

of representations from  $f$  into  $g$ .

PROOF. Let us choose homomorphism  $h$ . Let us choose element  $m \in M$  and element  $n \in N$ . To define map  $H$ , let us consider following diagram

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{H} & N \\
 |a| \downarrow & & \downarrow h(a) \\
 M & \xrightarrow{(1)} & N \\
 f \swarrow \searrow & & g \swarrow \searrow \\
 A & \xrightarrow{h} & B
 \end{array}$$

From commutativity of diagram (1), it follows that

$$H(am) = h(a)H(m)$$

For arbitrary  $m' \in M$ , we defined unambiguously  $a \in A$  such that  $m' = am$ . Therefore, we defined mapping  $H$  which satisfies to equation (2.2.3).  $\square$

**Theorem 2.2.8.** *Let*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

*be single transitive representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  and*

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

*be single transitive representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $B$ . Given homomorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra*

$$h : A \longrightarrow B$$

*let us consider a map*

$$H : M \longrightarrow N$$

*such that  $(h, H)$  is morphism of representations from  $f$  into  $g$ . This map is unique up to choice of image  $n = H(m) \in N$  of given element  $m \in M$ .*

PROOF. From proof of proof 2.2.7 it follows that choice of homomorphism  $h$  and elements  $m \in M$ ,  $n \in N$  uniquely defines the map  $H$ .  $\square$

**Theorem 2.2.9.** *Given single transitive representation*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

*of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$ , for any automorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  there exists automorphism*

$$p : A \longrightarrow A \quad P : M \longrightarrow M$$

*of representation  $f$ .*

PROOF. Let us consider following diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 & M & \xrightarrow{H} & M & \\
 a \downarrow & & & & p(a) \downarrow \\
 & M & \xrightarrow{H} & M & \\
 f \swarrow & & & & \searrow f \\
 A & \xrightarrow{p} & A & &
 \end{array}
 \quad (1)$$

Statement of theorem is corollary of theorem 2.2.7.  $\square$

**Theorem 2.2.10.** *Let*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

*be representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$ ,*

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

*be representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $B$ ,*

$$h : C \rightarrow {}^*L$$

*be representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $C$ . Given morphisms of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra*

$$p : A \longrightarrow B \quad P : M \longrightarrow N$$


$$q : B \longrightarrow C \quad Q : N \longrightarrow L$$

*There exists morphism of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra*

$$r : A \longrightarrow C \quad R : M \longrightarrow L$$

*where  $r = qp$ ,  $R = QP$ . We call morphism  $(r, R)$  of representations from  $f$  into  $h$  product of morphisms  $(p, P)$  and  $(q, Q)$  of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra.*

PROOF. We represent statement of theorem using diagram



Map  $r$  is homomorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  into  $\mathfrak{F}$ -algebra  $C$ . We need to show that tuple of maps  $(r, R)$  satisfies to (2.2.3):

$$\begin{aligned} R(f(a)m) &= QP(f(a)m) \\ &= Q(g(p(a))P(m)) \\ &= h(qp(a))QP(m)) \\ &= h(r(a))R(m) \end{aligned}$$

□

**Definition 2.2.11.** Let  $\mathcal{A}$  be category of  $\mathfrak{F}$ -algebras. We define **category  $T \star \mathcal{A}$**  of  $T \star$ -representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra from category  $\mathcal{A}$ .  $T \star$ -representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra are objects of this category. Morphisms of  $T \star$ -representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra are morphisms of this category. □

**Theorem 2.2.12.** Automorphisms of representation  $f$  form semigroup.

PROOF. From theorem 2.2.10, it follows that the product of automorphisms  $(p, P), (r, R)$  of the representation  $f$  is automorphism  $(pr, PR)$  of the representation  $f$ . □

**Definition 2.2.13.** Let us define equivalence  $S$  on the set  $M$ . Transformation  $f$  is called **coordinated with equivalence  $S$** , when  $f(m_1) \equiv f(m_2) \pmod{S}$  follows from condition  $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$ . □

**Theorem 2.2.14.** Let us consider equivalence  $S$  on set  $M$ . Let us consider  $\mathfrak{F}$ -algebra on set  ${}^*M$ . Since transformations are coordinated with equivalence  $S$ , we can define the structure of  $\mathfrak{F}$ -algebra on the set  ${}^*(M/S)$ .

PROOF. Let  $h = \text{nat } S$ . If  $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$ , then  $h(m_1) = h(m_2)$ . Since  $f \in {}^*M$  is coordinated with equivalence  $S$ , then  $h(f(m_1)) = h(f(m_2))$ . This allows to define transformation  $F$  according to rule

$$F([m]) = h(f(m))$$

Let  $\omega$  be n-ary operation of  $\mathfrak{F}$ -algebra. Suppose  $f_1, \dots, f_n \in {}^*M$  and

$$F_1([m]) = h(f_1(m)) \quad \dots \quad F_n([m]) = h(f_n(m))$$

We define operation on the set  ${}^*(M/S)$  according to rule

$$\omega(F_1, \dots, F_n)[m] = h(\omega(f_1, \dots, f_n)m)$$

This definition is proper because  $\omega(f_1, \dots, f_n) \in {}^*M$  and is coordinated with equivalence  $S$ . □

**Theorem 2.2.15.** Let

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

be representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$ ,

$$g : B \rightarrow {}^*N$$


be representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $B$ . Let

$$r : A \longrightarrow B \quad R : M \longrightarrow N$$

be morphism of representations from  $f$  into  $g$ . Suppose

$$s = rr^{-1} \quad S = RR^{-1}$$

Then there exist decompositions of  $r$  and  $R$ , which we describe using diagram



- $s = \ker r$  is a congruence on  $A$ . There exists decompositions of homomorphism  $r$

$$(2.2.15) \quad r = itj$$

$j = \text{nat } s$  is the natural homomorphism

$$(2.2.16) \quad j(a) = j(a)$$

$t$  is isomorphism

$$(2.2.17) \quad r(a) = t(j(a))$$

$i$  is the inclusion mapping

$$(2.2.18) \quad r(a) = i(r(a))$$

- $S = \ker R$  is an equivalence on  $M$ . There exists decompositions of homomorphism  $R$

$$(2.2.19) \quad R = ITJ$$

$J = \text{nat } S$  is surjection

$$(2.2.20) \quad J(m) = J(m)$$

$T$  is bijection

$$(2.2.21) \quad R(m) = T(J(m))$$

$I$  is the inclusion mapping

$$(2.2.22) \quad R(m) = I(R(m))$$

- $F$  is  $T\star$ -representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A/s$  in  $M/S$
- $G$  is  $T\star$ -representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $rA$  in  $RM$
- There exists decompositions of morphism of representations

$$(r, R) = (i, I)(t, T)(j, J)$$

PROOF. Existence of diagram (1) follows from theorem II.3.7 ([10], p. 60). Existence of diagram (2) follows from theorem I.3.1 ([10], p. 15).

We start from diagram (4).

Let  $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$ . Then

$$(2.2.23) \quad R(m_1) = R(m_2)$$

Since  $a_1 \equiv a_2 \pmod{S}$ , then

$$(2.2.24) \quad r(a_1) = r(a_2)$$

Therefore,  $j(a_1) = j(a_2)$ . Since  $(r, R)$  is morphism of representations, then

$$(2.2.25) \quad R(f(a_1)(m_1)) = g(r(a_1))(R(m_1))$$

$$(2.2.26) \quad R(f(a_2)(m_2)) = g(r(a_2))(R(m_2))$$

From (2.2.23), (2.2.24), (2.2.25), (2.2.26), it follows that

$$(2.2.27) \quad R(f(a_1)(m_1)) = R(f(a_2)(m_2))$$

From (2.2.27) it follows

$$(2.2.28) \quad f(a_1)(m_1) \equiv f(a_2)(m_2) \pmod{S}$$

and, therefore,

$$(2.2.29) \quad J(f(a_1)(m_1)) = J(f(a_2)(m_2))$$

From (2.2.29) it follows that we defined map

$$(2.2.30) \quad F(j(a))(J(m)) = J(f(a)(m))$$

reasonably and this map is transformation of set  $M/S$ .

From equation (2.2.28) (in case  $a_1 = a_2$ ) it follows that for any  $a$  transformation is coordinated with equivalence  $S$ . From theorem 2.2.14 it follows that we defined structure of  $\mathfrak{F}$ -algebra on the set  ${}^*(M/S)$ . Let us consider  $n$ -ary operation  $\omega$  and  $n$  transformations

$$F(j(a_i))(J(m)) = J(f(a_i)(m)) \quad i = 1, \dots, n$$

of the set  $M/S$ . We assume

$$\omega(F(j(a_1)), \dots, F(j(a_n)))(J(m)) = J(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))(m))$$

Therefore, map  $F$  is representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A/s$ .

From (2.2.30) it follows that  $(j, J)$  is morphism of representations  $f$  and  $F$ .

Let us consider diagram (5).

Since  $T$  is bijection, then we identify elements of the set  $M/S$  and the set  $MR$ , and this identification has form

$$(2.2.31) \quad T(J(m)) = R(m)$$

We can write transformation  $F(j(a))$  of the set  $M/S$  as

$$(2.2.32) \quad F(j(a)) : J(m) \rightarrow F(j(a))(J(m))$$

Since  $T$  is bijection, we define transformation

$$(2.2.33) \quad T(J(m)) \rightarrow T(F(j(a))(J(m)))$$

of the set  $RM$ . Transformation (2.2.33) depends on  $j(a) \in A/s$ . Since  $t$  is bijection, we identify elements of the set  $A/s$  and the set  $rA$ , and this identification has form

$$t(j(a)) = r(a)$$

Therefore, we defined map

$$G : rA \rightarrow {}^*RM$$

according to equation

$$(2.2.34) \quad G(t(\mathbf{j}(a)))(T(\mathbf{J}(m))) = T(F(\mathbf{j}(a))(\mathbf{J}(m)))$$

Let us consider  $n$ -ary operation  $\omega$  and  $n$  transformations

$$G(r(a_i))(R(m)) = T(F(\mathbf{j}(a_i))(\mathbf{J}(m))) \quad i = 1, \dots, n$$

of space  $RM$ . We assume

$$\omega(G(r(a_1)), \dots, G(r(a_n)))(R(m)) = T(\omega(F(\mathbf{j}(a_1), \dots, F(\mathbf{j}(a_n)))(\mathbf{J}(m)))$$

According to (2.2.34) operation  $\omega$  is defined reasonably on the set  ${}^*RM$ . Therefore, the map  $G$  is representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra.

From (2.2.34) it follows that  $(t, T)$  is morphism of representations  $F$  and  $G$ .

Diagram (6) is the most simple case in our prove. Since map  $I$  is immersion and diagram (2) is commutative, we identify  $n \in N$  and  $R(m)$  when  $n \in \text{Im } R$ . Similarly, we identify corresponding transformations.

$$(2.2.35) \quad \begin{aligned} g'(i(r(a)))(I(R(m))) &= I(G(r(a))(R(m))) \\ \omega(g'(r(a_1)), \dots, g'(r(a_n)))(R(m)) &= I(\omega(G(r(a_1), \dots, G(r(a_n)))(R(m))) \end{aligned}$$

Therefore,  $(i, I)$  is morphism of representations  $G$  and  $g$ .

To prove the theorem we need to show that defined in the proof representation  $g'$  is congruent with representation  $g$ , and operations over transformations are congruent with corresponding operations over  ${}^*N$ .

$$\begin{aligned} g'(i(r(a)))(I(R(m))) &= I(G(r(a))(R(m))) && \text{by (2.2.35)} \\ &= I(G(t(\mathbf{j}(a)))(T(\mathbf{J}(m)))) && \text{by (2.2.17), (2.2.21)} \\ &= IT(F(\mathbf{j}(a))(\mathbf{J}(m))) && \text{by (2.2.34)} \\ &= ITJ(f(a)(m)) && \text{by (2.2.30)} \\ &= R(f(a)(m)) && \text{by (2.2.19)} \\ &= g(r(a))(R(m)) && \text{by (2.2.3)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega(G(r(a_1)), \dots, G(r(a_n)))(R(m)) &= T(\omega(F(\mathbf{j}(a_1), \dots, F(\mathbf{j}(a_n)))(\mathbf{J}(m))) \\ &= T(F(\omega(\mathbf{j}(a_1), \dots, \mathbf{j}(a_n)))(\mathbf{J}(m))) \\ &= T(F(j(\omega(a_1, \dots, a_n)))(\mathbf{J}(m))) \\ &= T(J(f(\omega(a_1, \dots, a_n))(m))) \end{aligned}$$

□

From theorem 2.2.15 it follows that we can reduce the problem of studying of morphism of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra to the case described by diagram

$$(2.2.36) \quad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{J} & M/S \\ f(a) \downarrow & & \downarrow F(j(a)) \\ M & \xrightarrow{J} & M/S \\ f \swarrow \searrow & & F \swarrow \searrow \\ A & \xrightarrow{j} & A/S \end{array}$$

**Theorem 2.2.16.** *We can supplement diagram (2.2.36) with representation  $F_1$  of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  into set  $M/S$  such that diagram*

$$(2.2.37) \quad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{J} & M/S \\ f(a) \downarrow & & \downarrow F(j(a)) \\ M & \xrightarrow{J} & M/S \\ f \swarrow \searrow & \nearrow F_1 \quad \searrow J & F \swarrow \searrow \\ A & \xrightarrow{j} & A/S \end{array}$$

*is commutative. The set of transformations of representation  $F$  and the set of transformations of representation  $F_1$  coincide.*

PROOF. To prove theorem it is enough to assume

$$F_1(a) = F(j(a))$$

Since map  $j$  is surjection, then  $\text{Im } F_1 = \text{Im } F$ . Since  $j$  and  $F$  are homomorphisms of  $\mathfrak{F}$ -algebra, then  $F_1$  is also homomorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra.  $\square$

Theorem 2.2.16 completes the series of theorems dedicated to the structure of morphism of representations  $\mathfrak{F}$ -algebra. From these theorems it follows that we can simplify task of studying of morphism of representations  $\mathfrak{F}$ -algebra and not go beyond morphism of representations of form

$$id : A \longrightarrow A \quad R : M \longrightarrow N$$

In this case we identify morphism of  $(id, R)$  representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra and map  $R$ . We will use diagram

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{R} & N \\
 f(a) \downarrow & \nearrow g & \downarrow g(a) \\
 M & \xrightarrow{R} & N \\
 f \swarrow & \nearrow g & \downarrow g(a) \\
 A & &
 \end{array}$$

to represent morphism  $(id, R)$  of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra. From diagram it follows

$$R \circ f(a) = g(a) \circ R$$

By analogy with definition 2.2.11. we give following definition.

**Definition 2.2.17.** We define category  $T \star \mathfrak{F}$   $T\star$ -representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$ .  $T\star$ -representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  are objects of this category. Morphisms  $(id, R)$  of  $T\star$ -representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  are morphisms of this category.  $\square$

### 2.3. Representation of Group

Group is among few algebras that allow somebody to consider the product of transformations of the set  $M$  in such a way that, if transformations belong to the representation, then their product also belongs to the representation. In case of group representation we can define homomorphism (2.1.1) either as

$$f(ab) = f(a) \circ f(b)$$

or as

$$f(ab) = f(b) \circ f(a)$$

We should remember that order of maps in product depends on order of maps on diagram and how these maps act over elements of the set (from left or from right).

**Definition 2.3.1.** Let  ${}^*M$  be a group and  $\delta$  be unit of group  ${}^*M$ . Let  $G$  be group. We call a homomorphism of group

$$(2.3.1) \quad f : G \rightarrow {}^*M$$

**covariant  $T\star$ -representation of group**  $G$  in set  $M$  if map  $f$  holds

$$(2.3.2) \quad f(ab)u = f(a)(f(b)u)$$

$\square$

**Remark 2.3.2.** Since map (2.3.1) is homomorphism, then

$$(2.3.3) \quad f(ab)u = (f(a)f(b))u$$

We use here convention

$$f(a)f(b) = f(a) \circ f(b)$$

Thus, the idea of covariant representation is that we multiply elements of group in the same order as we multiply transformations of representation. From equations (2.3.2) and (2.3.3) it follows

$$(2.3.4) \quad (f(a)f(b))u = f(a)(f(b)u)$$

Equation (2.3.4) together with associativity of product of transformations expresses **associative law for covariant  $T\star$ -representation**. This allows writing of equation (2.3.4) without using of brackets

$$f(ab)u = f(a)f(b)u$$

□

**Definition 2.3.3.** Let  ${}^*M$  be a group and  $\delta$  be unit of group  ${}^*M$ . Let  $G$  be group. We call an antihomomorphism of group

$$f : G \rightarrow {}^*M$$

**contravariant  $T\star$ -representation of group  $G$**  in set  $M$  if map  $f$  holds

$$(2.3.5) \quad f(ba)u = f(a)(f(b)u)$$

□

**Definition 2.3.4.** Let  $M^*$  be a group and  $\delta$  be unit of group  $M^*$ . Let  $G$  be group. We call map

$$(2.3.6) \quad f : G \rightarrow M^*$$

**covariant  $\star T$ -representation of group  $G$**  in set  $M$  if map  $f$  holds

$$(2.3.7) \quad uf(ab) = (uf(a))f(b)$$

□

**Remark 2.3.5.** Since map (2.3.6) is homomorphism, then

$$(2.3.8) \quad uf(ab) = u(f(a)f(b))$$

From equations (2.3.7) and (2.3.8) it follows

$$(2.3.9) \quad (f(a)f(b))u = (uf(a))f(b)$$

Equation (2.3.9) together with associativity of product of transformations expresses **associative law for covariant  $\star T$ -representation**. This allows writing of equation (2.3.9) without using of brackets

$$uf(ab) = uf(a)f(b)$$

□

**Definition 2.3.6.** Let  $M^*$  be a group and  $\delta$  be unit of group  $M^*$ . Let  $G$  be group. We call map

$$f : G \rightarrow M^*$$

**contravariant  $\star T$ -representation of group  $G$**  in set  $M$  if map  $f$  holds

$$(2.3.10) \quad uf(ab) = (uf(a))f(b)$$

□

**Definition 2.3.7.** We call the transformation

$$t : M \rightarrow M$$

**nonsingular transformation**, if there exists inverse map.  $\square$

**Theorem 2.3.8.** For any  $g \in G$  transformation is nonsingular and satisfies equation

$$(2.3.11) \quad f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$$

PROOF. Since (2.3.5) and

$$f(e) = \delta$$

we have

$$u = \delta(u) = f(gg^{-1})(u) = f(g)(f(g^{-1})(u))$$

This completes the proof.  $\square$

**Theorem 2.3.9.** The group operation determines two different representations on the group:

- The left or  $T\star$ -shift  $t_\star$

$$(2.3.12) \quad \begin{aligned} b' &= t_\star(a)b = ab \\ b' &= t_\star(a)(b) = ab \end{aligned}$$

is covariant  $T\star$ -representation

$$(2.3.13) \quad t_\star(ab) = t_\star(a) \circ t_\star(b)$$

- The right or  $\star T$ -shift  $\star t$

$$(2.3.14) \quad \begin{aligned} b' &= b \star t(a) = ba \\ b' &= \star t(a)(b) = ba \end{aligned}$$

is covariant  $\star T$ -representation

$$(2.3.15) \quad \star t(ab) = \star t(a) \circ \star t(b)$$

PROOF. Equation (2.3.13) follows from associativity of product

$$t_\star(ab)c = (ab)c = a(bc) = t_\star(a)(t_\star(b)c) = (t_\star(a) \circ t_\star(b))c$$

In a similar manner we prove the equation (2.3.15).  $\square$

**Theorem 2.3.10.** Let  $T\star$ -representation

$$u' = f(a)u$$

be contravariant  $T\star$ -representation. Then  $T\star$ -representation

$$u' = h(a)u = f(a^{-1})u$$

is covariant  $T\star$ -representation.

PROOF. Statement follows from chain of equations

$$h(ab) = f((ab)^{-1}) = f(b^{-1}a^{-1}) = f(a^{-1})f(b^{-1}) = h(a)h(b)$$

$\square$

**Remark 2.3.11.** If we suppose the choice of a side to place the operator of representation on is arbitrary, we can get the impression we may not go beyond exploration either  $T\star$ -representations or covariant representations. Section [5]-5.2 serves as good illustration that different forms of representation are essential. When we need to show the order of factors we will use operational notation. Theorems 2.4.12, 2.4.15 are examples when functional notation has advantage.  $\square$

**Definition 2.3.12.** Let  $f$  be  $T\star$ -representation of the group  $G$  in set  $M$ . For any  $v \in M$  we define **orbit of  $T\star$ -representation of the group  $G$**  as set

$$f(G)v = \{w = f(g)v : g \in G\}$$

 $\square$ 

Since  $f(e) = \delta$  we have  $v \in f(G)v$ .

**Theorem 2.3.13.** Suppose

$$(2.3.16) \quad v \in f(G)u$$

Then

$$f(G)u = f(G)v$$

PROOF. From (2.3.16) it follows that there exists  $a \in G$  such that

$$(2.3.17) \quad v = f(a)u$$

Suppose  $w \in f(G)v$ . Then there exists  $b \in G$  such that

$$(2.3.18) \quad w = f(b)v$$

If we substitute (2.3.17) into (2.3.18) we get

$$(2.3.19) \quad w = f(b)(f(a)u)$$

Since (2.3.2), we see that from (2.3.19) it follows that  $w \in f(G)u$ . Thus

$$f(G)v \subseteq f(G)u$$

Since (2.3.11), we see that from (2.3.17) it follows that

$$(2.3.20) \quad u = f(a)^{-1}v = f(a^{-1})v$$

From (2.3.20) it follows that  $u \in f(G)v$  and therefore

$$f(G)u \subseteq f(G)v$$

This completes the proof.  $\square$

Thus,  $T\star$ -representation  $f$  of group  $G$  in set  $M$  forms equivalence  $S$  and the orbit  $f(G)u$  is equivalence class. We will use notation  $M/f(G)$  for quotient set  $M/S$  and this set is called **space of orbits of  $T\star$ -representation  $f$** .

**Theorem 2.3.14.** Suppose  $f_1$  is  $T\star$ -representation of group  $G$  in set  $M_1$  and  $f_2$  is  $T\star$ -representation of group  $G$  in set  $M_2$ . Then we introduce **direct product of  $T\star$ -representations  $f_1$  and  $f_2$  of group**

$$\begin{aligned} f &= f_1 \times f_2 : G \rightarrow M_1 \otimes M_2 \\ f(g) &= (f_1(g), f_2(g)) \end{aligned}$$

PROOF. To show that  $f$  is a representation, it is enough to prove that  $f$  satisfies the definition 2.3.1.

$$\begin{aligned} f(e) &= (f_1(e), f_2(e)) = (\delta_1, \delta_2) = \delta \\ f(ab)u &= (f_1(ab)u_1, f_2(ab)u_2) \\ &= (f_1(a)(f_1(b)u_1), f_2(a)(f_2(b)u_2)) \\ &= f(a)(f_1(b)u_1, f_2(b)u_2) \\ &= f(a)(f(b)u) \end{aligned}$$

□

#### 2.4. Single Transitive $T\star$ -Representation of Group

**Definition 2.4.1.** We call **kernel of inefficiency of  $T\star$ -representation of group  $G$**  a set

$$K_f = \{g \in G : f(g) = \delta\}$$

□

**Theorem 2.4.2.** A kernel of inefficiency of the  $T\star$ -representation of group  $G$  is a subgroup of the group  $G$ .

PROOF. Assume  $f(a_1) = \delta$  and  $f(a_2) = \delta$ . Then

$$\begin{aligned} f(a_1a_2)u &= f(a_1)(f(a_2)u) = u \\ f(a^{-1}) &= f^{-1}(a) = \delta \end{aligned}$$

□

**Theorem 2.4.3.**  $T\star$ -representation of the group  $G$  is **effective** iff kernel of inefficiency  $K_f = \{e\}$ .

PROOF. Statement is corollary of definitions 2.1.8 and 2.4.1 and of the theorem 2.4.2. □

If an action is not effective we can switch to an effective one by changing group  $G_1 = G|K_f$  using factorization by the kernel of inefficiency. This means that we can study only an effective action.

**Definition 2.4.4.** Consider  $T\star$ -representation  $f$  of group  $G$  in set  $M$ . A **stability group** or **stability group** of  $x \in M$  is the set

$$\textcolor{blue}{G}_x = \{g \in G : f(g)x = x\}$$

$T\star$ -representation  $f$  of group  $G$  is said to be **free**, if for any  $x \in M$  stability group  $G_x = \{e\}$ . □

**Theorem 2.4.5.** Given free  $T\star$ -representation  $f$  of group  $G$  in the set  $A$ , there exist 1–1 correspondence between orbits of representation, as well between orbit of representation and group  $G$ .

PROOF. Given  $a \in A$  there exist  $g_1, g_2 \in G$

$$(2.4.1) \quad f(g_1)a = f(g_2)a$$

We multiply both parts of equation (2.4.1) by  $f(g_1^{-1})$

$$a = f(g_1^{-1})f(g_2)a$$

Since the representation is free,  $g_1 = g_2$ . Since we established 1 – 1 correspondence between orbit and group  $G$ , we proved the statement of the theorem.  $\square$

**Definition 2.4.6.** We call a space  $V$  **homogeneous space of group  $G$**  if we have single transitive  $T\star$ -representation of group  $G$  on  $V$ .  $\square$

**Theorem 2.4.7.** If we define a single transitive covariant representation  $f$  of the group  $G$  on the manifold  $A$  then we can uniquely define coordinates on  $A$  using coordinates on the group  $G$ .

If  $f$  is a covariant  $T\star$ -representation than  $f(a)$  is equivalent to the  $T\star$ -shift  $t_\star(a)$  on the group  $G$ . If  $f$  is a covariant  $\star T$ -representation than  $f(a)$  is equivalent to the  $\star T$ -shift  $\star t(a)$  on the group  $G$ .

PROOF. We select a point  $v \in A$  and define coordinates of a point  $w \in A$  as coordinates of  $a \in G$  such that  $w = f(a)v$ . Coordinates defined this way are unique up to choice of an initial point  $v \in A$  because the action is effective.

If  $f$  is a covariant  $T\star$ -representation we will use the notation

$$f(a)v = av$$

Because the notation

$$f(a)(f(b)v) = a(bv) = (ab)v = f(ab)v$$

is compatible with the group structure we see that the covariant  $T\star$ -representation  $f$  is equivalent to the  $T\star$ -shift.

If  $f$  is a covariant  $\star T$ -representation we will use the notation

$$vf(a) = va$$

Because the notation

$$(vf(b))f(a) = (vb)a = v(ba) = vf(ba)$$

is compatible with the group structure we see that the covariant  $\star T$ -representation  $f$  is equivalent to the  $\star T$ -shift.  $\square$

**Remark 2.4.8.** We will write effective  $T\star$ -covariant representation of the group  $G$  as

$$v' = t_\star(a)v = av$$

Orbit of this representation is

$$\textcolor{blue}{G}v = t_\star(G)v$$

We will use notation  $\textcolor{blue}{M}/t_\star(G)$  space of orbits of effective  $T\star$ -covariant representation of the group.  $\square$

**Remark 2.4.9.** We will write effective  $\star T$ -covariant representation of the group  $G$  as

$$v' = v \star t(a) = va$$

Orbit of this representation is

$$\textcolor{blue}{v}\textcolor{blue}{G} = v \star t(G)$$

We will use notation  $\textcolor{blue}{M}/\star t(G)$  for the space of orbits of effective  $\star T$ -covariant representation of the group.  $\square$

**Theorem 2.4.10.** Free  $T\star$ -representation is effective. Free  $T\star$ -representation  $f$  of group  $G$  in set  $M$  is single transitive representation on orbit.

PROOF. The statement of theorem is the corollary of definition 2.4.4.  $\square$

**Theorem 2.4.11.**  *$T\star$ - and  $\star T$ -shifts on group  $G$  are commuting.*

PROOF. This is the consequence of the associativity on the group  $G$

$$(t_\star(a) \circ \star t(b))c = a(cb) = (ac)b = (\star t(b) \circ t_\star(a))c$$

□

Theorem 2.4.11 can be phrased in the following way.

**Theorem 2.4.12.** *Let  $G$  be group. For any  $a \in G$ , the map  $(id, t_\star(a))$  is automorphism of representation  $\star t$ .*

PROOF. According to theorem 2.4.11

$$(2.4.2) \quad t_\star(a) \circ \star t(b) = \star t(b) \circ t_\star(a)$$

Equation (2.4.2) coincides with equation (2.2.3) from definition 2.2.2 when  $r = id$ ,  $R = t_\star(a)$ . □

**Theorem 2.4.13.** *Suppose we defined a single transitive covariant  $T\star$ -representation  $f$  of the group  $G$  on the manifold  $M$ . Then we can uniquely define a single transitive covariant  $\star T$ -representation  $h$  of the group  $G$  on the manifold  $M$  such that diagram*

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{h(a)} & M \\ \downarrow f(b) & & \downarrow f(b) \\ M & \xrightarrow{h(a)} & M \end{array}$$

is commutative for any  $a, b \in G$ .<sup>2.1</sup>

PROOF. We use group coordinates for points  $v \in M$ . Then according to theorem 2.4.7 we can write the left shift  $t_\star(a)$  instead of the transformation  $f(a)$ .

Let points  $v_0, v \in M$ . Then we can find one and only one  $a \in G$  such that

$$v = v_0a = v_0 \star t(a)$$

We assume

$$h(a) = \star t(a)$$

For some  $b \in G$  we have

$$w_0 = f(b)v_0 = t_\star(b)v_0 \quad w = f(b)v = t_\star(b)v$$

According to theorem 2.4.11 the diagram

$$(2.4.3) \quad \begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=\star t(a)} & v \\ \downarrow f(b)=t_\star(b) & & \downarrow f(b)=t_\star(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)=\star t(a)} & w \end{array}$$

is commutative.

Changing  $b$  we get that  $w_0$  is an arbitrary point of  $M$ .

We see from the diagram that if  $v_0 = v$  than  $w_0 = w$  and therefore  $h(e) = \delta$ . On other hand if  $v_0 \neq v$  then  $w_0 \neq w$  because the  $T\star$ -representation  $f$  is single transitive. Therefore the  $\star T$ -representation  $h$  is effective.

---

<sup>2.1</sup>You can see this statement in [3].

In the same way we can show that for given  $w_0$  we can find  $a$  such that  $w = h(a)w_0$ . Therefore the  $\star T$ -representation  $h$  is single transitive.

In general the product of transformations of the  $T\star$ -representation  $f$  is not commutative and therefore the  $\star T$ -representation  $h$  is different from the  $T\star$ -representation  $f$ . In the same way we can create a  $T\star$ -representation  $f$  using the  $\star T$ -representation  $h$ .  $\square$

Representations  $f$  and  $h$  are called **twin representations of the group  $G$** .

**Remark 2.4.14.** It is clear that transformations  $t_\star(a)$  and  $\star t(a)$  are different until the group  $G$  is nonabelian. However they both are maps onto. Theorem 2.4.13 states that if both  $\star T$ - and  $T\star$ -shift presentations exist on the manifold  $M$  we can define two commuting representations on the manifold  $M$ . The  $\star T$ -shift or the  $T\star$ -shift only cannot represent both types of representation. To understand why it is so let us change diagram (2.4.3) and assume  $h(a)v_0 = t_\star(a)v_0 = v$  instead of  $h(a)v_0 = v_0 \star t(a) = v$  and let us see what expression  $h(a)$  has at the point  $w_0$ . The diagram

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=t_\star(a)} & v \\ \downarrow f(b)=t_\star(b) & & \downarrow f(b)=t_\star(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

is equivalent to the diagram

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=t_\star(a)} & v \\ \uparrow f^{-1}(b)=t_\star(b^{-1}) & & \downarrow f(b)=t_\star(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

and we have  $w = bv = bav_0 = bab^{-1}w_0$ . Therefore

$$h(a)w_0 = (bab^{-1})w_0$$

We see that the representation of  $h$  depends on its argument.  $\square$

**Theorem 2.4.15.** Let  $f$  and  $h$  be twin representations of the group  $G$ . For any  $a \in G$  the map  $(id, h(a))$  is automorphism of representation  $f$ .

PROOF. The statement of theorem is corollary of theorems 2.4.12 and 2.4.13.  $\square$

## 2.5. Basis of $T\star$ -representation

**Definition 2.5.1.** Let

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

be representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$  and

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

be representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $B$  in  $\mathfrak{H}$ -algebra  $N$ . Tuple of mapping  $(h, H)$

$$(2.5.1) \quad h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

such, that  $h$  is homomorphism of  $\mathfrak{F}$ -algebra,  $H$  is homomorphism of  $\mathfrak{H}$ -algebra and  $(h, H)$  is morphism of representations of algebra of type  $\mathfrak{F}$  is called **morphism of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra in  $\mathfrak{H}$ -algebra**.  $\square$

**Definition 2.5.2.** Let

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

be representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$ . The set  $N \subset M$  is called **stable set of representation  $f$** , if  $f(a)(m) \in N$  for each  $a \in A$ ,  $m \in N$ .  $\square$

We also say that the set  $M$  is stable with respect to the representation  $f$ .

**Theorem 2.5.3.** Let

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

be representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$ . Let set  $N \subset M$  be subalgebra of  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$  and stable set of representation  $f$ . Then there exists representation

$$f_N : A \rightarrow {}^*N$$

such that  $f_N(a) = f(a)|_N$ . Representation  $f_N$  is called **subrepresentation of representation  $f$** .

PROOF. Let  $\omega_1$  be  $n$ -ary operation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$ . Then for each  $a_1, \dots, a_n \in A$  and each  $b \in N$

$$\begin{aligned} \omega_1(f_N(a_1), \dots, f_N(a_n))(b) &= \omega_1(f(a_1), \dots, f(a_n))(b) \\ &= f(\omega_1(a_1, \dots, a_n))(b) \\ &= f_N(\omega_1(a_1, \dots, a_n))(b) \end{aligned}$$

Let  $\omega_2$  be  $n$ -ary operation of  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$ . Then for each  $b_1, \dots, b_n \in N$  and each  $a \in A$

$$\begin{aligned} \omega_2(f_N(a)(b_1), \dots, f_N(a)(b_n)) &= \omega_2(f(a)(b_1), \dots, f(a)(b_n)) \\ &= f(a)(\omega_2(b_1, \dots, b_n)) \\ &= f_N(a)(\omega_2(b_1, \dots, b_n)) \end{aligned}$$

We proved the statement of theorem.  $\square$

From the theorem 2.5.3, it follows that if  $f_N$  is subrepresentation of representation  $f$ , then the map  $(id : A \rightarrow A, id_N : N \rightarrow M)$  is morphism of representations.

**Theorem 2.5.4.** The set<sup>2.2</sup>  $\mathcal{B}_f$  of all subrepresentations of representation  $f$  generates a closure system on  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$  and therefore is a complete lattice.

PROOF. Let  $(K_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  be the set off subalgebras of  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$  that are stable with respect to representation  $f$ . We define the operation of intersection on the set  $\mathcal{B}_f$  according to rule

$$\bigcap f_{K_\lambda} = f_{\cap K_\lambda}$$

We difined the operation of intersection of subrepresentations properly.  $\cap K_\lambda$  is subalgebra of  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$ . Let  $m \in \cap K_\lambda$ . For each  $\lambda \in \Lambda$  and for each  $a \in A$ ,  $f(a)(m) \in K_\lambda$ . Therefore,  $f(a)(m) \in \cap K_\lambda$ . Therefore,  $\cap K_\lambda$  is the stable set of representation  $f$ .  $\square$

---

<sup>2.2</sup>This definition is similar to definition of the lattice of subalgebras ([10], p. 79, 80)

We denote the corresponding closure operator by  $J_f$ . Thus  $J_f(X)$  is the intersection of all subalgebras of  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$  containing  $X$  and stable with respect to representation  $f$ .

**Theorem 2.5.5.** *Let<sup>2.3</sup>*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

be representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$ . Let  $X \subset M$ . Define a subset  $X_k \subset M$  by induction on  $k$ .

$$\begin{aligned} X_0 &= X \\ x \in X_k &\Rightarrow x \in X_{k+1} \\ x_1 \in X_k, \dots, x_n \in X_k, \omega \in \mathfrak{H}(n) &\Rightarrow \omega(x_1, \dots, x_n) \in X_{k+1} \\ x \in X_k, a \in A &\Rightarrow f(a)(x) \in X_{k+1} \end{aligned}$$

Then

$$\bigcup_{k=0}^{\infty} X_k = J_f(X)$$

PROOF. If we put  $U = \cup X_k$ , then by definition of  $X_k$ , we have  $X_0 \subset J_f(X)$ , and if  $X_k \subset J_f(X)$ , then  $X_{k+1} \subset J_f(X)$ . By induction it follows that  $X_k \subset J_f(X)$  for all  $k$ . Therefore,

$$(2.5.2) \quad U \subset J_f(X)$$

If  $a \in U^n$ ,  $a = (a_1, \dots, a_n)$ , where  $a_i \in X_{k_i}$ , and if  $k = \max\{k_1, \dots, k_n\}$ , then  $\omega(a_1, \dots, a_n) \in X_{k+1} \subset U$ . Therefore,  $U$  is subalgebra of  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$ .

If  $m \in U$ , then there exists such  $k$  that  $m \in X_k$ . Therefore,  $f(a)(m) \in X_{k+1} \subset U$  for any  $a \in A$ . Therefore,  $U$  is stable set of the representation  $f$ .

Since  $U$  is subalgebra of  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$  and is a stable set of the representation  $f$ , then subrepresentation  $f_U$  is defined. Therefore,

$$(2.5.3) \quad J_f(X) \subset U$$

From (2.5.2), (2.5.3), it follows that  $J_f(X) = U$ . □

$J_f(X)$  is called **subrepresentation generated by set  $X$** , and  $X$  is a **generating set of subrepresentation  $J_f(X)$** . In particular, a **generating set of representation  $f$**  is a subset  $X \subset M$  such that  $J_f(X) = M$ .

**Definition 2.5.6.** Let  $X \subset M$  be generating set of representation

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

Let the map

$$(h : A \rightarrow A, H : M \rightarrow M)$$

is automorphism of the representation  $f$ . Let the set  $X' = HX$  be the image of the set  $X$  under the map  $H$ . Automorphism  $(h, H)$  of representation  $f$  is called **regular on generating set  $X$** , if the set  $X'$  is the generating set of representation  $f$ . Otherwise, automorphism of representation  $(h, H)$  is called **singular on generating set  $X$** , □

**Definition 2.5.7.** Automorphism of representation  $f$  is called **regular**, if it is regular on every generating set. □

---

<sup>2.3</sup>The statement of theorem is similar to the statement of theorem 5.1, [10], p. 79.

**Theorem 2.5.8.** *Product of regular automorphisms of representation is regular automorphism of representation.*

PROOF. From theorem 2.2.10, it follows that the product of automorphisms  $(p, P)$ ,  $(r, R)$  of the representation

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

is automorphism  $(pr, PR)$  of the representation  $f$ . Let  $X$  be generating set of representation  $f$ . According to definition 2.5.6,  $R(X)$ ,  $(PR)(X) = P(R(X))$  are generating sets of representation  $f$ .  $\square$

It is easy to see that the definition of generating set of representation does not depend on whether representation is effective or not. For this reason hereinafter we will assume that the representation is effective and we will use convention for effective  $T\star$ -representation in remark 2.1.9. From theorem 2.5.5, it follows that if the generating set  $X$  is given, then we can represent each element of the set  $M$  as  $\mathfrak{H}$ -word defined according to following rule.

- If  $m \in X$ , then  $m$  is  $\mathfrak{H}$ -word.
- If  $m_1, \dots, m_n$  are  $\mathfrak{H}$ -words and  $\omega \in \mathfrak{H}(n)$ , then  $m_1 \dots m_n \omega$  is  $\mathfrak{H}$ -word.
- If  $m$  is  $\mathfrak{H}$ -word and  $a \in A$ , then  $am$  is  $\mathfrak{H}$ -word.

Representation of  $m \in M$  in form of  $\mathfrak{H}$ -word is ambiguous. If  $m_1, \dots, m_n$  are  $\mathfrak{H}$ -words,  $\omega \in \mathfrak{H}(n)$  and  $a \in A$ , then  $\mathfrak{H}$ -words  $am_1 \dots m_n \omega$  and  $am_1 \dots am_n \omega$  describe the same element of  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$ . It is possible that there exist equations related to specific character of representation. For instance, if  $\omega$  is operation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  and operation of  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$ , then we require that  $\mathfrak{H}$ -words  $a_1 \dots a_n \omega x$  and  $a_1 x \dots a_n x \omega$  describe the same element of  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$ .

Listed above equations determine equivalence  $r_{\mathfrak{H}}$  on the set of  $\mathfrak{H}$ -words  $M_{\mathfrak{H}}$ . Quotient  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M_{\mathfrak{H}}/r_{\mathfrak{H}}$  coincide with  $\mathfrak{H}$ -algebra  $M$ .

In general, representation of arbitrary element  $m \in M$  of set  $M_{\mathfrak{H}}/r_{\mathfrak{H}}$  is ambiguous. If the generating set  $X$  is such that representation of the element  $m \in M$  in set  $M_{\mathfrak{H}}/r_{\mathfrak{H}}$  is unique, then the set  $X$  is called **basis of representation  $f$** .

Let representation  $f$  have basis  $X$ . In general, in contrast to vector space there is no simple mechanism that for given point allow to find the most simple form of  $\mathfrak{H}$ -word relative to given basis or to show corresponding equivalence class. For this reason we just select some  $\mathfrak{H}$ -word that represent given element  $m \in M$  and selected  $\mathfrak{H}$ -word  $w(m, X)$  is called **coordinates of element  $m$  relative to basis  $X$** .

Let  $X, X'$  be bases of representation  $f$ . If we consider the basis  $X'$  as the set of points of  $\mathfrak{H}$ -algebra, then the set  $w(X', X) = \{w(x, X) : x \in X'\}$  is called **coordinates of basis  $X'$  relative to basis  $X$** .

Let us consider the set  $\mathcal{B}$  of basises of representation  $f$ . We are not interesting about internal structure of basis and we consider basis as point of set  $\mathcal{B}$ .

According to definitions 2.5.6, 2.5.7, regular automorphism of representation  $f$  maps the generating set of the representation into the generating set of the representation. Therefore, regular automorphism of representation  $f$  forms transformation of the set of generating sets.

In particular, regular automorphism of representation  $f$  maps the basis of representation into the generating set. However, it is not follow from this that an image of basis is basis of representation. We assume that we determined some constrains

on the set of representations such way that regular automorphism maps basis of representation into basis. In the frame of this constrain, regular automorphism of representation  $f$  forms transformation of the set of basises. This transformation is called **active**.

### 2.6. Few Applications of Basis of Representation

**Example 2.6.1.** The most popular example is the basis of vector space. A linear combination of vectors is  $\mathfrak{H}$ -word. Since there exists algorithm to solve the system of linear equations over fields and division rings, we can answer following questions.

- Does vector  $\bar{a}$  belong to vector subspace generated by given vectors?
- Is given set of vectors a generating set of vector space?
- Is given set of vectors a basis?

□

**Example 2.6.2.** Let  $G$  be Abelian group, and  $M$  be a set. Let us consider effective representation of group  $G$  on the set  $M$ . For given  $a \in G$ ,  $A \in M$  we assume  $A \rightarrow A + a$ . We also use notation  $a = \vec{AB}$  if  $B = A + a$ . Then we can represent action of group as  $B = A + \vec{AB}$ . We can select for basis of the representation the set of points such that one and only one points belongs to each orbit. □

## CHAPTER 3


# Tower of Representations of $\mathfrak{F}$ -Algebras

### 3.1. Tower of Representations of $\mathfrak{F}$ -Algebras

Let us consider set of  $\mathfrak{F}_i$ -algebras  $A_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Assume  $\overline{A} = (A_1, \dots, A_n)$ . Assume  $\overline{f} = (f_{1,2}, \dots, f_{n-1,n})$ .

**Definition 3.1.1.** Let us consider set of  $\mathfrak{F}_i$ -algebras  $A_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Set of representations  $f_{i,i+1}$ ,  $i = 1, \dots, n-1$ , of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra  $A_i$  in  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -algebra  $A_{i+1}$  is called **tower  $(\overline{A}, \overline{f})$  of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebras**.  $\square$

Let us consider following diagram for the purposes of illustration of definition 3.1.1



$f_{i,i+1}$  is representation of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra  $A_i$  in  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -algebra  $A_{i+1}$ .  $f_{i+1,i+2}$  is representation of  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -algebra  $A_{i+1}$  in  $\mathfrak{F}_{i+2}$ -algebra  $A_{i+2}$ .

**Theorem 3.1.2. Map**

$$f_{i,i+2} : A_i \rightarrow {}^* A_{i+2}$$

is representation of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra  $A_i$  in  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -algebra  ${}^* A_{i+2}$ .

**PROOF.** Automorphism  $f_{i+1,i+2}(a_{i+1}) \in {}^* A_{i+2}$  corresponds to arbitrary  $a_{i+1} \in A_{i+1}$ . Automorphism  $f_{i,i+1}(a_i) \in {}^* A_{i+1}$  corresponds to arbitrary  $a_i \in A_i$ . Since  $f_{i,i+1}(a_i)(a_{i+1}) \in A_{i+1}$  is image of  $a_{i+1} \in A_{i+1}$ , then element  $a_i \in A_i$  generates transformation of  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -algebra  ${}^* A_{i+2}$  which is defined by equation

$$(3.1.2) \quad f_{i,i+2}(a_i)(f_{i+1,i+2}(a_{i+1})) = f_{i+1,i+2}(f_{i,i+1}(a_i)(a_{i+1}))$$

Let  $\omega$  be  $n$ -ary operation of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra. Because  $f_{i,i+1}$  is homomorphism of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra, then

$$(3.1.3) \quad f_{i,i+1}(\omega(a_{i,1}, \dots, a_{i,n})) = \omega(f_{i,i+1}(a_{i,1}), \dots, f_{i,i+1}(a_{i,n}))$$

For  $a_i, \dots, a_n \in A_i$  we define operation  $\omega$  on the set  ${}^*A_{i+2}$  using equations

$$\begin{aligned} (3.1.4) \quad & \omega(f_{i,i+2}(a_{i,1})(f_{i+1,i+2}(a_{i+1})), \dots, f_{i,i+2}(a_{i,n})(f_{i+1,i+2}(a_{i+1}))) \\ & = \omega(f_{i+1,i+2}(f_{i,i+1}(a_{i,1})(a_{i+1})), \dots, f_{i+1,i+2}(f_{i,i+1}(a_{i,n})(a_{i+1}))) \\ & = f_{i+1,i+2}(\omega(f_{i,i+1}(a_{i,1}), \dots, f_{i,i+1}(a_{i,n}))(a_{i+1})) \end{aligned}$$

First equation follows from equation (3.1.2). We wrote second equation on the base of demand that map  $f_{i+1,i+2}$  is homomorphism of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra. Therefore, we defined the structure of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra on the set  ${}^*A_{i+2}$ .

From (3.1.4) and (3.1.3) it follows that

$$\begin{aligned} (3.1.5) \quad & \omega(f_{i,i+2}(a_{i,1})(f_{i+1,i+2}(a_{i+1})), \dots, f_{i,i+2}(a_{i,n})(f_{i+1,i+2}(a_{i+1}))) \\ & = f_{i+1,i+2}(f_{i,i+1}(\omega(a_{i,1}, \dots, a_{i,n}))(a_{i+1})) \\ & = f_{i,i+2}(\omega(a_{i,1}, \dots, a_{i,n}))(f_{i+1,i+2}(a_{i+1})) \end{aligned}$$

From equation (3.1.5) it follows that

$$\omega(f_{i,i+2}(a_{i,1}), \dots, f_{i,i+2}(a_{i,n})) = f_{i,i+2}(\omega(a_{i,1}, \dots, a_{i,n}))$$

Therefore, the map  $f_{i,i+2}$  is homomorphism of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra. Therefore, the map  $f_{i,i+2}$  is  $T\star$ -representation of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra  $A_i$  in  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -algebra  ${}^*A_{i+2}$ .  $\square$

**Theorem 3.1.3.**  $(id, f_{i+1,i+2})$  is morphism of  $T\star$ -representations of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra from  $f_{i,i+1}$  into  $f_{i,i+2}$ .

PROOF. Let us consider diagram (3.1.1) in more detail.

$$\begin{array}{ccc} A_{i+1} & \xrightarrow{f_{i+1,i+2}} & {}^*A_{i+2} \\ f_{i,i+1}(a_i) \downarrow & & \downarrow f_{i,i+2}(a_i) \\ A_{i+1} & \xrightarrow{f_{i+1,i+2}} & {}^*A_{i+2} \\ f_{i,i+1} \swarrow & & \searrow f_{i,i+2} \\ A_i & \xrightarrow{id} & A_i \end{array}$$

(1)

The statement of theorem follows from equation (3.1.2) and definition 2.2.2.  $\square$

**Definition 3.1.4.** Let us consider the tower of representations

$$((A_1, A_2, A_3), (f_{1,2}, f_{2,3}))$$

The map  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$  is called **representation of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra  $A_i$  in representation  $f_{i+1,i+2}$** .  $\square$

**Definition 3.1.5.** Let us consider the tower of representations

$$((A_1, \dots, A_k), (f_{1,2}, \dots, f_{k-1,k}))$$

The map  $(f_{1,2}, \dots, f_{1,k})$  is called **representation of  $\mathfrak{F}_1$ -algebra  $A_1$  in tower of representations**

$$((A_2, \dots, A_k), (f_{2,3}, \dots, f_{k-1,k}))$$

□

### 3.2. Morphism of Tower of $T^*$ -Representations

**Definition 3.2.1.** Let us consider the set of  $\mathfrak{F}_i$ -algebras  $A_i, B_i, i = 1, \dots, n$ . The set of maps  $(h_1, \dots, h_n)$  is called **morphism from tower of  $T^*$ -representations  $(\bar{A}, \bar{f})$  into tower of  $T^*$ -representations  $(\bar{B}, \bar{g})$** , if for any  $i, i = 1, \dots, n - 1$ , the tuple of maps  $(h_i, h_{i+1})$  is morphism of  $T^*$ -representations from  $f_{i,i+1}$  into  $g_{i,i+1}$ . □

For any  $i, i = 1, \dots, n - 1$ , we have diagram

$$(3.2.1) \quad \begin{array}{ccc} A_{i+1} & \xrightarrow{h_{i+1}} & B_{i+1} \\ f_{i,i+1}(a_i) \downarrow & \nearrow (1) & \downarrow g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(\textcolor{red}{a}_i)) \\ A_i & \xrightarrow{h_i} & B_i \\ f_{i,i+1} \nearrow & & \downarrow g_{i,i+1} \\ A_i & \xrightarrow{h_{i+1}} & B_{i+1} \end{array}$$

Equation

$$(3.2.2) \quad h_{i+1} \circ \textcolor{blue}{f}_{i,i+1}(a_i) = g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(\textcolor{red}{a}_i)) \circ h_{i+1}$$

expresses commutativity of diagram (1). However for morphism  $(h_i, h_{i+1}), i > 1$ , diagram (3.2.1) is not complete. Assuming similar diagram for morphism  $(h_i, h_{i+1})$ , this diagram on the top layer has form

$$(3.2.3) \quad \begin{array}{ccccc} A_{i+2} & \xrightarrow{h_{i+2}} & B_{i+2} & & \\ f_{23}(f_{12}(a_i)a_{i+1}) \swarrow & & \searrow g_{23}(g_{12}(a_i)h_{i+1}(a_{i+1})) & & \\ & A_{i+2} & \xrightarrow{h_{i+2}} & B_{i+2} & \\ f_{i,i+2}(a_i) \downarrow & \xrightarrow{F} & \downarrow g_{i,i+2}(h_i(a_i)) & & \\ A_{i+2} & \xrightarrow{h_{i+2}} & B_{i+2} & & \\ f_{23}(a_{i+1}) \swarrow & h_{i+2} & \searrow g_{23}(h_{i+1}(a_{i+1})) & & \end{array}$$

Unfortunately, the diagram (3.2.3) is not too informative. It is evident that there exists morphism from  ${}^*A_{i+2}$  into  ${}^*B_{i+2}$ , mapping  $f_{i,i+2}(a_i)$  into  $g_{i,i+2}(h_i(a_i))$ . However, the structure of this morphism is not clear from the diagram. We need consider map from  ${}^*A_{i+2}$  into  ${}^*B_{i+2}$ , like we have done this in theorem 3.1.3.

**Theorem 3.2.2.** Since  $T^*$ -representation  $f_{i+1,i+2}$  is effective, then  $(h_i, {}^*h_{i+2})$  is morphism of  $T^*$ -representations from  $T^*$ -representation  $f_{i,i+2}$  into  $T^*$ -representation  $g_{i,i+2}$  of  $\mathfrak{F}_i$ -algebra.

PROOF. Let us consider the diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 A_{i+1} & \xrightarrow{h_{i+1}} & B_{i+1} & & \\
 \downarrow f_{i+1,i+2} & \searrow & \downarrow & \nearrow g_{i+1,i+2} & \\
 & *A_{i+2} & \xrightarrow{*h_{i+2}} & *B_{i+2} & \\
 \downarrow f_{i,i+2}(a_i) & \downarrow & \downarrow g_{i,i+2}(\textcolor{red}{h}_i(a_i)) & \downarrow & \downarrow g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(a_i)) \\
 & (2) & & & \\
 & \downarrow & & & \\
 & *A_{i+2} & \xrightarrow{*h_{i+2}} & *B_{i+2} & \\
 \downarrow f_{i+1,i+2} & \nearrow & \downarrow & \nearrow g_{i+1,i+2} & \\
 A_{i+1} & \xrightarrow{h_{i+1}} & B_{i+1} & &
 \end{array}$$

The existence of map  $*h_{i+2}$  and commutativity of the diagram (2) and (3) follows from effectiveness of map  $f_{i+1,i+2}$  and theorem 2.2.6. Commutativity of diagrams (4) and (5) follows from theorem 3.1.3.

From commutativity of the diagram (4) it follows that

$$(3.2.4) \quad f_{i+1,i+2} \circ f_{i,i+1}(a_i) = f_{i,i+2}(a_i) \circ f_{i+1,i+2}$$

From equation (3.2.4) it follows that

$$(3.2.5) \quad *h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2} \circ f_{i,i+1}(a_i) = *h_{i+2} \circ f_{i,i+2}(a_i) \circ f_{i+1,i+2}$$

From commutativity of diagram (3) it follows that

$$(3.2.6) \quad *h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2} = g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1}$$

From equation (3.2.6) it follows

$$(3.2.7) \quad *h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2} \circ f_{i,i+1}(a_i) = g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1} \circ f_{i,i+1}(a_i)$$

From equations (3.2.5) and (3.2.7) it follows that

$$(3.2.8) \quad *h_{i+2} \circ f_{i,i+2}(a_i) \circ f_{i+1,i+2} = g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1} \circ f_{i,i+1}(a_i)$$

From commutativity of the diagram (5) it follows that

$$(3.2.9) \quad g_{i+1,i+2} \circ g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(a_i)) = g_{i,i+2}(\textcolor{red}{h}_i(a_i)) \circ g_{i+1,i+2}$$

From equation (3.2.9) it follows that

$$(3.2.10) \quad g_{i+1,i+2} \circ g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(a_i)) \circ h_{i+1} = g_{i,i+2}(\textcolor{red}{h}_i(a_i)) \circ g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1}$$

From commutativity of the diagram (2) it follows that

$$(3.2.11) \quad *h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2} = g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1}$$

From equation (3.2.11) it follows that

$$(3.2.12) \quad g_{i,i+2}(\textcolor{red}{h}_i(a_i)) \circ *h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2} = g_{i,i+2}(\textcolor{red}{h}_i(a_i)) \circ g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1}$$

From equations (3.2.10) and (3.2.12) it follows that

$$(3.2.13) \quad g_{i+1,i+2} \circ g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(a_i)) \circ h_{i+1} = g_{i,i+2}(\textcolor{red}{h}_i(a_i)) \circ *h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2}$$

External diagram is diagram (3.2.1) when  $i = 1$ . Therefore, external diagram is commutative

$$(3.2.14) \quad h_{i+1} \circ f_{i,i+1}(a_i) = g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h_i(a_i)}) \circ h_{i+1}$$

From equation (3.2.14) it follows that

$$(3.2.15) \quad g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1} \circ f_{i,i+1}(a_i) = g_{i+1,i+2} \circ g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h_i(a_i)}) \circ h_{i+1}(a_{i+1})$$

From equations (3.2.8), (3.2.13) and (3.2.15) it follows that

$$(3.2.16) \quad {}^*h_{i+2} \circ f_{i,i+2}(a_i) \circ f_{i+1,i+2} = g_{i,i+2}(\textcolor{red}{h_i(a_i)}) \circ {}^*h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2}$$

Because the map  $f_{i+1,i+2}$  is injection, then from equation (3.2.16) it follows that

$$(3.2.17) \quad {}^*h_{i+2} \circ f_{i,i+2}(a_i) = g_{i,i+2}(\textcolor{red}{h_i(a_i)}) \circ {}^*h_{i+2}$$

From equation (3.2.17) commutativity of the diagram (1) follows. This proves the statement of theorem.  $\square$

Theorems 3.1.3 and 3.2.2 are true for any layer of tower of  $T\star$ -representations. In each particular case we need properly show sets and direction of the map. Meaning of given theorems is that all maps in tower of  $T\star$ -representations act coherently.

The theorem 3.2.2 states that unknown map on the diagram (3.2.3) is the map  ${}^*h_{i+2}$ .

### 3.3. Basis of Tower of Representations

**Definition 3.3.1.** Tower of  $T\star$ -representations  $(\overline{A}, \overline{f})$ . is called **effective**, if for any  $i$  the representation  $f_{i,i+1}$  is effective.  $\square$

**Theorem 3.3.2.** Let us consider the tower of  $T\star$ -representations  $(\overline{A}, \overline{f})$ . Let representations  $f_{i,i+1}, \dots, f_{i+k-1,i+k}$  be effective. Then representation  $f_{i,i+k}$  is effective.

PROOF. We will prove the statement of theorem by induction.

Let representations  $f_{i,i+1}, f_{i+1,i+2}$  be effective. Assume that transformation  $\textcolor{blue}{f}_{i,i+1}(a_i)$  is not identity transformation. Than there exists  $a_{i+1} \in A_{i+1}$  such that  $\textcolor{red}{f}_{i,i+1}(a_i)(a_{i+1}) \neq a_{i+1}$ . Because the representation  $f_{i+1,i+2}$  is effective, then transformations  $\textcolor{blue}{f}_{i+1,i+2}(a_{i+1})$  and  $\textcolor{blue}{f}_{i+1,i+2}(\textcolor{red}{f}_{i,i+1}(a_i)(a_{i+1}))$  do not coincide. According to construction in theorem 3.1.2, the transformation  $\textcolor{blue}{f}_{i,i+2}(a_i)$  is not identity transformation.

Assume the statement of theorem is true for  $k - 1$  representations. Let  $f_{i,i+1}, \dots, f_{i+k-1,i+k}$  be effective. According assumption of induction, representations  $f_{i,i+k-1}, f_{i+k-1,i+k}$  are effective. According to proven above, the representation  $f_{i,i+k}$  is effective.  $\square$

We construct the basis of representation of  $\mathfrak{F}_1$ -algebra  $A_1$  in the tower of representations in a similar way that we constructed the basis of representation in the section 2.5. We consider here representation of  $\mathfrak{F}_1$ -algebra  $A_1$  in representation  $f_{2,3}$ , keeping in mind that we can do similar construction to find basis of representation of  $\mathfrak{F}_1$ -algebra in tower of representations.

We will write elements of representation  $f_{2,3}$  as tuple  $(a_2, a_3)$ , where  $a_2 \in A_2$ ,  $a_3 \in A_3$ . We can interpret this record as

$$(a_2, a_3) = f_{2,3}(a_2)(a_3)$$

At the same time this record has additional meaning. For instance, in affine space,  $a_3$  is a point of space,  $a_2$  is a vector that determine the transformation of paralel

transfer. Thus, we can interpret a tuple  $(a_2, a_3)$  either as vector  $a_2$  with tail in point  $a_3$ , or as head of this vector.

**Definition 3.3.3.** Let  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$  be representation of  $\mathfrak{F}_1$ -algebra  $A_1$  in representation  $f_{2,3}$ . The tuple of sets  $N_* = (N_2 \subset A_2, N_3 \subset A_3)$  is called **tuple of stable sets of representation**  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ , if  $f_{1,2}(a_1)(a_2) \in N_2$ ,  $f_{2,3}(a_2)(a_3) \in N_3$  for every  $a_1 \in A_1, a_2 \in N_2, a_3 \in N_3$ .  $\square$

We also will say that tuple of sets  $N_* = (N_2 \subset A_2, N_3 \subset A_3)$  is stable relative to representation  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ .

**Theorem 3.3.4.** Let  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$  be representation of  $\mathfrak{F}_1$ -algebra  $A_1$  in representation  $f_{2,3}$ . Let set  $N_2 \subset A_2$  be subalgebra of  $\mathfrak{F}_2$ -algebra  $A_2$ . Let set  $N_3 \subset A_3$  be subalgebra of  $\mathfrak{F}_3$ -algebra  $A_3$ . Let tuple of sets  $N_* = (N_2 \subset A_2, N_3 \subset A_3)$  be stable relative to representation  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ . Then there exists representation

$$((A_1, N_2, N_3), (f_{N_*,1,2}, f_{N_*,2,3}))$$

such that

$$f_{N_*,1,2}(a_1) = f_{1,2}(a_1)|_{N_2} \quad f_{N_*,2,3}(a_2) = f_{2,3}(a_2)|_{N_3}$$

The representation  $(f_{N_*,1,2}, f_{N_*,2,3})$  is called **subrepresentation of representation**  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ .

PROOF. Let  $\omega_{k,1}$  be  $n$ -ary operation of  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $A_k$ ,  $k = 1, 2$ . Than for any  $a_{k,1}, \dots, a_{k,n} \in N_k$ <sup>3.1</sup> and any  $a_{k+1} \in N_{k+1}$

$$\begin{aligned} & \omega_{k,1}(f_{N_*,k,k+1}(a_{k,1}), \dots, f_{N_*,k,k+1}(a_{k,n}))(a_{k+1}) \\ &= \omega_{k,1}(f_{k,k+1}(a_{k,1}), \dots, f_{k,k+1}(a_{k,n}))(a_{k+1}) \\ &= f_{k,k+1}(\omega_{k,1}(a_{k,1}, \dots, a_{k,n}))(a_{k+1}) \\ &= f_{N_*,k,k+1}(\omega_{k,1}(a_{k,1}, \dots, a_{k,n}))(a_{k+1}) \end{aligned}$$

Let  $\omega_{k,2}$  be  $n$ -ary operation of  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $A_k$ ,  $k = 2, 3$ . Than for any  $a_{k,1}, \dots, a_{k,n} \in N_k$  and any  $a_{k-1} \in N_{k-1}$

$$\begin{aligned} & \omega_{k,2}(f_{N_*,k-1,k}(a_{k-1})(a_{k,1}), \dots, f_{N_*,k-1,k}(a_{k-1})(a_{k,n})) \\ &= \omega_{k,2}(f_{k-1,k}(a_{k-1})(a_{k,1}), \dots, f_{k-1,k}(a_{k-1})(a_{k,n})) \\ &= f_{k-1,k}(a_{k-1})(\omega_{k,2}(a_{k,1}, \dots, a_{k,n})) \\ &= f_{N_*,k-1,k}(a_{k-1})(\omega_{k,2}(a_{k,1}, \dots, a_{k,n})) \end{aligned}$$

We proved the statement of theorem.  $\square$

From theorem 3.3.4, it follows that if map  $(f_{N_*,1,2}, f_{N_*,2,3})$  is subrepresentation of representation  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ , then map

$$(id : A_1 \rightarrow A_1, id_2 : N_2 \rightarrow A_2, id_3 : N_3 \rightarrow A_3)$$

is morphism of towers of representations.

**Theorem 3.3.5.** The set<sup>3.2</sup>  $\mathcal{B}_{f_*}$  of all subrepresentations of representation  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ , generates a closure system on representation  $f_{2,3}$  and therefore is a complete lattice.

<sup>3.1</sup>Assume  $N_1 = A_1$ .

<sup>3.2</sup>This definition is similar to definition of the lattice of subalgebras ([10], p. 79, 80)

PROOF. Let for given  $\lambda \in \Lambda$ ,  $K_{\lambda,k}$ ,  $k = 2, 3$ , be subalgebra of  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $A_k$  that is stable relative to representation  $f_{k-1,k}$ . We determine the operation of intersection on the set  $\mathcal{B}_{f_*}$  according to rule

$$\begin{aligned} \bigcap f_{(K_{\lambda,*}),2,3} &= f_{(\cap K_{\lambda,*}),2,3} \\ \bigcap K_{\lambda,*} &= \left( K_1 = A_1, K_2 = \bigcap K_{\lambda,2}, K_3 = \bigcap K_{\lambda,3} \right) \end{aligned}$$

$\cap K_{\lambda,k}$  is subalgebra of  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $A_k$ . Let  $a_k \in \cap K_{\lambda,k}$ . For any  $\lambda \in \Lambda$  and for any  $a_{k-1} \in K_{k-1}$ ,

$$f_{k-1,k}(a_{k-1})(a_k) \in K_{\lambda,k}$$

Therefore,

$$f_{k-1,k}(a_{k-1})(a_k) \in K_k$$

Repeating this construction in the order of increment  $k$ ,  $k = 2, 3$ , we see that  $(K_2, K_3)$  is tuple of stable sets of representation  $f_*$ . Therefore, we determined the operation of intersection of subrepresentations properly.  $\square$

We denote the corresponding closure operator by  $J_{f_*}$ . If we denote  $X_*$  the tuple of sets

$$(X_2 \subset A_2, X_3 \subset A_3)$$

then  $J_{f_*}(X_*)$  is the intersection of all tuples  $(K_2, K_3)$  stable with respect to representation  $f_*$  and such that for  $k = 2, 3$ ,  $K_k$  is subalgebra of  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $A_k$  containing  $X_k$ .

**Theorem 3.3.6.** *Let<sup>3.3</sup>  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$  be representation of  $\mathfrak{F}_1$ -algebra  $A_1$  in representation  $f_{2,3}$ . Let  $X_k \subset A_k$ ,  $k = 2, 3$ . Assume  $Y_1 = A_1$ . Step by step increasing the value of  $k$ ,  $k = 2, 3$ , we define a subsets  $X_{k,m} \subset A_k$  by induction on  $m$ .*

$$\begin{aligned} X_{k,0} &= X_k \\ x \in X_{k,m} &\Rightarrow x \in X_{k,m+1} \\ x_1 \in X_{k,m}, \dots, x_n \in X_{k,m}, \omega \in \mathfrak{F}_k(n) &\Rightarrow \omega(x_1, \dots, x_n) \in X_{k,m+1} \\ x_k \in X_{k,m}, x_{k-1} \in Y_{k-1} &\Rightarrow f_{k-1,k}(x_{k-1})(x_k) \in X_{k,m+1} \end{aligned}$$

For each value of  $k$ , we assume

$$Y_k = \bigcup_{m=0}^{\infty} X_{k,m}$$

Then

$$Y_* = (Y_2, Y_3) = J_{f_*}(X_*)$$

PROOF. For each value of  $k$  the proof of the theorem coincides with the proof of theorem 2.5.5. Because to define stable subset of  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $A_k$  we need only certain stable subset of  $\mathfrak{F}_{k-1}$ -algebra  $A_{k-1}$ , we have to find stable subset of  $\mathfrak{F}_{k-1}$ -algebra  $A_{k-1}$  before we do this in  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $A_k$ .  $\square$

---

<sup>3.3</sup>The statement of theorem is similar to the statement of theorem 5.1, [10], p. 79.

$J_{f_*}(X_*)$  is called **subrepresentation of representation  $f_*$**  generated by **tuple of sets  $X_*$** , and  $X_*$  is a **generating tuple of subrepresentation  $J_{f_*}(X_*)$** . In particular, a **generating tuple of representation  $f_*$**  is a tuple  $(X_2 \subset A_2, X_3 \subset A_3)$  such that  $J_{f_*}(X_2, X_3) = (A_2, A_3)$ .

It is easy to see that definition of the generating tuple of representation does not depend on whether representation is effective or not. For this reason hereinafter we will assume that the representation is effective and we will use convention for effective  $T\star$ -representation in remark 2.1.9.

From theorem 3.3.6, it follows that for given generating tuple  $(X_2, X_3)$ , we can write any element of representation  $f_{2,3}$  as tuple  $(\mathfrak{F}_2, \mathfrak{F}_3)$ -words defined according to following rule.

- If  $a_1 \in A_1$ , then  $a_1$  is  $\mathfrak{F}_1$ -word.
- If  $a_k \in X_k$ ,  $k = 2, 3$ , then  $a_k$  is  $\mathfrak{F}_k$ -word.
- If  $a_{k,1}, \dots, a_{k,n}$  are  $\mathfrak{F}_k$ -words,  $k = 2, 3$ , and  $\omega \in \mathfrak{F}_k(n)$ , then  $a_{k,1} \dots a_{k,n} \omega$  is  $\mathfrak{F}_k$ -word.
- If  $a_k$  is  $\mathfrak{F}_k$ -word,  $k = 2, 3$ , and  $a_{k-1}$  is  $\mathfrak{F}_{k-1}$ -word, then  $a_{k-1} a_k$  is  $\mathfrak{F}_k$ -word.

Representation of  $a_k \in A_k$  as  $\mathfrak{F}_k$ -word is ambiguous. If  $a_{k,1}, \dots, a_{k,n}$  are  $\mathfrak{F}_k$ -words,  $\omega \in \mathfrak{F}_k(n)$  and  $a_{k-1} \in A_{k-1}$ , then  $\mathfrak{F}_k$ -words  $a_{k-1} a_{k,1} \dots a_{k,n} \omega$  and  $a_{k-1} a_{k,1} \dots a_{k-1} a_{k,n} \omega$  represent the same element of  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $A_k$ . It is possible that there exist equations related with a character of a representation. For instance, if  $\omega$  is the operation of  $\mathfrak{F}_{k-1}$ -algebra  $A_{k-1}$  and the operation of  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $A_k$ , then we can request that  $\mathfrak{F}_k$ -words  $a_{k-1,1} \dots a_{k-1,n} \omega a_k$  and  $a_{k-1,1} a_k \dots a_{k-1,n} a_k \omega$  represent the same element of  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $A_k$ .

Listed above equations for each value  $k$ ,  $k = 2, 3$ , determine equivalence  $r_k$  on the set of  $\mathfrak{F}_k$ -words  $W_k$ . Quotient  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $W_k/r_k$  coincide with  $\mathfrak{F}_k$ -algebra  $A_k$ . According to the construction, equivalence  $r_k$  on the set of  $\mathfrak{F}_k$ -words  $W_k$  depends not only on the choice of the set  $X_k$ , but also on the choice of the set  $X_{k-1}$ .

In general, representation of arbitrary element  $a_k \in A_k$  of set  $W_k/r_k$  is ambiguous. If the generating tuple  $X_*$  is such that representation of the element  $a_k \in A_k$  in the set  $W_k/r_k$  is unique for each  $k$ ,  $k = 2, 3$ , then the tuple  $X_*$  is called **basis of representation  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$** .

Let representation  $f_*$  have basis  $X_*$ . For each value  $k$ ,  $k = 2, 3$ , we select certain  $\mathfrak{F}_k$ -word that represent an element  $x_k \in A_k$  and selected the tuple of  $\mathfrak{F}_k$ -words  $w(x_*, X_*)$  is called **coordinates of the tuple  $x_*$  relative to basis  $X_*$** .

Let  $X_*$ ,  $X'_*$  be basises of representation  $f_*$ . If we consider the basis  $X'_*$  as the tuple of points of representation  $f_{2,3}$ , then the tuple

$$w(X'_*, X_*) = \{w(x_*, X_*) : x_2 \in X'_2, x_3 \in X'_3\}$$

is called **coordinates of basis  $X'_*$  relative to basis  $X_*$** .

### 3.4. Examples of Basis of Tower of Representation

Affine space is effective representation of vector space in Abelian group. We consider this example in chapter 6.

**Example 3.4.1.** Let  $A_2$  be free algebra over field  $A_1$ . Considering the algebra  $A_2$  as a ring, we can determine free vector space  $A_3$  over the algebra  $A_2$ . Let  $\bar{e}_{32}$  be

basis of algebra  $A_3$  over algebra  $A_2$ . A vector  $a_3 \in A_3$  has representation

$$(3.4.1) \quad a_3 = a_3^j {}_{j\bar{e}32} = (a_3^1 \dots a_3^n) \begin{pmatrix} {}^1\bar{e}_{32} \\ \dots \\ {}_n\bar{e}_{32} \end{pmatrix}$$

Let  $\bar{e}_{21}$  be basis of algebra  $A_2$  over field  $A_1$ . Because  $a_3^j \in A_2$ , we can write their coordinates relative to basis  $\bar{e}_{21}$

$$(3.4.2) \quad a_3^j = a_3^{ji} {}_{i\bar{e}21} = (a_3^{j1} \dots a_3^{jm}) \begin{pmatrix} {}^1\bar{e}_{21} \\ \dots \\ {}_m\bar{e}_{21} \end{pmatrix}$$

From equations (3.4.1), (3.4.2) it follows

$$(3.4.3) \quad a_3 = a_3^{ji} {}_{i\bar{e}21} {}_{j\bar{e}32} = \left( (a_3^{11} \dots a_3^{1m}) \begin{pmatrix} {}^1\bar{e}_{21} \\ \dots \\ {}_m\bar{e}_{21} \end{pmatrix} \dots (a_3^{n1} \dots a_3^{nm}) \begin{pmatrix} {}^1\bar{e}_{21} \\ \dots \\ {}_m\bar{e}_{21} \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} {}^1\bar{e}_{32} \\ \dots \\ {}_n\bar{e}_{32} \end{pmatrix}$$

Equation (3.4.3) shows the structure of coordinates in vector space  $A_3$  over field  $A_1$ . It is easy to see that vectors

$${}_{ij}\bar{e}_{31} = {}_{i\bar{e}21} {}_{j\bar{e}32}$$

are linear independent over field  $A_1$ . Therefore, we build the basis  $\bar{e}_{31}$  of vector space  $A_3$  over field  $A_1$ . Therefore, we can rewrite equation (3.4.3) as

$$(3.4.4) \quad a_3 = a_3^{ji} {}_{ij\bar{e}31} = (a_3^{11} \dots a_3^{1m} \dots a_3^{n1} \dots a_3^{nm}) \begin{pmatrix} {}^{11}\bar{e}_{31} \\ \dots \\ {}^{1m}\bar{e}_{31} \\ \dots \\ {}^{n1}\bar{e}_{31} \\ \dots \\ {}^{nm}\bar{e}_{31} \end{pmatrix}$$

□

**Example 3.4.2.** Let  $A_2$  be free algebra over field  $A_1$ . Considering the algebra  $A_2$  as ring we can define free algebra  $A_3$  over algebra  $A_2$ . Let  $\bar{e}_{21}$  be basis of algebra  $A_2$  over field  $A_1$ . Let  $\bar{e}_{32}$  be basis of algebra  $A_3$  over algebra  $A_2$ . Then we can represent basis  ${}_{ij}\bar{e}_{31}$  of algebra  $A_3$  over field  $A_1$  as

$${}_{ij}\bar{e}_{31} = (\bar{e}_{21}, \bar{e}_{32})$$

If structural constants of algebra  $A_3$  over algebra  $A_2$  belong to field  $A_1$ , then we can identify basis  ${}_{ij}\bar{e}_{31}$  with tensor product  $\bar{e}_{21} \otimes \bar{e}_{32}$ . □

### 3.5. Representations in Category

**Definition 3.5.1.** Let for any objects  $B$  and  $C$  of category  $\mathcal{B}$  the structure of  $\mathfrak{F}$ -algebra is defined on the set of morphisms  $Mor(B, C)$ . The set of homomorphisms of  $\mathfrak{F}$ -algebra

$$f_{B,C} : A \rightarrow Mor(B, C)$$

is called **representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in category  $\mathcal{B}$** . □

If we assume that the set  $Mor(B, C)$  is defined only when  $B = C$ , than we get definition of  $T\star$ -representation. The difference in definitions is that we do not restrict ourselves by transformations of the set  $B$ , but consider  $\mathfrak{F}$ -algebra of maps from the set  $B$  into set  $C$ . At first sight there is no fundamental differences between considered theories. However we can see that representation of vector space in category of bundles lead us to connection theory.

## CHAPTER 4

# Geometry of Division Ring

### 4.1. Center of Division Ring

**Definition 4.1.1.** Let  $D$  be a ring.<sup>4.1</sup> The set  $Z(D)$  of elements  $a \in D$  such that

$$(4.1.1) \quad ax = xa$$

for all  $x \in D$ , is called **center of ring**  $D$ .  $\square$

**Theorem 4.1.2.** *The center  $Z(D)$  of ring  $D$  is subring of ring  $D$ .*

PROOF. The statement follows immediately from definition 4.1.1.  $\square$

**Theorem 4.1.3.** *The center  $Z(D)$  of division ring  $D$  is subfield of division ring  $D$ .*

PROOF. According to theorem 4.1.2 it is enough to verify that  $a^{-1} \in Z(D)$  if  $a \in Z(D)$ . Let  $a \in Z(D)$ . Repeatedly using the equation (4.1.1) we get chain of equations

$$(4.1.2) \quad aa^{-1}x = x = xaa^{-1} = axa^{-1}$$

From (4.1.2) it follows

$$a^{-1}x = xa^{-1}$$

Therefore,  $a^{-1} \in Z(D)$ .  $\square$

**Definition 4.1.4.** Let  $D$  be a ring with unit element  $e$ .<sup>4.2</sup> The map

$$l : Z \rightarrow D$$

such that  $l(n) = ne$  is a homomorphism of rings, and its kernel is an ideal  $(n)$ , generated by integer  $n \geq 0$ . We have canonical injective homomorphism

$$Z/nZ \rightarrow D$$

which is an isomorphism between  $Z/nZ$  and subring of  $D$ . If  $nZ$  is prime ideal, then we have two cases.

- $n = 0$ .  $D$  contains as subring a ring which isomorphic to  $Z$ , and which is often identified with  $Z$ . In that case, we say that  $D$  has **characteristic** 0.
- $n = p$  for some prime number  $p$ .  $D$  has **characteristic**  $p$ , and  $D$  contains an isomorphic image of  $F_p = Z/pZ$ .

$\square$

**Theorem 4.1.5.** *Let  $D$  be ring of characteristic 0 and let  $d \in D$ . Then every integer  $n \in Z$  commutes with  $d$ .*

<sup>4.1</sup>[1], page 89.

<sup>4.2</sup>I made definition according to definition from [1], pages 89, 90.

PROOF. We prove statement by induction. The statement is evident for  $n = 0$  and  $n = 1$ . Let statement be true for  $n = k$ . From chain of equation

$$(k+1)d = kd + d = dk + d = d(k+1)$$

evidence of statement for  $n = k + 1$  follows.  $\square$

**Theorem 4.1.6.** *Let  $D$  be ring of characteristic 0. Then ring of integers  $Z$  is subring of center  $Z(D)$  of ring  $D$ .*

PROOF. Corollary of theorem 4.1.5.  $\square$

Let  $D$  be division ring. If  $D$  has characteristic 0,  $D$  contains as subfield an isomorphic image of the field  $Q$  of rational numbers. If  $D$  has characteristic  $p$ ,  $D$  contains as subfield an isomorphic image of  $F_p$ . In either case, this subfield will be called the prime field. Since the prime field is the smallest subfield of  $D$  containing 1 and has no automorphism except identity, it is customary to identify it with  $Q$  or  $F_p$  as the case may be.

**Theorem 4.1.7.** *Let  $D$  be division ring of characteristic 0 and let  $d \in D$ . Then for any integer  $n \in Z$*

$$(4.1.3) \quad n^{-1}d = dn^{-1}$$

PROOF. According to theorem 4.1.5 following chain of equation is true

$$(4.1.4) \quad n^{-1}dn = nn^{-1}d = d$$

Let us multiply right and left sides of equation (4.1.4) by  $n^{-1}$ . We get

$$(4.1.5) \quad n^{-1}d = n^{-1}dnn^{-1} = dn^{-1}$$

(4.1.3) follows from (4.1.5).  $\square$

**Theorem 4.1.8.** *Let  $D$  be division ring of characteristic 0 and let  $d \in D$ . Then every rational number  $p \in Q$  commutes with  $d$ .*

PROOF. Let us represent rational number  $p \in Q$  as  $p = mn^{-1}$ ,  $m, n \in Z$ . Statement of theorem follows from chain of equations

$$pd = mn^{-1}d = n^{-1}dm = dm n^{-1} = dp$$

based on the statement of theorem 4.1.5 and equation (4.1.3).  $\square$

**Theorem 4.1.9.** *Let  $D$  be division ring of characteristic 0. Then field of rational numbers  $Q$  is subfield of center  $Z(D)$  of division ring  $D$ .*

PROOF. Corollary of theorem 4.1.8.  $\square$

## 4.2. Geometry of Division Ring over Field

We may consider division ring  $D$  as vector space over field  $F \subset Z(D)$ . We will use following conventions.

- (1) We do not use standard notation for vector when we consider element of division ring  $D$  considering it as vector over field  $F$ . However we will use another color for index for notation of coordinates of element of division ring  $D$  as vector over field  $F$ .
- (2) Because  $F$  is field, we can write all indexes on right side of root letter. However we will use the same conventions, that we use for division ring.

Let  $\bar{e}$  be basis of division ring  $D$  over field  $F$ . Then we may present any element  $a \in D$  as

$$(4.2.1) \quad a = a^i \bar{e}$$

where  $a^i \in F$ . When dimension of division ring  $D$  over field  $F$  infinite, then basis may be either countable, or its power is not less than power of continuum. If basis is countable, then we put constraints on coefficients  $a^i$  of expansion (4.2.1). If power of the set  $I$  is continuum, then we assume that there is measure on the set  $I$  and sum in expansion (4.2.1) is integral over this measure.

Since we defined product in the division ring  $D$ , we consider the division ring as algebra over field  $F$ . For elements of basis we assume

$$(4.2.2) \quad i\bar{e} j\bar{e} = ijB^k k\bar{e}$$

Coefficients  $ijB^k$  of expansion (4.2.2) are called **structural constants of division ring  $D$  over field  $F$** . From equations (4.2.1), (4.2.2), it follows

$$(4.2.3) \quad ab = a^i b^j ijB^k k\bar{e}$$

From equation (4.2.3) it follows that

$$(4.2.4) \quad \begin{aligned} (ab)c &= (ab)^i c^j ijB^k k\bar{e} \\ &= a^m b^n mnB^i c^j ijB^k k\bar{e} \end{aligned}$$

$$(4.2.5) \quad \begin{aligned} a(bc) &= a^i (bc)^j ijB^k k\bar{e} \\ &= a^i b^m c^n mnB^j ijB^k k\bar{e} \end{aligned}$$

From associativity of product

$$(ab)c = a(bc)$$

and equations (4.2.4) and (4.2.5) it follows that

$$(4.2.6) \quad a^m b^n mnB^i c^j ijB^k k\bar{e} = a^i b^m c^n mnB^j ijB^k k\bar{e}$$

Because vectors  $a, b, c$  are arbitrary, and vectors  $k\bar{e}$  are linear independent, then from equation (4.2.6) it follows that

$$(4.2.7) \quad imB^j jnB^k = mnB^j ijB^k$$

**Theorem 4.2.1.** *Coordinates  $a^j$  of vector  $a$  are tensor*

$$(4.2.8) \quad a^j = a'^i iA^j$$

PROOF. Let  $\bar{e}'$  be another basis. Let

$$(4.2.9) \quad i\bar{e}' = iA^j j\bar{e}$$

be transformation, mapping basis  $\bar{e}$  into basis  $\bar{e}'$ . Because vector  $a$  does not change, then

$$(4.2.10) \quad a = a^i i\bar{e}' = a^j j\bar{e}$$

From equations (4.2.9) and (4.2.10) it follows that

$$(4.2.11) \quad a^j j\bar{e} = a'^i i\bar{e}' = a'^i iA^j j\bar{e}$$

Because vectors  $j\bar{e}$  are linear independent, then equation (4.2.8) follows from equation (4.2.11). Therefore, coordinates of vector are tensor.  $\square$

**Theorem 4.2.2.** *Structural constants of division ring  $D$  over field  $F$  are tensor*

$$(4.2.12) \quad nA^{-1}i m A^{-1}j ijB'^k kA^l = nmB^l$$

PROOF. Let us consider similarly the transformation of product. Equation (4.2.3) has form

$$(4.2.13) \quad ab = a'^{\textcolor{red}{i}} b'^{\textcolor{red}{j}} {}_{ij} B'^{\textcolor{red}{k}} {}_k \bar{e}'$$

relative to basis  $\bar{e}'$ . Let us substitute (4.2.8) and (4.2.9) into (4.2.13). We get

$$(4.2.14) \quad ab = a^{\textcolor{red}{n}} {}_n A^{-1}{}^i b^{\textcolor{red}{m}} {}_m A^{-1}{}^j {}_{ij} B'^{\textcolor{red}{k}} {}_k A^l {}_l \bar{e}$$

From (4.2.3) and (4.2.14) it follows that

$$(4.2.15) \quad a^{\textcolor{red}{n}} {}_n A^{-1}{}^i b^{\textcolor{red}{m}} {}_m A^{-1}{}^j {}_{ij} B'^{\textcolor{red}{k}} {}_k A^l {}_l \bar{e} = a^{\textcolor{red}{n}} b^{\textcolor{red}{m}} {}_{nm} B^l {}_l \bar{e}$$

Because vectors  $a$  and  $b$  are arbitrary, and vectors  $\bar{e}$  are linear independent, then equation (4.2.12) follows from equation (4.2.15). Therefore, structural constants are tensor.  $\square$

## CHAPTER 5

# Quadratic Map of Division Ring

### 5.1. Bilinear Map of Division Ring

**Theorem 5.1.1.** Let  $D$  be division ring of characteristic 0. Let  $F$  be field which is subring of center of division ring  $D$ . Let  $\bar{e}$  be basis in division ring  $D$  over field  $F$ . Standard representation over field  $F$  of bilinear map of division ring has form

$$(5.1.1) \quad f(a, b) = {}_{(1)}f^{ijk} \cdot e_a \cdot e_j \cdot e_b \cdot e_k + {}_{(2)}f^{ijk} \cdot e_b \cdot e_j \cdot e_a \cdot e_k$$

Expression  ${}_{(t)}f^{ijk}$  in equation (5.1.1) is called standard component over field  $F$  of bilinear map  $f$ .

PROOF. The statement of theorem is corollary of theorem [5]-9.3.6. Here we have transpositions

$$(5.1.2) \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

□

**Theorem 5.1.2.** Let field  $F$  be subring of center  $Z(D)$  of division ring  $D$ . Let  $\bar{e}$  be basis of division ring  $D$  over field  $F$ . We can represent bilinear function

$$g : D \times D \rightarrow D$$

as  $D$ -valued bilinear form over field  $F$

$$(5.1.3) \quad g(a, b) = a^i b^j \cdot {}_{ij}g$$

where

$$(5.1.4) \quad \begin{aligned} a &= a^i \cdot {}_i\bar{e} \\ b &= b^j \cdot {}_j\bar{e} \\ {}_{ij}g &= g({}_i\bar{e}, {}_j\bar{e}) \end{aligned}$$

and values  ${}_{ij}g$  are coordinates of  $D$ -valued covariant tensor over field  $F$ .

PROOF. The statement of theorem is corollary of theorem [5]-9.3.7. □

The matrix  $G = |{}_{ij}g|$  is called **matrix of bilinear function**. If matrix  $G$  is nonsingular, then bilinear function  $g$  is called **nonsingular**.

**Theorem 5.1.3.** Bilinear map

$$g : D \times D \rightarrow D$$

is symmetric iff the matrix  $G$  is symmetric

$${}_{ij}g = {}_{ji}g$$

PROOF. The statement of theorem is corollary of theorem [5]-9.3.8.  $\square$

**Theorem 5.1.4.** *Bilinear map*

$$g : D \times D \rightarrow D$$

is skew symmetric iff the matrix  $G$  is skew symmetric

$$\mathbf{ij}g = -\mathbf{ji}g$$

PROOF. The statement of theorem is corollary of theorem [5]-9.3.9.  $\square$

**Theorem 5.1.5.** *Components of bilinear map*

$$g : D \times D \rightarrow D$$

and its matrix over field  $F$  satisfy to equation

$$(5.1.5) \quad \mathbf{pq}g = ((1)g^{ijk} \mathbf{ip}B^s \mathbf{sj}B^l \mathbf{lq}B^t \mathbf{tk}B^r + (2)g^{ijk} \mathbf{iq}B^s \mathbf{sj}B^l \mathbf{lp}B^t \mathbf{tk}B^r) \mathbf{r}\bar{e}$$

$$(5.1.6) \quad \mathbf{pq}g^r = (1)g^{ijk} \mathbf{ip}B^s \mathbf{sj}B^l \mathbf{lq}B^t \mathbf{tk}B^r + (2)g^{ijk} \mathbf{iq}B^s \mathbf{sj}B^l \mathbf{lp}B^t \mathbf{tk}B^r$$

PROOF. The statement of theorem is corollary of theorem [5]-9.3.10. To prove statement it is enough to substitute (5.1.2) into equations [5]-(9.3.14), [5]-(9.3.15).  $\square$

**Theorem 5.1.6.** *Suppose bilinear map*

$$g : D \times D \rightarrow D$$

has matrix  $G = \|\mathbf{ij}g\|$ . Then there exists bilinear map

$$g' : D \times D \rightarrow D$$

with matrix  $G' = \|\mathbf{ij}g'\|$ ,  $\mathbf{ij}g' = \mathbf{ji}g$ .

PROOF. Assume

$$(5.1.7) \quad (1)g'^{ijk} = (2)g^{ijk} \quad (2)g'^{ijk} = (1)g^{ijk}$$

From equations (5.1.6), (5.1.7) it follows that

$$\begin{aligned} \mathbf{qp}g'^r &= (1)g'^{ijk} \mathbf{iq}B^s \mathbf{sj}B^l \mathbf{lp}B^t \mathbf{tk}B^r + (2)g'^{ijk} \mathbf{ip}B^s \mathbf{sj}B^l \mathbf{lq}B^t \mathbf{tk}B^r \\ &= (2)g^{ijk} \mathbf{iq}B^s \mathbf{sj}B^l \mathbf{lp}B^t \mathbf{tk}B^r + (1)g^{ijk} \mathbf{ip}B^s \mathbf{sj}B^l \mathbf{lq}B^t \mathbf{tk}B^r \\ &= \mathbf{pq}g^r \end{aligned}$$

$\square$

## 5.2. Quadratic Map of Division Ring

**Definition 5.2.1.** Let  $D$  be division ring. The map

$$h : D \rightarrow R$$

is called **quadratic**, if there exists bilinear map

$$g : D \times D \rightarrow D$$

such that

$$h(a) = g(a, a)$$

Bilinear map  $g$  is called map associated with the map  $h$ .  $\square$

For given map  $h$  the map  $g$  is defined ambiguously. However according to theorem 5.1.6, we always can assume that bilinear map  $g$  is symmetric

$$g(a, b) = g(b, a)$$

Indeed, if bilinear map  $g_1$ , associated with map  $h$ , is not symmetric, then we assume

$$g(a, b) = (g_1(a, b) + g_1(b, a))/2$$

Because bilinear map is homogeneous of degree 1 over field  $R$  with respect to each variable, quadratic map is homogeneous of degree 2 over field  $R$ .

**Theorem 5.2.2.** *Let  $D$  be division ring of characteristic 0. Let  $F$  be field which is subring of center of division ring  $D$ . Let  $\bar{p}$  be basis in division ring  $D$  over field  $F$ . Standard representation of quadratic map of division ring over field  $F$  has form*

$$(5.2.1) \quad f(a) = \mathbf{f}^{ijk} \mathbf{a}_i \bar{p} \mathbf{a}_j \bar{p} \mathbf{a}_k \bar{p}$$

Expression  $\mathbf{f}^{ijk}$  in equation (5.2.1) is called **standard component of quadratic map  $f$  over field  $F$** .

PROOF. The statement of theorem is corollary of theorem 5.1.1.  $\square$

**Theorem 5.2.3.** *Let field  $F$  be subring of center  $Z(D)$  of division ring  $D$ . Let  $\bar{e}$  be basis of division ring  $D$  over field  $F$ . We can represent quadratic map  $f$  as  $D$ -valued quadratic form over field  $F$*

$$(5.2.2) \quad f(a) = a^i a^j \mathbf{i} \mathbf{j} f$$

where

$$(5.2.3) \quad \begin{aligned} \bar{a} &= a^i \mathbf{i} \bar{e} \\ \mathbf{i} \mathbf{j} f &= g(\mathbf{i} \bar{e}, \mathbf{j} \bar{e}) \end{aligned}$$

and  $g$  is associated bilinear map. Values  $\mathbf{i} \mathbf{j} f$  are coordinates of  $D$ -valued covariant tensor over field  $F$ .

PROOF. For selected bilinear map  $g$  associated to map  $f$ , the statement of theorem is corollary of theorem 5.1.2. We need to prove independence of coordinates of quadratic map from choice of an associated map  $g$ .

Assume,  $g_1, g_2$  are bilinear maps associated to the map  $f$ . Then

$$(5.2.4) \quad \mathbf{i} \mathbf{i} f_1 = g_1(\mathbf{i} \bar{e}, \mathbf{i} \bar{e}) = g_2(\mathbf{i} \bar{e}, \mathbf{i} \bar{e}) = \mathbf{i} \mathbf{i} f_2$$

For arbitrary  $a \in D$ ,

$$a^i a^j \mathbf{i} \mathbf{j} f_1 = a^i a^j \mathbf{i} \mathbf{j} f_2$$

If for given  $i, j$  we consider  $a \in D$  such that  $a_i = a_j = 1$ , then we get

$$(5.2.5) \quad \mathbf{i} \mathbf{i} f_1 + \mathbf{i} \mathbf{j} f_1 + \mathbf{j} \mathbf{i} f_1 + \mathbf{j} \mathbf{j} f_1 = \mathbf{i} \mathbf{i} f_2 + \mathbf{i} \mathbf{j} f_2 + \mathbf{j} \mathbf{i} f_2 + \mathbf{j} \mathbf{j} f_2$$

From equations (5.2.4), (5.2.5) it follows that

$$\mathbf{i} \mathbf{j} f_1 + \mathbf{j} \mathbf{i} f_1 = \mathbf{i} \mathbf{j} f_2 + \mathbf{j} \mathbf{i} f_2$$

Therefore, if associated bilinear map is symmetric, then this map is determined unique.  $\square$

The matrix  $F = |\mathbf{i} \mathbf{j} f|$  is called **matrix of quadratic map**. If the matrix  $F$  is regular, then the quadratic map  $f$  is called **regular**. The rank of the matrix  $F$  is called **rank of quadratic map  $f$** .

**Theorem 5.2.4.** *The quadratic over field  $F$  map*

$$f : D \rightarrow D$$

*is defined as map over division ring iff*

$$(5.2.6) \quad pqf = f^{ijk} {}_{ip}B^s {}_{sj}B^l {}_{lq}B^t {}_{tk}B^r {}_{rp}$$

$$(5.2.7) \quad pqf^r = f^{ijk} {}_{ip}B^s {}_{sj}B^l {}_{lq}B^t {}_{tk}B^r$$

PROOF. Let us substitute

$$\bar{a} = a^j {}_{jp}$$

in equation (5.2.1). Than equation (5.2.1) gets form

$$(5.2.8) \quad \begin{aligned} f(a) &= f^{ijk} {}_{ip} \bar{a}^p {}_{pj} \bar{a}^q {}_{qk} \bar{a}^r \\ &= a^p a^q f^{ijk} {}_{ip} \bar{a}^r {}_{pj} \bar{a}^q {}_{qk} \\ &= a^p a^q f^{ijk} {}_{ip} B^s {}_{sj} B^l {}_{lq} B^t {}_{tk} B^r {}_{rp} \end{aligned}$$

Equation (5.2.6) follows from comparision of equations (5.2.8) and (5.2.2).  $\square$

From theorem 5.2.3, it follows that coordinates  $pqf$  form tensor. We described the structure of acceptable transformations in theorem [5]-9.2.11.

**Theorem 5.2.5.** *Let field  $F$  be subring of center  $Z(D)$  of division ring  $D$ . Let  $\bar{p}$  be basis of division ring  $D$  over field  $F$ . Let  $ijB^k$  be structural constants of division ring  $D$  over field  $F$ . If*

$$\det(a^i (ijB^k + jiB^k)) \neq 0$$

*then equation*

$$(5.2.9) \quad ax + xa = b$$

*has the unique solution.*

*If determinant equal 0, then  $F$ -linear dependence of vector  $b$  from vectors  $a^i (ijB^k + jiB^k) \bar{k}$  is condition of existence of solution. In this case, equation (5.2.9) has infinitely many solutions. Otherwise equation does not have solution.*

PROOF. From equations (4.2.3), (5.2.9), it follows that

$$(5.2.10) \quad a^i x^j {}_{ij}B^k {}_{kp} + x^i a^j {}_{ij}B^k {}_{kp} = b^k {}_{kp}$$

Since vectors  $\bar{k}$  are linear independent, then from equation (5.2.10) it follows that coordinates  $x^j$  satisfy to the system of linear equations

$$(5.2.11) \quad x^j a^i (ijB^k + jiB^k) = b^k$$

Therefore, if determinant of the system (5.2.11) does not equal 0, then the system has unique solution.

Similarly, if determinant equal 0, then equality of the rank of the extended matrix and the rank of the matrix of the system of linear equations is the condition of existence of solution.  $\square$

**Theorem 5.2.6.** *Let field  $F$  be subring of center  $Z(D)$  of division ring  $D$ . There exists a quadratic map  $f$  such that we can find a basis  $\bar{p}$  over field  $F$  such that map  $f$  is represented as sum of squares.*

PROOF. Reduction of quadratic form to diagonal representation is done the same way as is done in [4], p. 169 - 172. Considered transformations of variables are associated with the corresponding transformation of basis. We are not concerned in whether these transformations of basis are acceptable. The reason is that the basis chosen initially may not be connected with the canonical basis by acceptable transformation. But for us it is important that the final presentation of mapping  $f$  should be acceptable.

We will prove the statement by induction on number of variables in representation of quadratic map. For this we write the quadratic map  $f$  in the form of map of  $n$  variables  $a^1, \dots, a^n$

$$(5.2.12) \quad f(a) = f(a^1, \dots, a^n) = a^i a^j \_{ij} f$$

Representation of quadratic map in the form (5.2.12) is called **quadratic form**.

The statement is evident, when quadratic form depends on one variable  $a^1$ , because in this case the quadratic form has form

$$f(a^1) = (a^1)^2 \_{11} f$$

Assume, the statement of the theorem is true for quadratic form of  $n - 1$  variables.

- (1) Let the quadratic form holds squares of variables. Without loss of generality, assume  $\_{11} f \neq 0$ . Let us consider the map

$$(5.2.13) \quad f_1(a^1, \dots, a^n) = f(a^1, \dots, a^n) - \_{11} f^{-1} (a^j \_{j1} h)^2$$

We select values  $j$  so as to satisfy the equation

$$(5.2.14) \quad 2 \_{11} f \_{1j} f = \_{1} h \_{j1} h + \_{j1} h \_{1} h$$

When  $j = 1$ , from equation (5.2.14) it follows that

$$(5.2.15) \quad \_{1} h = \_{11} f$$

When  $j > 1$ , from equations (5.2.14), (5.2.15) it follows that

$$(5.2.16) \quad 2 \_{11} f \_{1j} f = \_{11} f \_{j1} h + \_{j1} h \_{11} f$$

From theorem 5.2.5 it follows that if

$$(5.2.17) \quad \det(\_{11} f^i (\_{ij} B^k + \_{ji} B^k)) \neq 0$$

then equation (5.2.16) has unique solution. We assume that condition (5.2.17) is satisfied and consider change of variables

$$\begin{aligned} b^1 &= a^j \_{j1} h \\ b^i &= a^i \quad i > 1 \end{aligned}$$

Therefore, the map  $f_1(a^1, \dots, a^n)$  does not depend on  $b^1$ . According to definition (5.2.13), we represented the map  $f(a^1, \dots, a^n)$  as sum of square of variable  $b^1$  and quadratic map that does not depend on  $b^1$ .

$$f(a^1, \dots, a^n) = \_{11} f^{-1} (b^1)^2 + f_1(b^2, \dots, b^n)$$

Since form  $f_1$  depends on  $n - 1$  variable, we can find a transformation of variables that leads this form to the sum of squares of variables.

(2) If  $\mathbf{11}f = \dots = \mathbf{nn}f = 0$ , then we need an additional linear transformation that lead to appearance of squares of variables. Assume  $\mathbf{12}f \neq 0$ . Let us consider the linear transformation

$$\begin{aligned} a^1 &= b^1 - b^2 \\ a^2 &= b^1 + b^2 \\ a^i &= b^i \quad i > 2 \end{aligned}$$

As a result of this transformation term

$$2 a^1 a^2 \mathbf{12}f$$

gets form

$$2 (b^1)^2 \mathbf{12}f - 2 (b^2)^2 \mathbf{12}f$$

We got quadratic form considered in case (1).  $\square$

If all coefficients of the quadratic form in canonical representation are real, then  $f(a) \in R$  for any  $a \in D$ .

**Definition 5.2.7.** Let  $D$  be division ring. Quadratic map

$$f : D \rightarrow D$$

is called **positive definite** when

$$f(a) \in R$$

for any  $a \in D$  and following condition is true

$$\begin{aligned} f(a) &\geq 0 \\ f(a) = 0 &\Rightarrow a = 0 \end{aligned}$$

Positive definite quadratic map  $f$  is called **Euclidean metric on division ring**  $D$ . Symmetric associative bilinear map  $g$  is called **Euclidean scalar product on division ring**  $D$ .  $\square$

If quadratic map  $f$  is not positive definite, then this map is called **pseudo-Euclidean metric on division ring**  $D$ . Symmetric associative bilinear map  $g$  is called **pseudo-Euclidean scalar product on division ring**  $D$ . Let  $\bar{e}$  be the basis such that form  $f$  is presented as sum of squares in this basis. There exist vectors of basis  $\bar{e}$  such that  $f(\bar{e}) < 0$ . For arbitrary  $a = a^i \bar{e}$  let us define operation of conjugation using the equation

$$a^* = \text{sign}(f(\bar{e})) a^i \bar{e}$$

Expression  $a^*$  is called **hermitian conjugation**.

Let us consider biadditive map

$$\begin{aligned} g^*(a, b) &= g(a, b^*) \\ f^*(a) &= g^*(a, a) \end{aligned}$$

The map  $f^*(a)$  is positive definite and is called **hermitian metric on division ring**  $D$ . Symmetric associative bilinear map  $g^*$  is called **hermitian scalar product on division ring**  $D$ .

If the map

$$a \rightarrow a^*$$

is linear, then hermitian scalar product coincides with Euclidean scalar product. Similar statement is true for metric.

## CHAPTER 6

### **D-Affine Space**

#### 6.1. D-Affine Space

**Definition 6.1.1.** Let us consider a set of points  $\overset{\circ}{A}$  and a set of vectors  $\overline{A}$ .<sup>6.1</sup> The set  $\overset{\circ}{A}$  satisfies to following axioms.

- (1) There exists at least one point
- (2) One and only one vector is in correspondence to any tuple of points  $(A, B)$ .  
We denote this vector as  $\overrightarrow{AB}$ .
- (3) For any point  $A$  and any vector  $\overline{a}$  there exists one and only one point  $B$  such, that  $\overrightarrow{AB} = \overline{a}$ . We will use notation<sup>6.2</sup>

$$(6.1.1) \quad B = A + \overline{a}$$

- (4) (Axiom of parallelogram.) If  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ , then  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ .

□

**Definition 6.1.2.** Let  $\overline{a}$  and  $\overline{b}$  be vectors. Let  $A \in \overset{\circ}{A}$  be arbitrary point. Let  $B \in \overset{\circ}{A}$ ,  $B = A + \overline{a}$ . Let  $C \in \overset{\circ}{A}$ ,  $C = B + \overline{b}$ . Vector  $\overrightarrow{AC}$  is called sum of vectors  $\overline{a}$  and  $\overline{b}$

$$(6.1.2) \quad \overline{a} + \overline{b} = \overrightarrow{AC}$$

□

**Theorem 6.1.3.** Vector  $\overrightarrow{AA}$  is zero with respect to addition and does not depend on point  $A$ . Vector  $\overrightarrow{AA}$  is called zero-vector and we assume  $\overrightarrow{AA} = \overline{0}$ .

PROOF. We can write rule of addition (6.1.2) in form of equation

$$(6.1.3) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

If  $B = C$ , then from equation (6.1.3) it follows that

$$(6.1.4) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB} = \overrightarrow{AB}$$

If  $C = A$ ,  $B = D$ , then from axiom (4) of definition 6.1.1 it follows that

$$(6.1.5) \quad \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$$

The statement of theorem follows from equations (6.1.4) and (6.1.5). □

---

<sup>6.1</sup>I wrote definitions and theorems in this section according to definition of affine space in [3], pp. 86 - 93.

<sup>6.2</sup>[11], p. 9.

**Theorem 6.1.4.** Let  $\bar{a} = \vec{AB}$ . Then

$$(6.1.6) \quad \vec{BA} = -\bar{a}$$

and this equation does not depend on a point A.

PROOF. From equation (6.1.3) it follows that

$$(6.1.7) \quad \vec{AB} + \vec{BA} = \vec{AA} = \vec{0}$$

Equation (6.1.6) follows from equation (6.1.7). Applying axiom (4) from definition 6.1.1 to equation  $\vec{AB} = \vec{CD}$  we get  $\vec{AC} = \vec{BD}$ , or (this is equivalent)  $\vec{BD} = \vec{AC}$ . Based on axiom (4) of definition 6.1.1 again  $\vec{BA} = \vec{DC}$  follows. Therefore, equation (6.1.6) does not depend on point A.  $\square$

**Theorem 6.1.5.** Sum of vectors  $\bar{a}$  and  $\bar{b}$  does not depend on point A.

PROOF. Let  $\bar{a} = \vec{AB} = \vec{A'B'}$ . Let  $\bar{b} = \vec{BC} = \vec{B'C'}$ . Let

$$\begin{aligned} \vec{AB} + \vec{BC} &= \vec{AC} \\ \vec{A'B'} + \vec{B'C'} &= \vec{A'C'} \end{aligned}$$

According to axiom (4) of definition 6.1.1

$$(6.1.8) \quad \vec{A'A} = \vec{B'B} = \vec{C'C}$$

Applying axiom (4) of definition 6.1.1 to outermost members of equation (6.1.8), we get

$$(6.1.9) \quad \vec{A'C'} = \vec{AC}$$

From equation (6.1.9) the statement of theorem follows.  $\square$

**Theorem 6.1.6.** Sum of vectors is associative.

PROOF. Let  $\bar{a} = \vec{AB}$ ,  $\bar{b} = \vec{BC}$ ,  $\bar{c} = \vec{CD}$ . From equation

$$\begin{aligned} \bar{a} + \bar{b} &= \vec{AC} \\ \vec{AB} + \vec{BC} &= \vec{AC} \end{aligned}$$

it follows that

$$(6.1.10) \quad \begin{aligned} (\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} &= \vec{AD} \\ \vec{AC} + \vec{CD} &= \vec{AD} \end{aligned}$$

From equation

$$\begin{aligned} \bar{b} + \bar{c} &= \vec{BD} \\ \vec{BC} + \vec{CD} &= \vec{BD} \end{aligned}$$

it follows that

$$(6.1.11) \quad \begin{aligned} \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) &= \vec{AD} \\ \vec{AB} + \vec{BD} &= \vec{AD} \end{aligned}$$

Associativity of sum follows from comparison of equations (6.1.10) and (6.1.11).  $\square$

**Theorem 6.1.7.** The structure of Abelian group is defined on the set  $\overline{A}$ .

PROOF. From theorems 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 it follows that sum of vectors determines group.

Let  $\bar{a} = \vec{AB}$ ,  $\bar{b} = \vec{BC}$ .

$$(6.1.12) \quad \begin{aligned} \bar{a} + \bar{b} &= \vec{AC} \\ \vec{AB} + \vec{BC} &= \vec{AC} \end{aligned}$$

According to axiom (3) of definition 6.1.1 there exists the point  $D$  such that  $\bar{b} = \vec{AD} = \vec{BC}$ . According to axiom (4) of definition 6.1.1  $\vec{AB} = \vec{DC} = \bar{a}$ . According to definition of sum of vectors

$$(6.1.13) \quad \begin{aligned} \vec{AD} + \vec{DC} &= \vec{AC} \\ \bar{b} + \bar{a} &= \vec{AC} \end{aligned}$$

commutativity of sum follows from comparison of equations (6.1.12) and (6.1.13).  $\square$

**Theorem 6.1.8.** *The map*

$$(6.1.14) \quad \overline{A} \rightarrow \overset{\circ}{A}^*$$

defined by equation (6.1.1), is an effective representation of Abelian group  $\overline{A}$ .

PROOF. axiom (4) of definition 6.1.1 determines the map (6.1.14). From theorem 6.1.5, it follows that the map (6.1.14) is a representation. Efficiency of the representation follows from theorem 6.1.3  $\square$

**Definition 6.1.9.** Let  $D$  be division ring of characteristic 0. Effective representation of division ring  $D$  in Abelian group  $\overline{A}$  forms the tower of representations

$$(6.1.15) \quad \overset{\circ}{A} = ((D, \overline{A}, \overset{\circ}{A}), (\bar{v} \rightarrow d \bar{v}, A \rightarrow A + \bar{v}))$$

The tower of representations (6.1.15) is called  **$D$ -affine space**.  $\square$

## 6.2. Basis in $D$ -Affine Space

Since  $D$ -affine space is the tower of representations (6.1.15), we will use tuple

$$(\bar{a} \in \overline{A}, B \in \overset{\circ}{A})$$

for representation of an element of affine space.

We select point  $O \in \overset{\circ}{A}$  as base point of affine space  $\overset{\circ}{A}$ . Vector  $\vec{OA} \in \overline{A}$  is coordinate of point  $A$ . However, because we can determine  $D^*_{*}$ -basis  $\bar{e}$  in vector space  $\overline{A}$ , we can identify coordinates  $A^1, \dots, A^n$  of vector  $\vec{OA}$  with coordinates of point  $A$  relative basis  $(\bar{e}, O)$ .

**Definition 6.2.1.**  $D^*_{*}$ -affine basis  $(\bar{e}, O) = (i\bar{e}, O)$  is set of  $D^*_{*}$ -linear independent vectors  $\bar{e}_i = \vec{OA}_i = (e_i^1, \dots, e_i^n)$  with common start point  $O = (O^1, \dots, O^n)$ .  $\square$

**Definition 6.2.2.**  $D^*_{*}$ -Basis manifold  $\mathcal{B}(D^*_{*}\mathcal{A}_n)$  of affine space is set of  $D^*_{*}$ -bases of this space.  $\square$

We can represent the map of basis  $(\bar{\bar{e}}, O)$  into basis  $(\bar{e}', O')$  as product of map of basis  $(\bar{\bar{e}}, O)$  into basis  $(\bar{e}, O')$  and  $D^*$ -linear map of basis  $(\bar{e}, O')$  into basis  $(\bar{e}', O')$ . Therefore,  $D^*$ -transformation has form

$$\begin{aligned}\bar{e}' &= A^*_{\bar{\bar{e}}} \bar{e} \\ O' &= O + \overset{\rightarrow}{O}O'\end{aligned}$$

Introducing coordinates  $A^1, \dots, A^n$  of a point  $A \in \mathcal{A}_n$  as coordinates of vector  $\overset{\rightarrow}{OA}$  relative to basis  $\bar{\bar{e}}$  we can write a linear transformation as

$$(6.2.1) \quad A'^i = A^j_{\bar{\bar{e}}} P^i + R^i \quad \text{rank}_{*_*} P = n$$

$$(6.2.2) \quad A'^*_{\bar{\bar{e}}} \bar{e} = (A^*_{\bar{\bar{e}}} P + R)^*_{\bar{\bar{e}}} \bar{e}$$

Vector  $(R^1, \dots, R^n)$  expresses displacement in affine space.

**Theorem 6.2.3.** *Set of transformations (6.2.2) is the group Lie which we denote as  $GL(\mathcal{A}_n)$  and call **affine transformation group**.*

PROOF. Let us consider transformations  $(P, R)$  and  $(Q, S)$ . Product of these transformations has the form

$$\begin{aligned}A''^i &= A'^j_{\bar{\bar{e}}} Q^i + S^i & A'' &= (A'^*_{\bar{\bar{e}}} Q + S)^*_{\bar{\bar{e}}} \bar{e} \\ &= (A^k_{\bar{\bar{e}}} P^j + R^j)_{\bar{\bar{e}}} Q^i + S^i & &= ((A^*_{\bar{\bar{e}}} P + R)^*_{\bar{\bar{e}}} Q + S)^*_{\bar{\bar{e}}} \bar{e} \\ &= A^k_{\bar{\bar{e}}} P^j_{\bar{\bar{e}}} Q^i + R^j_{\bar{\bar{e}}} Q^i + S^i & &= (A^*_{\bar{\bar{e}}} P^*_{\bar{\bar{e}}} Q + R^*_{\bar{\bar{e}}} Q + S)^*_{\bar{\bar{e}}} \bar{e}\end{aligned}$$

Therefore, we can write product of transformations  $(P, R)$  and  $(Q, S)$  in form

$$(6.2.3) \quad (P, R)^*_{\bar{\bar{e}}}(Q, S) = (P^*_{\bar{\bar{e}}} Q, R^*_{\bar{\bar{e}}} Q + S)$$

□

An active transformation is called **affine transformation**. A passive transformation is called **quasi affine transformation**.

If we do not concern about starting point of a vector we see little different type of space which we call central affine space  $CA_n$ . If we assume that the start point of vector is origin  $O$  of coordinate system in space then we can identify any point  $A \in CA_n$  with the vector  $a = \overset{\rightarrow}{OA}$ . Now transformation is simply map

$$a'^i = P_j^i a^j \quad \det P \neq 0$$

and such transformations build up Lie group  $GL_n$ .

**Definition 6.2.4.** *Central affine basis  $\bar{e} = (\bar{e}_i)$  is set of linearly independent vectors  $\bar{e}_i$ .* □

**Definition 6.2.5.** *Basis manifold  $\mathcal{B}(CA_n)$  of central affine space* is set of bases of this space. □

## CHAPTER 7

# Euclidean Space

### 7.1. Euclidean Space

Let  $\overline{V}$  be  $D$ -vector space. We can present bilinear map

$$g : \overline{V} \times \overline{V} \rightarrow D$$

as

$$g(\overline{v}, \overline{w}) = {}_{ij}g(v^i, w^j)$$

where  ${}_{ij}g$  are bilinear maps

$${}_{ij}g : D^2 \rightarrow D$$

**Definition 7.1.1.** Bilinear map

$$g : \overline{V} \times \overline{V} \rightarrow D$$

is called **symmetric** when

$$g(\overline{w}, \overline{v}) = g(\overline{v}, \overline{w})$$

□

**Definition 7.1.2.** Bilinear map

$$g : \overline{V} \times \overline{V} \rightarrow D$$

is called **Euclidean scalar product** in  $D$ -vector space  $\overline{V}$ , if  ${}_{ii}g$  is Euclidean scalar product in division ring  $D$  and  ${}_{ij}g = 0$  for  $i \neq j$ . □

**Definition 7.1.3.** Bilinear map

$$g : \overline{V} \times \overline{V} \rightarrow D$$

is called **pseudo-Euclidean scalar product** in  $D$ -vector space  $\overline{V}$ , if  ${}_{ii}g$  is pseudo-Euclidean scalar product in division ring  $D$  and  ${}_{ij}g = 0$  for  $i \neq j$ . □

If there exists hermitian conjugation in the division ring  $D$ , then we can extend this operation to  $D$ -vector space  $\overline{V}$ , namely for given vector  $\overline{v} = v^i {}_i\bar{e}$  we define **hermitian conjugated vector**

$$\overline{v}^* = (v^i)^* {}_i\bar{e}$$

**Definition 7.1.4.** Bilinear map

$$g : \overline{V} \times \overline{V} \rightarrow D$$

is called **hermitian scalar product** in  $D$ -vector space  $\overline{V}$ , if  ${}_{ii}g$  is hermitian scalar product in division ring  $D$  and  ${}_{ij}g = 0$  for  $i \neq j$ . □

## 7.2. Basis in Euclidean Space

When we introduce a metric in a central affine space we get a new geometry because we can measure a distance and a length of vector. If a metric is positive defined we call the space Euclid  $\mathcal{E}_n$  otherwise we call the space pseudo Euclid  $\mathcal{E}_{nm}$ .

Transformations that preserve length form Lie group  $SO(n)$  for Euclid space and Lie group  $SO(n, m)$  for pseudo Euclid space where  $n$  and  $m$  number of positive and negative terms in metrics.

**Definition 7.2.1.** **Orthonormal basis**  $\bar{\mathbf{e}} = (\bar{e}_i)$  is set of linearly independent vectors  $\bar{e}_i$  such that length of each vector is 1 and different vectors are orthogonal.  $\square$

**Definition 7.2.2.** **Basis manifold**  $\mathcal{B}(\mathcal{E}_n)$  of Euclid space is set of orthonormal bases of this space.  $\square$

A active transformation is called **movement**. An passive transformation is called **quasi movement**.

## CHAPTER 8

# Calculus in $D$ -Affine Space

### 8.1. Curvilinear Coordinates in $D$ -Affine Space

Let  $\overset{\rightarrow}{A}$  be  $D$ -affine space over continuous division ring  $D$ .<sup>8.1</sup>

Let  $(_1\bar{e}, \dots, _n\bar{e}, O)$  be  $D^*$ -basis of affine space. For each  $i$ ,  $i = 1, \dots, i = n$ , we define map<sup>8.2</sup>

$$(8.1.1) \quad \bar{x}_i : D \rightarrow \overset{\circ}{A} \quad v^i \mapsto O + v^i \cdot {}_i\bar{e}$$

For arbitrary point  $M(v^i)$  we can write vector  $\overset{\rightarrow}{OM}$  in form of linear combination

$$\overset{\rightarrow}{OM} = \bar{x}_i(v^i)$$

We consider the set of coordinates of affine space  $\overset{\circ}{A}$  as homeomorphism

$$f : \overset{\circ}{A} \rightarrow D^n$$

If homeomorphism

$$f : \overset{\circ}{A} \rightarrow D^n$$

is an arbitrary map of an open set of  $D$ -affine space into an open subset of the set  $D^n$ , then we will say that image of point  $A$  under map  $f$  is **curvilinear coordinates of point  $A$** , and map  $f$  is called the system of coordinates. If there are two systems of coordinates,  $f_1$  and  $f_2$ , then map  $f_1 f_2^{-1}$  is homeomorphism

$$\begin{aligned} g &: D^n \rightarrow D^n \\ x'^i &= x^i(x^1, \dots, x^n) \end{aligned}$$

and is called coordinate transformation. We can consider as particular case the coordinate transformation caused by affine transformation.

**Remark 8.1.1.** Let us consider a surface  $S$  in affine space defined by equation

$$\begin{aligned} f &: D^n \rightarrow D \\ f(x^1, \dots, x^n) &= 0 \end{aligned}$$

Let  $M(x^i)$  be arbitrary point. A small change of coordinates of the point

$$x'^i = x^i + \Delta x^i$$

leads to a small change of function

$$\Delta f = \partial f(\bar{x})(\Delta \bar{x})$$

<sup>8.1</sup>In this section, I explore curvilinear coordinates the way like it was done in [3], part V.

<sup>8.2</sup>There is no sum over index  $i$  in equation (8.1.1).

In particular, if neighboring points  $M(x^i)$  and  $L(x^i + \Delta x^i)$  belong to the same surface, then vector of increment  $\overrightarrow{ML} = \Delta \bar{x}$  satisfies to differential equation

$$\partial f(\bar{x})(\Delta \bar{x}) = 0$$

and is called vector tangent to surface  $S$ .

Since the Gâteaux derivative of map  $f$  in point  $X$  is a linear map, then this derivative is 1- $D$ -form. Let us consider the set of 1- $D$ -forms

$$dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}}$$

It is evident that

$$dx^i(\bar{a}) = \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}}(\bar{a}) = (x^i + a^i) - x^i = a^i$$

We can represent the Gâteaux derivative of arbitrary function in form

$$\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial \bar{x}} = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x^i} \left( \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}} \right) = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x^i} (dx^i)$$

$$(8.1.2) \quad \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial \bar{x}}(\bar{a}) = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x^i} \left( \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}}(\bar{a}) \right) = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x^i} (dx^i(\bar{a})) = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x^i}(a^i)$$

Therefore, the Gâteaux derivative of function  $f$  is linear combination of 1- $D$ -forms  $dx^i$ . Let

$$\begin{aligned} g : D^n &\rightarrow D^n \\ x'^i &= x^i(x^1, \dots, x^n) \end{aligned}$$

be coordinate transformation of affine space. From chain rule (theorem [8]-8.2.12), it follows

$$dx'^i = \frac{\partial x'^i}{\partial \bar{x}} = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} \left( \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}} \right) = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} (dx^j)$$

The coordinate line is a curve, along which changes only one coordinate  $x^i$ . We consider the coordinate line as a curve with a tangent vector

$$(8.1.3) \quad \bar{x}_i(\bar{x})(v) = \frac{\partial \bar{x}}{\partial x^i}(v)$$

Let the point  $O$  has coordinates  $\bar{x}$ . The set of vectors  $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$  is the basis of affine space

$$(\bar{x}_1(\bar{x}), \dots, \bar{x}_n(\bar{x}), \bar{x})$$

$$(8.1.4) \quad \bar{v} = \bar{x}_i(\bar{x})(v^i)$$

Let

$$\begin{aligned} g : D^n &\rightarrow D^n \\ x'^i &= x^i(x^1, \dots, x^n) \end{aligned}$$

be coordinate transformation of affine space. From chain rule (theorem [8]-8.2.12), it follows

$$(8.1.5) \quad \bar{x}'_i(\bar{x}')(v'^i) = \frac{\partial \bar{x}}{\partial x'^i}(v'^i) = \frac{\partial \bar{x}}{\partial x^j} \left( \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}(v'^i) \right) = \bar{x}_j(\bar{x}) \left( \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}(v'^i) \right)$$

The rule of transformation of coordinates of vector

$$(8.1.6) \quad v^j = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}(v'^i)$$

follows from comparison of equations (8.1.4), (8.1.5).

**Example 8.1.2.** Let us consider linear coordinate transformation

$$(8.1.7) \quad \begin{aligned} x'^1 &= ax^1b + ax^2c \\ x'^2 &= x^1 + x^2 \end{aligned}$$

Than

$$(8.1.8) \quad \begin{aligned} x^1 &= x'^2 - x^2 \\ x'^1 &= a(x'^2 - x^2)b + ax^2c = ax'^2b + ax^2(c - b) \\ (8.1.9) \quad ax^2(c - b) &= x'^1 - ax'^2b \end{aligned}$$

From equations (8.1.8), (8.1.9), it follows inverse transformation

$$(8.1.10) \quad \begin{aligned} x^2 &= a^{-1}x'^1(c - b)^{-1} - x'^2b(c - b)^{-1} \\ x^1 &= x'^2 - a^{-1}x'^1(c - b)^{-1} + x'^2b(c - b)^{-1} \\ &= -a^{-1}x'^1(c - b)^{-1} + x'^2(1 + b(c - b)^{-1}) \end{aligned}$$

From equations (8.1.7), it follows rule of transformation of 1-D-forms

$$\begin{aligned} dx'^1 &= adx^1b + adx^2c \\ dx'^2 &= dx^1 + dx^2 \end{aligned}$$

Rule of transformation of vector

$$\begin{aligned} v^1 &= -a^{-1}v'^1(c - b)^{-1} + v'^2(1 + b(c - b)^{-1}) \\ v^2 &= a^{-1}v'^1(c - b)^{-1} - v'^2b(c - b)^{-1} \end{aligned}$$

follows from equations (8.1.6), (8.1.10).  $\square$

## 8.2. Paralel Transfer

Let a vector  $\bar{v}$  have coordinates  $v_0^i$  in the point  $M_0$ . Let the vector  $\overrightarrow{M_0M_1}$  be the vector of infinitesimal displacement. Let  $N_0 = M_0 + \bar{v}$ ,  $N_1 = M_1 + \bar{v}$ . According to axiom 3 of definition 6.1.1 coordinates of vectors  $\overrightarrow{M_0N_0}$  and  $\overrightarrow{M_1N_1}$  equal. How this construction will look like in curvilinear coordinates?

We assume that functions  $v^i(\bar{x})$  are continuously differentiable in the Gâteaux sense. Therefore, vectors of the local basis  $\bar{x}_i$  and coordinates of the vector  $v^i$  are functions continuously differentiable in the Gâteaux sense. The equation

$$(8.2.1) \quad \bar{v} = \bar{x}_i(\bar{x})(v^i(\bar{x}))$$

is true at the point  $M(\bar{x})$ . Since  $\bar{v} = \text{const}$ , then differentiating the equation (8.2.1) with respect to  $\bar{x}$  we get

$$(8.2.2) \quad 0 = \frac{\partial \bar{x}_i(\bar{x})}{\partial \bar{x}}(v^i)(\bar{a}) + \bar{x}_i(\bar{x}) \left( \frac{\partial v^i}{\partial \bar{x}}(\bar{a}) \right)$$

From equations (8.1.2), (8.2.2), it follows

$$(8.2.3) \quad 0 = \frac{\partial \bar{x}_i(\bar{x})}{\partial x^j}(v^i)(a^j) + \bar{x}_i(\bar{x}) \left( \frac{\partial v^i}{\partial x^j}(a^j) \right)$$

The expression  $\frac{\partial \bar{x}_i(\bar{x})}{\partial x^j}(v^i)(a^j)$  is a vector of affine space and, in the local basis  $\bar{x}_i(\bar{x})$ , this expression has expansion

$$(8.2.4) \quad \frac{\partial \bar{x}_i(\bar{x})}{\partial x^j}(v^i)(a^j) = \bar{x}_k(\bar{x})(\Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j))$$

where  $\Gamma_{ji}^k$  are bilinear maps that we call **connection coefficients in  $D$ -affine space**. From equations (8.2.4), (8.2.3), it follows

$$(8.2.5) \quad 0 = \bar{x}_k(\bar{x})(\Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j)) + \bar{x}_i(\bar{x}) \left( \frac{\partial v^i}{\partial x^j}(a^j) \right)$$

Because  $\bar{x}_k(\bar{x})$  is the local basis, than, from equation (8.2.5), it follows

$$0 = \bar{x}_k(\bar{x}) \left( \Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j) + \frac{\partial v^k}{\partial x^j}(a^j) \right)$$

$$(8.2.6) \quad 0 = \Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j) + \frac{\partial v^k}{\partial x^j}(a^j)$$

Because  $\bar{u}$  is an arbitrary vector, than we can write the equation (8.2.6) in the following form

$$(8.2.7) \quad 0 = \Gamma_{ji}^k(v^i) + \frac{\partial v^k}{\partial x^j}$$

**Theorem 8.2.1.** *In affine space*

$$(8.2.8) \quad \Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j) = \Gamma_{ij}^k(v^i)(a^j)$$

PROOF. According to equation (8.1.3),

$$(8.2.9) \quad \frac{\partial \bar{x}_i(\bar{x})}{\partial x^j}(v^i)(a^j) = \frac{\partial^2 \bar{x}}{\partial x^j \partial x^i}(v^i; a^j)$$

According to theorem [8]-8.3.6

$$(8.2.10) \quad \frac{\partial^2 \bar{x}}{\partial x^j \partial x^i}(v^i; a^j) = \frac{\partial^2 \bar{x}}{\partial x^i \partial x^j}(v^i; a^j)$$

Equation (8.2.8) follows from equations (8.2.4), (8.2.10).  $\square$

Let

$$\begin{aligned} g : D^n &\rightarrow D^n \\ x'^i &= x'^i(x^1, \dots, x^n) \end{aligned}$$

be coordinate transformation of affine space. Let us differentiate the equation (8.1.5) with respect to  $x'^j$

$$(8.2.11) \quad \begin{aligned} &\frac{\partial \bar{x}'_i(\bar{x}')}{\partial x'^j}(v'^i)(a'^j) \\ &= \frac{\bar{x}_k(\bar{x}) \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right)}{\partial x^m} \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) + \bar{x}_k(\bar{x}) \left( \frac{\partial^2 x^k}{\partial x'^j \partial x'^i}(v'^i; a'^j) \right) \end{aligned}$$

From equations (8.2.4), (8.2.11), it follows that

$$(8.2.12) \quad \begin{aligned} &\bar{x}'_p(\bar{x}')( \Gamma'_{ji}^p(v'^i)(a'^j) ) \\ &= \bar{x}_r(\bar{x}) \left( \Gamma_{mk}^r \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right) \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) \right) + \bar{x}_r(\bar{x}) \left( \frac{\partial^2 x^r}{\partial x'^j \partial x'^i}(v'^i; a'^j) \right) \\ &= \bar{x}_r(\bar{x}) \left( \Gamma_{mk}^r \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right) \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) + \frac{\partial^2 x^r}{\partial x'^j \partial x'^i}(v'^i; a'^j) \right) \end{aligned}$$

From equations (8.1.5), (8.2.12) it follows that

$$(8.2.13) \quad \begin{aligned} & \bar{x}'_p(\bar{x}')(\Gamma'_{ji}^p(v'^i)(a'^j)) \\ &= \bar{x}'_p(\bar{x}) \left( \frac{\partial x'^p}{\partial x^r} \left( \Gamma_{mk}^r \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right) \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) + \frac{\partial^2 x^r}{\partial x'^j \partial x'^i}(v'^i; a'^j) \right) \right) \end{aligned}$$

From equation (8.2.13) it follows that

$$(8.2.14) \quad \begin{aligned} & \Gamma'_{ji}^p(v'^i)(a'^j) \\ &= \frac{\partial x'^p}{\partial x^r} \left( \Gamma_{mk}^r \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right) \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) + \frac{\partial^2 x^r}{\partial x'^j \partial x'^i}(v'^i; a'^j) \right) \end{aligned}$$



## CHAPTER 9

# Manifolds with $D$ -Affine Connections

The main goal of this chapter is to give general presentation about problems that we need to solve in process of exploration the differential geometry.

### 9.1. Manifolds with $D$ -Affine Connections

**Definition 9.1.1.** Fibered central  $D$ -affine space is called **manifold with  $D$ -affine connections**.  $\square$

We assume that dimension of base equal to dimension of fiber. This allows us to identify fiber with tangent space of base. Let us consider subset  $U$  of manifold where homeomorphism

$$\bar{x} : D^n \rightarrow U$$

is defined.

We assume that map between fibers is morphism of central  $D$ -affine space

$$d\bar{v} = \Gamma(\bar{v})(d\bar{x})$$

where bilinear map  $\Gamma$  is called  **$D$ -affine connection**. In the local basis we can represent connection as the set of bilinear functions  $\Gamma_{ij}^k$

$$\Gamma(\bar{v})(\bar{a}) = \bar{x}_k(\bar{x})(\Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j))$$

that we call  **$D$ -affine connection coefficients**. When we move from coordinate system  $\bar{x}$  to coordinate system  $\bar{x}'$   $D$ -affine connection coefficients transform according to rule

$$\begin{aligned} & \Gamma'_{ji}^{ip}(v'^i)(a'^j) \\ &= \frac{\partial x'^p}{\partial x^r} \left( \Gamma_{mk}^r \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right) \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) + \frac{\partial^2 x^r}{\partial x'^j \partial x'^i}(v'^i; a'^j) \right) \end{aligned}$$

Covariant derivative of vector field  $\bar{v}$  has form

$$D(\bar{v})(d\bar{x}) = \partial(\bar{v})(d\bar{x}) - \Gamma(\bar{v})(d\bar{x})$$

A vector field  $\bar{v}$  is being parallel transported in given direction if

$$\partial(\bar{v})(d\bar{x}) = \Gamma(\bar{v})(d\bar{x})$$

If  $\bar{x} = \bar{x}(t)$  is map of real field into considered space, then this map determines geodesic if tangent vector is being parallel transported along geodesic

$$(9.1.1) \quad \partial(\partial\bar{x}(d\bar{x}))(d\bar{x}) = \Gamma(d\bar{x})(d\bar{x})$$

Equation (9.1.1) is equivalent to equation

$$(9.1.2) \quad \partial^2\bar{x}(d\bar{x}; d\bar{x}) = \Gamma(d\bar{x})(d\bar{x})$$



## CHAPTER 10

### References

- [1] Serge Lang, Algebra, Springer, 2002
- [2] S. Burris, H.P. Sankappanavar, A Course in Universal Algebra, Springer-Verlag (March, 1982),  
eprint <http://www.math.uwaterloo.ca/~snburris/htdocs/ualg.html>  
(The Millennium Edition)
- [3] P. K. Rashevsky, Riemann Geometry and Tensor Calculus,  
Moscow, Nauka, 1967
- [4] A. G. Kurosh, High Algebra, Moscow, Nauka, 1968
- [5] Aleks Kleyn, Lectures on Linear Algebra over Division Ring,  
eprint [arXiv:math.GM/0701238](https://arxiv.org/abs/math.GM/0701238) (2007)
- [6] Aleks Kleyn, Fibered Correspondence,  
eprint [arXiv:0707.2246](https://arxiv.org/abs/0707.2246) (2007)
- [7] Aleks Kleyn, Morphism of  $T^*$ -Representations,  
eprint [arXiv:0803.2620](https://arxiv.org/abs/0803.2620) (2008)
- [8] Aleks Kleyn, Introduction into Calculus over Division Ring,  
eprint [arXiv:0812.4763](https://arxiv.org/abs/0812.4763) (2008)
- [9] John C. Baez, An Introduction to n-Categories,  
eprint [arXiv:q-alg/9705009](https://arxiv.org/abs/q-alg/9705009) (1997)
- [10] Paul M. Cohn, Universal Algebra, Springer, 1981
- [11] Paul Bamberg, Shlomo Sternberg, A course in mathematics for students  
of physics, Cambridge University Press, 1991
- [12] Alain Connes, Noncommutative Geometry,  
Academic Press, 1994

## CHAPTER 11

# Index

- active transformation of basis of representation 32
- affine transformation group 56
- associative law for covariant  $\star T$ -representation 22
- associative law for covariant  $T\star$ -representation 22
- automorphism of representation  $f$  12
- automorphism of representation regular on generating set  $X$  30
- automorphism of representation singular on generating set  $X$  30
- basis manifold of central affine space 56
- basis manifold of Euclid space 58
- basis of representation 31
- category of  $T\star$ -representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  21
- category of  $T\star$ -representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra from category  $\mathcal{A}$  16
- center of ring  $D$  43
- central affine basis 56
- connection coefficients in  $D$ -affine space 62
- contravariant  $\star T$ -representation of group 22
- contravariant  $T\star$ -representation of group 22
- coordinates of basis of representation 31
- coordinates of basis  $X'_*$  of representation in representation  $f_{2,3}$  relative to basis  $X_*$  40
- coordinates of element of representation 31
- coordinates of the tuple  $x_*$  of representation  $f_{2,3}$  relative to basis  $X_*$  40
- covariant  $\star T$ -representation of group 22
- covariant  $T\star$ -representation of group 21
- curvilinear coordinates of point in affine space 59
- $D$ -affine connection on manifold with affine connections 65
- $D$ -affine connection coefficients on manifold 65
- direct product of  $T\star$ -representations of group 24
- $D^*$ -affine basis 55
- $D^*$ -basis manifold of affine space 55
- effective representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  10
- effective tower of  $T\star$ -representations 37
- effective  $T\star$ -representation of group 25
- Euclidean metric on division ring 52
- Euclidean scalar product in  $D$ -vector space 57
- Euclidean scalar product on division ring 52
- free  $T\star$ -representation of group 25
- generating set of representation 30
- generating set of subrepresentation 30
- generating tuple of representation  $f_*$  40
- generating tuple of subrepresentation  $J_{f_*}(X)$  40
- hermitian conjugated vector 57
- hermitian conjugation in division ring 52
- hermitian metric on division ring 52
- hermitian scalar product in  $D$ -vector space 57
- hermitian scalar product on division ring 52
- homogeneous space of group 26
- kernel of inefficiency of  $T\star$ -representation of group  $G$  25
- left shift on group 23
- left-side representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in set  $M$  9
- left-side transformation 9
- little group 25
- manifold with  $D$ -affine connections 65
- matrix of bilinear function 47
- matrix of quadratic map 49
- morphism from tower of  $T\star$ -representations into tower of  $T\star$ -representations 35

- morphism of representations from  $f$  into  $g$  11
- morphism of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra 11
- morphism of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra in  $\mathfrak{H}$ -algebra 29
- movement on basis manifold 58
- nonsingular bilinear function 47
- nonsingular transformation 23
- orbit of  $T\star$ -representation of group 24
- orthonormal basis 58
- product of morphisms of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra 15
- pseudo-Euclidean metric on division ring 52
- pseudo-Euclidean scalar product in  $D$ -vector space 57
- pseudo-Euclidean scalar product on division ring 52
- quadratic form in division ring 51
- quadratic map of division ring 48
- quasi affine transformation on basis manifold 56
- quasi movement on basis manifold 58
- rank of quadratic map of division ring 49
- regular automorphism of representation 30
- regular quadratic map in division ring 49
- representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in category  $\mathcal{B}$  41
- representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in set  $M$  10
- representation of  $\mathcal{F}$ -algebra in representation 34
- representation of  $\mathcal{F}$ -algebra in tower of representations 34
- right shift on group 23
- right-side representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in set  $M$  9
- right-side transformation 9
- ring has characteristic 0 43
- ring has characteristic  $p$  43
- single transitive representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  10
- space of orbits of  $T\star$ -representation 24
- stability group 25
- stable set of representation 29
- standard component of quadratic map  $f$  over field  $F$  49
- standard component over field  $F$  of bilinear map  $f$  47
- standard representation of quadratic map of division ring over field  $F$  49
- standard representation over field  $F$  of bilinear map of division ring 47
- $\star T$ -representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in set  $M$  9
- $\star T$ -shift 23
- $\star T$ -transformation 9
- structural constants of division ring  $D$  over field  $F$  45
- subrepresentation generated by set  $X$  30
- subrepresentation of representation 29
- subrepresentation of representation  $f_*$  generated by tuple of sets 40
- subrepresentation of representation of algebra in representation 38
- symmetric bilinear map of  $D$ -vector space to division ring 57
- tower of representations of  $\mathfrak{F}$ -algebras 33
- transformation coordinated with equivalence 16
- transformation of set 9
- transitive representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  10
- $T\star$ -representation of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  in set  $M$  9
- $T\star$ -shift 23
- $T\star$ -transformation 9
- tuple of stable sets of representation 38
- twin representations of group 28

## CHAPTER 12

### Special Symbols and Notations

$\vec{A}$  affine space 55  
 $a^*$  hermitian conjugation in division ring 52  
 $\star t$  right shift 23  
 $t_\star$  left shift 23  
 $\mathcal{B}(D^* \mathcal{A}_n)$   $D^*$ -basis manifold of affine space 55  
 $\mathcal{B}(CA_n)$  basis manifold of central affine space 56  
 $\mathcal{B}(\mathcal{E}_n)$  basis manifold of Euclid space 58  
 $\mathcal{B}_f$  lattice of subrepresentations of representation  $f$  29  
 $\mathcal{B}_{f_*}$  lattice of subrepresentations of representation  $f_*$  38  
 $i_j B^k$  structural constants of division ring  $D$  over field  $F$  45  
 $CA_n$  central affine space 56  
 $(\bar{e}, O) = (\bar{e}_i, O)$  affine basis 55  
 $\mathcal{E}_n$  Euclid space 58  
 $\mathcal{E}_{nm}$  pseudo Euclid space 58  
 $\bar{\bar{e}} = (\bar{e}_i)$  central affine basis 56  
 $f(G)v$  representation orbit of group  $G$  24  
 $\bar{\bar{e}} = (\bar{e}_i)$  orthonormal basis 58  
 $f^{ijk}$  standard component of quadratic map  $f$  over field  $F$  49  
 $GL(\mathcal{A}_n)$  affine transformation group 56  
 $G_x$  little group of  $x$  25  
 $vG$  orbit of effective covariant  $\star T$ -representation of group 26  
 $Gv$  orbit of effective covariant  $T\star$ -representation of group 26  
 $G_x$  stability group of  $x$  25  
 $J_f$  closure operator of representation  $f$  30  
 $J_{f_*}$  closure operator of representation  $f_*$  39

$M^*$  set of  $\star T$ -transformations of set  $M$  9  
 ${}^*M$  set of transformations of set  $M$  10  
 ${}^*M$  set of  $T\star$ -transformations of set  $M$  9  
 $M/\star t(G)$  space of orbits of effective  $\star T$ -covariant representation of the group 26  
 $M/t_\star(G)$  space of orbits of effective  $T\star$ -covariant representation of the group 26  
 $M/f(G)$  space of orbits of  $T\star$ -representation  $f$  of group  $G$  in set  $M$  24  
 $T \star \mathfrak{F}$  category of  $T\star$ -representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra  $A$  21  
 $T \star \mathcal{A}$  category of  $T\star$ -representations of  $\mathfrak{F}$ -algebra from category  $\mathcal{A}$  16  
 $\bar{v}^*$  hermitian conjugated vector 57  
 $w(X', X)$  coordinates of basis  $X'$  relative to basis  $X$  of representation 31  
 $w(X'_*, X_*)$  coordinates of basis  $X'_*$  of representation in representation  $f_{2,3}$  relative to basis  $X_*$  40  
 $w(m, X)$  coordinates of  $m \in M$  relative to basis  $X$  of representation 31  
 $w(x_*, X_*)$  coordinates of the tuple  $x_*$  of representation  $f_{2,3}$  relative to basis  $X_*$  40  
 $\bar{x}_i(\bar{x})$  local basis of affine space 60  
 $Z(D)$  center of ring  $D$  43  
 $\delta$  identical transformation 9  
 $\Gamma_{ji}^k$  connection coefficients in  $D$ -affine space 61  
 $\Gamma(\bar{v})(d\bar{x})$  connection in  $D$ -affine manifold 65  
 $\Gamma_{ji}^k$   $D$ -affine connection coefficients on manifold 65

# Введение в геометрию над телом

Александр Клейн

*E-mail address:* Aleks\_Kleyn@mailAPS.org  
*URL:* <http://sites.google.com/site/alekskleyn/>  
*URL:* [http://arxiv.org/a/kleyn\\_a\\_1](http://arxiv.org/a/kleyn_a_1)  
*URL:* <http://AleksKleyn.blogspot.com/>

**Аннотация.** Теория представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры является естественным развитием теории  $\mathfrak{F}$ -алгебры. Изучение морфизмов представлений ведёт к понятиям множества образующих и базиса представления. В книге рассмотрено понятие башни  $T^*$ -представлений  $\mathfrak{F}_i$ -алгебр,  $i = 1, \dots, n$ , как множество согласованных  $T^*$ -представлений  $\mathfrak{F}_i$ -алгебр.

Рассматривается геометрия аффинного пространства как пример башни представлений. Изучение криволинейных координат позволяет понять как выглядят основные структуры в многообразии аффинной связности. Рассматривается геометрия евклидова пространства над телом.

# Оглавление

Глава 1. Предисловие . . . . .	5
1.1. Башня представлений . . . . .	5
1.2. Морфизм и базис представления . . . . .	5
1.3. $D$ -аффинное пространство . . . . .	6
1.4. Соглашения . . . . .	7
Глава 2. Представление $\mathfrak{F}$ -алгебры . . . . .	9
2.1. Представление $\mathfrak{F}$ -алгебры . . . . .	9
2.2. Морфизм представлений $\mathfrak{F}$ -алгебры . . . . .	11
2.3. Представление группы . . . . .	21
2.4. Однотранзитивное $T^*$ -представление группы . . . . .	26
2.5. Базис $T^*$ -представления . . . . .	29
2.6. Несколько примеров базиса представления . . . . .	33
Глава 3. Башня представлений $\mathfrak{F}$ -алгебр . . . . .	35
3.1. Башня представлений $\mathfrak{F}$ -алгебр . . . . .	35
3.2. Морфизм башни $T^*$ -представлений . . . . .	37
3.3. Базис башни представлений . . . . .	39
3.4. Примеры базиса башни представлений . . . . .	43
3.5. Представление в категории . . . . .	44
Глава 4. Геометрия тела . . . . .	45
4.1. Центр тела . . . . .	45
4.2. Геометрия тела над полем . . . . .	47
Глава 5. Квадратичное отображение тела . . . . .	49
5.1. Билинейное отображение тела . . . . .	49
5.2. Квадратичное отображение тела . . . . .	50
Глава 6. $D$ -аффинное пространство . . . . .	57
6.1. $D$ -аффинное пространство . . . . .	57
6.2. Базис в $D$ -аффинном пространстве . . . . .	59
Глава 7. Евклидово пространство . . . . .	63
7.1. Евклидово пространство . . . . .	63
7.2. Базис в евклидовом пространстве . . . . .	64
Глава 8. Математический анализ в $D$ -аффинном пространстве . . . . .	65
8.1. Криволинейные координаты в $D$ -аффинном пространстве . . . . .	65
8.2. Параллельный перенос . . . . .	67
Глава 9. Многообразие $D$ -аффинной связности . . . . .	71

9.1. Многообразие $D$ -аффинной связности . . . . .	71
Глава 10. Список литературы . . . . .	73
Глава 11. Предметный указатель . . . . .	74
Глава 12. Специальные символы и обозначения . . . . .	76

## Глава 1

# Предисловие

### 1.1. Башня представлений

Основная задача предлагаемой книги - это рассмотрение простейших геометрических конструкций над телом.

Однако я решил не ограничивать эту книгу описанием аффинной и евклидовой геометрии. В процессе построения аффинной геометрии я обнаруживаю интересную конструкцию. Я сперва определяю  $D^*$ -векторное пространство  $\bar{V}$ . Это  $T^*$ -представление тела  $D$  в аддитивной группе. Затем я рассматриваю множество точек, в котором определено представление  $D^*$ -векторного пространства  $\bar{V}$ . Эта многоярусная конструкция пробудила мой интерес и вернула меня к изучению  $T^*$ -представлений  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры.

Таким образом возникла концепция башни  $T^*$ -представлений. Как только я начал рисовать диаграммы, связанные с башней  $T^*$ -представлений, я увидел узор, похожий на диаграммы, построенные в статье [9]. Хотя мне не удалось довести эту аналогию до конца, я надеюсь, что эта аналогия может привести к интересным результатам.

### 1.2. Морфизм и базис представления

Изучение теории представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры показывает, что эта теория имеет много общего с теорией  $\mathfrak{F}$ -алгебры. В [5, 6, 7] я изучал морфизмы представления. Это отображения, которые сохраняют структуру представления  $\mathfrak{F}$ -алгебры (или башни представлений).

Линейные отображения векторных пространств являются примерами морфизма представлений. Понятие базиса является важной конструкцией в теории линейных пространств. Понятие базиса непосредственно связано с тем, что группа морфизмов линейного пространства имеет два однотранзитивных представления. Основная функция базиса - это порождать линейное пространство.

Возникает естественный вопрос. Можно ли обобщить эту конструкцию на произвольное представление? Базис - это не единственное множество, которое порождает векторное пространство. Это утверждение является исходной точкой, от которой я начал изучение множества образующих представления. Множество образующих представления - это ещё одна интересная параллель теории представлений с теорией универсальной алгебры.

Не для всякого представления возможность найти множество образующих равносильна возможности построения базиса. Задача найти класс представлений, где возможно построение базиса является интересной и важной задачей. Мне интересно, можно ли найти эффективный алгоритм построения базиса квантовой геометрии.

### 1.3. $D$ -аффинное пространство

Так же как и в случае  $D$ -векторных пространств, я могу начать с рассмотрения  $D^*$ -аффинного пространства и затем перейти к рассмотрению  $D$ -аффинных пространств. Однако на этом пути я не ожидаю новых явлений. Так как меня интересуют операции, связанные с дифференцированием, я сразу начинаю с рассмотрения  $D$ -аффинного пространства.

С того момента, как я понял, что аффинное пространство является башней представлений, а линейные отображения аффинных пространств являются морфизмами башни представлений, я понял как будет выглядеть связность в многообразии  $D$ -аффинной связности. Тем не менее, прежде чем изучать многообразие аффинной связности, я решил исследовать криволинейные координаты в аффинном пространстве.

Хотя я хорошо представлял, что должно происходить при замене координат, увиденное превзошло мои ожидания. Я встретил две очень важные концепции.

Я начал с построения аффинного пространства как башни представлений. Оказалось, что существует ещё одна модель, в которой векторные поля представлены в виде множества отображений.<sup>1.1</sup> Тем не менее эти две модели не противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга.

Второе наблюдение для меня не оказалось неожиданностью. Когда я начал изучать  $D$ -векторные пространства, я был готов рассмотреть линейную комбинацию векторов как полилинейную форму, однако я очень быстро пришёл к выводу, что это не изменит размерности пространства, и потому ограничился рассмотрением  $D^*$ -базиса.

Интересно наблюдать, как в процессе создания книги появляется новая концепция. Построения, выполненные в главе 8 снова вернули меня к линейной комбинации как сумме линейных форм. Однако на этот раз речь идёт о линейной зависимости 1-форм. При этом коэффициенты линейной зависимости находятся не вне 1-формы, а внутри. Если мы рассматриваем 1-формы над полем, то 1-форма прозрачна для скаляров поля и для нас не имеет значение находятся ли коэффициенты вне формы или внутри.

Линейная зависимость является темой этой книги. Я рассмотрю этот вопрос в последующих работах. В этой книге я буду пользоваться этим понятием, полагая, что его свойства понятны из приводимых равенств.

Изучение криволинейных координат также позволило увидеть как преобразуются координаты  $D$ -аффинной связности при замене координат. Однако, то что мне удалось записать явный закон преобразования, на мой взгляд удача, связанная с тем, что связность имеет только один контравариантный индекс. У меня есть все основания полагать, что такая операция, как поднятие или опускание индекса тензора в римановом пространстве может иметь только неявную форму записи.

Впрочем, здесь есть ещё одно неисследованное поле деятельности. Я надеюсь, что хорошее владение техникой представления расслоенных  $\mathfrak{F}$ -алгебр даст ключ к решению этой проблемы.

---

<sup>1.1</sup>Пока неясно, приведёт ли меня эта модель к геометрии, которую изучает Ален Конн в [12]. Ответ на этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Многие годы для меня аффинная геометрия была символом самой простой геометрии. Я рад увидеть, что я ошибался. В нужную минуту аффинная геометрия оказалась источником вдохновения. Аффинная геометрия - это врата дифференциальной геометрии. И хотя, для того, чтобы погрузиться в дифференциальную геометрию, я должен хорошо освоиться с дифференциальными уравнениями, я завершаю книгу очень коротким экскурсом в многообразия аффинной связности, для того, чтобы почувствовать вкус новой геометрии.

#### 1.4. Соглашения

- (1) Функция и отображение - синонимы. Однако существует традиция соответствие между кольцами или векторными пространствами называть отображением, а отображение поля действительных чисел или алгебры кватернионов называть функцией. Я тоже следую этой традиции.
- (2) Тело  $D$  можно рассматривать как  $D$ -векторное пространство размерности 1. Соответственно этому, мы можем изучать не только гомоморфизм тела  $D_1$  в тело  $D_2$ , но и линейное отображение тел. При этом подразумевается, что отображение мультипликативно над максимально возможным полем. В частности, линейное отображение тела  $D$  мультипликативно над центром  $Z(D)$ . Это не противоречит определению линейного отображения поля, так как для поля  $F$  справедливо  $Z(F) = F$ . Если поле  $F$  отлично от максимально возможного, то я это явно указываю в тексте.
- (3) Несмотря на некоммутативность произведения многие утверждения сохраняются, если заменить например правое представление на левое представление или правое векторное пространство на левое векторное пространство. Чтобы сохранить эту симметрию в формулировках теорем я пользуюсь симметричными обозначениями. Например, я рассматриваю  $D\star$ -векторное пространство и  $\star D$ -векторное пространство. Запись  $D\star$ -векторное пространство можно прочесть как D-star-векторное пространство либо как левое векторное пространство. Запись  $D\star$ -линейно зависимые векторы можно прочесть как D-star-линейно зависимые векторы либо как векторы, линейно зависимые слева.
- (4) При рассмотрении свободной алгебры мы будем отождествлять вектор базиса  $\textcolor{red}{e}$  с единицей алгебры.



## Глава 2

# Представление $\mathfrak{F}$ -алгебры

## 2.1. Представление $\mathfrak{F}$ -алгебры

**Определение 2.1.1.** Мы будем называть отображение

$$t : M \rightarrow M$$

преобразованием множества  $M$ .  $\square$

**Определение 2.1.2.** Преобразование называется левосторонним преобразованием или  $T\star$ -преобразованием, если оно действует слева

$$u' = tu$$

Мы будем обозначать  ${}^*M$  множество  $T\star$ -преобразований множества  $M$ .

Если на множестве  $M$  определена структура  $\mathfrak{H}$ -алгебры ([2]), то множество  ${}^*M$  состоит из  $T\star$ -преобразований, являющихся гомоморфизмами  $\mathfrak{H}$ -алгебры.  $\square$

**Определение 2.1.3.** Преобразование называется правосторонним преобразованием или  $\star T$ -преобразованием, если оно действует справа

$$u' = ut$$

Мы будем обозначать  $M^\star$  множество  $\star T$ -преобразований множества  $M$ .

Если на множестве  $M$  определена структура  $\mathfrak{H}$ -алгебры ([2]), то множество  $M^\star$  состоит из  $\star T$ -преобразований, являющихся гомоморфизмами  $\mathfrak{H}$ -алгебры.  $\square$

Мы будем обозначать  $\delta$  тождественное преобразование.

**Определение 2.1.4.** Пусть на множестве  ${}^*M$  определена структура  $\mathfrak{F}$ -алгебры ([2]). Пусть  $A$  является  $\mathfrak{F}$ -алгеброй. Мы будем называть гомоморфизм

$$(2.1.1) \quad f : A \rightarrow {}^*M$$

левосторонним или  $T\star$ -представлением  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в множестве  $M$ .  $\square$

**Определение 2.1.5.** Пусть на множестве  $M^\star$  определена структура  $\mathfrak{F}$ -алгебры ([2]). Пусть  $A$  является  $\mathfrak{F}$ -алгеброй. Мы будем называть гомоморфизм

$$f : A \rightarrow M^\star$$

правосторонним или  $\star T$ -представлением  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в множестве  $M$ .  $\square$

Мы распространим на теорию представлений соглашение, описанное в замечании [5]-2.2.14. Мы можем записать принцип двойственности в следующей форме

**Теорема 2.1.6** (принцип двойственности). *Любое утверждение, справедливое для  $T\star$ -представления  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$ , будет справедливо для  $\star T$ -представления  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$ .*

**Замечание 2.1.7.** Существует две формы записи преобразования множества  $M$ . Если мы пользуемся операторной записью, то преобразование  $A$  записывается в виде  $Aa$  или  $aA$ , что соответствует  $T\star$ -преобразованию или  $\star T$ -преобразованию. Если мы пользуемся функциональной записью, то преобразование  $A$  записывается в виде  $A(a)$  независимо от того, это  $T\star$ -преобразование или  $\star T$ -преобразование. Эта запись согласована с принципом двойственности.

Это замечание является основой следующего соглашения. Когда мы пользуемся функциональной записью, мы не различаем  $T\star$ -преобразование и  $\star T$ -преобразование. Мы будем обозначать  ${}^*M$  множество преобразований множества  $M$ . Пусть на множестве  ${}^*M$  определена структура  $\mathfrak{F}$ -алгебры. Пусть  $A$  является  $\mathfrak{F}$ -алгеброй. Мы будем называть гомоморфизм

$$(2.1.2) \quad f : A \rightarrow {}^*M$$

представлением  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в множестве  $M$ .

Соответствие между операторной записью и функциональной записью однозначно. Мы можем выбирать любую форму записи, которая удобна для изложения конкретной темы.  $\square$

Диаграмма

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f(a)} & M \\ & \uparrow f & \\ & A & \end{array}$$

означает, что мы рассматриваем представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$ . Отображение  $f(a)$  является образом  $a \in A$ .

**Определение 2.1.8.** Мы будем называть представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  **эффективным**, если отображение (2.1.2) - изоморфизм  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в  ${}^*M$ .  $\square$

**Замечание 2.1.9.** Если  $T\star$ -представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры эффективно, мы можем отождествлять элемент  $\mathfrak{F}$ -алгебры с его образом и записывать  $T\star$ -преобразование, порождённое элементом  $a \in A$ , в форме

$$v' = av$$

Если  $\star T$ -представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры эффективно, мы можем отождествлять элемент  $\mathfrak{F}$ -алгебры с его образом и записывать  $\star T$ -преобразование, порождённое элементом  $a \in A$ , в форме

$$v' = va$$

$\square$

**Определение 2.1.10.** Мы будем называть представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры **транзитивным**, если для любых  $a, b \in V$  существует такое  $g$ , что

$$a = f(g)(b)$$

Мы будем называть представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры **однотранзитивным**, если оно транзитивно и эффективно.  $\square$

**Теорема 2.1.11.**  *$T\star$ -представление однотранзитивно тогда и только тогда, когда для любых  $a, b \in M$  существует одно и только одно  $g \in A$  такое, что  $a = f(g)(b)$*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие определений 2.1.8 и 2.1.10.  $\square$

Если на множестве  $M$  определена дополнительная структура, мы предъявляем к представлению  $\mathfrak{F}$ -алгебры дополнительные требования.

Пусть на множестве  $M$  определена структура алгебры типа  $\mathfrak{H}$ . Тогда мы полагаем, что преобразование

$$u' = f(a)(u)$$

является автоморфизмом алгебры типа  $\mathfrak{H}$  либо отражает симметрии алгебры типа  $\mathfrak{H}$ .

Если на множестве  $M$  определено понятие непрерывности, то мы полагаем, что преобразование

$$u' = f(a)(u)$$

непрерывно по  $u$  и, следовательно,

$$\left| \frac{\partial u'}{\partial u} \right| \neq 0$$

## 2.2. Морфизм представлений $\mathfrak{F}$ -алгебры

**Теорема 2.2.1.** *Пусть  $A$  и  $B$  -  $\mathfrak{F}$ -алгебры. Представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $B$*

$$g : B \rightarrow {}^*M$$

*и гомоморфизм  $\mathfrak{F}$ -алгебры*

$$(2.2.1) \quad h : A \rightarrow B$$

*определяют представление  $f$   $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & {}^*M \\ & \searrow h & \nearrow g \\ & B & \end{array}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Отображение  $f$  является гомоморфизмом  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в  $\mathfrak{F}$ -алгебру  ${}^*M$ , так как отображение  $g$  является гомоморфизмом  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $B$  в  $\mathfrak{F}$ -алгебру  ${}^*M$ .  $\square$

Если мы изучаем представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры в множествах  $M$  и  $N$ , то нас интересуют отображения из  $M$  в  $N$ , сохраняющие структуру представления.

**Определение 2.2.2.** Рассмотрим представление

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в  $M$  и представление

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $B$  в  $N$ . Пара отображений  $(r, R)$

$$(2.2.2) \quad r : A \longrightarrow B \quad R : M \longrightarrow N$$

таких, что  $r$  - гомоморфизм  $\mathfrak{F}$ -алгебры и

$$(2.2.3) \quad R \circ f(a) = g(r(a)) \circ R$$

называется **морфизмом представлений из  $f$  в  $g$** . Мы также будем говорить, что определён **морфизм представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры**.  $\square$

Для произвольного  $m \in M$  равенство (2.2.3) имеет вид

$$(2.2.4) \quad R(f(a)(m)) = g(r(a))(R(m))$$

**Замечание 2.2.3.** Рассмотрим морфизм представлений (2.2.2). Мы можем обозначать элементы множества  $B$ , пользуясь буквой по образцу  $b \in B$ . Но если мы хотим показать, что  $b$  является образом элемента  $a \in A$ , мы будем пользоваться обозначением  $r(a)$ . Таким образом, равенство

$$r(a) = r(a)$$

означает, что  $r(a)$  (в левой части равенства) является образом  $a \in A$  (в правой части равенства). Пользуясь подобными соображениями, мы будем обозначать элемент множества  $N$  в виде  $R(m)$ . Мы будем следовать этому соглашению, изучая соотношения между гомоморфизмами  $\mathfrak{F}$ -алгебр и отображениями между множествами, где определены соответствующие представления.

Мы можем интерпретировать (2.2.4) двумя способами

- Пусть преобразование  $f(a)$  отображает  $m \in M$  в  $f(a)(m)$ . Тогда преобразование  $g(r(a))$  отображает  $R(m) \in N$  в  $R(f(a)(m))$ .
- Мы можем представить морфизм представлений из  $f$  в  $g$ , пользуясь диаграммой

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{R} & N \\ f(a) \downarrow & & \downarrow g(r(a)) \\ M & \xrightarrow{(1)} & N \\ f \swarrow & & \searrow g \\ A & \xrightarrow{r} & B \end{array}$$

Из (2.2.3) следует, что диаграмма (1) коммутативна.  $\square$

**Определение 2.2.4.** Рассмотрим представление

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в  $M$ . Пара отображений  $(r, R)$

$$(2.2.5) \quad r : A \longrightarrow A \quad R : M \longrightarrow M$$

таких, что  $r$  - автоморфизм  $\mathfrak{F}$ -алгебры и

$$(2.2.6) \quad R \circ f(a) = f(r(a)) \circ R$$

называется **автоморфизмом представления  $f$** .  $\square$

**Теорема 2.2.5.** Рассмотрим представление

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  и представление

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $B$ . Морфизм

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

представлений из  $f$  в  $g$  удовлетворяет соотношению

$$(2.2.7) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = \omega(g(h(a_1)), \dots, g(h(a_n))) \circ H$$

для произвольной  $n$ -арной операции  $\omega$   $\mathfrak{F}$ -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как  $f$  - гомоморфизм, мы имеем

$$(2.2.8) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = H \circ f(\omega(a_1, \dots, a_n))$$

Из (2.2.3) и (2.2.8) следует

$$(2.2.9) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = g(h(\omega(a_1, \dots, a_n))) \circ H$$

Так как  $h$  - гомоморфизм, из (2.2.9) следует

$$(2.2.10) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = g(\omega(h(a_1), \dots, h(a_n))) \circ H$$

Так как  $g$  - гомоморфизм, из (2.2.10) следует (2.2.7).  $\square$

**Теорема 2.2.6.** Пусть отображение

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

является морфизмом из представления

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в представление

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $B$ . Если представление  $f$  эффективно, то отображение

$${}^*H : {}^*M \rightarrow {}^*N$$

определенное равенством

$$(2.2.11) \quad {}^*H(f(a)) = g(h(a))$$

является гомоморфизмом  $\mathfrak{F}$ -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как представление  $f$  эффективно, то для выбранного преобразования  $f(a)$  выбор элемента  $a$  определён однозначно. Следовательно, преобразование  $g(h(a))$  в равенстве (2.2.11) определено корректно.

Так как  $f$  - гомоморфизм, мы имеем

$$(2.2.12) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = {}^*H(f(\omega(a_1, \dots, a_n)))$$

Из (2.2.11) и (2.2.12) следует

$$(2.2.13) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = g(h(\omega(a_1, \dots, a_n)))$$

Так как  $h$  - гомоморфизм, из (2.2.13) следует

$$(2.2.14) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = g(\omega(h(a_1), \dots, h(a_n)))$$

Так как  $g$  - гомоморфизм,

$${}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = \omega(g(h(a_1)), \dots, g(h(a_n))) = \omega({}^*H(f(a_1)), \dots, {}^*H(f(a_n)))$$

следует из (2.2.14). Следовательно, отображение  ${}^*H$  является гомоморфизмом  $\mathfrak{F}$ -алгебры.  $\square$

**Теорема 2.2.7.** *Если представление*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  однотранзитивно и представление

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $B$  однотранзитивно, то существует морфизм

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

представлений из  $f$  в  $g$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Выберем гомоморфизм  $h$ . Выберем элемент  $m \in M$  и элемент  $n \in N$ . Чтобы построить отображение  $H$ , рассмотрим следующую диаграмму

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{H} & N \\ \downarrow a & & \downarrow h(a) \\ M & \xrightarrow{(1)} & N \\ \downarrow f & \xrightarrow{H} & \downarrow g \\ A & \xrightarrow{h} & B \end{array}$$

Из коммутативности диаграммы (1) следует

$$H(am) = h(a)H(m)$$

Для произвольного  $m' \in M$  однозначно определён  $a \in A$  такой, что  $m' = am$ . Следовательно, мы построили отображение  $H$ , которое удовлетворяет равенству (2.2.3).  $\square$

**Теорема 2.2.8.** *Если представление*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  однотранзитивно и представление

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $B$  однотранзитивно, то для заданного гомоморфизма  $\mathfrak{F}$ -алгебры

$$h : A \longrightarrow B$$

отображение

$$H : M \longrightarrow N$$

такое, что  $(h, H)$  является морфизмом представлений из  $f$  в  $g$ , единственно с точностью до выбора образа  $n = H(m) \in N$  заданного элемента  $m \in M$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Из доказательства теоремы 2.2.7 следует, что выбор гомоморфизма  $h$  и элементов  $m \in M, n \in N$  однозначно определяет отображение  $H$ .  $\square$

**Теорема 2.2.9.** *Если представление*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

$\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  однотранзитивно, то для любого автоморфизма  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  существует автоморфизм

$$p : A \longrightarrow A \quad P : M \longrightarrow M$$

представления  $f$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Рассмотрим следующую диаграмму

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{H} & M \\ \downarrow a & & \downarrow p(a) \\ M & \xrightarrow{(1)} & M \\ \downarrow f & \searrow H & \downarrow f \\ A & \xrightarrow{p} & A \end{array}$$

Утверждение теоремы является следствием теоремы 2.2.7.  $\square$

**Теорема 2.2.10.** Пусть

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$ ,

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $B$ ,

$$h : C \rightarrow {}^*L$$

представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $C$ . Пусть определены морфизмы представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры

$$p : A \longrightarrow B \quad P : M \longrightarrow N$$


$$q : B \longrightarrow C \quad Q : N \longrightarrow L$$

Тогда определён морфизм представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры

$$r : A \longrightarrow C \quad R : M \longrightarrow L$$

где  $r = qp$ ,  $R = QP$ . Мы будем называть морфизм  $(r, R)$  представлений из  $f$  в  $h$  произведением морфизмов  $(p, P)$  и  $(q, Q)$  представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Мы можем представить утверждение теоремы, пользуясь диаграммой



Отображение  $r$  является гомоморфизмом  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в  $\mathfrak{F}$ -алгебру  $C$ . Нам надо показать, что пара отображений  $(r, R)$  удовлетворяет (2.2.3):

$$\begin{aligned} R(f(a)m) &= QP(f(a)m) \\ &= Q(g(p(a))P(m)) \\ &= h(qp(a))QP(m)) \\ &= h(r(a))R(m) \end{aligned}$$

□

**Определение 2.2.11.** Допустим  $\mathcal{A}$  категория  $\mathfrak{F}$ -алгебр. Мы определим **категорию  $T^* \mathcal{A}$**   $T^*$ -представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры из категории  $\mathcal{A}$ . Объектами этой категории являются  $T^*$ -представлениями  $\mathfrak{F}$ -алгебры. Морфизмами этой категории являются морфизмы  $T^*$ -представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры. □

**Теорема 2.2.12.** Автоморфизмы представления  $f$  порождают полугруппу.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Из теоремы 2.2.10 следует, что произведение автоморфизмов  $(p, P)$ ,  $(r, R)$  представления  $f$  является автоморфизмом  $(pr, PR)$  представления  $f$ . □

**Определение 2.2.13.** Пусть на множестве  $M$  определена эквивалентность  $S$ . Преобразование  $f$  называется **согласованным с эквивалентностью  $S$** , если из условия  $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$  следует  $f(m_1) \equiv f(m_2) \pmod{S}$ . □

**Теорема 2.2.14.** Пусть на множестве  $M$  определена эквивалентность  $S$ . Пусть на множестве  $*M$  определена  $\mathfrak{F}$ -алгебра. Если преобразования согласованы с эквивалентностью  $S$ , то мы можем определить структуру  $\mathfrak{F}$ -алгебры на множестве  $(*M)/S$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $h = \text{nat } S$ . Если  $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$ , то  $h(m_1) = h(m_2)$ . Поскольку  $f \in *M$  согласовано с эквивалентностью  $S$ , то  $h(f(m_1)) = h(f(m_2))$ . Это позволяет определить преобразование  $F$  согласно правилу

$$F([m]) = h(f(m))$$

Пусть  $\omega$  -  $n$ -арная операция  $\mathfrak{F}$ -алгебры. Пусть  $f_1, \dots, f_n \in {}^*M$  и

$$F_1([m]) = h(f_1(m)) \quad \dots \quad F_n([m]) = h(f_n(m))$$

Мы определим операцию на множестве  ${}^*(M/S)$  по правилу

$$\omega(F_1, \dots, F_n)[m] = h(\omega(f_1, \dots, f_n)m)$$

Это определение корректно, так как  $\omega(f_1, \dots, f_n) \in {}^*M$  и согласовано с эквивалентностью  $S$ .  $\square$

**Теорема 2.2.15.** *Пусть*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

*представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$ ,*

$$g : B \rightarrow {}^*N$$


*представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $B$ . Пусть*

$$r : A \longrightarrow B \quad R : M \longrightarrow N$$

*морфизмы представлений из  $f$  в  $g$ . Положим*

$$s = rr^{-1} \quad S = RR^{-1}$$

*Тогда для отображений  $r$ ,  $R$  существуют разложения, которые можно описать диаграммой*



- $s = \ker r$  является конгруэнцией на  $A$ . Существует разложение гомоморфизма  $r$

$$(2.2.15) \quad r = itj$$

$j = \text{nat } s$  - естественный гомоморфизм

$$(2.2.16) \quad j(a) = j(a)$$

$t$  - изоморфизм

$$(2.2.17) \quad r(a) = t(j(a))$$

$i$  - вложение

$$(2.2.18) \quad r(a) = i(r(a))$$

- $S = \ker R$  является эквивалентностью на  $M$ . Существует разложение отображения  $R$

$$(2.2.19) \quad R = ITJ$$

$J = \text{nat } S$  - сюръекция

$$(2.2.20) \quad J(m) = J(m)$$

$T$  - биекция

$$(2.2.21) \quad R(m) = T(J(m))$$

$I$  - вложение

$$(2.2.22) \quad R(m) = I(R(m))$$

- $F$  -  $T\star$ -представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A/s$  в  $M/S$
- $G$  -  $T\star$ -представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $rA$  в  $RM$
- Существует разложение морфизма представлений

$$(r, R) = (i, I)(t, T)(j, J)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Существование диаграммы (1) следует из теоремы II.3.7 ([10], с. 74). Существование диаграммы (2) следует из теоремы I.3.1 ([10], с. 28).

Мы начнём с диаграммы (4).

Пусть  $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$ . Следовательно,

$$(2.2.23) \quad R(m_1) = R(m_2)$$

Если  $a_1 \equiv a_2 \pmod{s}$ , то

$$(2.2.24) \quad r(a_1) = r(a_2)$$

Следовательно,  $j(a_1) = j(a_2)$ . Так как  $(r, R)$  - морфизм представлений, то

$$(2.2.25) \quad R(f(a_1)(m_1)) = g(r(a_1))(R(m_1))$$

$$(2.2.26) \quad R(f(a_2)(m_2)) = g(r(a_2))(R(m_2))$$

Из (2.2.23), (2.2.24), (2.2.25), (2.2.26) следует

$$(2.2.27) \quad R(f(a_1)(m_1)) = R(f(a_2)(m_2))$$

Из (2.2.27) следует

$$(2.2.28) \quad f(a_1)(m_1) \equiv f(a_2)(m_2) \pmod{S}$$

и, следовательно,

$$(2.2.29) \quad J(f(a_1)(m_1)) = J(f(a_2)(m_2))$$

Из (2.2.29) следует, что отображение

$$(2.2.30) \quad F(j(a))(J(m)) = J(f(a)(m))$$

определенко корректно и является преобразованием множества  $M/S$ .

Из равенства (2.2.28) (в случае  $a_1 = a_2$ ) следует, что для любого  $a$  преобразование согласовано с эквивалентностью  $S$ . Из теоремы 2.2.14 следует, что на множестве  $^*(M/S)$  определена структура  $\mathfrak{F}$ -алгебры. Рассмотрим  $n$ -арную операцию  $\omega$  и  $n$  преобразований

$$F(j(a_i))(J(m)) = J(f(a_i)(m)) \quad i = 1, \dots, n$$

пространства  $M/S$ . Мы положим

$$\omega(F(\mathbf{j}(a_1)), \dots, F(\mathbf{j}(a_n)))(\mathbf{J}(m)) = J(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))(m))$$

Следовательно, отображение  $F$  является представлением  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A/s$ .

Из (2.2.30) следует, что  $(j, J)$  является морфизмом представлений  $f$  и  $F$ .

Рассмотрим диаграмму (5).

Так как  $T$  - биекция, то мы можем отождествить элементы множества  $M/S$  и множества  $MR$ , причём это отождествление имеет вид

$$(2.2.31) \quad T(\mathbf{J}(m)) = \mathbf{R}(m)$$

Мы можем записать преобразование  $F(\mathbf{j}(a))$  множества  $M/S$  в виде

$$(2.2.32) \quad F(\mathbf{j}(a)) : \mathbf{J}(m) \rightarrow F(\mathbf{j}(a))(\mathbf{J}(m))$$

Так как  $T$  - биекция, то мы можем определить преобразование

$$(2.2.33) \quad T(\mathbf{J}(m)) \rightarrow T(F(\mathbf{j}(a))(\mathbf{J}(m)))$$

множества  $RM$ . Преобразование (2.2.33) зависит от  $\mathbf{j}(a) \in A/s$ . Так как  $t$  - биекция, то мы можем отождествить элементы множества  $A/s$  и множества  $rA$ , причём это отождествление имеет вид

$$t(\mathbf{j}(a)) = r(a)$$

Следовательно, мы определили отображение

$$G : rA \rightarrow {}^*RM$$

согласно равенству

$$(2.2.34) \quad G(t(\mathbf{j}(a)))(T(\mathbf{J}(m))) = T(F(\mathbf{j}(a))(\mathbf{J}(m)))$$

Рассмотрим  $n$ -арную операцию  $\omega$  и  $n$  преобразований

$$G(r(a_i))(R(m)) = T(F(\mathbf{j}(a_i))(\mathbf{J}(m))) \quad i = 1, \dots, n$$

пространства  $RM$ . Мы положим

$$\omega(G(r(a_1)), \dots, G(r(a_n)))(R(m)) = T(\omega(F(\mathbf{j}(a_1), \dots, F(\mathbf{j}(a_n)))(\mathbf{J}(m)))$$

Согласно (2.2.34) операция  $\omega$  корректно определена на множестве  ${}^*RM$ . Следовательно, отображение  $G$  является представлением  $\mathfrak{F}$ -алгебры.

Из (2.2.34) следует, что  $(t, T)$  является морфизмом представлений  $F$  и  $G$ .

Диаграмма (6) является самым простым случаем в нашем доказательстве. Поскольку отображение  $I$  является вложением и диаграмма (2) коммутативна, мы можем отождествить  $n \in N$  и  $R(m)$ , если  $n \in \text{Im } R$ . Аналогично, мы можем отождествить соответствующие преобразования.

$$(2.2.35) \quad g'(i(r(a)))(I(R(m))) = I(G(r(a))(R(m)))$$

$$\omega(g'(r(a_1)), \dots, g'(r(a_n)))(R(m)) = I(\omega(G(r(a_1), \dots, G(r(a_n)))(R(m)))$$

Следовательно,  $(i, I)$  является морфизмом представлений  $G$  и  $g$ .

Для доказательства теоремы осталось показать, что определённое в процессе доказательства представление  $g'$  совпадает с представлением  $g$ , а операции над преобразованиями совпадают с соответствующими операциями на

$*N.$ 

$$\begin{aligned}
 g'(i(\mathbf{r}(a))(I(\mathbf{R}(m))) &= I(G(\mathbf{r}(a))(\mathbf{R}(m))) && \text{согласно (2.2.35)} \\
 &= I(G(t(\mathbf{j}(a)))(T(\mathbf{J}(m)))) && \text{согласно (2.2.17), (2.2.21)} \\
 &= IT(F(\mathbf{j}(a))(\mathbf{J}(m))) && \text{согласно (2.2.34)} \\
 &= ITJ(f(a)(m)) && \text{согласно (2.2.30)} \\
 &= R(f(a)(m)) && \text{согласно (2.2.19)} \\
 &= g(r(a))(R(m)) && \text{согласно (2.2.3)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \omega(G(\mathbf{r}(a_1)), \dots, G(\mathbf{r}(a_n)))(\mathbf{R}(m)) &= T(\omega(F(\mathbf{j}(a_1), \dots, F(\mathbf{j}(a_n)))(\mathbf{J}(m))) \\
 &= T(F(\omega(\mathbf{j}(a_1), \dots, \mathbf{j}(a_n)))(\mathbf{J}(m))) \\
 &= T(F(j(\omega(a_1, \dots, a_n)))(\mathbf{J}(m))) \\
 &= T(J(f(\omega(a_1, \dots, a_n))(m)))
 \end{aligned}$$

□

Из теоремы 2.2.15 следует, что мы можем свести задачу изучения морфизма представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры к случаю, описываемому диаграммой

(2.2.36)

**Теорема 2.2.16.** Диаграмма (2.2.36) может быть дополнена представлением  $F_1$   $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в множестве  $M/S$  так, что диаграмма

(2.2.37)

коммутативна. При этом множество преобразований представления  $F$  и множество преобразований представления  $F_1$  совпадают.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для доказательства теоремы достаточно положить

$$F_1(a) = F(\mathbf{j}(a))$$

Так как отображение  $j$  - сюръекция, то  $\text{Im}F_1 = \text{Im}F$ . Так как  $j$  и  $F$  - гомоморфизмы  $\mathfrak{F}$ -алгебры, то  $F_1$  - также гомоморфизм  $\mathfrak{F}$ -алгебры.  $\square$

Теорема 2.2.16 завершает цикл теорем, посвящённых структуре морфизма представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры. Из этих теорем следует, что мы можем упростить задачу изучения морфизма представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры и ограничиться морфизмом представлений вида

$$id : A \longrightarrow A \quad R : M \longrightarrow N$$

В этом случае мы можем отождествить морфизм  $(id, R)$  представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры и отображение  $R$ . Мы будем пользоваться диаграммой

```

    \begin{CD}
    @. M @>R>> N \\
    @Vf(a)VV @VVg(a)V \\
    A @>R>> N \\
    @VfVV @VVg V \\
    @. M @>R>> N
    \end{CD}
  
```

для представления морфизма  $(id, R)$  представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры. Из диаграммы следует

$$R \circ f(a) = g(a) \circ R$$

Мы дадим следующее определение по аналогии с определением 2.2.11.

**Определение 2.2.17.** Мы определим категорию  $T \star \mathfrak{F}$   $T\star$ -представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$ . Объектами этой категории являются  $T\star$ -представлениями  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$ . Морфизмами этой категории являются морфизмы  $(id, R)$   $T\star$ -представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$ .  $\square$

### 2.3. Представление группы

Группа - одна из немногих алгебр, которая позволяет рассматривать произведение преобразований множества  $M$  таким образом, что если преобразования принадлежат представлению, то их произведение также принадлежит представлению. В случае представления групп гомоморфизм (2.1.1) может быть определён либо как

$$f(ab) = f(a) \circ f(b)$$

либо как

$$f(ab) = f(b) \circ f(a)$$

При этом следует помнить, что порядок отображений при суперпозиции зависит от порядка отображений на диаграмме и с какой стороны отображения действуют на элементы множества.

**Определение 2.3.1.** Пусть  ${}^*M$  - группа и  $\delta$  - единица группы  ${}^*M$ . Пусть  $G$  - группа. Мы будем называть гомоморфизм группы

$$(2.3.1) \quad f : G \rightarrow {}^*M$$

**ковариантным  $T^*$ -представлением группы  $G$**  в множестве  $M$ , если отображение  $f$  удовлетворяет условиям

$$(2.3.2) \quad f(ab)u = f(a)(f(b)u)$$

□

**Замечание 2.3.2.** Поскольку отображение (2.3.1) - гомоморфизм, то

$$(2.3.3) \quad f(ab)u = (f(a)f(b))u$$

Мы здесь пользуемся соглашением

$$f(a)f(b) = f(a) \circ f(b)$$

Таким образом, концепция ковариантного представления состоит в том, что в каком порядке мы перемножаем элементы группы, в том же порядке перемножаются соответствующие преобразования представления. Из равенств (2.3.2) и (2.3.3) следует

$$(2.3.4) \quad (f(a)f(b))u = f(a)(f(b)u)$$

Равенство (2.3.4) совместно с ассоциативностью произведения преобразований представляет собой **закон ассоциативности для ковариантного  $T^*$ -представления**. Это позволяет записывать равенство (2.3.4) без использования скобок

$$f(ab)u = f(a)f(b)u$$

□

**Определение 2.3.3.** Пусть  ${}^*M$  - группа и  $\delta$  - единица группы  ${}^*M$ . Пусть  $G$  - группа. Мы будем называть антигомоморфизм группы

$$f : G \rightarrow {}^*M$$

**контравариантным  $T^*$ -представлением группы  $G$**  в множестве  $M$ , если отображение  $f$  удовлетворяет условиям

$$(2.3.5) \quad f(ba)u = f(a)(f(b)u)$$

□

**Определение 2.3.4.** Пусть  $M^*$  - группа и  $\delta$  - единица группы  $M^*$ . Пусть  $G$  - группа. Мы будем называть гомоморфизм группы

$$(2.3.6) \quad f : G \rightarrow M^*$$

**ковариантным  $*T$ -представлением группы  $G$**  в множестве  $M$ , если отображение  $f$  удовлетворяет условиям

$$(2.3.7) \quad uf(ab) = (uf(a))f(b)$$

□

**Замечание 2.3.5.** Поскольку отображение (2.3.6) - гомоморфизм, то

$$(2.3.8) \quad uf(ab) = u(f(a)f(b))$$

Из равенств (2.3.7) и (2.3.8) следует

$$(2.3.9) \quad u(f(a)f(b)) = (uf(a))f(b)$$

Равенство (2.3.9) совместно с ассоциативностью произведения преобразований представляет собой **закон ассоциативности для ковариантного  $\star T$ -представления**. Это позволяет записывать равенство (2.3.9) без использования скобок

$$uf(ab) = uf(a)f(b)$$

□

**Определение 2.3.6.** Пусть  $M^*$  - группа и  $\delta$  - единица группы  ${}^*M$ . Пусть  $G$  - группа. Мы будем называть отображение

$$f : G \rightarrow M^*$$

**контравариантным  $\star T$ -представлением группы  $G$**  в множестве  $M$ , если отображение  $f$  удовлетворяет условиям

$$(2.3.10) \quad uf(ba) = (uf(a))f(b)$$

□

**Определение 2.3.7.** Мы будем называть преобразование

$$t : M \rightarrow M$$

**невырожденным преобразованием**, если существует обратное отображение.

□

**Теорема 2.3.8.** Для любого  $g \in G$  преобразование  $f(g)$  является невырожденным и удовлетворяет равенству

$$(2.3.11) \quad f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** На основании (2.3.5) и

$$f(e) = \delta$$

мы можем записать

$$u = \delta(u) = f(gg^{-1})(u) = f(g)(f(g^{-1})(u))$$

Это завершает доказательство.

□

**Теорема 2.3.9.** Групповая операция определяет два различных представления на группе:

- **Левый или  $T\star$ -сдвиг  $t_*$ ,**

$$(2.3.12) \quad \begin{aligned} b' &= t_*(a)b = ab \\ b' &= t_*(a)(b) = ab \end{aligned}$$

является ковариантным  $T\star$ -представлением

$$(2.3.13) \quad t_*(ab) = t_*(a) \circ t_*(b)$$

- Правый или  $\star T$ -сдвиг  $\star t$ ,

$$(2.3.14) \quad \begin{aligned} b' &= b \star t(a) = ba \\ b' &= \star t(a)(b) = ba \end{aligned}$$

является ковариантным  $\star T$ -представлением

$$(2.3.15) \quad \star t(ab) = \star t(a) \circ \star t(b)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Равенство (2.3.13) следует из ассоциативности произведения

$$t_\star(ab)c = (ab)c = a(bc) = t_\star(a)(t_\star(b)c) = (t_\star(a) \circ t_\star(b))c$$

Аналогично доказывается равенство (2.3.15).  $\square$

**Теорема 2.3.10.** Пусть  $T\star$ -представление

$$u' = f(a)u$$

является контравариантным  $T\star$ -представлением. Тогда  $T\star$ -представление

$$u' = h(a)u = f(a^{-1})u$$

является ковариантным  $T\star$ -представлением.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Утверждение следует из цепочки равенств

$$h(ab) = f((ab)^{-1}) = f(b^{-1}a^{-1}) = f(a^{-1})f(b^{-1}) = h(a)h(b)$$

$\square$

**Замечание 2.3.11.** Если предположить, что выбор с какой стороны писать оператор представления произведен, то может создаться впечатление, что мы можем ограничиться рассмотрением либо  $T\star$ -представлений, либо ковариантных представлений. Раздел [5]-5.2 служит хорошей иллюстрацией, что разные формы представления существенны. В тех случаях, когда необходимо указать порядок сомножителей, мы будем пользоваться операторной формой записи. Теоремы 2.4.12, 2.4.15 являются примерами, когда функциональная запись имеет преимущество.  $\square$

**Определение 2.3.12.** Пусть  $f$  -  $T\star$ -представление группы  $G$  в множестве  $M$ . Для любого  $v \in M$  мы определим **орбиту  $T\star$ -представления группы  $G$**  как множество

$$f(G)v = \{w = f(g)v : g \in G\}$$

$\square$

Так как  $f(e) = \delta$ , то  $v \in f(G)v$ .

**Теорема 2.3.13.** Если

$$(2.3.16) \quad v \in f(G)u$$

то

$$f(G)u = f(G)v$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из (2.3.16) следует существование  $a \in G$  такого, что

$$(2.3.17) \quad v = f(a)u$$

Если  $w \in f(G)v$ , то существует  $b \in G$  такой, что

$$(2.3.18) \quad w = f(b)v$$

Подставив (2.3.17) в (2.3.18), мы получим

$$(2.3.19) \quad w = f(b)(f(a)u)$$

На основании (2.3.2) из (2.3.19) следует, что  $w \in f(G)u$ . Таким образом,

$$f(G)v \subseteq f(G)u$$

На основании (2.3.11) из (2.3.17) следует, что

$$(2.3.20) \quad u = f(a)^{-1}v = f(a^{-1})v$$

Равенство (2.3.20) означает, что  $u \in f(G)v$  и, следовательно,

$$f(G)u \subseteq f(G)v$$

Это завершает доказательство.  $\square$

Таким образом,  $T\star$ -представление  $f$  группы  $G$  в множестве  $M$  порождает отношение эквивалентности  $S$  и орбита  $f(G)u$  является классом эквивалентности. Мы будем пользоваться обозначением  $M/f(G)$  для фактор множества  $M/S$  и мы будем называть это множество **пространством орбит  $T\star$ -представления  $f$** .

**Теорема 2.3.14.** *Если определены  $T\star$ -представление  $f_1$  группы  $G$  в множестве  $M_1$  и  $T\star$ -представление  $f_2$  группы  $G$  в множестве  $M_2$ , то мы можем определить прямое произведение  $T\star$ -представлений  $f_1$  и  $f_2$  группы*

$$\begin{aligned} f &= f_1 \times f_2 : G \rightarrow M_1 \otimes M_2 \\ f(g) &= (f_1(g), f_2(g)) \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Чтобы показать, что  $f$  является представлением, достаточно показать, что  $f$  удовлетворяет определению 2.3.1.

$$f(e) = (f_1(e), f_2(e)) = (\delta_1, \delta_2) = \delta$$

$$\begin{aligned} f(ab)u &= (f_1(ab)u_1, f_2(ab)u_2) \\ &= (f_1(a)(f_1(b)u_1), f_2(a)(f_2(b)u_2)) \\ &= f(a)(f_1(b)u_1, f_2(b)u_2) \\ &= f(a)(f(b)u) \end{aligned}$$

$\square$

## 2.4. Однотранзитивное $T\star$ -представление группы

**Определение 2.4.1.** Мы будем называть **ядром неэффективности**  $T\star$ -представления группы  $G$  множество

$$K_f = \{g \in G : f(g) = \delta\}$$

□

**Теорема 2.4.2.** Ядро неэффективности  $T\star$ -представления группы  $G$  - это подгруппа группы  $G$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим  $f(a_1) = \delta$  и  $f(a_2) = \delta$ . Тогда

$$\begin{aligned} f(a_1 a_2) u &= f(a_1)(f(a_2)u) = u \\ f(a^{-1}) &= f^{-1}(a) = \delta \end{aligned}$$

□

**Теорема 2.4.3.**  $T\star$ -представление группы  $G$  **эффективно** тогда и только тогда, когда ядро неэффективности  $K_f = \{e\}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение является следствием определений 2.1.8 и 2.4.1 и теоремы 2.4.2. □

Если действие не эффективно, мы можем перейти к эффективному заменив группой  $G_1 = G|K_f$ , пользуясь факторизацией по ядру неэффективности. Это означает, что мы можем изучать только эффективное действие.

**Определение 2.4.4.** Рассмотрим  $T\star$ -представление  $f$  группы  $G$  в множестве  $M$ . **Малая группа или группа стабилизации** элемента  $x \in M$  - это множество

$$G_x = \{g \in G : f(g)x = x\}$$

Мы будем называть  $T\star$ -представление  $f$  группы  $G$  **свободным**, если для любого  $x \in M$  группа стабилизации  $G_x = \{e\}$ . □

**Теорема 2.4.5.** Если определено свободное  $T\star$ -представление  $f$  группы  $G$  на множестве  $A$ , то определено взаимно однозначное соответствие между орбитами представления, а также между орбитой представления и группой  $G$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим для точки  $a \in A$  существуют  $g_1, g_2 \in G$

$$(2.4.1) \quad f(g_1)a = f(g_2)a$$

Умножим обе части равенства (2.4.1) на  $f(g_1^{-1})$

$$a = f(g_1^{-1})f(g_2)a$$

Поскольку представление свободное,  $g_1 = g_2$ . Теорема доказана, так как мы установили взаимно однозначное соответствие между орбитой и группой  $G$ . □

**Определение 2.4.6.** Мы будем называть пространство  $V$  **однородным пространством группы**  $G$ , если мы имеем однотранзитивное  $T\star$ -представление группы  $G$  на  $V$ . □

**Теорема 2.4.7.** Если мы определим однотранзитивное ковариантное представление  $f$  группы  $G$  на многообразии  $A$ , то мы можем однозначно определить координаты на  $A$ , пользуясь координатами на группе  $G$ .

Если  $f$  - ковариантное  $T\star$ -представление, то  $f(a)$  эквивалентно  $T\star$ -сдвигу  $t_\star(a)$  на группе  $G$ . Если  $f$  - ковариантное  $\star T$ -представление, то  $f(a)$  эквивалентно  $\star T$ -сдвигу  $\star t(a)$  на группе  $G$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Мы выберем точку  $v \in A$  и определим координаты точки  $w \in A$  как координаты  $a \in G$  такого, что  $w = f(a)v$ . Координаты, определённые таким образом, однозначны с точностью до выбора начальной точки  $v \in A$ , так как действие эффективно.

Если  $f$  - ковариантное  $T\star$ -представление, мы будем пользоваться записью

$$f(a)v = av$$

Так как запись

$$f(a)(f(b)v) = a(bv) = (ab)v = f(ab)v$$

совместима с групповой структурой, мы видим, что ковариантное  $T\star$ -представление  $f$  эквивалентно  $T\star$ -сдвигу.

Если  $f$  - ковариантное  $\star T$ -представление, мы будем пользоваться записью

$$vf(a) = va$$

Так как запись

$$(vf(b))f(a) = (vb)a = v(ba) = vf(ba)$$

совместима с групповой структурой, мы видим, что ковариантное  $\star T$ -представление  $f$  эквивалентно  $\star T$ -сдвигу.  $\square$

**Замечание 2.4.8.** Мы будем записывать  $T\star$ -ковариантное эффективное представление группы  $G$  в форме

$$v' = t_\star(a)v = av$$

Орбита этого представления имеет вид

$$\mathbf{G}v = t_\star(G)v$$

Мы будем пользоваться обозначением  $M/t_\star(G)$  для пространства орбит  $T\star$ -ковариантного эффективного представления группы.  $\square$

**Замечание 2.4.9.** Мы будем записывать  $\star T$ -ковариантное эффективное представление группы  $G$  в форме

$$v' = v \star t(a) = va$$

Орбита этого представления имеет вид

$$v\mathbf{G} = v \star t(G)$$

Мы будем пользоваться обозначением  $M/\star t(G)$  для пространства орбит  $\star T$ -ковариантного эффективного представления группы.  $\square$

**Теорема 2.4.10.** Свободное  $T\star$ -представление эффективно. Свободное  $T\star$ -представление  $f$  группы  $G$  в множестве  $M$  однотранзитивно на орбите.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Следствие определения 2.4.4.  $\square$

**Теорема 2.4.11.**  $T\star$ - и  $\star T$ -сдвиги на группе  $G$  перестановочны.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Это следствие ассоциативности группы  $G$

$$(t_*(a) \circ {}_* t(b))c = a(cb) = (ac)b = ({}_* t(b) \circ t_*(a))c$$

□

Теорема 2.4.11 может быть сформулирована следующим образом.

**Теорема 2.4.12.** Пусть  $G$  - группа. Для любого  $a \in G$  отображение  $(id, t_*(a))$  является автоморфизмом представления  ${}_* t$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Согласно теореме 2.4.11

$$(2.4.2) \quad t_*(a) \circ {}_* t(b) = {}_* t(b) \circ t_*(a)$$

Равенство (2.4.2) совпадает с равенством (2.2.3) из определения 2.2.2 при условии  $r = id$ ,  $R = t_*(a)$ . □

**Теорема 2.4.13.** Если мы определили однотранзитивное ковариантное  $T\star$ -представление  $f$  группы  $G$  на многообразии  $M$ , то мы можем однозначно определить однотранзитивное ковариантное  $\star T$ -представление  $h$  группы  $G$  на многообразии  $M$  такое, что диаграмма

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{h(a)} & M \\ \downarrow f(b) & & \downarrow f(b) \\ M & \xrightarrow{h(a)} & M \end{array}$$

коммутативна для любых  $a, b \in G$ .<sup>2.1</sup>

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Мы будем пользоваться групповыми координатами для точек  $v \in M$ . Тогда согласно теореме 2.4.7 мы можем записать  $T\star$ -сдвиг  $t_*(a)$  вместо преобразования  $f(a)$ .

Пусть точки  $v_0, v \in M$ . Тогда мы можем найти одно и только одно  $a \in G$  такое, что

$$v = v_0 a = v_0 {}_* t(a)$$

Мы предположим

$$h(a) = {}_* t(a)$$

Существует  $b \in G$  такое, что

$$w_0 = f(b)v_0 = t_*(b)v_0 \quad w = f(b)v = t_*(b)v$$

Согласно теореме 2.4.11 диаграмма

$$(2.4.3) \quad \begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)= {}_* t(a)} & v \\ \downarrow f(b)=t_*(b) & & \downarrow f(b)=t_*(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)= {}_* t(a)} & w \end{array}$$

коммутативна.

Изменяя  $b$  мы получим, что  $w_0$  - это произвольная точка, принадлежащая  $M$ .

---

<sup>2.1</sup>Это утверждение можно также найти в [3].

Мы видим из диаграммы, что, если  $v_0 = v$  then  $w_0 = w$  и следовательно  $h(e) = \delta$ . С другой стороны, если  $v_0 \neq v$ , то  $w_0 \neq w$  потому, что  $T\star$ -представление  $f$  однотранзитивно. Следовательно  $\star T$ -представление  $h$  эффективно.

Таким же образом мы можем показать, что для данного  $w_0$  мы можем найти  $a$  такое, что  $w = h(a)w_0$ . Следовательно  $\star T$ -представление  $h$  однотранзитивно.

В общем случае, произведение преобразований  $T\star$ -представления  $f$  не коммутативно и следовательно  $\star T$ -представление  $h$  отлично от  $T\star$ -представления  $f$ . Таким же образом мы можем создать  $T\star$ -представление  $f$ , пользуясь  $\star T$ -представлением  $h$ .  $\square$

Мы будем называть представления  $f$  и  $h$  **парными представлениями группы  $G$** .

**Замечание 2.4.14.** Очевидно, что преобразования  $t_\star(a)$  и  $\star t(a)$  отличаются, если группа  $G$  неабелева. Тем не менее, они являются отображениями на. Теорема 2.4.13 утверждает, что, если оба представления  $\star T$ - и  $T\star$ -сдвига существуют на многообразии  $M$ , то мы можем определить два перестановочных представления на многообразии  $M$ . Только  $T\star$ - или  $\star T$ -сдвиг не может представлять оба типа представления. Чтобы понять почему это так, мы можем изменить диаграмму (2.4.3) и предположить  $h(a)v_0 = t_\star(a)v_0 = v$  вместо  $h(a)v_0 = v_0 \star t(a) = v$  и проанализировать, какое выражение  $h(a)$  имеет в точке  $w_0$ . Диаграмма

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=t_\star(a)} & v \\ \downarrow f(b)=t_\star(b) & & \downarrow f(b)=t_\star(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

эквивалентна диаграмме

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=t_\star(a)} & v \\ \uparrow f^{-1}(b)=t_\star(b^{-1}) & & \downarrow f(b)=t_\star(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

и мы имеем  $w = bv = bav_0 = bab^{-1}w_0$ . Следовательно

$$h(a)w_0 = (bab^{-1})w_0$$

Мы видим, что представление  $h$  зависит от его аргумента.  $\square$

**Теорема 2.4.15.** Пусть  $f$  и  $h$  - парные представления группы  $G$ . Для любого  $a \in G$  отображение  $(id, h(a))$  является автоморфизмом представления  $f$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие теорем 2.4.12 и 2.4.13.  $\square$

## 2.5. Базис $T\star$ -представления

**Определение 2.5.1.** Пусть

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в  $\mathfrak{H}$ -алгебре  $M$  и

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $B$  в  $\mathfrak{H}$ -алгебре  $N$ . Пара отображений  $(h, H)$

$$(2.5.1) \quad h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

таких, что  $h$  - гомоморфизм  $\mathfrak{F}$ -алгебры,  $H$  - гомоморфизм  $\mathfrak{H}$ -алгебры и  $(h, H)$  - морфизм представлений алгебры типа  $\mathfrak{F}$  называется **морфизмом представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры в  $\mathfrak{H}$ -алгебре**.  $\square$

**Определение 2.5.2.** Пусть

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в  $\mathfrak{H}$ -алгебре  $M$ . Множество  $N \subset M$  называется **стабильным множеством представления**  $f$ , если  $f(a)(m) \in N$  для любых  $a \in A$ ,  $m \in N$ .  $\square$

Мы также будем говорить, что множество  $M$  стабильно относительно представления  $f$ .

**Теорема 2.5.3.** Пусть

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в  $\mathfrak{H}$ -алгебре  $M$ . Пусть множество  $N \subset M$  является подалгеброй  $\mathfrak{H}$ -алгебры  $M$  и стабильным множеством представления  $f$ . Тогда существует представление

$$f_N : A \rightarrow {}^*N$$

такое, что  $f_N(a) = f(a)|_N$ . Представление  $f_N$  называется **подпредставлением представления**  $f$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $\omega_1$  -  $n$ -арная операция  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$ . Тогда для любых  $a_1, \dots, a_n \in A$  и любого  $b \in N$

$$\begin{aligned} \omega_1(f_N(a_1), \dots, f_N(a_n))(b) &= \omega_1(f(a_1), \dots, f(a_n))(b) \\ &= f(\omega_1(a_1, \dots, a_n))(b) \\ &= f_N(\omega_1(a_1, \dots, a_n))(b) \end{aligned}$$

Пусть  $\omega_2$  -  $n$ -арная операция  $\mathfrak{H}$ -алгебры  $M$ . Тогда для любых  $b_1, \dots, b_n \in N$  и любого  $a \in A$

$$\begin{aligned} \omega_2(f_N(a)(b_1), \dots, f_N(a)(b_n)) &= \omega_2(f(a)(b_1), \dots, f(a)(b_n)) \\ &= f(a)(\omega_2(b_1, \dots, b_n)) \\ &= f_N(a)(\omega_2(b_1, \dots, b_n)) \end{aligned}$$

Утверждение теоремы доказано.  $\square$

Из теоремы 2.5.3 следует, что если  $f_N$  - подпредставление представления  $f$ , то отображение  $(id : A \rightarrow A, id_N : N \rightarrow M)$  является морфизмом представлений.

**Теорема 2.5.4.** Множество<sup>2.2</sup>  $\mathcal{B}_f$  всех подпредставлений представления  $f$  порождает систему замыканий на  $\mathfrak{H}$ -алгебре  $M$  и, следовательно, является **полной структурой**.

<sup>2.2</sup>Это определение аналогично определению структуры подалгебр ([10], стр. 93, 94)

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $(K_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  - семейство подалгебр  $\mathfrak{H}$ -алгебры  $M$ , стабильных относительно представления  $f$ . Операцию пересечения на множестве  $\mathcal{B}_f$  мы определим согласно правилу

$$\bigcap f_{K_\lambda} = f_{\cap K_\lambda}$$

Операция пересечения подпредставлений определена корректно.  $\cap K_\lambda$  - подалгебра  $\mathfrak{H}$ -алгебры  $M$ . Пусть  $m \in \cap K_\lambda$ . Для любого  $\lambda \in \Lambda$  и для любого  $a \in A$ ,  $f(a)(m) \in K_\lambda$ . Следовательно,  $f(a)(m) \in \cap K_\lambda$ . Следовательно,  $\cap K_\lambda$  - стабильное множество представления  $f$ .  $\square$

Обозначим соответствующий оператор замыкания через  $J_f$ . Таким образом,  $J_f(X)$  является пересечением всех подалгебр  $\mathfrak{H}$ -алгебры  $M$ , содержащих  $X$  и стабильных относительно представления  $f$ .

**Теорема 2.5.5.** *Пусть<sup>2.3</sup>*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в  $\mathfrak{H}$ -алгебре  $M$ . Пусть  $X \subset M$ . Определим подмножество  $X_k \subset M$  индукцией по  $k$ .

$$\begin{aligned} X_0 &= X \\ x \in X_k &\Rightarrow x \in X_{k+1} \\ x_1 \in X_k, \dots, x_n \in X_k, \omega \in \mathfrak{H}(n) &\Rightarrow \omega(x_1, \dots, x_n) \in X_{k+1} \\ x \in X_k, a \in A &\Rightarrow f(a)(x) \in X_{k+1} \end{aligned}$$

Тогда

$$\bigcup_{k=0}^{\infty} X_k = J_f(X)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Если положим  $U = \bigcup X_k$ , то по определению  $X_k$  имеем  $X_0 \subset J_f(X)$ , и если  $X_k \subset J_f(X)$ , то  $X_{k+1} \subset J_f(X)$ . По индукции следует, что  $X_k \subset J_f(X)$  для всех  $k$ . Следовательно,

$$(2.5.2) \quad U \subset J_f(X)$$

Если  $a \in U^n$ ,  $a = (a_1, \dots, a_n)$ , где  $a_i \in X_{k_i}$ , и если  $k = \max\{k_1, \dots, k_n\}$ , то  $\omega(a_1, \dots, a_n) \in X_{k+1} \subset U$ . Следовательно,  $U$  является подалгеброй  $\mathfrak{H}$ -алгебры  $M$ .

Если  $m \in U$ , то  $m \in X_k$  для некоторого  $k$ . Следовательно,  $f(a)(m) \in X_{k+1} \subset U$  для любого  $a \in A$ . Следовательно,  $U$  - стабильное множество представления  $f$ .

Так как  $U$  - подалгеброй  $\mathfrak{H}$ -алгебры  $M$  и стабильное множество представления  $f$ , то определено подпредставление  $f_U$ . Следовательно,

$$(2.5.3) \quad J_f(X) \subset U$$

Из (2.5.2), (2.5.3), следует  $J_f(X) = U$ .  $\square$

$J_f(X)$  называется **подпредставлением, порождённым множеством**  $X$ , а  $X$  - **множеством образующих подпредставления**  $J_f(X)$ . В частности, **множество образующих представления**  $f$  будет такое подмножество  $X \subset M$ , что  $J_f(X) = M$ .

<sup>2.3</sup>Утверждение теоремы аналогично утверждению теоремы 5.1, [10], стр. 94.

**Определение 2.5.6.** Пусть  $X \subset M$  - множество образующих представления

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

Пусть отображение

$$(h : A \rightarrow A, H : M \rightarrow M)$$

является автоморфизмом представления  $f$ . Пусть множество  $X' = HX$  является образом множества  $X$  при отображении  $H$ . Автоморфизм  $(h, H)$  представления  $f$  называется **невырожденным на множестве образующих  $X$** , если множество  $X'$  является множеством образующих представления  $f$ . В противном случае, автоморфизм представлений  $(h, H)$  называется **вырожденным на множестве образующих  $X$** ,  $\square$

**Определение 2.5.7.** Автоморфизм представления  $f$  называется **невырожденным**, если он невырожден на любом множестве образующих.  $\square$

**Теорема 2.5.8.** *Произведение невырожденных автоморфизмов представления является невырожденным автоморфизмом представления.*

**Доказательство.** Из теоремы 2.2.10 следует, что произведение автоморфизмов  $(p, P), (r, R)$  представления

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

является автоморфизмом  $(pr, PR)$  представления  $f$ . Пусть  $X$  - множество образующих представления  $f$ . Согласно определению 2.5.6,  $R(X), (PR)(X) = P(R(X))$  являются множествами образующих представления  $f$ .  $\square$

Нетрудно видеть, что определение множества образующих представления не зависит от того, эффективно представление или нет. Поэтому в дальнейшем мы будем предполагать, что представление эффективно и будем опираться на соглашение для эффективного  $T\star$ -представления в замечании 2.1.9. Из теоремы 2.5.5 следует, что если задано множество образующих  $X$ , то любой элемент множества  $M$  может быть представлен в виде  $\mathfrak{H}$ -слов, определённых согласно следующему правилу.

- Если  $m \in X$ , то  $m$  -  $\mathfrak{H}$ -слово.
- Если  $m_1, \dots, m_n$  -  $\mathfrak{H}$ -слова и  $\omega \in \mathfrak{H}(n)$ , то  $m_1 \dots m_n \omega$  -  $\mathfrak{H}$ -слово.
- Если  $m$  -  $\mathfrak{H}$ -слово и  $a \in A$ , то  $am$  -  $\mathfrak{H}$ -слово.

Представление  $m \in M$  в виде  $\mathfrak{H}$ -слова неоднозначно. Если  $m_1, \dots, m_n$  -  $\mathfrak{H}$ -слова,  $\omega \in \mathfrak{H}(n)$  и  $a \in A$ , то  $\mathfrak{H}$ -слова  $am_1 \dots m_n \omega$  и  $am_1 \dots am_n \omega$  описывают один и тот же элемент  $\mathfrak{H}$ -алгебры  $M$ . Возможны равенства, связанные со спецификой представления. Например, если  $\omega$  является операцией  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  и операцией  $\mathfrak{H}$ -алгебры  $M$ , то мы можем потребовать, что  $\mathfrak{H}$ -слова  $a_1 \dots a_n \omega x$  и  $a_1 x \dots a_n x \omega$  описывают один и тот же элемент  $\mathfrak{H}$ -алгебры  $M$ .

Перечисленные выше равенства определяют отношение эквивалентности  $r_{\mathfrak{H}}$  на множестве  $\mathfrak{H}$ -слов  $M_{\mathfrak{H}}$ . Фактор  $\mathfrak{H}$ -алгебра  $M_{\mathfrak{H}}/r_{\mathfrak{H}}$  совпадает с  $\mathfrak{H}$ -алгеброй  $M$ .

Вообще говоря, представление произвольного элемента  $m \in M$  в множестве  $M_{\mathfrak{H}}/r_{\mathfrak{H}}$  неоднозначно. Если множество образующих  $X$  таково, что представление элемента  $m \in M$  в множестве  $M_{\mathfrak{H}}/r_{\mathfrak{H}}$  однозначно, то множество  $X$  называется **базисом представления  $f$** .

Пусть представление  $f$  имеет базис  $X$ . Вообще говоря, в отличие от векторных пространств нет простого механизма, позволяющего для данной точки

найти простейшую форму  $\mathfrak{H}$ -слова относительно данного базиса или указать соответствующий класс эквивалентности. Поэтому мы просто будем выбирать некоторое  $\mathfrak{H}$ -слово, представляющее данный элемент  $m \in M$  и называть выбранное  $\mathfrak{H}$ -слово  $w(m, X)$  **координатами элемента  $m$  относительно базиса  $X$** .

Пусть  $X, X'$  - базисы представления  $f$ . Если мы рассматриваем базис  $X'$  как множество точек  $\mathfrak{H}$ -алгебры, то множество  $w(X', X) = \{w(x, X) : x \in X'\}$  называется **координатами базиса  $X'$  относительно базиса  $X$** .

Рассмотрим множество  $\mathcal{B}$  базисов представления  $f$ . Нас не интересует внутренняя структура базиса и мы будем рассматривать базис как точку множества  $\mathcal{B}$ .

Согласно определениям 2.5.6, 2.5.7, невырожденный автоморфизм представления  $f$  отображает множество образующих представления в множество образующих представления. Следовательно, невырожденный автоморфизм представления  $f$  порождает преобразование множества образующих.

В частности, невырожденный автоморфизм представления  $f$  отображает базис представления в множество образующих. Однако из этого не следует, что образ базиса является базисом представления. Мы будем предполагать, что мы определили некоторое ограничение на множество представлений таким образом, что невырожденный автоморфизм отображает базис представления в базис. В рамках этого ограничения, невырожденный автоморфизм представления  $f$  порождает преобразование множества базисов. Это преобразование называется **активным**.

## 2.6. Несколько примеров базиса представления

**Пример 2.6.1.** Самый известный пример - это базис векторного пространства.  $\mathfrak{H}$ -словом является линейная комбинация векторов. Поскольку для полей и тел существует алгоритм решения систем линейных уравнений, то мы можем ответить на следующие вопросы.

- Принадлежит ли вектор  $\bar{a}$  векторному подпространству, порождённому заданными векторами?
- Является ли данное множество векторов множеством образующих векторного пространства?
- Является ли данное множество векторов базисом?

□

**Пример 2.6.2.** Пусть  $G$  - абелевая группа, и  $M$  - множество. Рассмотрим эффективное представление группы  $G$  на множестве  $M$ . Для заданных  $a \in G$ ,  $A \in M$  положим  $A \rightarrow A + a$ . Мы будем также пользоваться записью  $a = \vec{AB}$ , если  $B = A + a$ . Тогда действие группы можно представить в виде  $B = A + \vec{AB}$ . В качестве базиса представления можно выбрать множество точек таким образом, что каждой орбите представления принадлежит одна и только одна точка. □



## Глава 3


# Башня представлений $\mathfrak{F}$ -алгебр

## 3.1. Башня представлений $\mathfrak{F}$ -алгебр

Рассмотрим множество  $\mathfrak{F}_i$ -алгебр  $A_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Положим  $\overline{A} = (A_1, \dots, A_n)$ . Положим  $\overline{f} = (f_{1,2}, \dots, f_{n-1,n})$ .

**Определение 3.1.1.** Рассмотрим множество  $\mathfrak{F}_i$ -алгебр  $A_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Множество представлений  $f_{i,i+1}$ ,  $i = 1, \dots, n-1$ ,  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры  $A_i$  в  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -алгебре  $A_{i+1}$  называется **башней**  $(\overline{A}, \overline{f})$  **представлений**  $\mathfrak{F}$ -алгебр.  $\square$

Мы можем проиллюстрировать определение 3.1.1 с помощью диаграммы



$f_{i,i+1}$  - представление  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры  $A_i$  в  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -алгебре  $A_{i+1}$ .  $f_{i+1,i+2}$  - представление  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -алгебры  $A_{i+1}$  в  $\mathfrak{F}_{i+2}$ -алгебре  $A_{i+2}$ .

**Теорема 3.1.2.** *Отображение*

$$f_{i,i+2} : A_i \rightarrow {}^* A_{i+2}$$

является представлением  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры  $A_i$  в  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -алгебре  ${}^* A_{i+2}$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Произвольному  $a_{i+1} \in A_{i+1}$  соответствует автоморфизм  $f_{i+1,i+2}(a_{i+1}) \in {}^* A_{i+2}$ . Произвольному  $a_i \in A_i$  соответствует автоморфизм  $f_{i,i+1}(a_i) \in {}^* A_{i+1}$ . Так как образом элемента  $a_{i+1} \in A_{i+1}$  является элемент  $f_{i,i+1}(a_i)(a_{i+1}) \in A_{i+1}$ , то тем самым элемент  $a_i \in A_i$  порождает преобразование  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -алгебры  ${}^* A_{i+2}$ , определённое равенством

(3.1.2)  $f_{i,i+2}(a_i)(f_{i+1,i+2}(a_{i+1})) = f_{i+1,i+2}(f_{i,i+1}(a_i)(a_{i+1}))$

Пусть  $\omega$  -  $n$ -арная операция  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры. Так как  $f_{i,i+1}$  - гомоморфизм  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры, то

$$(3.1.3) \quad f_{i,i+1}(\omega(a_{i,1}, \dots, a_{i,n})) = \omega(f_{i,i+1}(a_{i,1}), \dots, f_{i,i+1}(a_{i,n}))$$

Для  $a_1, \dots, a_n \in A_i$  мы определим операцию  $\omega$  на множестве  ${}^*A_{i+2}$  с помощью равенства

$$\begin{aligned} (3.1.4) \quad & \omega(f_{i,i+2}(a_{i,1})(f_{i+1,i+2}(a_{i+1})), \dots, f_{i,i+2}(a_{i,n})(f_{i+1,i+2}(a_{i+1}))) \\ &= \omega(f_{i+1,i+2}(f_{i,i+1}(a_{i,1})(a_{i+1})), \dots, f_{i+1,i+2}(f_{i,i+1}(a_{i,n})(a_{i+1}))) \\ &= f_{i+1,i+2}(\omega(f_{i,i+1}(a_{i,1}), \dots, f_{i,i+1}(a_{i,n}))(a_{i+1})) \end{aligned}$$

Первое равенство следует из равенства (3.1.2). Второе равенство постулировано на основе требования, что отображение  $f_{i+1,i+2}$  является гомоморфизмом  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры. Следовательно, мы определили структуру  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры на множестве  ${}^*A_{i+2}$ .

Из (3.1.4) и (3.1.3) следует

$$\begin{aligned} (3.1.5) \quad & \omega(f_{i,i+2}(a_{i,1})(f_{i+1,i+2}(a_{i+1})), \dots, f_{i,i+2}(a_{i,n})(f_{i+1,i+2}(a_{i+1}))) \\ &= f_{i+1,i+2}(f_{i,i+1}(\omega(a_{i,1}, \dots, a_{i,n}))(a_{i+1})) \\ &= f_{i,i+2}(\omega(a_{i,1}, \dots, a_{i,n}))(f_{i+1,i+2}(a_{i+1})) \end{aligned}$$

Из равенства (3.1.5) следует

$$\omega(f_{i,i+2}(a_{i,1}), \dots, f_{i,i+2}(a_{i,n})) = f_{i,i+2}(\omega(a_{i,1}, \dots, a_{i,n}))$$

Следовательно, отображение  $f_{i,i+2}$  является гомоморфизмом  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры. Следовательно, отображение  $f_{i,i+2}$  является  $T\star$ -представлением  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры  $A_i$  в  $\mathfrak{F}_{i+1}$ -алгебре  ${}^*A_{i+2}$ .  $\square$

**Теорема 3.1.3.**  $(id, f_{i+1,i+2})$  является морфизмом  $T\star$ -представлений  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры из  $f_{i,i+1}$  в  $f_{i,i+2}$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Рассмотрим более детально диаграмму (3.1.1).

$$\begin{array}{ccccc} & & A_{i+1} & \xrightarrow{f_{i+1,i+2}} & {}^*A_{i+2} \\ & & \downarrow f_{i,i+1}(a_i) & & \downarrow f_{i,i+2}(a_i) \\ & & A_{i+1} & \xrightarrow{(1)} & {}^*A_{i+2} \\ & & \downarrow f_{i,i+1} & & \downarrow f_{i,i+2} \\ & & A_i & \xrightarrow{id} & A_i \end{array}$$

Утверждение теоремы следует из равенства (3.1.2) и определения 2.2.2.  $\square$

**Определение 3.1.4.** Рассмотрим башню представлений

$$((A_1, A_2, A_3), (f_{1,2}, f_{2,3}))$$

Отображение  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$  называется **представлением  $\mathfrak{F}_i$ -алгебры  $A_i$  в представлении  $f_{i+1,i+2}$** .  $\square$

**Определение 3.1.5.** Рассмотрим башню представлений

$$((A_1, \dots, A_k), (f_{1,2}, \dots, f_{k-1,k}))$$

Отображение  $(f_{1,2}, \dots, f_{1,k})$  называется **представлением**  $\mathfrak{F}_1$ -алгебры  $A_1$  в башне представлений

$$((A_2, \dots, A_k), (f_{2,3}, \dots, f_{k-1,k}))$$

□

### 3.2. Морфизм башни $T^*$ -представлений

**Определение 3.2.1.** Рассмотрим множество  $\mathfrak{F}_i$ -алгебр  $A_i, B_i, i = 1, \dots, n$ . Множество отображений  $(h_1, \dots, h_n)$  называется **морфизмом из башни  $T^*$ -представлений**  $(\overline{A}, \overline{f})$  в **башню  $T^*$ -представлений**  $(\overline{B}, \overline{g})$ , если для каждого  $i, i = 1, \dots, n - 1$ , пара отображений  $(h_i, h_{i+1})$  является морфизмом  $T^*$ -представлений из  $f_{i,i+1}$  в  $g_{i,i+1}$ . □

Для любого  $i, i = 1, \dots, n - 1$ , мы имеем диаграмму

$$(3.2.1) \quad \begin{array}{ccc} A_{i+1} & \xrightarrow{h_{i+1}} & B_{i+1} \\ f_{i,i+1}(a_i) \downarrow & & \downarrow g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(\textcolor{blue}{a}_i)) \\ A_{i+1} & \xrightarrow{h_{i+1}} & B_{i+1} \\ f_{i,i+1} \swarrow & & \searrow g_{i,i+1} \\ A_i & \xrightarrow{h_i} & B_i \end{array}$$

Равенство

$$(3.2.2) \quad h_{i+1} \circ f_{i,i+1}(a_i) = g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(\textcolor{blue}{a}_i)) \circ h_{i+1}$$

выражает коммутативность диаграммы (1). Однако уже для морфизма  $(h_i, h_{i+1}), i > 1$ , диаграмма (3.2.1) неполна. Учитывая аналогичную диаграмму для морфизма  $(h_i, h_{i+1})$  эта диаграмма на верхнем уровне приобретает вид

$$(3.2.3) \quad \begin{array}{ccccc} A_{i+2} & \xrightarrow{h_{i+2}} & B_{i+2} & & \\ f_{23}(f_{12}(a_i)a_{i+1}) \swarrow & & \searrow g_{23}(g_{12}(a_i)h_{i+1}(a_{i+1})) & & \\ A_{i+2} & \xrightarrow{h_{i+2}} & B_{i+2} & & \\ f_{i,i+2}(a_i) \times & \xrightarrow{F} & g_{i,i+2}(h_i(a_i)) & & \\ A_{i+2} & \xrightarrow{h_{i+2}} & B_{i+2} & & \\ f_{23}(a_{i+1}) \swarrow & & \searrow g_{23}(h_{i+1}(a_{i+1})) & & \\ A_{i+2} & \xrightarrow{h_{i+2}} & B_{i+2} & & \end{array}$$

К сожалению, диаграмма (3.2.3) малоинформативна. Очевидно, что существует морфизм из  ${}^*A_{i+2}$  в  ${}^*B_{i+2}$ , отображающий  $f_{i,i+2}(a_i)$  в  $g_{i,i+2}(h_i(a_i))$ . Однако структура этого морфизма из диаграммы неясна. Мы должны рассмотреть отображение из  ${}^*A_{i+2}$  в  ${}^*B_{i+2}$ , так же мы это сделали в теореме 3.1.3.

**Теорема 3.2.2.** *Если  $T^\star$ -представления  $f_{i+1,i+2}$  эффективно, то  $(h_i, {}^*h_{i+2})$  является морфизмом  $T^\star$ -представлений из  $T^\star$ -представления  $f_{i,i+2}$  в  $T^\star$ -представление  $g_{i,i+2}$   $\mathfrak{F}_i$ -алгебры.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим диаграмму

$$\begin{array}{ccccc}
 A_{i+1} & \xrightarrow{h_{i+1}} & B_{i+1} & & \\
 \downarrow f_{i,i+1}(a_i) & \searrow f_{i+1,i+2} & \downarrow {}^*h_{i+2} & \swarrow g_{i+1,i+2} & \downarrow g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(\textcolor{red}{a}_i)) \\
 & \downarrow & & & \downarrow g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(\textcolor{red}{a}_i)) \\
 & & {}^*A_{i+2} & & \\
 & & \downarrow f_{i,i+2}(a_i) & & \\
 & & \downarrow (1) & & \\
 & & {}^*A_{i+2} & \xrightarrow{{}^*h_{i+2}} & {}^*B_{i+2} \\
 & & \downarrow (4) & & \downarrow (5) \\
 & & f_{i+1,i+2} & & g_{i+1,i+2} \\
 A_{i+1} & \xrightarrow{h_{i+1}} & B_{i+1} & & 
 \end{array}$$

Существование отображения  ${}^*h_{i+2}$  и коммутативность диаграмм (2) и (3) следует из эффективности отображения  $f_{i+1,i+2}$  и теоремы 2.2.6. Коммутативность диаграмм (4) и (5) следует из теоремы 3.1.3.

Из коммутативности диаграммы (4) следует

$$(3.2.4) \quad f_{i+1,i+2} \circ f_{i,i+1}(a_i) = f_{i,i+2}(a_i) \circ f_{i+1,i+2}$$

Из равенства (3.2.4) следует

$$(3.2.5) \quad {}^*h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2} \circ f_{i,i+1}(a_i) = {}^*h_{i+2} \circ f_{i,i+2}(a_i) \circ f_{i+1,i+2}$$

Из коммутативности диаграммы (3) следует

$$(3.2.6) \quad {}^*h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2} = g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1}$$

Из равенства (3.2.6) следует

$$(3.2.7) \quad {}^*h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2} \circ f_{i,i+1}(a_i) = g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1} \circ f_{i,i+1}(a_i)$$

Из равенств (3.2.5) и (3.2.7) следует

$$(3.2.8) \quad {}^*h_{i+2} \circ f_{i,i+2}(a_i) \circ f_{i+1,i+2} = g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1} \circ f_{i,i+1}(a_i)$$

Из коммутативности диаграммы (5) следует

$$(3.2.9) \quad g_{i+1,i+2} \circ g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(\textcolor{red}{a}_i)) = g_{i,i+2}(\textcolor{red}{h}_i(\textcolor{red}{a}_i)) \circ g_{i+1,i+2}$$

Из равенства (3.2.9) следует

$$(3.2.10) \quad g_{i+1,i+2} \circ g_{i,i+1}(\textcolor{red}{h}_i(\textcolor{red}{a}_i)) \circ h_{i+1} = g_{i,i+2}(\textcolor{red}{h}_i(\textcolor{red}{a}_i)) \circ g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1}$$

Из коммутативности диаграммы (2) следует

$$(3.2.11) \quad {}^*h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2} = g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1}$$

Из равенства (3.2.11) следует

$$(3.2.12) \quad g_{i,i+2}(\mathbf{h}_i(a_i)) \circ {}^*h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2} = g_{i,i+2}(\mathbf{h}_i(a_i)) \circ g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1}$$

Из равенств (3.2.10) и (3.2.12) следует

$$(3.2.13) \quad g_{i+1,i+2} \circ g_{i,i+1}(\mathbf{h}_i(a_i)) \circ h_{i+1} = g_{i,i+2}(\mathbf{h}_i(a_i)) \circ {}^*h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2}$$

Внешняя диаграмма является диаграммой (3.2.1) при  $i = 1$ . Следовательно, внешняя диаграмма коммутативна

$$(3.2.14) \quad h_{i+1} \circ f_{i,i+1}(a_i) = g_{i,i+1}(\mathbf{h}_i(a_i)) \circ h_{i+1}(a_{i+1})$$

Из равенства (3.2.14) следует

$$(3.2.15) \quad g_{i+1,i+2} \circ h_{i+1} \circ f_{i,i+1}(a_i) = g_{i+1,i+2} \circ g_{i,i+1}(\mathbf{h}_i(a_i)) \circ h_{i+1}$$

Из равенств (3.2.8), (3.2.13) и (3.2.15) следует

$$(3.2.16) \quad {}^*h_{i+2} \circ f_{i,i+2}(a_i) \circ f_{i+1,i+2} = g_{i,i+2}(\mathbf{h}_i(a_i)) \circ {}^*h_{i+2} \circ f_{i+1,i+2}$$

Так как отображение  $f_{i+1,i+2}$  - инъекция, то из равенства (3.2.16) следует

$$(3.2.17) \quad {}^*h_{i+2} \circ f_{i,i+2}(a_i) = g_{i,i+2}(\mathbf{h}_i(a_i)) \circ {}^*h_{i+2}$$

Из равенства (3.2.17) следует коммутативность диаграммы (1), откуда следует утверждение теоремы.  $\square$

Теоремы 3.1.3 и 3.2.2 справедливы для любых уровней башни  $T\star$ -представлений. В каждом конкретном случае надо правильно указывать множества, откуда и куда направленно отображение. Смысл приведенных теорем состоит в том, что все отображения в башне представлений действуют согласовано.

Теорема 3.2.2 утверждает, что неизвестное отображение на диаграмме (3.2.3) является отображением  ${}^*h_{i+2}$ .

### 3.3. Базис башни представлений

**Определение 3.3.1.** Башня  $T\star$ -представлений  $(\bar{A}, \bar{f})$  называется **эффективной**, если для любого  $i$  представление  $f_{i,i+1}$  эффективно.  $\square$

**Теорема 3.3.2.** Рассмотрим башню  $T\star$ -представлений  $(\bar{A}, \bar{f})$ . Пусть представления  $f_{i,i+1}, \dots, f_{i+k-1,i+k}$  эффективны. Тогда представление  $f_{i,i+k}$  эффективно.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Мы докажем утверждение теоремы по индукции.

Пусть представления  $f_{i,i+1}, f_{i+1,i+2}$  эффективны. Предположим, что преобразование  $\mathbf{f}_{i,i+1}(a_i)$  не является тождественным преобразованием. Тогда существует  $a_{i+1} \in A_{i+1}$  такой, что  $\mathbf{f}_{i,i+1}(a_i)(a_{i+1}) \neq a_{i+1}$ . Так как представление  $f_{i+1,i+2}$  эффективно, то преобразования  $\mathbf{f}_{i+1,i+2}(a_{i+1})$  и  $\mathbf{f}_{i+1,i+2}(\mathbf{f}_{i,i+1}(a_i)(a_{i+1}))$  не совпадают. Согласно построению, выполненному в теореме 3.1.2, преобразование  $\mathbf{f}_{i,i+2}(a_i)$  не является тождественным преобразованием. Следовательно, представление  $f_{i,i+2}$  эффективно.

Предположим утверждение теоремы верно для  $k-1$  представлений и пусть  $f_{i,i+1}, \dots, f_{i+k-1,i+k}$  эффективны. Согласно предположению индукции, представления  $f_{i,i+k-1}, f_{i+k-1,i+k}$  эффективны. Согласно доказанному выше, представление  $f_{i,i+k}$  эффективно.  $\square$

Мы строим базис представления  $\mathfrak{F}_1$ -алгебры  $A_1$  в башне представлений по той же схеме, что мы построили базис представления в секции 2.5. Мы ограничимся рассмотрением представления  $\mathfrak{F}_1$ -алгебры  $A_1$  в представлении  $f_{2,3}$ , имея в виду, что аналогичное построение можно выполнить для построения базиса представления  $\mathfrak{F}_1$ -алгебры в башне представлений.

Мы будем записывать элементы представления  $f_{2,3}$  в виде кортежа  $(a_2, a_3)$ , где  $a_2 \in A_2$ ,  $a_3 \in A_3$ . Эту запись можно интерпретировать как

$$(a_2, a_3) = f_{2,3}(a_2)(a_3)$$

В тоже время эта запись имеет дополнительный смысл. Например, в аффинном пространстве  $a_3$  - это точка пространства,  $a_2$  - вектор, определяющий преобразование параллельного переноса. Таким образом, мы можем интерпретировать кортеж  $(a_2, a_3)$  либо как вектор  $a_2$  с началом в точке  $a_3$ , либо как конец этого вектора.

**Определение 3.3.3.** Пусть  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$  - представление  $\mathfrak{F}_1$ -алгебры  $A_1$  в представлении  $f_{2,3}$ . Кортеж множеств  $N_* = (N_2 \subset A_2, N_3 \subset A_3)$  называется **кортежем стабильных множеств представления**  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ , если  $f_{1,2}(a_1)(a_2) \in N_2$ ,  $f_{2,3}(a_2)(a_3) \in N_3$  для любых  $a_1 \in A_1$ ,  $a_2 \in N_2$ ,  $a_3 \in N_3$ .  $\square$

Мы также будем говорить, что кортеж множеств  $N_* = (N_2 \subset A_2, N_3 \subset A_3)$  стабилен относительно представления  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ .

**Теорема 3.3.4.** Пусть  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$  - представление  $\mathfrak{F}_1$ -алгебры  $A_1$  в представлении  $f_{2,3}$ . Пусть множество  $N_2 \subset A_2$  является подалгеброй  $\mathfrak{F}_2$ -алгебры  $A_2$ . Пусть множество  $N_3 \subset A_3$  является подалгеброй  $\mathfrak{F}_3$ -алгебры  $A_3$ . Пусть кортеж множеств  $N_* = (N_2 \subset A_2, N_3 \subset A_3)$  стабилен относительно представления  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ . Тогда существует башня представлений

$$((A_1, N_2, N_3), (f_{N_*, 1, 2}, f_{N_*, 2, 3}))$$

такая, что

$$f_{N_*, 1, 2}(a_1) = f_{1,2}(a_1)|_{N_2} \quad f_{N_*, 2, 3}(a_2) = f_{2,3}(a_2)|_{N_3}$$

Представление  $(f_{N_*, 1, 2}, f_{N_*, 2, 3})$  называется **подпредставлением представления**  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $\omega_{k,1}$  -  $n$ -арная операция  $\mathfrak{F}_k$ -алгебры  $A_k$ ,  $k = 1, 2$ . Тогда для любых  $a_{k,1}, \dots, a_{k,n} \in N_k$ <sup>3.1</sup> и любого  $a_{k+1} \in N_{k+1}$

$$\begin{aligned} & \omega_{k,1}(f_{N_*, k, k+1}(a_{k,1}), \dots, f_{N_*, k, k+1}(a_{k,n}))(a_{k+1}) \\ &= \omega_{k,1}(f_{k, k+1}(a_{k,1}), \dots, f_{k, k+1}(a_{k,n}))(a_{k+1}) \\ &= f_{k, k+1}(\omega_{k,1}(a_{k,1}, \dots, a_{k,n}))(a_{k+1}) \\ &= f_{N_*, k, k+1}(\omega_{k,1}(a_{k,1}, \dots, a_{k,n}))(a_{k+1}) \end{aligned}$$

---

<sup>3.1</sup> Положим  $N_1 = A_1$ .

Пусть  $\omega_{k,2}$  -  $n$ -арная операция  $\mathfrak{F}_k$ -алгебры  $A_k$ ,  $k = 2, 3$ . Тогда для любых  $a_{k,1}, \dots, a_{k,n} \in N_k$  и любого  $a_{k-1} \in N_{k-1}$

$$\begin{aligned} & \omega_{k,2}(f_{N_*,k-1,k}(a_{k-1})(a_{k,1}), \dots, f_{N_*,k-1,k}(a_{k-1})(a_{k,n})) \\ &= \omega_{k,2}(f_{k-1,k}(a_{k-1})(a_{k,1}), \dots, f_{k-1,k}(a_{k-1})(a_{k,n})) \\ &= f_{k-1,k}(a_{k-1})(\omega_{k,2}(a_{k,1}, \dots, a_{k,n})) \\ &= f_{N_*,k-1,k}(a_{k-1})(\omega_{k,2}(a_{k,1}, \dots, a_{k,n})) \end{aligned}$$

Утверждение теоремы доказано.  $\square$

Из теоремы 3.3.4 следует, что если отображение  $(f_{N_*,1,2}, f_{N_*,1,3})$  - подпредставление представления  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ , то отображение

$$(id : A_1 \rightarrow A_1, id_2 : N_2 \rightarrow A_2, id_3 : N_3 \rightarrow A_3)$$

является морфизмом башен представлений.

**Теорема 3.3.5.** *Множество<sup>3.2</sup>  $\mathcal{B}_{f_*}$  всех подпредставлений представления  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ , порождает систему замыканий на представлении  $f_{2,3}$  и, следовательно, является полной структурой.*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть для данного  $\lambda \in \Lambda$ ,  $K_{\lambda,k}$ ,  $k = 2, 3$ , - подалгебра  $\mathfrak{F}_k$ -алгебры  $A_k$ , стабильная относительно представления  $f_{k-1,k}$ . Операцию пересечения на множестве  $\mathcal{B}_{f_*}$  мы определим согласно правилу

$$\begin{aligned} \bigcap f_{(K_{\lambda,*}),2,3} &= f_{(\cap K_{\lambda,*}),2,3} \\ \bigcap K_{\lambda,*} &= \left( K_1 = A_1, K_2 = \bigcap K_{\lambda,2}, K_3 = \bigcap K_{\lambda,3} \right) \end{aligned}$$

$\cap K_{\lambda,k}$  - подалгебра  $\mathfrak{F}_k$ -алгебры  $A_k$ . Пусть  $a_k \in \cap K_{\lambda,k}$ . Для любого  $\lambda \in \Lambda$  и для любого  $a_{k-1} \in K_{k-1}$ ,

$$f_{k-1,k}(a_{k-1})(a_k) \in K_{\lambda,k}$$

Следовательно,

$$f_{k-1,k}(a_{k-1})(a_k) \in K_k$$

Повторяя приведенное построение в порядке возрастания  $k$ ,  $k = 2, 3$ , мы видим, что  $(K_2, K_3)$  - кортеж стабильных множеств представления  $f_*$ . Следовательно, операция пересечения подпредставлений определена корректно.  $\square$

Обозначим соответствующий оператор замыкания через  $J_{f_*}$ . Если мы обозначим через  $X_*$  кортеж множеств

$$(X_2 \subset A_2, X_3 \subset A_3)$$

то  $J_{f_*}(X_*)$  является пересечением всех кортежей  $(K_2, K_3)$ , стабильных относительно представления  $f_*$  и таких, что для  $k = 2, 3$ ,  $K_k$  - подалгебра  $\mathfrak{F}_k$ -алгебры  $A_k$ , содержащая  $X_k$ .

---

<sup>3.2</sup>Это определение аналогично определению структуры подалгебр ([10], стр. 93, 94)

**Теорема 3.3.6.** Пусть<sup>3.3</sup>  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$  - представление  $\mathfrak{F}_1$ -алгебры  $A_1$  в представлении  $f_{2,3}$ . Пусть  $X_k \subset A_k$ ,  $k = 2, 3$ . Положим  $Y_1 = A_1$ . Последовательно увеличивая значение  $k$ ,  $k = 2, 3$ , определим подмножества  $X_{k,m} \subset A_k$  индукцией по  $m$ .

$$\begin{aligned} X_{k,0} &= X_k \\ x \in X_{k,m} &\Rightarrow x \in X_{k,m+1} \\ x_1 \in X_{k,m}, \dots, x_n \in X_{k,m}, \omega \in \mathfrak{F}_k(n) &\Rightarrow \omega(x_1, \dots, x_n) \in X_{k,m+1} \\ x_k \in X_{k,m}, x_{k-1} \in Y_{k-1} &\Rightarrow f_{k-1,k}(x_{k-1})(x_k) \in X_{k,m+1} \end{aligned}$$

Для каждого значения  $k$  положим

$$Y_k = \bigcup_{m=0}^{\infty} X_{k,m}$$

Тогда

$$Y_* = (Y_2, Y_3) = J_{f_*}(X_*)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Для каждого значения  $k$  доказательство теоремы совпадает с доказательством теоремы 2.5.5. Так как для определения устойчивого подмножества  $\mathfrak{F}_k$ -алгебры  $A_k$  нас интересует только некоторое устойчивое подмножество  $\mathfrak{F}_{k-1}$ -алгебры  $A_{k-1}$ , мы должны сперва найти устойчивое подмножество  $\mathfrak{F}_{k-1}$ -алгебры  $A_{k-1}$ .  $\square$

$J_{f_*}(X_*)$  называется **подпредставлением** представления  $f_*$ , порождённым кортежем множеств  $X_*$ , а  $X_*$  - кортежем **образующих** подпредставления  $J_{f_*}(X_*)$ . В частности, **кортеж образующих** представления  $f_*$  будет такой кортеж  $(X_2 \subset A_2, X_3 \subset A_3)$ , что  $J_{f_*}(X_2, X_3) = (A_2, A_3)$ .

Нетрудно видеть, что определение кортежа образующих представления не зависит от того, эффективно представление или нет. Поэтому в дальнейшем мы будем предполагать, что представление эффективно и будем опираться на соглашение для эффективного  $T\star$ -представления в замечании 2.1.9.

Из теоремы 3.3.6 следует, что если задан кортеж образующих  $(X_2, X_3)$ , то любой элемент представления  $f_{2,3}$  может быть представлен в виде кортежа  $(\mathfrak{F}_2, \mathfrak{F}_3)$ -слов, определённых согласно следующему правилу.

- Если  $a_1 \in A_1$ , то  $a_1$  -  $\mathfrak{F}_1$ -слово.
- Если  $a_k \in X_k$ ,  $k = 2, 3$ , то  $a_k$  -  $\mathfrak{F}_k$ -слово.
- Если  $a_{k,1}, \dots, a_{k,n}$  -  $\mathfrak{F}_k$ -слова,  $k = 2, 3$ , и  $\omega \in \mathfrak{F}_k(n)$ , то  $a_{k,1} \dots a_{k,n} \omega$  -  $\mathfrak{F}_k$ -слово.
- Если  $a_k$  -  $\mathfrak{F}_k$ -слово,  $k = 2, 3$ , и  $a_{k-1}$  -  $\mathfrak{F}_{k-1}$ -слово, то  $a_{k-1} a_k$  -  $\mathfrak{F}_k$ -слово.

Представление  $a_k \in A_k$  в виде  $\mathfrak{F}_k$ -слова неоднозначно. Если  $a_{k,1}, \dots, a_{k,n}$  -  $\mathfrak{F}_k$ -слова,  $\omega \in \mathfrak{F}_k(n)$  и  $a_{k-1} \in A_{k-1}$ , то  $\mathfrak{F}_k$ -слова  $a_{k-1} a_{k,1} \dots a_{k,n} \omega$  и  $a_{k-1} a_{k,1} \dots a_{k-1} a_{k,n} \omega$  описывают один и тот же элемент  $\mathfrak{F}_k$ -алгебры  $A_k$ . Возможны равенства, связанные со спецификой представления. Например, если  $\omega$  является операцией  $\mathfrak{F}_{k-1}$ -алгебры  $A_{k-1}$  и операцией  $\mathfrak{F}_k$ -алгебры  $A_k$ , то мы можем потребовать, что  $\mathfrak{F}_k$ -слова  $a_{k-1,1} \dots a_{k-1,n} \omega a_k$  и  $a_{k-1,1} a_k \dots a_{k-1,n} a_k \omega$  описывают один и тот же элемент  $\mathfrak{F}_k$ -алгебры  $A_k$ .

Перечисленные выше равенства для каждого значения  $k$ ,  $k = 2, 3$ , определяют отношение эквивалентности  $r_k$  на множестве  $\mathfrak{F}_k$ -слов  $W_k$ . Фактор  $\mathfrak{F}_k$ -

---

<sup>3.3</sup> Утверждение теоремы аналогично утверждению теоремы 5.1, [10], стр. 94.

алгебра  $W_k/r_k$  совпадает с  $\mathfrak{F}_k$ -алгеброй  $A_k$ . Согласно построению, отношение эквивалентности  $r_k$  на множестве  $\mathfrak{F}_k$ -слов  $W_k$  зависит не только от выбора множества  $X_k$ , но и от выбора множества  $X_{k-1}$ .

Вообще говоря, представление произвольного элемента  $a_k \in A_k$  в множестве  $W_k/r_k$  неоднозначно. Если кортеж образующих  $X_*$  таков, что представление элемента  $a_k \in A_k$  в множестве  $W_k/r_k$  однозначно для любого  $k$ ,  $k = 2, 3$ , то кортеж  $X_*$  называется **базисом представления**  $f_* = (f_{1,2}, f_{1,3})$ .

Пусть представление  $f_*$  имеет базис  $X_*$ . Для каждого значения  $k$ ,  $k = 2, 3$ , мы будем выбирать некоторое  $\mathfrak{F}_k$ -слово, представляющее элемент  $x_k \in A_k$  и называть выбранный кортеж  $\mathfrak{F}_k$ -слов  $w(x_*, X_*)$  **координатами кортежа**  $x_*$  **относительно базиса**  $X_*$ .

Пусть  $X_*$ ,  $X'_*$  - базисы представления  $f_*$ . Если мы рассматриваем базис  $X'_*$  как кортеж точек представления  $f_{2,3}$ , то кортеж

$$w(X'_*, X_*) = \{w(x_*, X_*) : x_2 \in X'_2, x_3 \in X'_3\}$$

называется **координатами базиса**  $X'_*$  **относительно базиса**  $X_*$ .

### 3.4. Примеры базиса башни представлений

Аффинное пространство - это эффективное представление векторного пространства в абелевой группе. Этот пример рассмотрен в главе 6.

**Пример 3.4.1.** Пусть  $A_2$  - свободная алгебра над полем  $A_1$ . Рассматривая алгебру  $A_2$  как кольцо, мы можем определить свободное векторное пространство  $A_3$  над алгеброй  $A_2$ . Пусть  $\bar{e}_{32}$  - базис алгебры  $A_3$  над алгеброй  $A_2$ . Вектор  $a_3 \in A_3$  имеет представление

$$(3.4.1) \quad a_3 = a_3^j {}_j \bar{e}_{32} = (a_3^1 \dots a_3^n) \begin{pmatrix} {}^1 \bar{e}_{32} \\ \dots \\ {}_n \bar{e}_{32} \end{pmatrix}$$

Пусть  $\bar{e}_{21}$  - базис алгебры  $A_2$  над полем  $A_1$ . Так как  $a_3^j \in A_2$ , то мы можем записать их координаты относительно базиса  $\bar{e}_{21}$

$$(3.4.2) \quad a_3^j = a_3^{ji} {}_i \bar{e}_{21} = (a_3^{j1} \dots a_3^{jm}) \begin{pmatrix} {}^1 \bar{e}_{21} \\ \dots \\ {}_m \bar{e}_{21} \end{pmatrix}$$

Из равенств (3.4.1), (3.4.2) следует

$$(3.4.3) \quad a_3 = a_3^{ji} {}_i \bar{e}_{21} {}_j \bar{e}_{32} = \left( (a_3^{11} \dots a_3^{1m}) \begin{pmatrix} {}^1 \bar{e}_{21} \\ \dots \\ {}_m \bar{e}_{21} \end{pmatrix} \dots (a_3^{n1} \dots a_3^{nm}) \begin{pmatrix} {}^1 \bar{e}_{21} \\ \dots \\ {}_m \bar{e}_{21} \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} {}^1 \bar{e}_{32} \\ \dots \\ {}_n \bar{e}_{32} \end{pmatrix}$$

Равенство (3.4.3) показывает структуру координат в векторном пространстве  $A_3$  над полем  $A_1$ . Нетрудно убедиться, что векторы

$${}_{ij} \bar{e}_{31} = {}_i \bar{e}_{21} {}_j \bar{e}_{32}$$

линейно независимы над полем  $A_1$ . Следовательно, мы построили базис  $\bar{e}_{31}$  векторного пространства  $A_3$  над полем  $A_1$ . Следовательно, мы можем переписать равенство (3.4.3) в виде

$$(3.4.4) \quad a_3 = a_3^{ji} {}_{ij}\bar{e}_{31} = (a_3^{11} \dots a_3^{1m} \dots a_3^{n1} \dots a_3^{nm}) \begin{pmatrix} 11\bar{e}_{31} \\ \dots \\ 1m\bar{e}_{31} \\ \dots \\ n1\bar{e}_{31} \\ \dots \\ nm\bar{e}_{31} \end{pmatrix}$$

□

**Пример 3.4.2.** Пусть  $A_2$  - свободная алгебра над полем  $A_1$ . Рассматривая алгебру  $A_2$  как кольцо, мы можем определить свободную алгебру  $A_3$  над алгеброй  $A_2$ . Пусть  $i\bar{e}_{21}$  - базис алгебры  $A_2$  над полем  $A_1$ . Пусть  $j\bar{e}_{32}$  - базис алгебры  $A_3$  над алгеброй  $A_2$ . Тогда базис  $ij\bar{e}_{31}$  алгебры  $A_3$  над полем  $A_1$  можно представить в виде

$$ij\bar{e}_{31} = (i\bar{e}_{21}, j\bar{e}_{32})$$

Если структурные константы алгебры  $A_3$  над алгеброй  $A_2$  принадлежат полю  $A_1$ , то базис  $ij\bar{e}_{31}$  можно отождествить с тензорным произведением  $i\bar{e}_{21} \otimes j\bar{e}_{32}$ .

□

### 3.5. Представление в категории

**Определение 3.5.1.** Пусть для любых объектов  $B$  и  $C$  категории  $\mathcal{B}$  на множестве морфизмов  $Mor(B, C)$  определена структура  $\mathfrak{F}$ -алгебры. Множество гомоморфизмов  $\mathfrak{F}$ -алгебры

$$f_{B,C} : A \rightarrow Mor(B, C)$$

называется **представлением  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в категории  $\mathcal{B}$** .

□

Если предположить, что множество  $Mor(B, C)$  определено только, когда  $B = C$ , то мы получим определение  $T\star$ -представления. Различие в определениях состоит в том, что мы не ограничиваем себя преобразованиями множества  $B$ , а рассматриваем  $\mathfrak{F}$ -алгебру отображений из множества  $B$  в множество  $C$ . На первый взгляд нет принципиальных различий между рассматриваемыми теориями. Однако нетрудно заметить, что представление векторного пространства в категории расслоений приводит к теории связностей.

## Глава 4

# Геометрия тела

### 4.1. Центр тела

**Определение 4.1.1.** Пусть  $D$  - кольцо.<sup>4.1</sup> Множество  $Z(D)$  элементов  $a \in D$  таких, что

$$(4.1.1) \quad ax = xa$$

для всех  $x \in D$ , называется **центром кольца**  $D$ .  $\square$

**Теорема 4.1.2.** Центр  $Z(D)$  кольца  $D$  является подкольцом кольца  $D$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Непосредственно следует из определения 4.1.1.  $\square$

**Теорема 4.1.3.** Центр  $Z(D)$  тела  $D$  является подполем тела  $D$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 4.1.2 достаточно проверить, что  $a^{-1} \in Z(D)$ , если  $a \in Z(D)$ . Пусть  $a \in Z(D)$ . Многократно применяя равенство (4.1.1), мы получим цепочку равенств

$$(4.1.2) \quad aa^{-1}x = x = xaa^{-1} = axa^{-1}$$

Из (4.1.2) следует

$$a^{-1}x = xa^{-1}$$

Следовательно,  $a^{-1} \in Z(D)$ .  $\square$

**Определение 4.1.4.** Пусть  $D$  - кольцо с единицей  $e$ .<sup>4.2</sup> Отображение

$$l : Z \rightarrow D$$

для которого  $l(n) = ne$  будет гомоморфизмом колец, и его ядро является идеалом  $(n)$ , порождённым целым числом  $n \geq 0$ . Канонический инъективный гомоморфизм

$$Z/nZ \rightarrow D$$

является изоморфизмом между  $Z/nZ$  и подкольцом в  $D$ . Если  $nZ$  - простой идеал, то у нас возникает два случая.

- $n = 0$ .  $D$  содержит в качестве подкольца кольцо, изоморфное  $Z$  и часто отождествляемое с  $Z$ . В этом случае мы говорим, что  $D$  имеет **характеристику 0**.
  - $n = p$  для некоторого простого числа  $p$ .  $D$  имеет **характеристику  $p$** , и  $D$  содержит изоморфный образ  $F_p = Z/pZ$ .
- $\square$

---

<sup>4.1</sup>[1], стр. 84.

<sup>4.2</sup>Определение дано согласно определению из [1], стр. 84, 85.

**Теорема 4.1.5.** Пусть  $D$  - кольцо характеристики 0 и пусть  $d \in D$ . Тогда любое целое число  $n \in Z$  коммутирует с  $d$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Утверждение теоремы доказывается по индукции. При  $n = 0$  и  $n = 1$  утверждение очевидно. Допустим утверждение справедливо при  $n = k$ . Из цепочки равенств

$$(k+1)d = kd + d = dk + d = d(k+1)$$

следует очевидность утверждения при  $n = k + 1$ .  $\square$

**Теорема 4.1.6.** Пусть  $D$  - кольцо характеристики 0. Тогда кольцо целых чисел  $Z$  является подкольцом центра  $Z(D)$  кольца  $D$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Следствие теоремы 4.1.5.  $\square$

Пусть  $D$  - тело. Если  $D$  имеет характеристику 0,  $D$  содержит в качестве подполя изоморфный образ поля  $Q$  рациональных чисел. Если  $D$  имеет характеристику  $p$ ,  $D$  содержит в качестве подполя изоморфный образ  $F_p$ . В обоих случаях это подполе будет называться простым полем. Так как простое поле является наименьшим подполем в  $D$ , содержащим 1 и не имеющим автоморфизмов, кроме тождественного, его обычно отождествляют с  $Q$  или  $F_p$ , в зависимости от того, какой случай имеет место.

**Теорема 4.1.7.** Пусть  $D$  - тело характеристики 0 и пусть  $d \in D$ . Тогда для любого целого числа  $n \in Z$

$$(4.1.3) \quad n^{-1}d = dn^{-1}$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Согласно теореме 4.1.5 справедлива цепочка равенств

$$(4.1.4) \quad n^{-1}dn = nn^{-1}d = d$$

Умножив правую и левую части равенства (4.1.4) на  $n^{-1}$ , получим

$$(4.1.5) \quad n^{-1}d = n^{-1}dnn^{-1} = dn^{-1}$$

Из (4.1.5) следует (4.1.3).  $\square$

**Теорема 4.1.8.** Пусть  $D$  - тело характеристики 0 и пусть  $d \in D$ . Тогда любое рациональное число  $p \in Q$  коммутирует с  $d$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Мы можем представить рациональное число  $p \in Q$  в виде  $p = mn^{-1}$ ,  $m, n \in Z$ . Утверждение теоремы следует из цепочки равенств

$$pd = mn^{-1}d = n^{-1}dm = dm n^{-1} = dp$$

основанной на утверждении теоремы 4.1.5 и равенстве (4.1.3).  $\square$

**Теорема 4.1.9.** Пусть  $D$  - тело характеристики 0. Тогда поле рациональных чисел  $Q$  является подполем центра  $Z(D)$  тела  $D$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Следствие теоремы 4.1.8.  $\square$

## 4.2. Геометрия тела над полем

Мы можем рассматривать тело  $D$  как векторное пространство над полем  $F \subset Z(D)$ . При этом мы будем пользоваться следующими соглашениями.

- (1) Мы не будем для элемента тела  $D$  пользоваться стандартными обозначениями для вектора, если мы будем рассматривать этот элемент как вектор над полем  $F$ . Однако мы будем пользоваться другим цветом для индекса при записи координат элемента тела  $D$  как вектора над полем  $F$ .
- (2) Так как  $F$  - поле, то мы можем писать все индексы справа от корневой буквы. Однако мы будем пользоваться тем же соглашением, что мы пользуемся для тела.

Пусть  $\bar{e}$  - базис тела  $D$  над полем  $F$ . Тогда произвольный элемент  $a \in D$  можно представить в виде

$$(4.2.1) \quad a = a^i \bar{e}$$

где  $a^i \in F$ . Если размерность тела  $D$  над полем  $F$  бесконечна, то базис может быть либо счётным, либо его мощность может быть не меньше, чем мощность континуума. Если базис счётный, то на коэффициенты  $a^i$  разложения (4.2.1) накладываются определённые ограничения. Если мощность множества  $I$  континуум, то предполагается, что на множестве  $I$  определена мера и сумма в разложении (4.2.1) является интегралом по этой мере.

Поскольку в теле  $D$  определена операция произведения, то мы можем рассматривать тело как алгебру над полем  $F$ . Для элементов базиса мы положим

$$(4.2.2) \quad i\bar{e} j\bar{e} = ijB^k k\bar{e}$$

Коэффициенты  $ijB^k$  разложения (4.2.2) называются **структурными константами тела  $D$  над полем  $F$** . Из равенств (4.2.1), (4.2.2) следует

$$(4.2.3) \quad ab = a^i b^j ijB^k k\bar{e}$$

Из равенства (4.2.3) следует

$$(4.2.4) \quad \begin{aligned} (ab)c &= (ab)^i c^j ijB^k k\bar{e} \\ &= a^m b^n mnB^i c^j ijB^k k\bar{e} \end{aligned}$$

$$(4.2.5) \quad \begin{aligned} a(bc) &= a^i (bc)^j ijB^k k\bar{e} \\ &= a^i b^m c^n mnB^j ijB^k k\bar{e} \end{aligned}$$

Из ассоциативности произведения

$$(ab)c = a(bc)$$

и равенств (4.2.4) и (4.2.5) следует

$$(4.2.6) \quad a^m b^n mnB^i c^j ijB^k k\bar{e} = a^i b^m c^n mnB^j ijB^k k\bar{e}$$

Так как векторы  $a, b, c$  произвольны, а векторы  $k\bar{e}$  линейно независимы, то из равенства (4.2.6) следует

$$(4.2.7) \quad imB^j jnB^k = mnB^j ijB^k$$

**Теорема 4.2.1.** Координаты  $a^j$  вектора  $a$  являются тензором

$$(4.2.8) \quad a^j = a'^i iA^j$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $\overline{\overline{e'}}$  - другой базис. Пусть

$$(4.2.9) \quad {}_i\overline{e'} = {}_iA^j {}_j\overline{e}$$

преобразование, отображающее базис  $\overline{\overline{e'}}$  в базис  $\overline{\overline{e'}}$ . Так как вектор  $a$  не меняется, то

$$(4.2.10) \quad a = a'^i {}_i\overline{e'} = a^j {}_j\overline{e}$$

Из равенств (4.2.9) и (4.2.10) следует

$$(4.2.11) \quad a^j {}_j\overline{e} = a'^i {}_i\overline{e'} = a'^i {}_iA^j {}_j\overline{e}$$

Так как векторы  ${}_j\overline{e}$  линейно независимы, то равенство (4.2.8) следует из равенства (4.2.11). Следовательно, компоненты вектора являются тензором.  $\square$

**Теорема 4.2.2.** *Структурные константы тела  $D$  над полем  $F$  являются тензором*

$$(4.2.12) \quad {}_nA^{-1}{}^i {}_m A^{-1}{}^j {}_{ij} B'{}^k {}_k A^l = {}_{nm}B^l$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим аналогичным образом преобразование произведения. Равенство (4.2.3) в базисе  $\overline{\overline{e'}}$  имеет вид

$$(4.2.13) \quad ab = a'^i b'^j {}_{ij} B'{}^k {}_k \overline{\overline{e'}}$$

Подставив (4.2.8) и (4.2.9) в (4.2.13), получим

$$(4.2.14) \quad ab = a^n {}_n A^{-1}{}^i b^m {}_m A^{-1}{}^j {}_{ij} B'{}^k {}_k A^l {}_l \overline{e}$$

Из (4.2.3) и (4.2.14) следует

$$(4.2.15) \quad a^n {}_n A^{-1}{}^i b^m {}_m A^{-1}{}^j {}_{ij} B'{}^k {}_k A^l {}_l \overline{e} = a^n b^m {}_{nm}B^l {}_l \overline{e}$$

Так как векторы  $a$  и  $b$  произвольны, а векторы  ${}_l\overline{e}$  линейно независимы, то равенство (4.2.12) следует из равенства (4.2.15). Следовательно, структурные константы являются тензором.  $\square$

## Глава 5

# Квадратичное отображение тела

### 5.1. Билинейное отображение тела

**Теорема 5.1.1.** Пусть  $D$  - тело характеристики 0. Пусть  $F$  - поле, которое является подкольцом центра тела  $D$ . Допустим  $\bar{e}$  - базис тела  $D$  над полем  $F$ . Стандартное представление над полем  $F$  билинейного отображения тела имеет вид

$$(5.1.1) \quad f(a, b) = {}_{(1)}f^{ijk} e_a e_b e_k + {}_{(2)}f^{ijk} e_b e_a e_k$$

Выражение  ${}_{(t)}f^{ijk}$  в равенстве (5.1.1) называется **стандартной компонентой** над полем  $F$  билинейного отображения  $f$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие теоремы [5]-9.3.6. Здесь даны перестановки

$$(5.1.2) \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

□

**Теорема 5.1.2.** Пусть поле  $F$  является подкольцом центра  $Z(D)$  тела  $D$ . Пусть  $\bar{e}$  - базис тела  $D$  над полем  $F$ . Билинейное отображение

$$g : D \times D \rightarrow D$$

можно представить в виде  $D$ -значной билинейной формы над полем  $F$

$$(5.1.3) \quad g(a, b) = a^i b^j {}_{ij}g$$

где

$$(5.1.4) \quad \begin{aligned} a &= a^i {}_{i\bar{e}} \\ b &= b^j {}_{j\bar{e}} \\ {}_{ij}g &= g(\bar{e}, \bar{e}) \end{aligned}$$

и величины  ${}_{ij}g$  являются координатами  $D$ -значного ковариантного тензора над полем  $F$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие теоремы [5]-9.3.7. □

Матрица  $G = |{}_{ij}g|$  называется **матрицей билинейной функции**. Если матрица  $G$  невырождена, то билинейная функция  $g$  называется **невырожденной**.

**Теорема 5.1.3.** Билинейное отображение

$$g : D \times D \rightarrow D$$

симметрично тогда и только тогда, когда матрица  $G$  симметрична

$${}_{ij}g = {}_{ji}g$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие теоремы [5]-9.3.8.  $\square$

**Теорема 5.1.4.** *Билинейное отображение*

$$g : D \times D \rightarrow D$$

косо симметрично тогда и только тогда, когда матрица  $G$  косо симметрична

$$ijg = -jig$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие теоремы [5]-9.3.9.  $\square$

**Теорема 5.1.5.** *Компоненты билинейного отображения*

$$g : D \times D \rightarrow D$$

и его матрица над полем  $F$  связаны равенством

$$(5.1.5) \quad pqg = ((1)g^{ijk} {}_{ip}B^s {}_{sj}B^l {}_{lq}B^t {}_{tk}B^r + (2)g^{ijk} {}_{iq}B^s {}_{sj}B^l {}_{lp}B^t {}_{tk}B^r) r \bar{e}$$

$$(5.1.6) \quad pqg^r = (1)g^{ijk} {}_{ip}B^s {}_{sj}B^l {}_{lq}B^t {}_{tk}B^r + (2)g^{ijk} {}_{iq}B^s {}_{sj}B^l {}_{lp}B^t {}_{tk}B^r$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие теоремы [5]-9.3.10. Для доказательства утверждения достаточно подставить (5.1.2) в равенства [5]-(9.3.14), [5]-(9.3.15).  $\square$

**Теорема 5.1.6.** *Если билинейное отображение*

$$g : D \times D \rightarrow D$$

имеет матрицу  $G = \|ijg\|$ , то существует билинейное отображение

$$g' : D \times D \rightarrow D$$

которое имеет матрицу  $G' = \|ijg'\|$ ,  $ijg' = jig$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Положим

$$(5.1.7) \quad (1)g'^{ijk} = (2)g^{ijk} \quad (2)g'^{ijk} = (1)g^{ijk}$$

Из равенств (5.1.6), (5.1.7) следует

$$\begin{aligned} qp g'^r &= (1)g'^{ijk} {}_{iq}B^s {}_{sj}B^l {}_{lp}B^t {}_{tk}B^r + (2)g'^{ijk} {}_{ip}B^s {}_{sj}B^l {}_{lq}B^t {}_{tk}B^r \\ &= (2)g^{ijk} {}_{iq}B^s {}_{sj}B^l {}_{lp}B^t {}_{tk}B^r + (1)g^{ijk} {}_{ip}B^s {}_{sj}B^l {}_{lq}B^t {}_{tk}B^r \\ &= pqg^r \end{aligned}$$

$\square$

## 5.2. Квадратичное отображение тела

**Определение 5.2.1.** Пусть  $D$  - тело. Отображение

$$h : D \rightarrow R$$

называется **квадратичным**, если существует билинейное отображение

$$g : D \times D \rightarrow D$$

такое, что

$$h(a) = g(a, a)$$

Билинейное отображение  $g$  называется отображением, ассоциированным отображению  $h$ .  $\square$

Отображение  $g$  определено неоднозначно для заданного отображения  $h$ . Однако согласно теореме 5.1.6, мы всегда можем положить, что билинейное отображение  $g$  симметрично

$$g(a, b) = g(b, a)$$

Действительно, если билинейное отображение  $g_1$ , ассоциированное отображению  $h$ , не симметрично, то мы положим

$$g(a, b) = (g_1(a, b) + g_1(b, a))/2$$

Так как билинейное отображение однородно степени 1 над полем  $R$  по каждой переменной, квадратичное отображение однородно степени 2 над полем  $R$ .

**Теорема 5.2.2.** *Пусть  $D$  - тело характеристики 0. Пусть  $F$  - поле, которое является подкольцом центра тела  $D$ . Допустим  $\bar{p}$  - базис тела  $D$  над полем  $F$ . Стандартное представление квадратичного отображения тела над полем  $F$  имеет вид*

$$(5.2.1) \quad f(a) = \mathbf{f}^{ijk} \mathbf{a}_i \bar{p} \mathbf{a}_j \bar{p} \mathbf{a}_k \bar{p}$$

*Выражение  $\mathbf{f}^{ijk}$  в равенстве (5.2.1) называется стандартной компонентой квадратичного отображения  $f$  над полем  $F$ .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие теоремы 5.1.1. □

**Теорема 5.2.3.** *Пусть поле  $F$  является подкольцом центра  $Z(D)$  тела  $D$ . Пусть  $\bar{e}$  - базис тела  $D$  над полем  $F$ . Квадратичное отображение  $f$  можно представить в виде  $D$ -значной квадратичной формы над полем  $F$*

$$(5.2.2) \quad f(a) = a^i a^j \mathbf{ij} f$$

где

$$(5.2.3) \quad \begin{aligned} \bar{a} &= a^i \mathbf{i} \bar{e} \\ \mathbf{ij} f &= g(\mathbf{i} \bar{e}, \mathbf{j} \bar{e}) \end{aligned}$$

и  $g$  - ассоциированное билинейное отображение. Величины  $\mathbf{ij} f$  являются координатами  $D$ -значного ковариантного тензора над полем  $F$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для выбранного билинейного отображения  $g$ , ассоциированного отображению  $f$ , утверждение теоремы является следствием теоремы 5.1.2. Нам надо доказать независимость координат квадратичного отображения от выбора ассоциированного отображения  $g$ .

Допустим,  $g_1, g_2$  - билинейные отображения, ассоциированные отображению  $f$ . Тогда

$$(5.2.4) \quad \mathbf{ii} f_1 = g_1(\mathbf{i} \bar{e}, \mathbf{i} \bar{e}) = g_2(\mathbf{i} \bar{e}, \mathbf{i} \bar{e}) = \mathbf{ii} f_2$$

Для произвольного  $a \in D$

$$a^i a^j \mathbf{ij} f_1 = a^i a^j \mathbf{ij} f_2$$

Если для данных  $i, j$  мы рассмотрим  $a \in D$ , для которого  $a_i = a_j = 1$ , то мы получим

$$(5.2.5) \quad \mathbf{ii} f_1 + \mathbf{ij} f_1 + \mathbf{ji} f_1 + \mathbf{jj} f_1 = \mathbf{ii} f_2 + \mathbf{ij} f_2 + \mathbf{ji} f_2 + \mathbf{jj} f_2$$

Из равенств (5.2.4), (5.2.5) следует

$$\mathbf{i}\mathbf{j}f_1 + \mathbf{j}\mathbf{i}f_1 = \mathbf{i}\mathbf{j}f_2 + \mathbf{j}\mathbf{i}f_2$$

Следовательно, если ассоциированное билинейное отображение симметрично, то оно определено однозначно.  $\square$

Матрица  $F = |\mathbf{i}\mathbf{j}f|$  называется **матрицей квадратичного отображения**. Если матрица  $F$  невырождена, то квадратичное отображение  $f$  называется **невырожденным**. Ранг матрицы  $F$  называется **рангом квадратичного отображения**  $f$ .

**Теорема 5.2.4.** *Отображение*

$$f : D \rightarrow D$$

*квадратичное над полем  $F$ , определено как отображение над телом тогда и только тогда, когда*

$$(5.2.6) \quad \mathbf{pq}f = f^{ijk} \mathbf{i}\mathbf{p}B^s \mathbf{s}\mathbf{j}B^l \mathbf{l}\mathbf{q}B^t \mathbf{t}\mathbf{k}B^r \mathbf{r}\bar{p}$$

$$(5.2.7) \quad \mathbf{pq}f^r = f^{ijk} \mathbf{i}\mathbf{p}B^s \mathbf{s}\mathbf{j}B^l \mathbf{l}\mathbf{q}B^t \mathbf{t}\mathbf{k}B^r$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Подставим

$$\bar{a} = a^j \mathbf{j}\bar{p}$$

в равенство (5.2.1). Тогда равенство (5.2.1) примет вид

$$(5.2.8) \quad \begin{aligned} f(a) &= f^{ijk} \mathbf{i}\bar{p} a^p \mathbf{p}\bar{p} \mathbf{j}\bar{p} a^q \mathbf{q}\bar{p} \mathbf{k}\bar{p} \\ &= a^p a^q f^{ijk} \mathbf{i}\bar{p} \mathbf{p}\bar{p} \mathbf{j}\bar{p} \mathbf{q}\bar{p} \mathbf{k}\bar{p} \\ &= a^p a^q f^{ijk} \mathbf{i}\mathbf{p}B^s \mathbf{s}\mathbf{j}B^l \mathbf{l}\mathbf{q}B^t \mathbf{t}\mathbf{k}B^r \mathbf{r}\bar{p} \end{aligned}$$

Равенство (5.2.6) следует из сравнения равенств (5.2.8) и (5.2.2).  $\square$

Из теоремы 5.2.3 следует, что координаты  $\mathbf{pq}f$  образуют тензор. В теореме [5]-9.2.11 описана структура допустимых преобразований.

**Теорема 5.2.5.** Пусть поле  $F$  является подкольцом центра  $Z(D)$  тела  $D$ . Пусть  $\bar{p}$  - базис тела  $D$  над полем  $F$ . Пусть  $\mathbf{i}\mathbf{j}B^k$  - структурные константы тела  $D$  над полем  $F$ . Если

$$\det(a^i (\mathbf{i}\mathbf{j}B^k + \mathbf{j}\mathbf{i}B^k)) \neq 0$$

то уравнение

$$(5.2.9) \quad ax + xa = b$$

имеет единственного решения.

Если определитель равен 0, то условием существования решения является  $F$ -линейная зависимость вектора  $b$  от векторов  $a^i (\mathbf{i}\mathbf{j}B^k + \mathbf{j}\mathbf{i}B^k) \mathbf{k}\bar{p}$ . В этом случае, уравнение (5.2.9) имеет бесконечно много решений. В противном случае уравнение не имеет решений.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Из равенств (4.2.3), (5.2.9) следует

$$(5.2.10) \quad a^i x^j \mathbf{i}\mathbf{j}B^k \mathbf{k}\bar{p} + x^i a^j \mathbf{i}\mathbf{j}B^k \mathbf{k}\bar{p} = b^k \mathbf{k}\bar{p}$$

Так как векторы  $\mathbf{k}\bar{p}$  линейно независимы, то из равенства (5.2.10) следует, что координаты  $x^j$  удовлетворяют системе линейных уравнений

$$(5.2.11) \quad x^j a^i (\mathbf{i}\mathbf{j}B^k + \mathbf{j}\mathbf{i}B^k) = b^k$$

Следовательно, если определитель системы (5.2.11) не равен 0, то система имеет единственное решение.

Аналогично, если определитель равен 0, то условием существования решения является равенство ранга расширенной матрицы и ранга матрицы системы линейных уравнений.  $\square$

**Теорема 5.2.6.** Пусть поле  $F$  является подкольцом центра  $Z(D)$  тела  $D$ . Существует квадратичное отображение  $f$  такое, что можно найти базис  $\bar{r}$  над полем  $F$ , в котором отображение  $f$  представлено как сумма квадратов.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Приведение квадратичной формы к диагональному виду выполнено аналогично тому как это сделано в [4], с. 169 - 172. Рассматриваемые преобразования переменных связаны с соответствующими преобразованиями базиса. Нас не интересует, является ли эти преобразования базиса допустимыми. Причина состоит в том, что базис, выбранный вначале может быть не связан с каноническим базисом допустимым преобразованием. Однако для нас важно, чтобы окончательное представление отображения  $f$  было допустимым.

Мы докажем утверждение индукцией по числу переменных в представлении квадратичного отображения. Для этого мы будем записывать квадратичное отображение  $f$  в виде отображения от  $n$  переменных  $a^1, \dots, a^n$

$$(5.2.12) \quad f(a) = f(a^1, \dots, a^n) = a^i a^j \_{ij} f$$

Представление квадратичного отображения в виде (5.2.12) называется **квадратичной формой**.

Утверждение очевидно, если квадратичная форма зависит от одной переменной  $a^1$ , так как в этом случае квадратичная форма имеет вид

$$f(a^1) = (a^1)^2 \_{11} f$$

Допустим утверждение теоремы справедливо для квадратичной формы от  $n - 1$  переменной.

- (1) Пусть квадратичная форма содержит квадраты переменных. Не нарушая общности, положим  $\_{11} f \neq 0$ . Рассмотрим отображение

$$(5.2.13) \quad f_1(a^1, \dots, a^n) = f(a^1, \dots, a^n) - \_{11} f^{-1} (a^j \_{j1} h)^2$$

Мы выбираем значения  $\_{j1} h$  таким образом, чтобы удовлетворить равенство

$$(5.2.14) \quad 2 \_{11} f \_{1j} f = \_{1} h \_{j1} h + \_{j1} h \_{11} f$$

Когда  $j = 1$ , из равенства (5.2.14) следует

$$(5.2.15) \quad \_{1} h = \_{11} f$$

Когда  $j > 1$ , из равенств (5.2.13), (5.2.15) следует

$$(5.2.16) \quad 2 \_{11} f \_{1j} f = \_{11} f \_{j1} h + \_{j1} h \_{11} f$$

Из теоремы 5.2.5 следует, что если

$$(5.2.17) \quad \det(\_{11} f^i (\_{ij} B^k + \_{ji} B^k)) \neq 0$$

то уравнение (5.2.16) имеет единственное решение. Мы предположим, что условие (5.2.17) выполнено, и рассмотрим замену переменных

$$\begin{aligned} b^1 &= a^j h_j \\ b^i &= a^i \quad i > 1 \end{aligned}$$

Следовательно, отображение  $f_1(a^1, \dots, a^n)$  не зависит от  $b^1$ . Согласно определению (5.2.13), мы представили отображение  $f(a^1, \dots, a^n)$  в виде суммы квадрата переменной  $b^1$  и квадратичного отображения от  $b^1$  не зависящего.

$$f(a^1, \dots, a^n) = f_1(b^1)^2 + f_2(b^2, \dots, b^n)$$

Так как форма  $f_1$  зависит от  $n - 1$  переменной, то мы можем найти преобразование переменных, приводящее эту форму к сумме квадратов переменных.

- (2) Если  $f_{11} = \dots = f_{nn} = 0$ , то нам нужно дополнительное линейное преобразование, приводящее к появлению квадратов переменных. Положим  $f_{12} \neq 0$ . Совершим линейное преобразование

$$\begin{aligned} a^1 &= b^1 - b^2 \\ a^2 &= b^1 + b^2 \\ a^i &= b^i \quad i > 2 \end{aligned}$$

В результате этого преобразования слагаемое

$$2 a^1 a^2 f_{12}$$

примет вид

$$2 (b^1)^2 f_{12} - 2 (b^2)^2 f_{12}$$

Мы получили квадратичную форму, рассмотренную в случае (1).

□

Если все коэффициенты квадратичной формы в каноническом представлении действительны, то  $f(a) \in R$  для любого  $a \in D$ .

Допустим, мы выбрали квадратичную форму  $f$ , принимающую действительные значения.

**Определение 5.2.7.** Пусть  $D$  - тело. Квадратичное отображение

$$f : D \times D \rightarrow D$$

называется **положительно определённым**, если

$$f(a) \in R$$

для любого  $a \in D$  и при этом выполнены условия

$$\begin{aligned} f(a) &\geq 0 \\ f(a) = 0 &\Rightarrow a = 0 \end{aligned}$$

Положительно определённое квадратичное отображение называется **евклидовой метрикой на теле**  $D$ . Симметричное ассоциированное билинейное отображение  $g$  называется **евклидовым скалярным произведением на теле**  $D$ .

□

Если квадратичное отображение  $f$  не является положительно определённым, то это отображение называется **псевдоевклидовой метрикой на теле**  $D$ . Симметричное ассоциированное билинейное отображение  $g$  называется **псевдоевклидовым скалярным произведением на теле**  $D$ . Пусть  $\bar{e}$  - базис, относительно которого форма  $f$  представлена в виде суммы квадратов. Существуют вектора базиса  $\bar{e}_i$ , для которых  $f(\bar{e}_i) < 0$ . Для произвольного  $a = a^i \bar{e}_i$  определим операцию сопряжения равенством

$$\mathbf{a}^* = \text{sign}(f(\bar{e})) a^i \bar{e}_i$$

Выражение  $\mathbf{a}^*$  называется **эрмитовым сопряжением**.

Рассмотрим биаддитивное отображение

$$\begin{aligned} g^*(a, b) &= g(a, b^*) \\ f^*(a) &= g^*(a, a) \end{aligned}$$

Отображение  $f^*(a)$  положительно определено и называется **эрмитовой метрикой на теле**  $D$ . Симметричное ассоциированное отображение  $g^*$  называется **эрмитовым скалярным произведением на теле**  $D$ .

Если отображение

$$a \rightarrow a^*$$

линейно, то эрмитово скалярное произведение совпадает с евклидовым скалярным произведением. Аналогичное утверждение верно для метрики.



## Глава 6

### *D-аффинное пространство*

#### 6.1. *D-аффинное пространство*

**Определение 6.1.1.** Рассмотрим множество точек  $\overset{\circ}{A}$  и множество векторов  $\overrightarrow{A}$ .<sup>6.1</sup> Множество  $\overset{\circ}{A}$  удовлетворяет следующим аксиомам

- (1) Существует по крайней мере одна точка
- (2) Каждой паре точек  $(A, B)$  поставлен в соответствие один и только один вектор. Этот вектор мы будем обозначать  $\overrightarrow{AB}$ .
- (3) Для каждой точки  $A$  и любого вектора  $\overline{a}$  существует одна и только одна точка  $B$  такая, что  $\overrightarrow{AB} = \overline{a}$ . Мы будем также пользоваться записью<sup>6.2</sup>

$$(6.1.1) \quad B = A + \overline{a}$$

- (4) (Аксиома параллелограмма.) Если  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ , то  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ .

□

**Определение 6.1.2.** Пусть даны векторы  $\overline{a}$  и  $\overline{b}$ . Пусть  $A \in \overset{\circ}{A}$  - произвольная точка. Пусть  $B \in \overset{\circ}{A}$ ,  $B = A + \overline{a}$ . Пусть  $C \in \overset{\circ}{A}$ ,  $C = B + \overline{b}$ . Вектор  $\overrightarrow{AC}$  называется суммой векторов  $\overline{a}$  и  $\overline{b}$

$$(6.1.2) \quad \overline{a} + \overline{b} = \overrightarrow{AC}$$

□

**Теорема 6.1.3.** Вектор  $\overrightarrow{AA}$  является нулём по отношению к операции сложения и не зависит от выбора точки  $A$ . Вектор  $\overrightarrow{AA}$  называется нуль-вектором и мы полагаем  $\overrightarrow{AA} = \overline{0}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы можем записать правило сложения (6.1.2) в виде

$$(6.1.3) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Если  $B = C$ , то из равенства (6.1.3) следует

$$(6.1.4) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB} = \overrightarrow{AB}$$

Если  $C = A$ ,  $B = D$ , то из аксиомы (4) определения 6.1.1 следует

$$(6.1.5) \quad \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$$

<sup>6.1</sup> Я написал определения и теоремы в этом разделе согласно определению аффинного пространства в [3], с. 86 - 93.

<sup>6.2</sup>[11], р. 9.

Утверждение теоремы следует из равенств (6.1.4) и (6.1.5).  $\square$

**Теорема 6.1.4.** Пусть  $\bar{a} = \overrightarrow{AB}$ . Тогда

$$(6.1.6) \quad \overrightarrow{BA} = -\bar{a}$$

и это равенство не зависит от выбора точки  $A$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из равенства (6.1.3) следует

$$(6.1.7) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \overline{0}$$

Равенство (6.1.6) следует из равенства (6.1.7). Применяя аксиому (4) определения 6.1.1 к равенству  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  получим  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ , или, что то же,  $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$ . В силу аксиомы (4) определения 6.1.1 снова следует  $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DC}$ . Следовательно, равенство (6.1.6) не зависит от выбора точки  $A$ .  $\square$

**Теорема 6.1.5.** Сумма векторов  $\bar{a}$  и  $\bar{b}$  не зависит от выбора точки  $A$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $\bar{a} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$ . Пусть  $\bar{b} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{B'C'}$ . Пусть

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} &= \overrightarrow{A'C'} \end{aligned}$$

Согласно аксиоме (4) определения 6.1.1

$$(6.1.8) \quad \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{C'C}$$

Применяя аксиому (4) определения 6.1.1 к крайним членам равенства (6.1.8), получаем

$$(6.1.9) \quad \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$$

Из равенства (6.1.9) следует утверждение теоремы.  $\square$

**Теорема 6.1.6.** Сложение векторов ассоциативно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $\bar{a} = \overrightarrow{AB}$ ,  $\bar{b} = \overrightarrow{BC}$ ,  $\bar{c} = \overrightarrow{CD}$ . Из равенства

$$\begin{array}{rcl} \bar{a} + \bar{b} &=& \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} &=& \overrightarrow{AC} \end{array}$$

следует

$$(6.1.10) \quad \begin{array}{rcl} (\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} &=& \overrightarrow{AD} \\ \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} &=& \overrightarrow{AD} \end{array}$$

Из равенства

$$\begin{array}{rcl} \bar{b} + \bar{c} &=& \overrightarrow{BD} \\ \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} &=& \overrightarrow{BD} \end{array}$$

следует

$$(6.1.11) \quad \begin{array}{rcl} \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) &=& \overrightarrow{AD} \\ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} &=& \overrightarrow{AD} \end{array}$$

Из сравнения равенств (6.1.10) и (6.1.11) следует ассоциативность сложения.

□

**Теорема 6.1.7.** На множестве  $\overline{A}$  определена структура абелевой группы.

**Доказательство.** Из теорем 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 следует, что операция сложение векторов определяет группу.

Пусть  $\overline{a} = \overrightarrow{AB}$ ,  $\overline{b} = \overrightarrow{BC}$ .

$$(6.1.12) \quad \begin{aligned} \overline{a} + \overline{b} &= \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

Согласно аксиоме (3) определения 6.1.1 существует точка  $D$  такая, что  $\overline{b} = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ . Согласно аксиоме (4) определения 6.1.1  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overline{a}$ .

$$(6.1.13) \quad \begin{aligned} \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} &= \overrightarrow{AC} \\ \overline{b} + \overline{a} &= \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

Из сравнения равенств (6.1.12) и (6.1.13) следует коммутативность сложения.

□

**Теорема 6.1.8.** Отображение

$$(6.1.14) \quad \overline{A} \rightarrow \overset{\circ}{A^*}$$

определенное равенством (6.1.1), является эффективным представлением абелевой группы  $\overline{A}$ .

**Доказательство.** Аксиома (4) определения 6.1.1 определяет отображение (6.1.14). Из теоремы 6.1.5 следует, что отображение (6.1.14) является представлением. Эффективность представления следует из теоремы 6.1.3

□

**Определение 6.1.9.** Пусть  $D$  - тело характеристики 0. Эффективное представление тела  $D$  в абелевой группе  $\overline{A}$  порождает башню представлений

$$(6.1.15) \quad \overset{\circ}{A} = ((D, \overline{A}, \overset{\circ}{A}), (\overline{v} \rightarrow d \overline{v}, A \rightarrow A + \overline{v}))$$

Башня представлений (6.1.15) называется *D-аффинным пространством*.

□

## 6.2. Базис в $D$ -аффинном пространстве

Так как  $D$ -аффинное пространство является башней представлений (6.1.15), то мы будем пользоваться кортежем

$$(\overline{a} \in \overline{A}, B \in \overset{\circ}{A})$$

для представления элемента аффинного пространства.

Мы выберем точку  $O \in \overset{\circ}{A}$  как начальную точку аффинного пространства  $\overset{\circ}{A}$ . Вектор  $\overrightarrow{OA} \in \overline{A}$  является координатой точки  $A$ . Однако, так как мы можем определить  $D^{*_*}$ -базис  $\overline{e}$  в векторном пространстве  $\overline{A}$ , мы можем отождествить координаты  $A^1, \dots, A^n$  вектора  $\overrightarrow{OA}$  с координатами точки  $A$  относительно базиса  $(\overline{e}, O)$ .

**Определение 6.2.1.**  $D^*$ -аффинный базис  $(\bar{\bar{e}}, O) = (\bar{e}, O)$  - это множество  $D^*$ -линейно независимых векторов  $\bar{e}_i = \overrightarrow{OA_i} = (e_i^1, \dots, e_i^n)$  с общей начальной точкой  $O = (O^1, \dots, O^n)$ .  $\square$

**Определение 6.2.2.** Многообразие  $D^*$ -базисов  $\mathcal{B}(D^*\mathcal{A}_n)$  аффинного пространства - это множество  $D^*$ -базисов этого пространства.  $\square$

Отображение базиса  $(\bar{\bar{e}}, O)$  в базис  $(\bar{e}', O')$  можно представить как композицию отображения базиса  $(\bar{\bar{e}}, O)$  в базис  $(\bar{e}, O')$  и  $D^*$ -линейного отображения базиса  $(\bar{e}, O')$  в базис  $(\bar{e}', O')$ . Следовательно,  $D^*$ -преобразование имеет вид

$$\begin{aligned}\bar{e}' &= A^*_* \bar{e} \\ O' &= O + \overrightarrow{OO'}\end{aligned}$$

Вводя координаты  $A^1, \dots, A^n$  точки  $A \in \mathcal{A}_n$  как координаты вектора  $\overrightarrow{OA}$  относительно базиса  $\bar{\bar{e}}$ , мы можем записать линейное преобразование как

$$(6.2.1) \quad A'^i = A^j{}_j P^i + R^i \quad \text{rank}_* P = n$$

$$(6.2.2) \quad A'^*_* \bar{e} = (A^*_* P + R)^*_* \bar{e}$$

Вектор  $(R^1, \dots, R^n)$  выражает смещение в аффинном пространстве.

**Теорема 6.2.3.** Множество преобразований (6.2.2) - это группа Ли, которую мы обозначим  $GL(\mathcal{A}_n)$  и будем называть группой аффинных преобразований.

**Доказательство.** Рассмотрим преобразования  $(P, R)$  и  $(Q, S)$ . Последовательное выполнение этих преобразований имеет вид

$$\begin{aligned}A''^i &= A'^j{}_j Q^i + S^i & A'' &= (A'^*_* Q + S)^*_* \bar{e} \\ &= (A^k{}_k P^j + R^j)_j Q^i + S^i & &= ((A^*_* P + R)^*_* Q + S)^*_* \bar{e} \\ &= A^k{}_k P^j{}_j Q^i + R^j{}_j Q^i + S^i & &= (A^*_* P^*_* Q + R^*_* Q + S)^*_* \bar{e}\end{aligned}$$

Следовательно, мы можем записать произведение преобразований  $(P, R)$  и  $(Q, S)$  в виде

$$(6.2.3) \quad (P, R)^*_* (Q, S) = (P^*_* Q, R^*_* Q + S)$$

$\square$

Мы будем называть активное преобразование **аффинным преобразованием**. Мы будем называть пассивное преобразование **квазиаффинным преобразованием**.

Если мы не заботимся о начальной точке вектора, мы получим несколько отличный тип пространства, которое мы будем называть центро-аффинным пространством  $C\mathcal{A}_n$ . Если мы предположим, что начальная точка вектора - это начало  $O$  координатной системы в пространстве, то мы можем отождествить любую точку  $A \in C\mathcal{A}_n$  с вектором  $a = \overrightarrow{OA}$ . Теперь преобразование - это просто отображение

$$a'^i = P_j^i a^j \quad \det P \neq 0$$

и такие преобразования порождают группу Ли  $GL_n$ .

**Определение 6.2.4.** Центро-аффинный базис  $\bar{\bar{e}} = (\bar{e}_i)$  - это множество линейно независимых векторов  $\bar{e}_i$ .  $\square$

**Определение 6.2.5.** Многообразие базисов  $\mathcal{B}(CA_n)$  центро-аффинного пространства - это множество базисов этого пространства.  $\square$



## Глава 7

# Евклидово пространство

### 7.1. Евклидово пространство

Пусть  $\overline{V}$  -  $D$ -векторное пространство. Билинейное отображение

$$g : \overline{V} \times \overline{V} \rightarrow D$$

можно представить в виде

$$g(\overline{v}, \overline{w}) = {}_{ij}g(v^i, w^j)$$

где  ${}_{ij}g$  - билинейное отображение

$${}_{ij}g : D^2 \rightarrow D$$

**Определение 7.1.1.** Билинейное отображение

$$g : \overline{V} \times \overline{V} \rightarrow D$$

называется **симметричным**, если

$$g(\overline{w}, \overline{v}) = g(\overline{v}, \overline{w})$$

□

**Определение 7.1.2.** Билинейное отображение

$$g : \overline{V} \times \overline{V} \rightarrow D$$

называется **евклидовым скалярным произведением** в  $D$ -векторном пространстве  $\overline{V}$ , если  ${}_{ii}g$  - евклидово скалярное произведение в теле  $D$  и  ${}_{ij}g = 0$  для  $i \neq j$ . □

**Определение 7.1.3.** Билинейное отображение

$$g : \overline{V} \times \overline{V} \rightarrow D$$

называется **псевдоевклидовым скалярным произведением** в  $D$ -векторном пространстве  $\overline{V}$ , если  ${}_{ii}g$  - псевдоевклидово скалярное произведение в теле  $D$  и  ${}_{ij}g = 0$  для  $i \neq j$ . □

Если в теле  $D$  определена операция эрмитова сопряжения, то мы можем эту операцию распространить на  $D$ -векторное пространство  $\overline{V}$ , а именно для данного вектора  $\overline{v} = v^i {}_i\bar{e}$  мы определим **эрмитово сопряжённый вектор**

$$\overline{v}^* = (v^i)^* {}_i\bar{e}$$

**Определение 7.1.4.** Билинейное отображение

$$g : \overline{V} \times \overline{V} \rightarrow D$$

называется **эрмитовым скалярным произведением** в  $D$ -векторном пространстве  $\overline{V}$ , если  ${}_{ii}g$  - эрмитово скалярное произведение в теле  $D$  и  ${}_{ij}g = 0$  для  $i \neq j$ . □

## 7.2. Базис в евклидовом пространстве

Когда мы определяем метрику в центро-аффинном пространстве, мы получаем новую геометрию потому, что мы можем измерять расстояние и длину вектора. Если метрика положительно определена, мы будем называть пространство евклидовым  $\mathcal{E}_n$ , в противном случае мы будем называть пространство псевдоевклидовым  $\mathcal{E}_{nm}$ .

Преобразования, которые сохраняют длину, образуют группу Ли  $SO(n)$  для евклидова пространства и группу Ли  $SO(n, m)$  для псевдоевклидова пространства, где  $n$  и  $m$  числа положительных и отрицательных слагаемых в метрике.

**Определение 7.2.1.** Ортонормальный базис  $\bar{\mathbf{e}} = (\bar{\mathbf{e}}_i)$  - это множество линейно независимых векторов  $\bar{\mathbf{e}}_i$  таких, что длина каждого вектора равна 1 и различные векторы ортогональны.  $\square$

**Определение 7.2.2.** Многообразие базисов  $\mathcal{B}(\mathcal{E}_n)$  евклидова пространства - это множество ортонормальных базисов этого пространства.  $\square$

Мы будем называть активное преобразование **движением**. Мы будем называть пассивное преобразование **квазидвижением**.

## Глава 8

# Математический анализ в $D$ -аффинном пространстве

### 8.1. Криволинейные координаты в $D$ -аффинном пространстве

Пусть  $\overset{\rightarrow}{A}$  -  $D$ -аффинное пространство над непрерывным тело  $D$ .<sup>8.1</sup>

Пусть  $(_1\bar{e}, \dots, _n\bar{e}, O)$  -  $D^*$ -базис аффинного пространства. Для каждого  $i$ ,  $i = 1, \dots, i = n$ , определим отображение<sup>8.2</sup>

$$(8.1.1) \quad \bar{x}_i : D \rightarrow \overset{\circ}{A} \quad v^i \rightarrow O + v^i \cdot {}_i\bar{e}$$

Для произвольной точки  $M(v^i)$  мы можем записать вектор  $\overset{\rightarrow}{OM}$  в виде линейной комбинации

$$\overset{\rightarrow}{OM} = \bar{x}_i(v^i)$$

Мы можем рассматривать множество координат аффинного пространства  $\overset{\circ}{A}$  как гомеоморфизм

$$f : \overset{\circ}{A} \rightarrow D^n$$

Если гомеоморфизм

$$f : \overset{\circ}{A} \rightarrow D^n$$

является произвольным отображением открытого подмножества  $D$ -аффинного пространства в открытое подмножество множества  $D^n$ , то мы будем говорить, что образ точки  $A$  при отображении  $f$  является **криволинейными координатами точки  $A$** , а отображение  $f$  будем называть системой координат. Если даны две системы координат,  $f_1$  и  $f_2$ , то отображение  $g = f_1 f_2^{-1}$  является гомеоморфизмом

$$\begin{aligned} g : D^n &\rightarrow D^n \\ x'^i &= x^i(x^1, \dots, x^n) \end{aligned}$$

и называется преобразованием координат. Преобразование координат, порождённое аффинным преобразованием, можно рассматривать как частный случай.

**Замечание 8.1.1.** Рассмотрим поверхность  $S$  в аффинном пространстве, определённую уравнением

$$\begin{aligned} f : D^n &\rightarrow D \\ f(x^1, \dots, x^n) &= 0 \end{aligned}$$

<sup>8.1</sup>В этом разделе я изучаю криволинейные координаты аналогично тому, как это сделано в [3], глава V.

<sup>8.2</sup>В равенстве (8.1.1) нет суммы по индексу  $i$ .

Пусть  $M(x^i)$  - произвольная точка. Малое изменение координат точки

$$x'^i = x^i + \Delta x^i$$

приводит к малому изменению функции

$$\Delta f = \partial f(\bar{x})(\Delta \bar{x})$$

В частности, если бесконечно близкие точки  $M(x^i)$  и  $L(x^i + \Delta x^i)$  лежат на одной поверхности, то вектор приращения  $\overrightarrow{ML} = \Delta \bar{x}$  удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$\partial f(\bar{x})(\Delta \bar{x}) = 0$$

и называется вектором, касательным к поверхности  $S$ .

Так как производная Гато отображения  $f$  в точке  $X$  является линейным отображением, то эта производная является  $1$ - $D$ -формой. Рассмотрим множество  $1$ - $D$ -форм

$$dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}}$$

Очевидно, что

$$dx^i(\bar{a}) = \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}}(\bar{a}) = (x^i + a^i) - x^i = a^i$$

Производную Гато произвольной функции можно представить в виде

$$\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial \bar{x}} = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x^i} \left( \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}} \right) = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x^i} (dx^i)$$

$$(8.1.2) \quad \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial \bar{x}}(\bar{a}) = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x^i} \left( \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}}(\bar{a}) \right) = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x^i} (dx^i(\bar{a})) = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x^i}(a^i)$$

Следовательно, производная Гато функции  $f$  является линейной комбинацией  $1$ - $D$ -форм  $dx^i$ . Пусть

$$\begin{aligned} g : D^n &\rightarrow D^n \\ x'^i &= x^i(v^1, \dots, v^n) \end{aligned}$$

преобразование координат аффинного пространства. Из правила дифференцирования сложной функции (теорема [8]-8.2.12) следует

$$dx'^i = \frac{\partial x'^i}{\partial \bar{x}} = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} \left( \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}} \right) = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} (dx^j)$$

Координатная линия - это кривая, вдоль которой изменяется только одна координата  $x^i$ . Мы будем рассматривать координатную кривую как кривую, имеющую касательный вектор

$$(8.1.3) \quad \bar{x}_i(\bar{x})(v) = \frac{\partial \bar{x}}{\partial x^i}(v)$$

Пусть точка  $O$  имеет координаты  $\bar{x}$ . Множество векторов  $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$  является базисом аффинного пространства

$$(\bar{x}_1(\bar{x}), \dots, \bar{x}_n(\bar{x}), \bar{x})$$

$$(8.1.4) \quad \bar{v} = \bar{x}_i(\bar{x})(v^i)$$

Пусть

$$\begin{aligned} g : D^n &\rightarrow D^n \\ x'^i &= x^i(v^1, \dots, v^n) \end{aligned}$$

преобразование координат аффинного пространства. Из правила дифференцирования сложной функции (теорема [8]-8.2.12) следует

$$(8.1.5) \quad \bar{x}'_i(\bar{x}')(v'^i) = \frac{\partial \bar{x}}{\partial x'^i}(v'^i) = \frac{\partial \bar{x}}{\partial x^j} \left( \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}(v'^i) \right) = \bar{x}_j(\bar{x}) \left( \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}(v'^i) \right)$$

Из сравнения равенств (8.1.4), (8.1.5) следует закон преобразования координат вектора

$$(8.1.6) \quad v^j = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}(v'^i)$$

**Пример 8.1.2.** Рассмотрим линейное преобразование координат

$$(8.1.7) \quad \begin{aligned} x'^1 &= ax^1 b + ax^2 c \\ x'^2 &= x^1 + x^2 \end{aligned}$$

Тогда

$$(8.1.8) \quad \begin{aligned} x^1 &= x'^2 - x^2 \\ x'^1 &= a(x'^2 - x^2)b + ax^2 c = ax'^2 b + ax^2(c - b) \\ (8.1.9) \quad ax^2(c - b) &= x'^1 - ax'^2 b \end{aligned}$$

Из равенств (8.1.8), (8.1.9) следует обратное преобразование

$$(8.1.10) \quad \begin{aligned} x^2 &= a^{-1}x'^1(c - b)^{-1} - x'^2 b(c - b)^{-1} \\ x^1 &= x'^2 - a^{-1}x'^1(c - b)^{-1} + x'^2 b(c - b)^{-1} \\ &= -a^{-1}x'^1(c - b)^{-1} + x'^2(1 + b(c - b)^{-1}) \end{aligned}$$

Из равенств (8.1.7) следует закон преобразования 1-D-форм

$$\begin{aligned} dx'^1 &= adx^1 b + adx^2 c \\ dx'^2 &= dx^1 + dx^2 \end{aligned}$$

Из равенств (8.1.6), (8.1.10) следует закон преобразования координат вектора

$$\begin{aligned} v^1 &= -a^{-1}v'^1(c - b)^{-1} + v'^2(1 + b(c - b)^{-1}) \\ v^2 &= a^{-1}v'^1(c - b)^{-1} - v'^2 b(c - b)^{-1} \end{aligned}$$

□

## 8.2. Параллельный перенос

Пусть в точке  $M_0$  вектор  $\bar{v}$  имеет координаты  $v_0^i$ . Пусть вектор  $\overrightarrow{M_0 M_1}$  является вектором бесконечно малого смещения. Пусть  $N_0 = M_0 + \bar{v}$ ,  $N_1 = M_1 + \bar{v}$ . Из аксиомы 3 определения 6.1.1 координаты векторов  $\overrightarrow{M_0 N_0}$  и  $\overrightarrow{M_1 N_1}$  равны. Как это построение будет выглядеть в криволинейных координатах?

Мы полагаем функции  $v^i(\bar{x})$  непрерывно дифференцируемыми в смысле Гато. Следовательно, векторы локального репера  $\bar{x}_i$  и координаты вектора  $v^i$  являются непрерывно дифференцируемыми в смысле Гато функциями. В точке  $M(\bar{x})$  справедливо равенство

$$(8.2.1) \quad \bar{v} = \bar{x}_i(\bar{x})(v^i(\bar{x}))$$

Так как  $\bar{v} = \text{const}$ , то, дифференцируя равенство (8.2.1) по  $\bar{x}$ , получим

$$(8.2.2) \quad 0 = \frac{\partial \bar{x}_i(\bar{x})}{\partial \bar{x}}(v^i)(\bar{a}) + \bar{x}_i(\bar{x}) \left( \frac{\partial v^i}{\partial \bar{x}}(\bar{a}) \right)$$

Из равенств (8.1.2), (8.2.2) следует

$$(8.2.3) \quad 0 = \frac{\partial \bar{x}_i(\bar{x})}{\partial x^j}(v^i)(a^j) + \bar{x}_i(\bar{x}) \left( \frac{\partial v^i}{\partial x^j}(a^j) \right)$$

Выражение  $\frac{\partial \bar{x}_i(\bar{x})}{\partial x^j}(v^i)(a^j)$  является вектором аффинного пространства и в локальном базисе  $\bar{x}_i(\bar{x})$  это выражение имеет разложение

$$(8.2.4) \quad \frac{\partial \bar{x}_i(\bar{x})}{\partial x^j}(v^i)(a^j) = \bar{x}_k(\bar{x})(\Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j))$$

где  $\Gamma_{ji}^k$  - билинейные отображения, называемые **коэффициентами связности в  $D$ -аффинном пространстве**. Из равенств (8.2.4), (8.2.3) следует

$$(8.2.5) \quad 0 = \bar{x}_k(\bar{x})(\Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j)) + \bar{x}_i(\bar{x}) \left( \frac{\partial v^i}{\partial x^j}(a^j) \right)$$

Так как  $\bar{x}_k(\bar{x})$  - локальный базис, то из равенства (8.2.5) следует

$$0 = \bar{x}_k(\bar{x}) \left( \Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j) + \frac{\partial v^k}{\partial x^j}(a^j) \right)$$

$$(8.2.6) \quad 0 = \Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j) + \frac{\partial v^k}{\partial x^j}(a^j)$$

Так как  $\bar{a}$  - произвольный вектор, то равенство (8.2.6) можно записать в виде

$$(8.2.7) \quad 0 = \Gamma_{ji}^k(v^i) + \frac{\partial v^k}{\partial x^j}$$

**Теорема 8.2.1.** В аффинном пространстве

$$(8.2.8) \quad \Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j) = \Gamma_{ij}^k(v^i)(a^j)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно равенству (8.1.3)

$$(8.2.9) \quad \frac{\partial \bar{x}_i(\bar{x})}{\partial x^j}(v^i)(a^j) = \frac{\partial^2 \bar{x}}{\partial x^j \partial x^i}(v^i; a^j)$$

Согласно теореме [8]-8.3.6

$$(8.2.10) \quad \frac{\partial^2 \bar{x}}{\partial x^j \partial x^i}(v^i; a^j) = \frac{\partial^2 \bar{x}}{\partial x^i \partial x^j}(v^i; a^j)$$

Равенство (8.2.8) следует из равенств (8.2.4), (8.2.10).  $\square$

Пусть

$$\begin{aligned} g : D^n &\rightarrow D^n \\ x'^i &= x'^i(x^1, \dots, x^n) \end{aligned}$$

преобразование координат аффинного пространства. Продифференцируем равенство (8.1.5) по  $x'^j$

$$(8.2.11) \quad \frac{\partial \bar{x}'_i(\bar{x}')}{\partial x'^j}(v'^i)(a'^j) = \bar{x}_k(\bar{x}) \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right) \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) + \bar{x}_k(\bar{x}) \left( \frac{\partial^2 x^k}{\partial x'^j \partial x'^i}(v'^i; a'^j) \right)$$

Из равенств (8.2.4), (8.2.11) следует

$$(8.2.12) \quad \begin{aligned} & \bar{x}'_p(\bar{x}')( \Gamma'_{ji}^{ip}(v'^i)(a'^j) ) \\ &= \bar{x}_r(\bar{x}) \left( \Gamma_{mk}^r \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right) \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) \right) + \bar{x}_r(\bar{x}) \left( \frac{\partial^2 x^r}{\partial x'^j \partial x'^i}(v'^i; a'^j) \right) \\ &= \bar{x}_r(\bar{x}) \left( \Gamma_{mk}^r \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right) \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) + \frac{\partial^2 x^r}{\partial x'^j \partial x'^i}(v'^i; a'^j) \right) \end{aligned}$$

Из равенств (8.1.5), (8.2.12) следует

$$(8.2.13) \quad \begin{aligned} & \bar{x}'_p(\bar{x}')( \Gamma'_{ji}^{ip}(v'^i)(a'^j) ) \\ &= \bar{x}'_p(\bar{x}) \left( \frac{\partial x'^p}{\partial x^r} \left( \Gamma_{mk}^r \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right) \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) + \frac{\partial^2 x^r}{\partial x'^j \partial x'^i}(v'^i; a'^j) \right) \right) \end{aligned}$$

Из равенства (8.2.13) следует

$$(8.2.14) \quad \begin{aligned} & \Gamma'_{ji}^{ip}(v'^i)(a'^j) \\ &= \frac{\partial x'^p}{\partial x^r} \left( \Gamma_{mk}^r \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right) \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) + \frac{\partial^2 x^r}{\partial x'^j \partial x'^i}(v'^i; a'^j) \right) \end{aligned}$$



## Глава 9

# Многообразие $D$ -аффинной связности

Основная задача этой главы - дать общее представление о тех задачах, которые необходимо будет решать в процессе изучения дифференциальной геометрии.

### 9.1. Многообразие $D$ -аффинной связности

**Определение 9.1.1.** Расслоенное центральное  $D$ -аффинное пространство называется **многообразием  $D$ -аффинной связности**.  $\square$

Мы полагаем, что размерность базы равна размерности слоя. Это позволяет отождествить слой с касательным пространством к базе. Рассмотрим область  $U$  многообразия, в которой определён гомеоморфизм

$$\bar{x} : D^n \rightarrow U$$

Так же как и в случае аффинного пространства мы в каждом слое определим локальный базис

$$\bar{x}_k : \frac{\partial \bar{x}}{\partial x^k}$$

Мы полагаем, что отображение между слоями является морфизмом центрального  $D$ -аффинного пространства

$$d\bar{v} = \Gamma(\bar{v})(d\bar{x})$$

где билинейное отображение  $\Gamma$  называется  **$D$ -аффинной связностью**. В локальном базисе связность можно представить как множество билинейных функций  $\Gamma_{ij}^k$

$$\Gamma(\bar{v})(\bar{a}) = \bar{x}_k(\bar{x})(\Gamma_{ji}^k(v^i)(a^j))$$

которые называются **коэффициентами  $D$ -аффинной связности**. При переходе от системы координат  $\bar{x}$  к системе координат  $\bar{x}'$  коэффициенты  $D$ -аффинной связности преобразуются согласно правилу

$$\begin{aligned} & \Gamma'_{ji}^{kp}(v'^i)(a'^j) \\ &= \frac{\partial x'^p}{\partial x^r} \left( \Gamma_{mk}^r \left( \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}(v'^i) \right) \left( \frac{\partial x^m}{\partial x'^j}(a'^j) \right) + \frac{\partial^2 x^r}{\partial x'^i \partial x'^j}(v'^i; a'^j) \right) \end{aligned}$$

Ковариантная производная векторного поля  $\bar{v}$  имеет вид

$$D(\bar{v})(d\bar{x}) = \partial(\bar{v})(d\bar{x}) - \Gamma(\bar{v})(d\bar{x})$$

Векторное поле  $\bar{v}$  параллельно переносится в данном направлении, если

$$\partial(\bar{v})(d\bar{x}) = \Gamma(\bar{v})(d\bar{x})$$

Если  $\bar{x} = \bar{x}(t)$  - отображение поля действительных чисел в рассматриваемое пространство, то это отображение определяет геодезическую, если касательный вектор параллельно переносится вдоль геодезической

$$(9.1.1) \quad \partial(\partial\bar{x}(d\bar{x}))(d\bar{x}) = \Gamma(d\bar{x})(d\bar{x})$$

Уравнение (9.1.1) эквивалентно уравнению

$$(9.1.2) \quad \partial^2\bar{x}(d\bar{x}; d\bar{x}) = \Gamma(d\bar{x})(d\bar{x})$$

## Глава 10

### Список литературы

- [1] Серж Ленг, Алгебра, М. Мир, 1968
- [2] S. Burris, H.P. Sankappanavar, A Course in Universal Algebra, Springer-Verlag (March, 1982),  
eprint <http://www.math.uwaterloo.ca/~snburris/htdocs/ualg.html>  
(The Millennium Edition)
- [3] П. К. Рашевский, Риманова геометрия и тензорный анализ,  
М., Наука, 1967
- [4] А. Г. Курош, Курс высшей алгебры, М., Наука, 1968
- [5] Александр Клейн, Лекции по линейной алгебре над телом,  
eprint [arXiv:math.GM/0701238](https://arxiv.org/abs/math.GM/0701238) (2007)
- [6] Александр Клейн, Расслоенное соответствие,  
eprint [arXiv:0707.2246](https://arxiv.org/abs/0707.2246) (2007)
- [7] Александр Клейн, Морфизм  $T_\star$ -представлений,  
eprint [arXiv:0803.2620](https://arxiv.org/abs/0803.2620) (2008)
- [8] Александр Клейн, Введение в математический анализ над телом,  
eprint [arXiv:0812.4763](https://arxiv.org/abs/0812.4763) (2008)
- [9] John C. Baez, An Introduction to n-Categories,  
eprint [arXiv:q-alg/9705009](https://arxiv.org/abs/q-alg/9705009) (1997)
- [10] П. Кон, Универсальная алгебра, М., Мир, 1968
- [11] Paul Bamberg, Shlomo Sternberg, A course in mathematics for students  
of physics, Cambridge University Press, 1991
- [12] Alain Connes, Noncommutative Geometry,  
Academic Press, 1994

## Предметный указатель

- D*-аффинная связность на многообразии  
аффинной связности 71
- $D^*$ -аффинный базис 60
- $\star T$ -представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в  
множестве  $M$  9
- $\star T$ -преобразование 9
- $\star T$ -сдвиг 24
- $T\star$ -представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в  
множестве  $M$  9
- $T\star$ -преобразование 9
- $T\star$ -сдвиг 23
- автоморфизм представления  $f$  12
- автоморфизм представления,  
вырожденный на множестве  
образующих  $X$  32
- автоморфизм представления,  
невырожденный на множестве  
образующих  $X$  32
- активное преобразование базиса  
представления 33
- базис представления 32
- башня представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебр 35
- группа аффинных преобразований 60
- группа стабилизации 26
- движение на многообразии базисов 64
- закон ассоциативности для  
ковариантного  $\star T$ -представления 23
- закон ассоциативности для  
ковариантного  $T\star$ -представления 22
- категория  $T\star$ -представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры  
 $A$  21
- категория  $T\star$ -представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры  
из категории  $\mathcal{A}$  16
- квадратичная форма на теле 53
- квадратичное отображение тела 50
- квазиаффинное преобразование на  
многообразии базисов 60
- квазидвижение на многообразии базисов  
64
- ковариантное  $\star T$ -представление группы  
22
- ковариантное  $T\star$ -представление группы  
22
- кольцо имеет характеристику 0 45
- кольцо имеет характеристику  $p$  45
- контравариантное  $\star T$ -представление  
группы 23
- контравариантное  $T\star$ -представление  
группы 22
- координаты базиса  $X'_*$  представления в  
представлении  $f_{2,3}$  относительно  
базиса  $X_*$  43
- координаты базиса представления 33
- координаты кортежа  $x_*$  представления  
 $f_{1,2}$  относительно базиса  $X_*$  43
- координаты элемента представления 33
- кортеж образующих подпредставления  
 $J_{f_*}(\overline{X})$  42
- кортеж образующих представления  $f_*$  42
- кортеж стабильных множеств  
представления 40
- коэффициенты *D*-аффинной связности  
на многообразии 71
- коэффициенты связности в *D*-аффинном  
пространстве 68
- криволинейные координаты точки  
аффинного пространства 65
- левостороннее представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  
 $A$  в множестве  $M$  9
- левостороннее преобразование 9
- левый сдвиг на группе 23
- малая группа 26
- матрица билинейной функции 49
- матрица квадратичного отображения 52
- многообразие *D*-аффинной связности 71

- многообразие  $D^*_*$ -базисов аффинного пространства 60
- многообразие базисов евклидова пространства 64
- многообразие базисов центро-аффинного пространства 61
- множество образующих подпредставления 31
- множество образующих представления 31
- морфизм из башни  $T\star$ -представлений в башню  $T\star$ -представлений 37
- морфизм представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры 12
- морфизм представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры в  $\mathfrak{H}$ -алгебре 30
- морфизм представлений из  $f$  в  $g$  12
- невырожденная билинейная функция 49
- невырожденное преобразование 23
- невырожденный автоморфизм представления 32
- однородное пространство группы 26
- однотранзитивное представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  10
- орбита  $T\star$ -представления группы 24
- ортонормальный базис 64
- парные представления группы 29
- подпредставление представления 30
- подпредставление представления алгебры в представлении 40
- подпредставление представления  $f_*$ , порождённое кортежем множеств 42
- подпредставление, порождённое множеством  $X$  31
- правостороннее представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в множестве  $M$  9
- правостороннее преобразование 9
- правый сдвиг на группе 24
- представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в категории  $\mathcal{B}$  44
- представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  в множестве  $M$  10
- представление  $\mathcal{F}$ -алгебры в башне представлений 37
- представление  $\mathcal{F}$ -алгебры в представлении 36
- преобразование множества 9
- преобразование, согласованное эквивалентностью 16
- произведение морфизмов представлений  $\mathfrak{F}$ -алгебры 15
- пространство орбит  $T\star$ -представления 25
- прямое произведение  $T\star$ -представлений группы 25
- псевдоевклидова метрика на теле 55
- псевдоевклидово скалярное произведение в  $D$ -векторном пространстве 63
- псевдоевклидово скалярное произведение на теле 55
- ранг квадратичного отображения тела 52
- свободное  $T\star$ -представление группы 26
- симметричное билинейное отображение  $D$ -векторного пространства в тело 63
- стабильное множество представления 30
- стандартная компонента квадратичного отображения  $f$  над полем  $F$  51
- стандартная компонента над полем  $F$  билинейного отображения  $f$  49
- стандартное представление квадратичного отображения тела над полем  $F$  51
- стандартное представление над полем  $F$  билинейного отображения тела 49
- структурные константы тела  $D$  над полем  $F$  47
- транзитивное представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  10
- центр кольца  $D$  45
- центро-аффинный базис 60
- евклидова метрика на теле 54
- евклидово скалярное произведение в  $D$ -векторном пространстве 63
- евклидово скалярное произведение на теле 54
- эрмитова метрика на теле 55
- эрмитово скалярное произведение в  $D$ -векторном пространстве 63
- эрмитово скалярное произведение на теле 55
- эрмитово сопряжение в теле 55
- эрмитово сопряжённый вектор 63
- эффективная башня  $T\star$ -представлений 39
- эффективное  $T\star$ -представление группы 26
- эффективное представление  $\mathfrak{F}$ -алгебры  $A$  10
- ядро неэффективности  $T\star$ -представления группы  $G$  26

## Специальные символы и обозначения

$\vec{A}$	аффинное пространство 59	$Gv$	орбита ковариантного эффективного $\star T$ -представления группы 27
$a^*$	эрмитово сопряжение в теле 55	$G_x$	группа стабилизации элемента $x$ 26
$\star t$	правый сдвиг 24	$J_f$	оператор замыкания представления $f$ 31
$t_\star$	левый сдвиг 23	$J_{f_*}$	оператор замыкания представления $f_*$ 41
$\mathcal{B}(D^* \star \mathcal{A}_n)$	многообразие $D^*$ -базисов аффинного пространства 60	$M^\star$	множество $\star T$ -преобразований множества $M$ 9
$\mathcal{B}(\mathcal{C}\mathcal{A}_n)$	многообразие базисов центро-аффинного пространства 61	${}^*M$	множество преобразований множества $M$ 10
$\mathcal{B}(\mathcal{E}_n)$	многообразие базисов евклидова пространства 64	${}^*M$	множество $T$ -преобразований множества $M$ 9
$\mathcal{B}_f$	структура всех подпредставлений представления $f$ 30	$M/\star t(G)$	пространство орбит $\star T$ -ковариантного эффективного представления группы 27
$\mathcal{B}_{f_*}$	структура подпредставлений представления $f_*$ 41	$M/t_\star(G)$	пространство орбит $T$ -ковариантного эффективного представления группы 27
$i_j B^k$	структурные константы тела $D$ над полем $F$ 47	$M/f(G)$	пространство орбит $T$ -ковариантного эффективного представления группы $G$ в множестве $M$ 25
$\mathcal{C}\mathcal{A}_n$	центро-аффинное пространство 60	$T \star \mathfrak{F}$	категория $T$ -представлений $\mathfrak{F}$ -алгебры $A$ 21
$(\bar{e}, O) = (i\bar{e}, O)$	аффинный базис 60	$T \star \mathcal{A}$	категория $T$ -представлений $\mathfrak{F}$ -алгебры из категории $\mathcal{A}$ 16
$\mathcal{E}_n$	евклидово пространство 64	$\bar{v}^*$	эрмитово сопряжённый вектор 63
$\mathcal{E}_{nm}$	псевдоевклидово пространство 64	$w(X', X)$	координаты базиса $X'$ относительно базиса $X$ представления 33
$\bar{\bar{e}} = (\bar{e}_i)$	центро-аффинный 60	$w(X'_*, X_*)$	координаты базиса $X'_*$ относительно базиса $X_*$ в представлении $f_{2,3}$
$f(G)v$	орбита представления группы $G$ 24	$w(m, X)$	координаты $m \in M$ относительно базиса $X$ представления 33
$\bar{\bar{e}} = (\bar{e}_i)$	ортонормальный базис 64		
$f^{ijk}$	стандартная компонента квадратичного отображения $f$ над полем $F$ 51		
$GL(\mathcal{A}_n)$	группа аффинных преобразований 60		
$G_x$	малая группа элемента $x$ 26		
$vG$	орбита ковариантного эффективного $\star T$ -представления группы 27		

$w(x_*, X_*)$  координаты кортежа  $x_*$   
представления  $f_{1,2}$  относительно  
базиса  $X_*$  43

$\bar{x}_i(\bar{x})$  локальный базис аффинного  
пространства 66

$Z(D)$  центр кольца  $D$  45

$\delta$  тождественное преобразование 9

$\Gamma_{ji}^k$  коэффициенты связности в  $D$ -  
аффинном пространстве 68

$\Gamma(\bar{v})(d\bar{x})$  связность в  $D$ -аффинном  
пространстве 71

$\Gamma_{ji}^k$  коэффициенты  $D$ -аффинной  
связности на многообразии 71