

# BEOBACHTUNG ÜBER REIHEN, DEREN TERME NACH DEN SINUS ODER KOSINUS VIELFACHER WINKEL FORTSCHREITEN\*

Leonhard Euler

§1 Wenn also die Summation dieser Reihe

$$A + Bx + Cxx + Dx^3 + \text{etc}$$

bekannt war, sodass, welcher Wert auch immer dem Buchstaben  $x$  zugeteilt wird, ihre Summe angegeben werden kann, dann wird auch immer so die Summe dieser Reihe

$$A + B \cos \varphi + C \cos 2\varphi + D \cos 3\varphi + \text{etc}$$

wie dieser

$$B \sin \varphi + C \sin 2\varphi + D \sin 3\varphi + E \sin 4\varphi + \text{etc}$$

beschafft werden können. Weil nämlich die Summe der ersten Reihe durch eine gewisse Funktion von  $x$  ausgedrückt wird, die wir mit dem Charakter  $\Delta : x$  bezeichnen wollen, sodass

$$\Delta : x = A + Bx + Cxx + Dx^3 + \text{etc}$$

ist, wird, wenn wir anstelle von  $x$

$$\cos \varphi + \sqrt{-1} \sin \varphi$$

---

\*Originaltitel: „Observationes generales circa series, quarum termini secundum sinus vel cosinus angulorum multiplorum progrediuntur“, erstmals publiziert in „*Nova Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitinae* 7, 1793, pp. 87-98“, Nachdruck in „*Opera Omnia: Series 1, Volume 16, pp. 163 - 177*“, Eneström-Nummer E655, übersetzt von: Alexander Aycock, Textsatz: Artur Diener, im Rahmen des Projektes „Eulerkreis Mainz“

sowie

$$\cos \varphi - \sqrt{-1} \sin \varphi$$

schreiben, die Summen der daher entstehenden Reihen

$$2A + 2B \cos \varphi + 2C \cos 2\varphi + 2D \cos 3\varphi + 2E \cos 4\varphi + \text{etc}$$

sein, deren Summe also

$$\Delta : (\cos \varphi + \sqrt{-1} \sin \varphi) + \Delta : (\cos \varphi - \sqrt{-1} \sin \varphi)$$

sein wird; wenn wir aber letztere von der ersten abziehen, wird diese Reihe hervorgehen:

$$2B\sqrt{-1} \sin \varphi + 2C\sqrt{-1} \sin 2\varphi + 2D\sqrt{-1} \sin 3\varphi + 2E\sqrt{-1} \sin 4\varphi + \text{etc}$$

hervorgehen, deren Summe also

$$\Delta : (\cos \varphi + \sqrt{-1} \sin \varphi) - \Delta : (\cos \varphi - \sqrt{-1} \sin \varphi)$$

sein wird.

§2 Damit wir diese Ausdrücke vereinfachen, wollen wir der Kürze wegen

$$\cos \varphi + \sqrt{-1} \sin \varphi = p \quad \text{und} \quad \cos \varphi - \sqrt{-1} \sin \varphi = q$$

setzen und es wird, wie im Allgemeinen bekannt ist,

$$pq = 1$$

sein und daher

$$q = \frac{1}{p};$$

dann wird aber

$$\cos \varphi = \frac{p+q}{2}, \quad \cos 2\varphi = \frac{pp+qq}{2}, \quad \cos 3\varphi = \frac{p^3+q^3}{2}, \quad \cos 4\varphi = \frac{p^4+q^4}{2}, \quad \text{etc}$$

sein. Außerdem aber wird man für die Sinus haben

$$\sin \varphi = \frac{p-q}{2\sqrt{-1}}, \quad \sin 2\varphi = \frac{pp-qq}{2\sqrt{-1}}, \quad \sin 3\varphi = \frac{p^3-q^3}{2\sqrt{-1}}, \quad \sin 4\varphi = \frac{p^4-q^4}{2\sqrt{-1}}, \quad \text{etc,}$$

nach Festsetzen wovon wir diese 2 Summationen erreichen:

$$A \cos 0\varphi + B \cos \varphi + C \cos 2\varphi + D \cos 3\varphi + \text{etc} = \frac{\Delta : p + \Delta : q}{2}$$

und

$$A \sin 0\varphi + B \sin \varphi + C \sin 2\varphi + D \sin 3\varphi + \text{etc} = \frac{\Delta : p - \Delta : q}{2\sqrt{-1}}.$$

§3 Wir wollen nun für die anfängliche Reihe eine beliebige entwickelte Potenz des Binoms nehmen, welche

$$(1+x)^n = 1 + \frac{n}{1}x + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}xx + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^3 + \text{etc}$$

ist, sodass in diesem Fall

$$\Delta : x = (1+x)^n$$

ist, dann aber, damit wir diesen Ausdruck zusammenfassen, wollen wir die einzelnen Koeffizienten, wie ich es schon des öfteren gemacht habe, mit diesen Charakteren bezeichnen:

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \binom{n}{3}, \binom{n}{4}, \text{etc,}$$

sodass

$$\begin{aligned} \binom{n}{0} &= 1 \\ \binom{n}{1} &= n \\ \binom{n}{2} &= \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \\ \binom{n}{3} &= \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \\ &\text{etc} \end{aligned}$$

ist, wo es förderlich sein wird, bemerkt zu haben, dass im Allgemeinen

$$\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1}$$

ist und daher

$$\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1.$$

Außerdem ist in der Tat klar, dass, sooft  $i$  entweder eine negative Zahl war oder eine positive größer als  $n$ , dass dann immer

$$\binom{n}{i} = 0$$

ist, wenn natürlich  $n$  eine ganze Zahl war. Nachdem diese Dinge also bemerkt worden sind, werden wir diese anfängliche Summation haben:

$$(1+x)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \binom{n}{3}x^3 + \binom{n}{4}x^4 + \text{etc,}$$

woher also durch die gerade angegebenen Festlegungen diese beiden Summationen berechnen werden:

$$\binom{n}{0} \cos 0\varphi + \binom{n}{1} \cos 1\varphi + \binom{n}{2} \cos 2\varphi + \binom{n}{3} \cos 3\varphi + \text{etc} = \frac{(1+p)^n + (1+q)^n}{2}$$

und

$$\binom{n}{0} \sin 0\varphi + \binom{n}{1} \sin 1\varphi + \binom{n}{2} \sin 2\varphi + \binom{n}{3} \sin 3\varphi + \text{etc} = \frac{(1+p)^n - (1+q)^n}{2\sqrt{-1}}.$$

In diesem Fall aber werden sich, obwohl die für  $p$  und  $q$  angenommenen Formeln imaginär sind, dennoch die Formeln auf reelle Werte zurückführen lassen, so wie wir in den folgenden Problemen zeigen werden.

## PROBLEM 1

Nachdem diese Reihe der Kosinus vorgelegt wurde

$$1 + \frac{n}{1} \cos \varphi + \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cos 2\varphi + \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-2}{3} \cos 3\varphi + \text{etc} = s,$$

sodass durch die festgesetzten Charaktere

$$s = \binom{n}{0} \cos 0\varphi + \binom{n}{1} \cos 1\varphi + \binom{n}{2} \cos 2\varphi + \binom{n}{3} \cos 3\varphi + \text{etc},$$

ist ihre Summe reell auszudrücken.

## LÖSUNG

§4 Weil also, wie wir gerade gesehen haben

$$s = \frac{(1+p)^n + (1+q)^n}{2}$$

ist, während

$$p = \cos \varphi + \sqrt{-1} \sin \varphi \quad \text{und} \quad q = \cos \varphi - \sqrt{-1} \sin \varphi$$

wird, geht die ganze Aufgabe darauf zurück, dass dieser für  $s$  beschaffte Ausdruck vom Imaginären befreit wird; es ist nämlich klar, wenn die Formeln  $(1+p)^n$  und  $(1+q)^n$  entwickelt werden, dass sich dann die imaginären Anteile von selbst aufheben werden, weil ja die zu summierende Reihe selbst entsteht; deshalb werden wir eine andere Auflösung suchen, dass ohne angewandte Entwicklung die imaginäre Anteile aufgehoben werden; das wird auf die folgende Weise gemacht werden können.

§5 Weil  $pq = 1$  ist, wird die Formel  $1 + p$  so ausgedrückt werden können, dass

$$1 + p = (\sqrt{p} + \sqrt{q}) \sqrt{p}$$

ist; und auf ähnliche Weise wird

$$1 + q = (\sqrt{p} + \sqrt{q}) \sqrt{q}$$

sein; nach der Einführung dieser Werte wird unsere Summe als

$$s = \frac{1}{2} (\sqrt{p} + \sqrt{q})^n (p^{\frac{n}{2}} + q^{\frac{n}{2}})$$

hervorgehen. Weil schon im Allgemeinen

$$p^\alpha + q^\alpha = 2 \cos \alpha \varphi$$

ist, wird

$$p^{\frac{1}{2}} + q^{\frac{1}{2}} = 2 \cos \frac{1}{2} \varphi \quad \text{und} \quad p^{\frac{n}{2}} + q^{\frac{n}{2}} = 2 \cos \frac{1}{2} n \varphi$$

sein, nach Einsetzen welcher Werte die gesuchte schon reell auf die folgende Weise ausgedrückt werden wird:

$$s = 2^n \cos^n \frac{\varphi}{2} \cos \frac{1}{2} n \varphi.$$

§6 Nach dieser Übereinkunft also haben wir eine besonders bemerkenswerte Summation erhalten, die sich so verhält, dass immer

$$\begin{aligned} & 1 + \frac{n}{1} \cos \varphi + \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cos 2\varphi + \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-2}{3} \cos 3\varphi + \text{etc} \\ & = 2^n \cos^n \frac{1}{2} \varphi \cos \frac{1}{2} n \varphi, \end{aligned}$$

die immer mit der Wahrheit verträglich ist, welche Zahlen auch immer für  $n$  eingesetzt werden, ob ganze oder gebrochene oder sogar negative. Es wird also der Mühe Wert sein, aus jeder Art einfachere Fälle vor Augen zu führen.

## ENTWICKLUNG DER FÄLLE, IN DENEN DER EXPONENT $n$ EINE GANZE POSITIVE ZAHL IST

§7 Wir wollen die folgenden Fälle betrachten:

1. Es sei  $n = 0$  und die Reihe selbst wird zur Einheit verschmelzen, die Summe wird aber gleich 1 sein.

2. Es sei  $n = 1$  und eine Reihe wird in

$$1 + \cos \varphi$$

übergehen; die gefundene Summe aber liefert

$$2 \cos^2 \frac{1}{2} \varphi,$$

es ist aber bekannt, dass

$$2 \cos^2 \frac{1}{2} \varphi = 1 + \cos \varphi$$

ist.

3. Es sei  $n = 2$  und die Reihe wird in

$$1 + 2 \cos \varphi + \cos 2\varphi$$

übergehen, es entsteht aber die Summe

$$4 \cos^2 \frac{1}{2} \varphi \cos \varphi.$$

Gerade aber haben wir gesehen, dass  $2 \cos^2 \frac{1}{2} \varphi = 1 + \cos \varphi$  ist, welche Form mit  $2 \cos \varphi$  multipliziert

$$2 \cos \varphi \cdot 2 \cos^2 \frac{1}{2} \varphi = 1 + 2 \cos \varphi + \cos 2\varphi$$

ergibt.

4. Es sei nun  $n = 3$  und es entsteht diese Reihe

$$1 + 3 \cos \varphi + 3 \cos 2\varphi + \cos 3\varphi,$$

deren Summe gleich

$$8 \cos^3 \frac{1}{2} \varphi \cos \frac{3}{2} \varphi$$

ist, welche Formel durch hinreichend bekannte Reduktion die Reihe selbst ergibt.

5. Es sei nun  $n = 4$  und die Reihe geht über in

$$1 + 4 \cos \varphi + 6 \cos 2\varphi + 4 \cos 3\varphi + \cos 4\varphi,$$

deren Summe also

$$2^4 \cos^4 \frac{1}{2} \varphi \cos 2\varphi$$

sein wird, deren Gültigkeit man auch nicht schwer zeigt. Und so wird sich die Gültigkeit immer durch bekannte Reduktionen zeigen lassen.

ENTWICKLUNG DER FÄLLE, IN DENEN FÜR  $n$  EINE GANZE  
NEGATIVE ZAHL ANGENOMMEN WIRD

§8 Wir wollen zuerst  $n = -1$  setzen und es wird die folgende unendliche Reihe entstehen:

$$1 - \cos \varphi + \cos 2\varphi - \cos 3\varphi + \cos 4\varphi - \cos 5\varphi + \text{etc}$$

ins Unendlich, deren Summe also durch unsere allgemeine Reihe

$$\frac{\cos \frac{1}{2}\varphi}{2 \cos \frac{1}{2}\varphi} = \frac{1}{2}$$

sein wird, was freilich schon längst von den Mathematikern beobachtet worden ist. Wenn daher nämlich diese Reihe, deren Summe solange gleich  $s$  gesetzt wird, mit  $2 \cos \frac{1}{2}\varphi$  multipliziert wird, wird man durch allbekannte Reduktionen

$$2s \cos \frac{1}{2}\varphi = \left\{ \begin{array}{l} 2 \cos \frac{1}{2}\varphi - \cos \frac{3}{2}\varphi + \cos \frac{5}{2}\varphi - \cos \frac{7}{2}\varphi + \cos \frac{9}{2}\varphi \\ - \cos \frac{1}{2}\varphi + \cos \frac{3}{2}\varphi - \cos \frac{5}{2}\varphi + \cos \frac{7}{2}\varphi - \cos \frac{9}{2}\varphi \end{array} \right\} \text{etc}$$

finden, was natürlich auf  $2s \cos \frac{1}{2}\varphi = \cos \frac{1}{2}\varphi$  hinausläuft und daher  $s = \frac{1}{2}$ .

§9 Wir wollen nun  $n = -2$  setzen und es wird die folgende Reihe entstehen

$$1 - 2 \cos \varphi + 3 \cos 2\varphi - 4 \cos 3\varphi + 5 \cos 4\varphi - 6 \cos 5\varphi + \text{etc},$$

deren Summe also gleich

$$\frac{\cos \varphi}{4 \cos^2 \frac{1}{2}\varphi}$$

sein wird, deren Gültigkeit darüber hinaus auf die folgende Weise gezeigt werden kann. Nachdem die Summe der Reihe gleich  $s$  gesetzt wurde, wird

$$2s \cos \frac{1}{2}\varphi = \left\{ \begin{array}{l} 2 \cos \frac{1}{2}\varphi - 2 \cos \frac{3}{2}\varphi + 3 \cos \frac{5}{2}\varphi - 4 \cos \frac{7}{2}\varphi \\ - 2 \cos \frac{1}{2}\varphi + 3 \cos \frac{3}{2}\varphi - 4 \cos \frac{5}{2}\varphi + 5 \cos \frac{7}{2}\varphi \end{array} \right\} \text{etc}$$

sein, welcher Wert zur folgenden Reihe verschmilzt

$$2s \cos \frac{1}{2}\varphi = \cos \frac{3}{2}\varphi - \cos \frac{5}{2}\varphi + \cos \frac{7}{2}\varphi - \cos \frac{9}{2}\varphi + \text{etc}.$$

Man multipliziere erneut mit  $2 \cos \frac{1}{2} \varphi$  und es wird

$$4s \cos^2 \frac{1}{2} \varphi = \left\{ \begin{array}{l} \cos \varphi + \cos 2\varphi - \cos 3\varphi + \cos 4\varphi - \cos 5\varphi \\ - \cos 2\varphi + \cos 3\varphi - \cos 4\varphi + \cos 5\varphi \end{array} \right\} \text{etc} = \cos \varphi$$

hervorgehen und daher

$$s = \frac{\cos \varphi}{4 \cos^2 \frac{1}{2} \varphi},$$

wie wir gefunden haben, oder es wird auch

$$s = \frac{\cos \varphi}{2(1 + \cos \varphi)}$$

sein.

**§10** Es sei nun  $n = -3$  und es wird diese unendliche Reihe entstehen

$$1 - 3 \cos \varphi + 6 \cos 2\varphi - 10 \cos 3\varphi + 15 \cos 4\varphi - 21 \cos 5\varphi + \text{etc},$$

deren Summe also gleich

$$\frac{\cos \frac{3}{2} \varphi}{8 \cos^3 \frac{1}{2} \varphi}$$

sein wird. Dieser Ausdruck wird aber weiter auf diesen zurückgeführt

$$s = \frac{1}{2} - \frac{3}{8 \cos^2 \frac{1}{2} \varphi} = \frac{1}{2} - \frac{3}{4(1 + \cos \varphi)},$$

sodass auch

$$s = \frac{-1 + 2 \cos \varphi}{4(1 + \cos \varphi)}$$

ist.



§11 Auf ähnliche Weise werden wir auch die folgenden Summationen erhalten:

$$\begin{aligned}
 1 - 4 \cos \varphi + 10 \cos 2\varphi - 20 \cos 3\varphi + 35 \cos 4\varphi - \text{etc} &= \frac{\cos 2\varphi}{16 \cos^4 \frac{1}{2}\varphi} \\
 1 - 5 \cos \varphi + 15 \cos 2\varphi - 35 \cos 3\varphi + 70 \cos 4\varphi - \text{etc} &= \frac{\cos \frac{5}{2}\varphi}{32 \cos^5 \frac{1}{2}\varphi} \\
 1 - 6 \cos \varphi + 21 \cos 2\varphi - 56 \cos 3\varphi + 126 \cos 4\varphi - \text{etc} &= \frac{\cos 3\varphi}{64 \cos^6 \frac{1}{2}\varphi} \\
 1 - 7 \cos \varphi + 28 \cos 2\varphi - 84 \cos 3\varphi + 210 \cos 4\varphi - \text{etc} &= \frac{\cos \frac{7}{2}\varphi}{128 \cos^7 \frac{1}{2}\varphi} \\
 &\text{etc.}
 \end{aligned}$$

### ENTWICKLUNG DES FALLES, IN DEM $n = \frac{1}{2}$ IST

§12 Es wird daher also die folgende unendliche Reihe gebildet werden

$$1 + \frac{1}{2} \cos \varphi - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} \cos 2\varphi + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cos 3\varphi - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \cos 4\varphi + \text{etc},$$

deren Summe also gleich

$$\cos \frac{1}{4}\varphi \sqrt{2 \cos \frac{1}{2}\varphi}$$

sein wird, deren Gültigkeit nicht leicht sein wird anderswoher zu prüfen; in anderen Fällen aber springt sie natürlich ins Auge. Wenn z. B.  $\varphi = 0$  war, wird man

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \text{etc} = \sqrt{2}$$

haben; die Reihe entsteht natürlich aus der Entwicklung

$$(1 + 1)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}.$$

Wir wollen nun  $\varphi = 180^\circ$  setzen, dass  $\frac{1}{2}\varphi = 90^\circ$  ist, und die Reihe wird

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} - \text{etc} = 0$$

sein, was auch daher klar ist, weil diese Reihe aus der Form  $(1 - 1)^{\frac{1}{2}}$  entsteht. Es sei auch  $\varphi = 90^\circ$  und die daher entstehende Reihe wird

$$1 + \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12} - \text{etc} = \cos 22^\circ 30' \sqrt[4]{2}$$

sein. Es ist aber

$$\cos 22^\circ 30' = \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2\sqrt{2}}},$$

woher man die Summe

$$\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}}$$

folgert und so hat man diese höchst bemerkenswerte Summation

$$1 + \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12} - \text{etc} = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}}.$$

Wir wollen auch  $\varphi = 60^\circ$  nehmen und es wird diese Reihe entstehen

$$1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot 1 + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \cdot \frac{1}{2} \\ + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12} \cdot 1 + \text{etc},$$

die Summe welcher Reihe also  $\cos 15^\circ \sqrt[4]{3}$  sein wird. Weil also

$$\cos 15^\circ = \sqrt{\frac{1 + \cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{4}}$$

ist, wird die Summe der Reihe

$$\frac{1}{2} \sqrt{3 + 2\sqrt{3}}$$

sein.

### ENTWICKLUNG DES FALLES, IN DEM $n = -\frac{1}{2}$ IST

§13 Daher wird also die folgende unendliche Reihe gebildet werden

$$1 - \frac{1}{2} \cos \varphi + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cos 2\varphi - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cos 3\varphi + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \cos 4\varphi - \text{etc},$$

deren Summe also gleich

$$\frac{\cos \frac{1}{4} \varphi}{\sqrt{2 \cos \frac{1}{2} \varphi}}$$

sein wird. Daher entsteht, wenn  $\varphi = 0$  war, diese Summation

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} - \text{etc} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Diese Reihe entsteht nämlich aus der Form  $(1 + 1)^{-\frac{1}{2}}$ . Es sei nun  $\varphi = 180^\circ$  und die resultierende Reihe wird

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \text{etc} = \infty$$

sein. Diese Reihe entsteht nämlich aus der Entwicklung  $(1 - 1)^{-\frac{1}{2}}$ . Wir wollen auch  $\varphi = 90^\circ$  nehmen und die Reihe wird

$$1 - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12} + \text{etc} = \frac{\cos 22^\circ 30'}{\sqrt[4]{2}}$$

sein. Vorher aber haben wir gesehen, dass

$$\cos 22^\circ 30' = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2\sqrt{2}}}$$

ist, woher die Summe gleich

$$\frac{1}{2} \sqrt{1 + \sqrt{2}}$$

sein wird.

**§14** Im Allgemeinen wird es auch für beliebige Exponenten  $n$  der Mähe Wert sein, dem Winkel  $\varphi$  bestimmte Werte zuzuteilen; und nachdem freilich zuerst  $\varphi = 0$  genommen wurde, werden wir

$$1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \binom{n}{4} + \text{etc} = 2^n$$

haben; diese Reihe selbst ist natürlich die entwickelte Formel  $(1 + 1)^n$ . Wir wollen nun  $\varphi = 180^\circ$  nehmen und es wird diese Reihe entstehen

$$1 - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \binom{n}{4} - \text{etc} = 0,$$

diese Reihe ist natürlich  $(1 - 1)^n$ ; Es sei auch  $\varphi = 90^\circ$  und die daher entstehende Reihe wird

$$1 - \binom{n}{2} + \binom{n}{4} - \binom{n}{6} + \binom{n}{8} - \binom{n}{10} + \text{etc}$$

sein, deren Summe also

$$2^n (\cos 45^\circ)^n \cos n45^\circ = 2^{\frac{1}{2}n} \cos n45^\circ$$

sein wird.

**§15** Diese letzte Reihe scheint umso größerer Aufmerksamkeit würdig, weil deren Gültigkeit nicht gerade wenig mysteriös ist; daher wird es nicht unpassend sein, dass einige Spezialfälle betrachtet werden und zwar für ganze positive Zahlen:

1. Wenn  $n = 0$  ist, wird  $1 = 1$  sein.
2. Wenn  $n = 1$  ist, wird  $1 = \cos 45^\circ \sqrt{2}$  sein.
3. Wenn  $n = 2$  ist, wird  $1 - 1 = 2 \cos 90^\circ = 0$  sein.
4. Wenn  $n = 3$  ist, wird  $1 - 3 = 2^{\frac{3}{2}} \cos 3 \cdot 45^\circ = -2$  sein.
5. Wenn  $n = 4$  ist, wird  $1 - 6 + 1 = 2^2 \cos 4 \cdot 45^\circ = -4$  sein.
6. Wenn  $n = 5$  ist, wird  $1 - 10 + 5 = 2^{\frac{5}{2}} \cos 5 \cdot 45^\circ = -4$  sein.
7. Wenn  $n = 6$  ist, wird  $1 - 15 + 15 - 1 = 2^3 \cos 6 \cdot 45^\circ = 0$  sein.
8. Wenn  $n = 7$  ist, wird  $1 - 21 + 35 - 7 = 2^{\frac{7}{2}} \cos 7 \cdot 45^\circ = 2^3$  sein.
9. Wenn  $n = 8$  ist, wird  $1 - 28 + 70 + 28 + 1 = 2^4 \cos 8 \cdot 45^\circ = 2^4$  sein.

etc.

**§16** Größere Aufmerksamkeit verdienen die Fälle, in denen für  $n$  eine negative Zahl angenommen wird, in denen ja unendliche Reihen hervorgehen:

1. Wenn  $n = -1$  ist, wird

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \text{etc} = \frac{\cos 45^\circ}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

sein.

2. Wenn  $n = -2$  ist, wird

$$1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + 14 - 15 + 17 - \text{etc} = \frac{\cos 2 \cdot 45^\circ}{2} = 0$$

sein.

3. Wenn  $n = -3$  ist, wird

$$1 - 6 + 15 - 28 + 45 - 66 + 91 - \text{etc} = \frac{\cos 3 \cdot 45^\circ}{\sqrt{8}} = -\frac{1}{4}$$

sein.

4. Wenn  $n = -4$  ist, wird

$$1 - 10 + 35 - 84 + 165 - 286 + 455 - \text{etc} = \frac{\cos 4 \cdot 45^\circ}{4} = -\frac{1}{4}$$

sein.

5. Wenn  $n = -5$  ist, wird

$$1 - 15 + 70 - 210 + 495 - 1001 + \text{etc} = \frac{\cos 5 \cdot 45^\circ}{2^{\frac{5}{2}}} = -\frac{1}{8}$$

sein.

6. Wenn  $n = -6$  ist, wird

$$1 - 21 + 126 - 462 + 1287 - 3003 + \text{etc} = \frac{\cos 6 \cdot 45^\circ}{8} = 0$$

sein, etc.

Im Allgemeinen wird aber für diese Fälle

$$1 - \frac{\lambda(\lambda+1)}{1 \cdot 2} + \frac{\lambda(\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda+3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{\lambda(\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda+3)(\lambda+4)(\lambda+5)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} \\ + \frac{\lambda(\lambda+1) \cdots (\lambda+7)}{1 \cdot 2 \cdots 8} - \frac{\lambda(\lambda+1) \cdots (\lambda+9)}{1 \cdot 2 \cdots 10} + \text{etc}$$

sein, die Summe welcher Reihe also gleich

$$\frac{\cos \lambda \cdot 45^\circ}{2^{\frac{1}{2}\lambda}}$$

sein wird.

## PROBLEM 2

Nachdem diese Reihe der Sinus vorgelegt wurde:

$$\frac{n}{1} \sin \varphi + \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \sin 2\varphi + \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-2}{3} \sin 3\varphi + \text{etc} = s,$$

sodass durch die oben verwendeten Charaktere

$$s = \binom{n}{0} \sin 0\varphi + \binom{n}{1} \sin 1\varphi + \binom{n}{2} \sin 2\varphi + \binom{n}{3} \sin 3\varphi + \text{etc}$$

ist, ist der Wert dieser Summe  $s$  reell auszudrücken.

## LÖSUNG

§17 Wenn wir also hier wiederum die Buchstaben

$$p = \cos \varphi + \sqrt{-1} \sin \varphi$$

und

$$q = \cos \varphi - \sqrt{-1} \sin \varphi$$

eingeführen, teile man, weil ja

$$p^n - q^n = 2\sqrt{-1} \sin n\varphi$$

ist, die vorgelegte Reihe in die 2 folgenden auf

$$2s\sqrt{-1} = \left\{ \begin{array}{l} + \binom{n}{1} p + \binom{n}{2} pp + \binom{n}{3} p^3 + \binom{n}{4} p^4 \\ - \binom{n}{1} q - \binom{n}{2} qq - \binom{n}{3} q^3 - \binom{n}{4} q^4 \end{array} \right\} \text{etc,}$$

woher natürlich

$$2s\sqrt{-1} = (1+p)^n - (1+q)^n$$

sein wird.

§18 Hier wird es wiederum gleich förderlich sein bemerkt zu haben, dass

$$1+p = (\sqrt{p} + \sqrt{q})\sqrt{p}$$

und

$$1+q = (\sqrt{p} + \sqrt{q})\sqrt{q}$$

ist, nach Verwendung welcher Werte

$$2s\sqrt{-1} = (\sqrt{p} + \sqrt{q})^n (p^{\frac{n}{2}} - q^{\frac{n}{2}})$$

sein wird. Weil daher

$$p^{\frac{n}{2}} - q^{\frac{n}{2}} = 2\sqrt{-1} \sin \frac{1}{2}n\varphi$$

ist und

$$\sqrt{p} + \sqrt{q} = 2 \cos \frac{1}{2}\varphi,$$

wird daher, indem man durch  $2\sqrt{-1}$  teilt, die gesuchte Summe reell ausgedrückt hervorgehen:

$$s = 2^n \cos^n \frac{1}{2}\varphi \sin \frac{1}{2}n\varphi.$$