

Spectre du Laplacien singulier associé aux métriques canoniques sur \mathbb{P}^1

Mounir Hajli

Saturday 3rd November, 2018, 16:32

Abstract

Nous construisons un opérateur différentiel associé à une classe de métriques singulières sur les fibrés en droites sur \mathbb{P}^1 . Cet opérateur étend la notion du Laplacien classique (voir, par exemple [2]). Nous établissons qu'il admet un spectre positif, discret et infini, qu'on calcule explicitement.

Ce calcul sera une application d'une théorie des séries de Fourier-Bessel généralisée que nous développons dans ce texte.

Introduction

Soit X une variété kählérienne compacte munie une forme de Kähler ω_X de classe \mathcal{C}^∞ et $\overline{E} = (E, h_E)$ un fibré vectoriel holomorphe muni de h_E , une métrique hermitienne de classe \mathcal{C}^∞ . À cette donnée on attache un opérateur différentiel $\Delta_{\overline{E}}^q$ appelé l'opérateur Laplacien agissant sur l'espace des $(0, q)$ -formes différentielles de classe \mathcal{C}^∞ à coefficients dans E pour $q = 0, 1, \dots, n$. Alors, il est bien connu que cet opérateur admet un spectre positif, infini et discret.

Le calcul explicite du spectre est un problème intéressant. Il y a peu de cas pour les quels on sait calculer explicitement le spectre de $\Delta_{\overline{E}}^*$.

Lorsque $X = \mathbb{P}^n$ est muni de la métrique de Fubini-Study et \overline{E} est le fibré en droites hermitien trivial, Ikeda et Taniguchi calculent explicitement le spectre du Laplacien $\Delta_{\overline{E}}^q$, voir [9, théorème 5.2]. Ces calculs ont été utilisés par Gillet et Soulé afin de calculer explicitement la torsion analytique holomorphe correspondante et par suite établir un théorème de Riemann-Roch arithmétique, voir [5, théorème 2.1.1 et §2.3.2]. L'idée d'Ikeda et Taniguchi consiste à utiliser la compatibilité de la structure de \mathbb{P}^n , vu comme variété homogène, avec la métrique de Fubini-Study et d'appliquer ensuite la théorie des représentations. Plus concrètement, si $X = G/K$ est une variété riemannienne homogène telle que G agit transitivement sur X , et g une métrique riemannienne G -invariante sur X . Alors, Δ le Laplacien associé est G -invariant, et donc ses espaces propres sont des G -modules. D'après Ikeda et Taniguchi, le calcul du spectre de Δ se ramène donc à un problème de la théorie des représentations.

Motivation

Dans ce texte, nous nous intéressons à une classe de métriques singulières sur les fibrés en droites sur \mathbb{P}^1 , l'espace projectif complexe de dimension 1, appelées les métriques canoniques. Ce sont des métriques continues mais pas \mathcal{C}^∞ en général, déterminées uniquement par la structure combinatoire de \mathbb{P}^1 , vu comme variété torique. Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, la métrique canonique sur $\mathcal{O}(m)$ est donnée comme suit:

$$h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(s, s)(x) = \frac{|s(x)|^2}{\max(|x_0|, |x_1|)^{2m}} \quad (1)$$

où $x = [x_0 : x_1] \in \mathbb{P}^1$ et s est une section locale holomorphe de $\mathcal{O}(m)$ autour de x . Comme $T\mathbb{P}^1 \simeq \mathcal{O}(2)$, alors on peut munir \mathbb{P}^1 de la forme de Kähler singulière suivante:

$$\omega_\infty := \frac{i}{2\pi} \frac{dz \wedge d\bar{z}}{\max(1, |z|)^4},$$

et on note par $h_{\overline{T\mathbb{P}^1}_\infty}$ la métrique sur $T\mathbb{P}^1$ correspondante.

À priori, il n'est pas clair si la théorie classique du Laplacien peut être étendue à ce genre de métriques.

Le but de cet article est double: Nous montrons qu'on peut associer aux métriques canoniques sur \mathbb{P}^1 une théorie d'opérateurs singuliers généralisant formellement la théorie classique du Laplacien, et nous établissons ensuite que ces opérateurs possèdent des propriétés analogues au cas classique.

Plus concrètement, nous montrons qu'on peut associer à ω_∞ et à $h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ un opérateur Laplacien singulier que nous noterons par $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ qui étend la notion classique du Laplacien. Nous établissons qu'il possède un spectre, noté $\text{Spec}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty})$, que nous calculons explicitement. On notera, comme dans le cas classique, que $\text{Spec}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty})$ est discret, infini et positif.

Remarque 0.1. Nous utiliserons ces calculs afin de définir une fonction Zêta associée à $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ et à son étude (voir [8]), aussi pour définir une torsion analytique holomorphe canonique associée aux métriques canoniques, avec applications à la géométrie d'Arakelov (voir [6]).

Résultats et organisation de l'article

Soit $(\cdot, \cdot)_{L^2, \infty}$ le produit hermitien sur $A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$ associé à ω_∞ et à $h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ (voir §2). On note par $\mathcal{H}^{(m)}$ la complétion de cet espace par $(\cdot, \cdot)_{L^2, \infty}$. Comme les métriques sont singulières alors la construction classique du Laplacien (voir rappel §1) n'est plus valable ici.

Malgré cela, nous construisons (voir §2) un opérateur différentiel singulier $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$, en associant à tout élément de $A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$ de la forme $f \otimes z^k$, l'élément $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(f \otimes z^k)$ défini sur $\mathbb{P}^1 \setminus \mathbb{S}^1$ comme suit:

$$\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(f \otimes z^k) = -h_{\overline{T\mathbb{P}^1}_\infty} \left(\frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \right)^{-1} h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(z^k, z^k)^{-1} \frac{\partial}{\partial z} \left(h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(z^k, z^k) \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \otimes z^k.$$

Observons que lorsque les métriques sont \mathcal{C}^∞ , alors on vérifie que le Laplacien possède cette expression locale. Nous vérifions ensuite que définition s'étend par linéarité pour tout élément $\xi \in A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$. Contrairement au cas classique, on n'a pas $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))) = A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$, cela est dû bien évidemment au caractère singulier des métriques. Mais nous établissons dans le théorème ci-dessous que $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ est à valeurs dans $\mathcal{H}^{(m)}$, et qu'il possède quelques propriétés analogues au cas classique:

Définition-Proposition 0.2 (voir proposition 2.1). *On a $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} : A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m)) \rightarrow \mathcal{H}^{(m)}$ est un opérateur linéaire, on l'appelle le Laplacien canonique associé à ω_∞ et à $h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$. Soient $\xi, \eta \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$, on a:*

1.

$$\ker \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m)).$$

2.

$$(\xi, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \eta)_{L^2, \infty} = (\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi, \eta)_{L^2, \infty}$$

3.

$$(\xi, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi)_{L^2, \infty} \geq 0.$$

Comme dans le cas classique, $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ admet une extension maximale auto-adjointe et positive:

Théorème 0.3 (voir théorème 2.2). *Pour tout $m \in \mathbb{N}$, l'opérateur $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ admet une extension maximale auto-adjointe et positive.*

La suite de l'article est dédiée à l'étude des propriétés spectrales de $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$. Bien évidemment la théorie classique du Laplacien n'est plus applicable ici.

Soient $n \in \mathbb{Z}$ et $m \in \mathbb{N}$. Nous introduisons la fonction $L_{m,n}$ définie sur \mathbb{C}^* comme suit:

$$L_{m,n}(z) = -z^m \frac{d}{dz} (z^{-m} J_n(z) J_{n-m}(z))^1$$

et on note par $\mathcal{Z}_{m,n}$ l'ensemble des zéros de $L_{m,n}$. Nous verrons que $L_{m,n}$ et $\mathcal{Z}_{m,n}$ jouent un rôle fondamental dans l'étude de l'opérateur $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$. Notre principal résultat de cet article s'énonce comme suit:

Théorème 0.4 (voir théorème 4.1). *Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ admet un spectre discret, positif et infini, et on a*

$$\text{Spec}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}) = \{0\} \cup \left\{ \frac{\lambda^2}{4} \mid \exists n \in \mathbb{N}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n} \right\},$$

En plus, on a

1. Lorsque m est pair, alors la multiplicité de $\frac{\lambda^2}{4}$ est égale à 2 si $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$ si $n \geq m+1$ ou $0 \leq n \leq \frac{m}{2} - 1$, et de multiplicité 1 si $\lambda \in \mathcal{Z}_{m, \frac{m}{2}}$.
2. Si m est impair, alors $\frac{\lambda^2}{4}$ est de multiplicité 2 si $n \geq m+1$, et vaut 1 si $0 \leq n \leq m$.

Le cas $m=0$, c-à-d l'étude du $\Delta_{\overline{\mathcal{O}}_\infty}$, constitue une situation relativement facile à traitée. En effet, nous démontrons que le résultat ci-dessus pour $m=0$ résulte du théorème 4.4 dont la preuve est une conséquence de la théorie classique des séries de Fourier Bessel, (voir [11, §18], ou le paragraphe 4.1 pour un bref rappel sur cette théorie). En d'autres termes, nous avons montré que l'étude des propriétés spectrales de $\Delta_{\overline{\mathcal{O}}_\infty}$ est équivalente à la théorie des séries de Fourier-Bessel classique.

Idée de la preuve: Nous établissons que l'étude de l'opérateur $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ est équivalente à une théorie des séries de Fourier-Bessel généralisée que nous allons développer dans cet article.

Stratégie de la preuve: La preuve du théorème ci-dessus sera une conséquence d'une suite de résultats. Ces derniers sont répartis en deux sections §3 et §4.

Le but de la section 3 consiste à construire explicitement une famille de vecteurs propres pour $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$. Nous commençons tout d'abord par étudier les fonctions $L_{m,n}$ et les ensembles $\mathcal{Z}_{m,n}$ (voir lemme 3.2). Après, nous associons à tout $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$ un élément $\varphi_{n,\lambda}^{(m)} \in \mathcal{H}^{(m)}$ (voir 25), et nous établissons que la

¹ J_n désigne la fonction de Bessel d'ordre n .

famille $\{\varphi_{n,\lambda}^{(m)} \mid n \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}\}$ est orthogonale par rapport à $(\cdot, \cdot)_{L^2, \infty}$, nous déduisons alors que $\mathcal{Z}_{m,n}$ est un sous-ensemble discret de \mathbb{R}^2 (voir théorème 3.3). Le résultat majeur de cette section est le théorème suivant, dans lequel on montre que les fonctions $L_{m,n}$ génèrent des vecteurs propres pour le Laplacien $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$:

Théorème 0.5 (voir théorème 3.4). *Soit $m \in \mathbb{N}$, on a pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$ et $k \in \{0, 1, \dots, m\}$:*

$$(1 \otimes z^k, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi)_{L^2, \infty} = 0,$$

$$(\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi)_{L^2, \infty} = \frac{\lambda^2}{4} (\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \xi)_{L^2, \infty},$$

et

$$(\varphi_{-n+m,\lambda}^{(m)}, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi)_{L^2, \infty} = \frac{\lambda^2}{4} (\varphi_{-n+m,\lambda}^{(m)}, \xi)_{L^2, \infty},$$

pour tout $\xi \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$. En particulier,

$$\{0\} \cup \left\{ \frac{\lambda^2}{4} \mid \exists n \in \mathbb{N}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n} \right\} \subset \text{Spec}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}).$$

Nous terminons cette section par une formule reliant la norme L^2 de $\varphi_{n,\lambda}^{(m)}$ et la dérivée de $L_{m,n}$ en λ (voir théorème 3.5). Ce résultat est crucial pour la suite (voir page 31).

La section 4 constitue le noyau de ce travail, à savoir que l'opérateur $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ admet un spectre discret, positif et infini, et qu'il est complètement déterminé par les ensembles $\mathcal{Z}_{m,n}$, $n \in \mathbb{Z}$. Plus concrètement, nous établissons dans cette section le théorème:

Théorème 0.6 (cf. Théorème 4.1). *Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ admet un spectre discret, positif et infini, et on a*

$$\text{Spec}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}) = \{0\} \cup \left\{ \frac{\lambda^2}{4} \mid \exists n \in \mathbb{N}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n} \right\},$$

En plus, on a

1. Lorsque m est pair, alors la multiplicité de $\frac{\lambda^2}{4}$ est égale à 2 si $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$ si $n \geq m+1$ ou $0 \leq n \leq \frac{m}{2} - 1$, et de multiplicité 1 si $\lambda \in \mathcal{Z}_{m, \frac{m}{2}}$.
2. Si m est impair, alors $\frac{\lambda^2}{4}$ est de multiplicité 2 si $n \geq m+1$, et vaut 1 si $0 \leq n \leq m$.

Ce théorème sera une conséquence du résultat suivant:

Théorème 0.7 (voir théorème 4.2).

$$\left\{ 1 \otimes 1, 1 \otimes z, \dots, 1 \otimes z^m \right\} \cup \left\{ \varphi_{\nu,\lambda}^{(m)} \mid \nu \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,\nu} \right\}, \quad (2)$$

est une base hilbertienne pour $\mathcal{H}^{(m)}$.

²Notons que lorsque $m = 0$, on a $\mathcal{Z}_{0,n} = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid J_n(\lambda)J'_n(\lambda) = 0\}$. Il est bien connu que les zéros des fonctions de Bessel d'ordre entier et leurs dérivées sont réels. Notre résultat 3.3 4. peut être vu comme une généralisation: Les zéros de $L_{m,n}$ sont réels.

Ce théorème affirme que les vecteurs propres calculés théorème 3.4 sont les uniques vecteurs propres possibles. Le théorème 4.4 traite le cas $m = 0$, nous montrons qu'il découle de la théorie classique des séries de Fourier-Bessel.

LA THÉORIE DES SÉRIES DE FOURIER-BESSEL GÉNÉRALISÉE Dans §4.2, nous développons une théorie des séries de Fourier-Bessel généralisée qui étend la théorie classique. Comme application, nous établissons les résultats cités plus haut.

Soit E le sous-espace vectoriel des fonctions complexes sur \mathbb{R}^+ défini comme suit: $f \in E$ si les fonctions suivantes $x \in [0, 1] \mapsto f(x)$ et $x \in]0, 1] \mapsto f(\frac{1}{x})$ sont continues et bornées. Soit $m \in \mathbb{N}$. On munit E de la norme scalaire $\|\cdot\|_m$ suivante:

$$\|f\|_m^2 := \int_0^1 |f(x)|^2 x dx + \int_1^\infty |f(x)|^2 \frac{dx}{x^{3+2m}} \quad \forall f \in E,$$

et nous notons par \mathcal{E}_m la complétion de E pour cette norme. Nous montrons par exemple que \mathcal{E}_0 est isométrique à $L^2([0, 1]) \oplus L^2([0, 1])$ ³ (Cet espace joue un rôle important dans la théorie des séries de Fourier-Bessel) et que la suite $(\mathcal{E}_m)_{m \in \mathbb{N}}$ forme une suite strictement croissante pour l'inclusion (voir proposition 4.8). Nous expliquons dans 4.9, le lien entre \mathcal{E}_m et $\mathcal{H}^{(m)}$.

Nous établissons que pour tout $m \in \mathbb{N}$, il existe une théorie des séries de Fourier-Bessel généralisée sur \mathcal{E}_m . Par définition, la théorie classique des séries de Fourier-Bessel est associée à \mathcal{E}_0 (voir la remarque 4.11). Avec les notations de §4.2, le théorème 4.10 établit l'existence d'une telle théorie:

Théorème 0.8 (voir théorème 4.10). *La famille suivante:*

$$\{\varphi_{\nu,k}^{(m)} \mid k \in \mathbb{N}\} \quad (\text{resp. } \{1, x, \dots, x^m\} \cup \{\varphi_{\nu,k}^{(m)} \mid k \in \mathbb{N}\}),$$

est une base hilbertienne dans \mathcal{E}_m lorsque $\nu \leq -1$ ou $\nu \geq m + 1$ (resp. si $\nu \in \{0, 1, \dots, m\}$).

La preuve de ce résultat suit la démarche dans [11, §18], dont un aperçu est donné au §4.1. Nous adaptons les techniques de la théorie des séries de Fourier-Bessel (voir [11, §.18]) à notre situation, par exemple, les fonctions $L_{m,n}$ joueront ici le rôle des fonctions de Bessel.

En utilisant le lien existant entre \mathcal{E}_m et $\mathcal{H}^{(m)}$ (remarque 4.9), nous déduisons le théorème 4.2 et par suite le théorème 4.1.

Remerciements: Cet article est une partie de ma thèse (voir [7]) sous la direction de Vincent Maillot. Je le remercie pour ses conseils et son aide lors de la préparation de ce travail. Je tiens aussi à remercier Gérard Freixas pour les longues discussions mathématiques qu'on a eu autour de ce travail.

Contents

1	Rappel sur la théorie classique du Laplacien	6
2	Le Laplacien canonique	6
3	Sur le Spectre de $\Delta_{\overline{\mathcal{O}^{(m)}_\infty}}$ (I)	9
4	Sur le Spectre de $\Delta_{\overline{\mathcal{O}^{(m)}_\infty}}$ (II)	21
4.1	Théorie des séries Fourier-Bessel classique	24
4.2	Théorie des séries de Fourier-Bessel généralisée	27

³ $L^2([0, 1])$ désigne l'espace des fonctions complexes carré intégrables pour la mesure $x dx$ sur $[0, 1]$

1 Rappel sur la théorie classique du Laplacien

Dans cette section, on rappelle quelques éléments de la théorie classique des opérateurs Laplaciens (voir [2]).

Soit (X, h_X) une variété kählérienne compacte de dimension n et $\overline{E} := (E, h_E)$ un fibré hermitien muni d'une métrique de classe \mathcal{C}^∞ sur X . Pour $p, q = 0, 1, \dots, n$, on note par $\Omega^{(p,q)}(X, E)$ (resp. $A^{(p,q)}(X, E)$) le fibré vectoriel des (p, q) -formes de classe \mathcal{C}^∞ à coefficients dans E (resp. l'espace des sections globales de $\Omega^{(p,q)}(X, E)$). La métrique de h_X sur $T^{(1,0)}X$ induit par dualité une métrique hermitienne $\Omega^{(1,0)}X$ et par conjugaison une métrique sur $\Omega^{(0,1)}(X)$. En prenant les différents produits extérieurs de cette métrique et en les tensorisant avec la métrique de E , on construit un produit hermitien ponctuel $(s(x), t(x))$ pour deux sections s et t de $A^{(0,q)}(X, E) = A^{(0,q)}(X) \otimes_{\mathcal{C}^\infty(X)} A^{(0,0)}(X, E)$. Soit ω_0 la forme de Kähler normalisée, donnée dans chaque carte locale (z_α) sur X par

$$\omega_0 = \frac{i}{2\pi} \sum_{\alpha, \beta} h \left(\frac{\partial}{\partial z_\alpha}, \frac{\partial}{\partial z_\beta} \right) dz_\alpha \wedge d\bar{z}_\beta.$$

Le produit scalaire L^2 de deux sections $s, t \in A^{(0,q)}(X, E)$ est défini par la formule suivante:

$$(s, t)_{L^2} = \int_X (s(x), t(x)) \frac{\omega_0^n}{n!}. \quad (3)$$

On dispose du complexe suivant appelé complexe de Dolbeault:

$$0 \longrightarrow A^{(0,0)}(X, E) \xrightarrow{\overline{\partial}_E^0} A^{(0,1)}(X, E) \xrightarrow{\overline{\partial}_E^1} \dots \xrightarrow{\overline{\partial}_E^{n-1}} A^{(0,n)}(X, E) \longrightarrow 0.$$

L'opérateur de Cauchy-Riemann $\overline{\partial}_E$, admet un adjoint formel pour la métrique L^2 , c'est à dire un opérateur

$$\overline{\partial}_E^* : A^{(0,q+1)}(X, E) \longrightarrow A^{(0,q)}(X, E)$$

qui vérifie

$$(s, \overline{\partial}_E^* t)_{L^2} = (\overline{\partial}_E s, t)_{L^2}$$

pour tout $s \in A^{(0,q)}(X, E)$ et $t \in A^{(0,q+1)}(X, E)$.

Pour $q = 0, \dots, n$, l'opérateur

$$\Delta_E^q = \overline{\partial}_E^{q-1} \overline{\partial}_E^{q*} + \overline{\partial}_E^{q+1*} \overline{\partial}_E^q, \quad (4)$$

agissant sur $A^{(0,q)}(X, E)$ est appelé l'opérateur Laplacien. On sait (voir par exemple [2], [10]) que Δ_E^q est un opérateur positif, autoadjoint et qu'il admet un spectre positif, discret et infini. En plus, les vecteurs propres associés sont dans $A^{0,q}(X, E)$.

2 Le Laplacien canonique

Dans ce paragraphe nous introduisons la notion du Laplacien canonique associé à des métriques canoniques sur \mathbb{P}^1 . Nous montrerons qu'il admet une extension maximale autoadjointe, ce résultat sera une combinaison des théorèmes 3.4, 4.2 et le lemme 5.3. Cette notion étend celle du Laplacien associé aux métriques de classe \mathcal{C}^∞ .

Soit $(\mathbb{P}^1, \omega_\infty)$ l'espace projectif complexe de dimension 1, muni de la forme Kähler suivante ω_∞ donnée sur \mathbb{C} par:

$$\omega_\infty = \frac{i}{2\pi} \frac{dz \wedge d\bar{z}}{\max(1, |z|^2)^2}.$$

C'est la métrique induite par la métrique canonique de $\mathcal{O}(2)$ via l'isomorphisme $\mathbb{TP}^1 \simeq \mathcal{O}(2)$. On l'appellera la forme de Kähler canonique de \mathbb{P}^1 . On note par $\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty = (\mathcal{O}(m), h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty})$ muni de sa métrique canonique.

Cette donnée induit un produit hermitien L^2_∞ sur $A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$ définie comme suit:

$$(\xi, \xi')_{L^2, \infty} = \int_{\mathbb{P}^1} h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(\xi, \xi') \omega_\infty,$$

pour tous $\xi, \xi' \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$. On note par $\mathcal{H}^{(m)}$ le complété de $A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$ par rapport à ce produit hermitien.

Nous allons définir un opérateur linéaire $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ défini sur $A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$ à valeurs dans $\mathcal{H}^{(m)}$ associé aux métriques canoniques, et qui étend la notion classique du Laplacien.

Soit $\xi \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$. Comme $\mathcal{O}(m)$ est engendré par ses sections globales, et par une partition de l'unité, alors ξ peut s'écrire comme une combinaison linéaire d'éléments de la forme $f \otimes z^k$ où $f \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1)$ et z^k est le polynôme monomial de degré $k \leq m$. On commence d'abord par poser $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(f \otimes z^k)$, la fonction à coefficients dans $\mathcal{O}(m)$ définie sur $\mathbb{P}^1 \setminus \mathbb{S}^1$ comme suit:

$$\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(f \otimes z^k) = -h_{\overline{\mathbb{P}^1}_\infty} \left(\frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \right)^{-1} h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(z^k, z^k)^{-1} \frac{\partial}{\partial z} \left(h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(z^k, z^k) \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \otimes z^{k45} \quad (5)$$

On étend par linéarité cette définition à tout élément de $A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$.

Cet élément représente un élément de $\mathcal{H}^{(m)}$. En d'autres termes, $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(f \otimes z^k) \in \mathcal{H}^{(m)}$. En effet, on a

$$\begin{aligned} \|\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(f \otimes z^k)\|_{L^2, \infty}^2 &= \frac{i}{2\pi} \int_{\mathbb{P}^1 \setminus \mathbb{S}^1} h_{\overline{\mathbb{P}^1}_\infty} \left(\frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \right)^{-1} h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(z^k, z^k)^{-1} \left| \frac{\partial}{\partial z} \left(h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(z^k, z^k) \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \right|^2 dz \wedge d\bar{z} \\ &= \frac{i}{2\pi} \int_{\mathbb{P}^1 \setminus \mathbb{S}^1} \max(1, |z|^4) \max(|z|^{-2k}, |z|^{2m-2k}) \left| \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{|z|^{2k}}{\max(1, |z|^{2m})} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \right|^2 dz \wedge d\bar{z} \\ &= \frac{i}{2\pi} \int_{|z| < 1} |z|^{-2k} \left| \frac{\partial}{\partial z} \left(|z|^{2k} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \right|^2 dz \wedge d\bar{z} \\ &\quad + \frac{i}{2\pi} \int_{|z| > 1} |z|^{4+2m-2k} \left| \frac{\partial}{\partial z} \left(|z|^{2k-2m} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \right|^2 dz \wedge d\bar{z}, \end{aligned}$$

donc,

$$\|\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(f \otimes z^k)\|_{L^2, \infty}^2 = \frac{i}{2\pi} \int_{|z| < 1} |z|^{-2k} \left| \frac{\partial}{\partial z} \left(|z|^{2k} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \right|^2 dz \wedge d\bar{z} + \frac{i}{2\pi} \int_{|z| > 1} |z|^{4+2m-2k} \left| \frac{\partial}{\partial z} \left(|z|^{2k-2m} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \right|^2 dz \wedge d\bar{z}, \quad (6)$$

et puisque f est $A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1)$, alors on vérifie que $\left| \frac{\partial}{\partial z} \left(|z|^{2k} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \right|^2 = O(|z|^{2k-1})$ au voisinage de $z = 0$, donc

$$\int_{|z| < 1} |z|^{-2k} \left| \frac{\partial}{\partial z} \left(|z|^{2k} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \right|^2 dz \wedge d\bar{z} \leq \frac{i}{2\pi} \int_{|z| < 1} O(|z|^{-1}) dz \wedge d\bar{z} < \infty,$$

⁴Notons que $h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(z^k, z^k)(z) = \frac{|z|^{2k}}{\max(1, |z|)^{2m}}$, $\forall z \in \mathbb{C}$, donc C^∞ par morceaux et ses dérivées sont bornées localement.

⁵Lorsque les métriques sont de classe C^∞ alors on vérifie que le Laplacien (voir 4) possède la même expression locale.

En faisant le changement de variables $y = \frac{1}{z}$ dans la deuxième intégrale, on conclut avec le même raisonnement que

$$\frac{i}{2\pi} \int_{|z|>1} |z|^{4+2m-2k} \left| \frac{\partial}{\partial z} \left(|z|^{2k-2m} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \right|^2 dz \wedge d\bar{z} < \infty.$$

Donc,

$$\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (f \otimes z^k) \in \mathcal{H}^{(m)} \quad \forall f \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1), \forall k = 0, \dots, m. \quad (7)$$

Si l'on considère $g \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1)$ et $l \in \{0, 1, \dots, m\}$. On a,

$$\begin{aligned} (f \otimes z^k, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (g \otimes z^l))_{L^2, \infty} &= \int_{\mathbb{P}^1} h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (z^l, z^l)^{-1} h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (z^k, z^l) f \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (z^l, z^l) \frac{\partial \bar{g}}{\partial z} \right) \omega_\infty \\ &= \frac{i}{2\pi} \int_{|z| \leq 1} \frac{z^k}{z^l} f \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(|z|^{2l} \frac{\partial \bar{g}}{\partial z} \right) dz \wedge \bar{z} + \frac{i}{2\pi} \int_{|z| \geq 1} \frac{z^k}{z^l} f \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\frac{|z|^{2l}}{|z|^{2m}} \frac{\partial \bar{g}}{\partial z} \right) \frac{dz \wedge \bar{z}}{|z|^4} \\ &= \frac{i}{2\pi} \int_{|z| \leq 1} f \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(z^k \bar{z}^l \frac{\partial \bar{g}}{\partial z} \right) dz \wedge \bar{z} + \frac{i}{2\pi} \int_{|z| \geq 1} f \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\frac{z^k \bar{z}^l}{|z|^{2m}} \frac{\partial \bar{g}}{\partial z} \right) \frac{dz \wedge \bar{z}}{|z|^4}. \end{aligned}$$

En utilisant la formule de Stokes, on peut déduire que

$$(f \otimes z^k, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (g \otimes z^l))_{L^2, \infty} = \frac{i}{2\pi} \int_{|z| \leq 1} z^k \bar{z}^l \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \frac{\partial \bar{g}}{\partial z} dz \wedge \bar{z} + \frac{i}{2\pi} \int_{|z| \geq 1} \frac{z^k \bar{z}^l}{|z|^{2m}} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \frac{\partial \bar{g}}{\partial z} dz \wedge \bar{z} = \int_{\mathbb{P}^1} h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} z^k, \frac{\partial \bar{g}}{\partial z} z^l \right) \omega_\infty. \quad (8)$$

Par conséquent,

$$(f \otimes z^k, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (g \otimes z^l))_{L^2, \infty} = (\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (f \otimes z^k), g \otimes z^l)_{L^2, \infty}. \quad (9)$$

Définition-Proposition 2.1. On a $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} : A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m)) \rightarrow \mathcal{H}^{(m)}$ est un opérateur linéaire, on l'appelle le Laplacien canonique associé à ω_∞ et à $h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$. Soient $\xi, \eta \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$, on a:

1.

$$\ker \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m)).$$

2.

$$(\xi, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \eta)_{L^2, \infty} = (\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi, \eta)_{L^2, \infty}$$

3.

$$(\xi, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi)_{L^2, \infty} \geq 0$$

Proof. Soit $\xi \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$. Il existe $f_0, f_1, \dots, f_m \in A^{0,0}(\mathbb{P}^1)$ tels que $\xi = \sum_{k=1}^m f_k \otimes z^k$. On vérifie facilement que sur $\mathbb{P}^1 \setminus \mathbb{S}^1$,

$$\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi = \sum_{k=0}^m \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (f_k \otimes z^k).$$

D'après 7, on conclut que

$$\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi \in \mathcal{H}^{(m)}. \quad (10)$$

En utilisant 8, nous avons

$$(\xi, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi)_{L^2, \infty} = \sum_{0 \leq k, j \leq m} (f_k \otimes z^k, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (f_j \otimes z^j))_{L^2, \infty} = \sum_{0 \leq k, j \leq m} \int_{\mathbb{P}^1} h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \left(\frac{\partial f_k}{\partial \bar{z}} z^k, \frac{\partial f_j}{\partial \bar{z}} z^j \right) \omega_\infty. \quad (11)$$

1. Si $\xi \in \ker \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$. Donc, par ce qui précède, et par continuité de la métrique $h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$:

$$0 = \sum_{0 \leq k, j \leq m} h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \left(\frac{\partial f_k}{\partial \bar{z}} z^k, \frac{\partial f_j}{\partial \bar{z}} z^j \right) = h_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \left(\sum_{k=0}^m \frac{\partial f_k}{\partial \bar{z}} z^k, \sum_{k=0}^m \frac{\partial f_k}{\partial \bar{z}} z^k \right).$$

Donc, $\sum_{k=0}^m \frac{\partial f_k}{\partial \bar{z}} z^k = 0$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. Par conséquent, $z \mapsto \sum_{k=0}^m f_k z^k$ est holomorphe sur \mathbb{C} . Comme les fonctions f_k sont bornées sur \mathbb{P}^1 , alors par un argument classique d'analyse complexe, il existe a_0, \dots, a_m des constantes telles que $\sum_{k=0}^m f_k z^k = \sum_{k=0}^m a_k z^k, \forall z \in \mathbb{C}$. On vérifie que $\|\xi - \sum_{k=0}^m a_k \otimes z^k\|_{L^2, \infty} = 0$. On conclut que

$$\ker \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m)).$$

2. Par linéarité, cela résulte du 9.

3. C'est une conséquence immédiate de 11. □

On se propose dans la suite d'établir que l'opérateur $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ admet un spectre discret, infini et positif. Nous allons adopter la définition fonctionnelle pour parler d'un vecteur propre, c-à-d que α est une valeur propre de $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ s'il existe $\varphi \in \mathcal{H}^{(m)}$, tel que

$$(\varphi, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi)_{L^2, \infty} = \alpha (\varphi, \xi)_{L^2, \infty}, \quad \forall \xi \in A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m)). \quad (12)$$

On note par $\text{Spec}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty})$ l'ensemble des valeurs propres.

Théorème 2.2. *Pour tout $m \in \mathbb{N}$, l'opérateur $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ admet une extension maximale auto-adjointe et positive. Si l'on note par $\text{Dom}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty})$ le domaine de $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$, alors*

$$\text{Dom}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}) = \left\{ \xi \in \mathcal{H}^{(m)} \mid \sum_{n \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}} \frac{\lambda^4}{16} |(\xi, \varphi_{n,\lambda}^{(m)})|^2 < \infty \right\}.$$

Proof. Montrons que $A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m)) \subset \text{Dom}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty})$. Soit $\xi \in A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$. D'après le théorème 4.2, il existe $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{C}$ et $(a_{n,\lambda})_{n \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}}$ une suite de nombres complexes telles que $\xi = \sum_{k=0}^m a_k (1 \otimes z^k) + \sum_{n \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}} a_{n,\lambda} \varphi_{n,\lambda}^{(m)}$ dans $\mathcal{H}^{(m)}$. Or, on a montré dans 2.1, que $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi \in \mathcal{H}^{(m)}$. Il existe alors $b_0, \dots, b_m \in \mathbb{C}$ et $(b_{n,\lambda})_{n \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}}$ une suite de nombres complexes telles que $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi = \sum_{k=0}^m b_k (1 \otimes z^k) + \sum_{n \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}} b_{n,\lambda} \varphi_{n,\lambda}^{(m)}$ dans $\mathcal{H}^{(m)}$. En utilisant le théorème 3.4, on obtient que $b_0 = \dots = b_m = 0$ et $b_{n,\lambda} = \frac{\lambda^2}{4} a_{n,\lambda}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$. Par conséquent, $\xi \in \text{Dom}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty})$.

On applique le lemme 5.3 pour conclure. □

3 Sur le Spectre de $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ (I)

Cette section constitue la première partie dans notre étude de l'opérateur $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$. Nous introduisons une famille de fonctions $(L_{m,n})_{n \in \mathbb{Z}}$ et nous expliquerons son lien avec l'étude de l'opérateur $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$. À cette famille, nous associons une famille d'éléments de $\mathcal{H}^{(m)}$ orthogonale pour le produit $(\cdot, \cdot)_{L^2, \infty}$ (voir théorème 3.3). Le résultat majeur de cette section établit que cette famille génère une partie du spectre de $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ (théorème 3.4).

Soit m un entier positif.

Définition 3.1. Pour tout $\nu \in \mathbb{Z}$, on considère $L_{m,\nu}$, la fonction définie par:

$$L_{m,\nu}(z) = -z^m \frac{d}{dz} (z^{-m} J_\nu(z) J_{\nu-m}(z)), \quad \forall z \in \mathbb{C},$$

et on pose

$$\mathcal{Z}_{m,\nu} := \left\{ \lambda \in \mathbb{C}^* \mid L_{m,\nu}(\lambda) = 0 \right\}^6. \quad (13)$$

Notons que pour $m = 0$, $L_{0,\nu} = -2J_\nu J'_\nu$.

Soit $\nu \in \mathbb{Z}$. L'ensemble des zéros de J_ν , et plus généralement ceux de $J_\nu + HJ'_\nu$ (avec H une constante réelle) a été étudié de manière intense dans la littérature (voir par exemple [11]). On montre par exemple, que ces zéros sont simples et réels, et que $\{r \mapsto J_\nu(\lambda r) \mid J_\nu(\lambda) = 0\}$ forme un système orthogonal dans $L^2([0, 1], r dr)$ (voir [11, §15]).

Notre but ici est d'étendre cette théorie à cette nouvelle classe de fonctions $L_{m,\nu}$ pour tout $m \geq 1$ et $\nu \in \mathbb{Z}$. Par exemple, on va établir que les zéros de $L_{m,\nu}$ sont réels et simples (voir 4. théorème 3.3 et théorème 3.5).

Nous commençons d'abord par étudier les propriétés de $L_{m,\nu}$ et de $\mathcal{Z}_{m,\nu}$:

Lemme 3.2. $\forall m \in \mathbb{N}, \forall \nu \in \mathbb{Z}$, $L_{m,\nu}$ est une fonction analytique sur \mathbb{C} entier qui vérifie les propriétés suivantes:

1.

$$L_{m,\nu}(z) = J_{\nu+1}(z)J_{\nu-m}(z) - J_\nu(z)J_{\nu-m-1}(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}, \quad (14)$$

2.

$$L_{m,-\nu}(z) = (-1)^m L_{m,\nu+m}(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}, \quad (15)$$

3.

$$L_{m,\nu}(-z) = (-1)^{m+1} L_{m,\nu}(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}, \quad (16)$$

4. On a pour z assez petit,

$$L_{m,\nu}(z) = -\frac{z^{2\nu-m-1}}{2^{2\nu-m-1} n!(n-m-1)!} + o(z^{2\nu-m-1}) \quad \text{si } \nu \geq m+1, \quad (17)$$

et

$$L_{m,\nu}(z) = (-1)^{m+\nu} \frac{m+2}{(m-\nu+1)!(\nu+1)!} z^{m+1} + o(z^{m+1}) \quad \text{si } 0 \leq \nu \leq m. \quad (18)$$

En particulier, $\mathcal{Z}_{m,\nu}$ est un sous-ensemble infini et discret de \mathbb{C}^* et on a

5.

$$\mathcal{Z}_{m,-\nu} = \mathcal{Z}_{m,\nu+m}, \quad (19)$$

6. Si $m \neq 0$,

$$\mathcal{Z}_{m,\nu} \cap \{\lambda \in \mathbb{R} \mid J_{\nu-m}(\lambda)J_\nu(\lambda) = 0\} = \emptyset. \quad (20)$$

7. Si $m \neq 0$

$$\mathcal{Z}_{m,\nu} \neq \mathcal{Z}_{0,\nu}.$$

Proof. En utilisant les relations de récurrences des fonctions de Bessel, voir appendice 5.1,

⁶Lorsque $m = 0$, on a $\mathcal{Z}_{0,\nu}$ est formé par les zéros de J_ν et ceux de J'_ν .

1. nous montrons que pour tout $z \in \mathbb{C}^*$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz}(z^{-m}J_\nu(z)J_{\nu-m}(z)) &= \frac{d}{dz}\left(z^{-\nu}J_\nu(z)z^{\nu-m}J_{\nu-m}(z)\right) \\ &= \frac{d}{dz}(z^{-\nu}J_\nu(z))z^{\nu-m}J_{\nu-m}(z) + z^{-\nu}J_\nu(z)\frac{d}{dz}(z^{\nu-m}J_{\nu-m}(z)) \\ &= -z^{-\nu}J_{\nu+1}(z)z^{\nu-m}J_{\nu-m}(z) + z^{-\nu}J_\nu(z)z^{\nu-m}J_{\nu-m-1}(z) \quad \text{par 67 et 68} \\ &= -z^{-m}J_{\nu+1}(z)J_{\nu-m}(z) + z^{-m}J_\nu(z)J_{\nu-m-1}(z). \end{aligned}$$

Par suite,

$$L_{m,\nu}(z) = J_{\nu+1}(z)J_{\nu-m}(z) - J_\nu(z)J_{\nu-m-1}(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}, \forall \nu \in \mathbb{Z}.$$

2. De cette identité, nous déduisons que pour tout $z \in \mathbb{C}$ et $\nu \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} L_{m,-\nu}(z) &= J_{(-\nu)+1}(z)J_{(-\nu)-m}(z) - J_{(-\nu)}(z)J_{(-\nu)-m-1}(z) \\ &= (-1)^{m+1}J_{n-1}(z)J_{\nu+m}(z) - (-1)^{m+1}J_\nu(z)J_{\nu+m+1}(z) \quad \text{car } J_{-p} = (-1)^p J_p \\ &= (-1)^m \left(J_{(\nu+m)+1}(z)J_{(\nu+m)-m}(z) - J_{(\nu+m)}(z)J_{(\nu+m)-m-1}(z) \right) \\ &= (-1)^m L_{m,\nu+m}(z). \end{aligned}$$

3. Comme $J_p(-z) = (-1)^p J_p(z)$, $\forall z \in \mathbb{C}$ et $\forall p \in \mathbb{N}$, alors la fonction $z \in \mathbb{C}^* \mapsto z^{-m}J_\nu(z)J_{\nu-m}(z)$ est paire. On en déduit que

$$L_{m,\nu}(-z) = (-1)^{m+1}L_{m,\nu}(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}, \forall \nu \in \mathbb{Z}.$$

4. Evaluons maintenant l'ordre de $L_{m,\nu}$ en $z = 0$ en fonction de $\nu \in \mathbb{N}$. D'après l'appendice 5.1, on a lorsque $p \geq 0$, $J_p(z) = \frac{1}{2^p p!} z^p + o(z^p)$ pour tout z assez petit.

(a) Si $\nu \geq m + 1$. On peut écrire, en utilisant les identités précédentes et le développement ci-dessus, que pour tout z assez petit:

$$\begin{aligned} L_{m,\nu}(z) &= J_{\nu+1}(z)J_{\nu-m}(z) - J_\nu(z)J_{\nu-(m+1)}(z) \\ &= \frac{z^{2\nu-m+1}}{2^{2\nu-m+1}(\nu+1)!(\nu-m)!} - \frac{z^{2\nu-m-1}}{2^{2\nu-m-1}\nu!(\nu-m-1)!} + o(z^{2\nu-m-1}) \\ &= -\frac{z^{2\nu-m-1}}{2^{2\nu-m-1}\nu!(\nu-m-1)!} + o(z^{2\nu-m-1}). \end{aligned}$$

(b) Si $0 \leq \nu \leq m$. Comme $L_{m,\nu}(z) = J_{\nu+1}(z)J_{\nu-m}(z) - J_\nu(z)J_{\nu-m-1}(z)$, et puisque $J_{-p} = (-1)^p J_p$ alors pour tout $z \in \mathbb{C}$ et en particulier pour z assez petit, nous avons:

$$\begin{aligned} L_{m,\nu}(z) &= (-1)^{m-n}J_{\nu+1}(z)J_{m-n}(z) - (-1)^{m+1-n}J_\nu(z)J_{m+1-n}(z) \\ &= (-1)^{m-n}(J_\nu(z)J_{m+1-n}(z) - J_{\nu+1}(z)J_{m-n}(z)) \\ &= (-1)^{m+\nu} \left(\frac{z^{m+1}}{2^{m+1}n!(m+2-\nu)!} + \frac{z^{m+1}}{2^{m+1}(\nu+1)!(m+1-\nu)!} + o(z^{m+1}) \right) \\ &= (-1)^{m+\nu} \frac{m+2}{(m-\nu+1)!(\nu+1)!} z^{m+1} + o(z^{m+1}). \end{aligned}$$

Nous déduisons que dans tous les cas, $L_{m,\nu}$ est une fonction analytique avec un zéro d'ordre au moins $m + 1$ en $z = 0$. Donc $\mathcal{Z}_{m,\nu}$ est discret et non vide. On sait que les fonctions de Bessel d'ordre supérieur à $\frac{1}{2}$ ont une infinité de zéros et qui sont en plus tous réels, voir par exemple [11, §15]. Nous pouvons donc affirmer à l'aide du théorème de accroissements finis, que la fonction $z \mapsto \frac{d}{dz}(z^{-m}J_\nu(z)J_{\nu-m}(z))$ restreinte à \mathbb{R}^* , s'annule entre deux zéros de J_ν (resp. de $J_{\nu-m}$). On conclut que $\mathcal{Z}_{m,\nu}$ est un sous-ensemble discret et infini de \mathbb{C}^* .

5. Le point (5.) se déduit du (2.).

6. Montrons par l'absurde que

$$\mathcal{Z}_{m,\nu} \cap \{\lambda \in \mathbb{C} \mid J_{\nu-m}(\lambda) = 0\} = \emptyset.$$

Rappelons que $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid J_{\nu-m}(\lambda) = 0\} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid J_{\nu-m}(\lambda) = 0\}$, puisque les zéros de J_p sont réels lorsque $|p| \in \mathbb{N}$. Soit λ un élément de $\mathcal{Z}_{m,\nu} \cap \{\lambda \in \mathbb{C} \mid J_{\nu-m}(\lambda) = 0\}$, alors on obtient:

$$0 = L_{m,\nu}(\lambda) = J_{\nu+1}(\lambda)J_{\nu-m}(\lambda) - J_\nu(\lambda)J_{\nu-m-1}(\lambda) = -J_\nu(\lambda)J_{\nu-m-1}(\lambda),$$

donc,

$$J_\nu(\lambda)J_{\nu-m-1}(\lambda) = 0.$$

D'après [11, §15.22], deux fonction de $\{J_{\nu-m-1}, J_{\nu-m}, J_\nu\}$ ⁷ n'ont pas de zéros non nuls communs, lorsque $\nu > -1$. Donc on a nécessairement

$$J_\nu(\lambda) = 0.⁸$$

Montrons que cela est impossible, pour cela on va montrer que si $\nu > 1$ alors les dérivées supérieures de J_ν s'écrivent en fonction de J_ν et J'_ν , plus précisément on montre facilement par récurrence que pour tout $k \geq 1$, il existe P_k et Q_k deux fractions rationnelles avec au plus un pôle en zéro, telles que

$$J_\nu^{(k)}(z) = P_k(z)J_\nu(z) + Q_k(z)J'_\nu(z), \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \quad (21)$$

Pour $k = 1$, l'égalité précédente est triviale. Si $k = 2$, c'est une conséquence immédiate de l'équation de Bessel cf. 66 et on a $P_2(z) = -(1 - \frac{\nu^2}{z^2})$ et $Q_2(z) = -\frac{1}{z}$.

On sait que

$$\frac{d}{dz}(z^{-\nu}J_\nu(z)) = -z^{-\nu}J_{\nu+1}(z), \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

donc

$$\frac{d}{dz}\left(z^{-1}\frac{d}{dz}(z^{-\nu}J_\nu(z))\right) = \frac{d}{dz}(z^{-(\nu+1)}J_{\nu+1}(z)) = z^{-\nu-1}J_{\nu+2}(z),$$

et on montre par récurrence que

$$\frac{d}{dz}\left(z^{-1}\frac{d}{dz}\left(z^{-1}\frac{d}{dz}\dots\left(z^{-1}\frac{d}{dz}(z^{-\nu}J_\nu(z))\right)\right)\right) = (-1)^k z^{-\nu-k+1}J_{\nu+k}(z).$$

Alors, il existe des fonctions rationnelles R_0, \dots, R_k , ayant un éventuel pôle en $z = 0$, telles que:

$$J_{\nu+k}(z) = \sum_{j=0}^k R_j(z)J_\nu^{(j)}(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}^*.$$

⁷Comme on a supposé que $m \geq 1$, alors cet ensemble est de cardinal 3

⁸Notons que $|\nu - m - 1| \in \mathbb{N}$, donc on peut supposer que $\nu - m - 1 \geq -1$. l'autre cas se traite de la même manière en utilisant la formule $J_{-p} = (-1)^p J_p$.

De cette égalité et par 21, on déduit l'existence deux fractions rationnelles P et Q avec un éventuel pôle en $z = 0$ telles que:

$$J_{\nu+k}(z) = P(z)J_{\nu}(z) + Q(z)J'_{\nu}(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}^*.$$

Donc si l'on prend $\nu = \nu - m$ et $k = m$, on obtient:

$$P(z)J_{\nu-m}(z) + Q(z)J'_{\nu-m}(z) = J_{\nu}(z), \quad \forall z \neq 0.$$

Or on sait (par hypothèse) que $J_{\nu-m}(\lambda) = 0$ et $J_{\nu}(\lambda) = 0$ donc

$$J'_{\nu-m}(\lambda) = 0,$$

ce qui est impossible car les zéros non nuls des fonctions de Bessel sont simples.

Or, $\mathcal{Z}_{m, -\nu+m} = \mathcal{Z}_{m, \nu}$ d'après 19, et comme $J_{-\nu} = J_{\nu}$, on conclut que

$$\mathcal{Z}_{m, \nu} \cap \{\lambda \in \mathbb{R} \mid J_{\nu-m}(\lambda)J_{\nu}(\lambda) = 0\} = \emptyset.$$

7. Cela découle directement du (6.).

□

Dans la suite, on construit à partir de la famille $(\mathcal{Z}_{m,n})_{n \in \mathbb{Z}}$ une famille $\{\varphi_{n,\lambda} \mid n \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}\}$ d'éléments de $\mathcal{H}^{(m)}$ orthogonale pour le produit L^2_{∞} . Soient $n \in \mathbb{Z}$ et $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$. On considère $f_{n,\lambda}^{(m)}$, la fonction définie sur $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$ comme suit:

1. Si $m \geq 1$, on pose:

$$f_{n,\lambda}^{(m)}(r, \theta) := \begin{cases} J_n(\lambda r)e^{in\theta} & \text{si } r \in [0, 1[, \theta \in \mathbb{R}, \\ \frac{J_n(\lambda)}{J_{n-m}(\lambda)} r^m J_{n-m}(\frac{\lambda}{r})e^{in\theta} & \text{si } r \in]1, \infty[, \theta \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (22)$$

(Notons que cette fonction est bien définie au voisinage 0, puisque on a $J_{|n-m|}(x) = O(x^{|n-m|})$ pour x assez petit (voir 65)).

2. Si $m = 0$, on pose:

(a) Si $\lambda \in \mathcal{Z}_{0,n}$ avec $J'_n(\lambda) = 0$,

$$f_{n,\lambda}^{(0)}(r, \theta) := \begin{cases} J_n(\lambda r)e^{in\theta} & \text{si } r \in [0, 1[, \theta \in \mathbb{R}, \\ J_n(\frac{\lambda}{r})e^{in\theta} & \text{si } r \in]1, \infty[, \theta \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (23)$$

(b) Si $\lambda \in \mathcal{Z}_{0,n}$ avec $J_n(\lambda) = 0$

$$f_{n,\lambda}^{(0)}(r, \theta) := \begin{cases} -J_n(\lambda r)e^{in\theta} & \text{si } r \in [0, 1[, \theta \in \mathbb{R}, \\ J_n(\frac{\lambda}{r})e^{in\theta} & \text{si } r \in]1, \infty[, \theta \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (24)$$

On vérifie que $f_{n,\lambda}^{(m)}$ définit une fonction continue sur \mathbb{C} , qu'on va noter par la même notation et on pose

$$\varphi_{n,\lambda}^{(m)} := f_{n,\lambda}^{(m)} \otimes 1. \quad (25)$$

où 1 désigne la section globale 1 de $\mathcal{O}(m)$.

Théorème 3.3. $\forall m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{Z}, \forall \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$. On a

1.

$$\varphi_{n,\lambda}^{(m)} \in \mathcal{H}^{(m)},$$

2.

$$\|\varphi_{n,\lambda}^{(m)}\|_{L^2,\infty}^2 = \frac{J_n(\lambda)^2}{2} \left(\frac{J'_n(\lambda)^2}{J_n(\lambda)^2} + \frac{J'_{n-m}(\lambda)^2}{J_{n-m}(\lambda)^2} \right) + \frac{J_n(\lambda)^2}{2} \left(2 - \frac{(n-m)^2 + n^2}{\lambda^2} \right).$$

3.

$$(\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \varphi_{n',\lambda'}^{(m)})_{L^2,\infty} = \delta_{n,n'} \delta_{\lambda,\lambda'} (\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \varphi_{n,\lambda}^{(m)})_{L^2,\infty}, \quad \forall n, n' \in \mathbb{Z}, \forall \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}, \lambda' \in \mathcal{Z}_{m,n'}^9.$$

4. $\mathcal{Z}_{m,n}$ est un sous-ensemble discret et infini de \mathbb{R}^* .

Proof.

1. Comme $f_{n,\lambda}^{(m)}$ est continue sur \mathbb{P}^1 . Alors, par compacité, on peut approcher $\varphi_{n,\lambda}^{(m)}$ uniformément par une suite d'éléments de $A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$. On déduit que $\varphi_{n,\lambda}^{(m)} \in \mathcal{H}^{(m)}$.

2. Soit $n \in \mathbb{Z}$ et $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$. Calculons la norme L_{∞}^2 de $\varphi_{n,\lambda}^{(m)}$:

$$\begin{aligned} \|\varphi_{n,\lambda}^{(m)}\|_{L^2,\infty}^2 &= \int_{x \in \mathbb{P}^1} |f_{n,\lambda}(x)|^2 h_{\mathcal{O}(m)}(1,1)(x) \omega_{\infty} \\ &= \int_{\mathbb{R}^+} |f_{n,\lambda}(r, \theta)| \frac{1}{\max(1, |r|^{2m})} \frac{r dr}{\max(1, |r|^4)} \\ &= \int_0^1 J_n(\lambda r)^2 r dr + \frac{J_n(\lambda)^2}{J_{n-m}(\lambda)^2} \int_1^{\infty} J_{n-m}\left(\frac{\lambda}{r}\right)^2 \frac{r dr}{r^4} \\ &= \int_0^1 J_n(\lambda r)^2 r dr + \frac{J_n(\lambda)^2}{J_{n-m}(\lambda)^2} \int_0^1 J_{n-m}(\lambda r)^2 r dr \\ &= \frac{1}{2} \left(J'_n(\lambda)^2 + \left(1 - \frac{n^2}{\lambda^2}\right) J_n(\lambda)^2 \right) + \frac{J_n(\lambda)^2}{J_{n-m}(\lambda)^2} \left(J'_{n-m}(\lambda)^2 + \left(1 - \frac{(n-m)^2}{\lambda^2}\right) J_{n-m}(\lambda)^2 \right) \quad \text{par 70} \\ &= \frac{J_n(\lambda)^2}{2} \left(\frac{J'_n(\lambda)^2}{J_n(\lambda)^2} + \frac{J'_{n-m}(\lambda)^2}{J_{n-m}(\lambda)^2} \right) + \frac{J_n(\lambda)^2}{2} \left(2 - \frac{(n-m)^2 + n^2}{\lambda^2} \right). \end{aligned}$$

(Notons que le dernier terme est bien défini puisque $J_{n-m}(\lambda)J_n(\lambda) \neq 0$ d'après le lemme 3.2).

3. (a) Supposons d'abord que $m \geq 1$. Soient $n, n' \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$ et $\lambda' \in \mathcal{Z}_{m,n'}$. On a

$$\begin{aligned} (\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \varphi_{n',\lambda'}^{(m)})_{L^2,\infty} &= \int_{\mathbb{P}^1} f_{n,\lambda}^{(m)} \overline{f_{n',\lambda'}^{(m)}} \|1\|_{\infty}^2 \omega_{\infty} \\ &= \delta_{n,n'} \int_{r \leq 1} J_n(\lambda r) J_n(\lambda' r) r dr + \delta_{n,n'} \int_{r \geq 1} \frac{J_n(\lambda) J_n(\lambda')}{J_{n-m}(\lambda) J_{n-m}(\lambda')} J_{n-m}\left(\frac{\lambda}{r}\right) J_{n-m}\left(\frac{\lambda'}{r}\right) \frac{r dr}{r^4} \\ &= \delta_{n,n'} \int_{r \leq 1} J_n(\lambda r) J_n(\lambda' r) r dr + \delta_{n,n'} \int_{r \leq 1} \frac{J_n(\lambda) J_n(\lambda')}{J_{n-m}(\lambda) J_{n-m}(\lambda')} J_{n-m}(\lambda r) J_{n-m}(\lambda' r) r dr \end{aligned}$$

⁹ $\delta_{*,*}$ par définition égale à 0 si $* \neq *$, 1 sinon.

Si $\lambda \neq \lambda'$, on a d'après 69:

$$\begin{aligned}
(\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \varphi_{n',\lambda'}^{(m)})_{L^2,\infty} &= \frac{1}{\lambda'^2 - \lambda^2} \left(\lambda J_n(\lambda') J_n'(\lambda) - \lambda' J_n(\lambda) J_n'(\lambda') \right) \\
&+ \frac{1}{\lambda'^2 - \lambda^2} \frac{J_n(\lambda) J_n(\lambda')}{J_{n-m}(\lambda) J_{n-m}(\lambda')} \left(\lambda J_{n-m}(\lambda') J_{n-m}'(\lambda) - \lambda' J_{n-m}(\lambda) J_{n-m}'(\lambda') \right) \quad \text{si } \lambda \neq \lambda' \\
&= \frac{1}{\lambda'^2 - \lambda^2} \frac{\lambda J_n(\lambda')}{J_{n-m}(\lambda)} \left(J_n'(\lambda) J_{n-m}(\lambda) + J_n(\lambda) J_{n-m}'(\lambda) \right) \\
&- \frac{1}{\lambda'^2 - \lambda^2} \frac{\lambda' J_n(\lambda)}{J_{n-m}(\lambda')} \left(J_n'(\lambda') J_{n-m}(\lambda') + J_n(\lambda') J_{n-m}'(\lambda') \right) \\
&= \frac{1}{\lambda'^2 - \lambda^2} \frac{\lambda J_n(\lambda')}{J_{n-m}(\lambda)} \frac{m}{\lambda} J_n(\lambda) J_{n-m}(\lambda) - \frac{1}{\lambda'^2 - \lambda^2} \frac{\lambda' J_n(\lambda)}{J_{n-m}(\lambda')} \frac{m}{\lambda'} J_n(\lambda') J_{n-m}(\lambda') \\
&= \frac{m J_n(\lambda') J_n(\lambda)}{\lambda'^2 - \lambda^2} (1 - 1) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

(On a utilisé l'égalité suivante $J_n'(\lambda) J_{n-m}(\lambda) + J_n(\lambda) J_{n-m}'(\lambda) = \frac{m}{\lambda} J_n(\lambda) J_{n-m}(\lambda)$ qui résulte du fait $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$).

(b) le cas $m = 0$. Il suffit de traiter le cas de $\varphi_{n,\lambda}^{(0)}$ et $\varphi_{n,\lambda'}^{(0)}$ avec $J_n(\lambda) = 0$ et $J_n'(\lambda') = 0$. On a,

$$\begin{aligned}
(\varphi_{n,\lambda}^{(0)}, \varphi_{n,\lambda'}^{(0)})_{L^2,\infty} &= \int_{\mathbb{P}^1} f_{n,\lambda}^{(0)} \overline{f_{n,\lambda'}^{(0)}} \|1\|_\infty^2 \omega_\infty \\
&= - \int_{r \leq 1} J_n(\lambda r) J_n(\lambda' r) r dr + \int_{r \geq 1} J_n\left(\frac{\lambda}{r}\right) J_n\left(\frac{\lambda'}{r}\right) \frac{r dr}{r^4} \\
&= - \int_{r \leq 1} J_n(\lambda r) J_n(\lambda' r) r dr + \int_{r \leq 1} J_n(\lambda r) J_n(\lambda r) r dr \\
&= 0.
\end{aligned}$$

4. On a déjà montré que $\mathcal{Z}_{m,n}$ est discret et infini (voir lemme 3.2). Montrons que $\mathcal{Z}_{m,n} \subset \mathbb{R}$. On procède par l'absurde: Soit $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$ et supposons que $\bar{\lambda} \neq \lambda$. On a $L_{m,n}(\bar{\lambda}) = \overline{L_{m,n}(\lambda)} = 0$, (puisque $L_{m,n}$ est une fonction analytique à coefficients réels). Si l'on note par $f_{n,\bar{\lambda}}$ la fonction définie par

$$f_{n,\bar{\lambda}}^{(m)} := \begin{cases} J_n(\bar{\lambda} r) \exp(in\theta) & \text{si } r \leq 1, \\ \frac{J_n(\bar{\lambda})}{J_{n-m}(\bar{\lambda})} r^m J_{n-m}\left(\frac{\bar{\lambda}}{r}\right) \exp(in\theta) & \text{si } r > 1, \end{cases}$$

et on pose

$$\varphi_{n,\bar{\lambda}}^{(m)} := f_{n,\bar{\lambda}}^{(m)} \otimes 1.$$

Alors on a,

$$\begin{aligned}
(\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \varphi_{n,\bar{\lambda}}^{(m)})_{L^2,\infty} &= \int_{\mathbb{P}^1} f_{n,\lambda} \overline{f_{n,\bar{\lambda}}} \|1\|_\infty^2 \omega_\infty \\
&= \int_{r \leq 1} J_n(\lambda r) J_n(\bar{\lambda} r) r dr + \int_{r \geq 1} \frac{J_n(\lambda) J_n(\bar{\lambda})}{J_{n-m}(\lambda) J_{n-m}(\bar{\lambda})} J_{n-m}\left(\frac{\lambda}{r}\right) J_{n-m}\left(\frac{\bar{\lambda}}{r}\right) \frac{r dr}{r^4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{r \leq 1} J_n(\lambda r) J_n(\bar{\lambda} r) r dr + \int_{r \leq 1} \frac{J_n(\lambda) J_n(\bar{\lambda})}{J_{n-m}(\lambda) J_{n-m}(\bar{\lambda})} J_{n-m}(\lambda r) J_{n-m}(\bar{\lambda} r) r dr \\
&= \frac{1}{\bar{\lambda}^2 - \lambda^2} \left(\lambda J_n(\bar{\lambda}) J_n'(\lambda) - \bar{\lambda} J_n(\lambda) J_n'(\bar{\lambda}) \right) \\
&+ \frac{1}{\bar{\lambda}^2 - \lambda^2} \frac{J_n(\lambda) J_n(\bar{\lambda})}{J_{n-m}(\lambda) J_{n-m}(\bar{\lambda})} \left(\lambda J_{n-m}(\bar{\lambda}) J_{n-m}'(\lambda) - \bar{\lambda} J_{n-m}(\lambda) J_{n-m}'(\bar{\lambda}) \right) \quad \text{par 69} \\
&= \frac{1}{\bar{\lambda}^2 - \lambda^2} \frac{\lambda J_n(\bar{\lambda})}{J_{n-m}(\lambda)} \left(J_n'(\lambda) J_{n-m}(\lambda) + J_n(\lambda) J_{n-m}'(\lambda) \right) \\
&- \frac{1}{\bar{\lambda}^2 - \lambda^2} \frac{\bar{\lambda} J_n(\lambda)}{J_{n-m}(\bar{\lambda})} \left(J_n'(\bar{\lambda}) J_{n-m}(\bar{\lambda}) + J_n(\bar{\lambda}) J_{n-m}'(\bar{\lambda}) \right) \\
&= \frac{1}{\bar{\lambda}^2 - \lambda^2} \frac{\lambda J_n(\bar{\lambda})}{J_{n-m}(\lambda)} \frac{m}{\lambda} J_n(\lambda) J_{n-m}(\lambda) - \frac{1}{\bar{\lambda}^2 - \lambda^2} \frac{\bar{\lambda} J_n(\lambda)}{J_{n-m}(\bar{\lambda})} \frac{m}{\bar{\lambda}} J_n(\lambda) J_{n-m}(\bar{\lambda}) \\
&= \frac{m J_n(\bar{\lambda}) J_n(\lambda)}{\bar{\lambda}^2 - \lambda^2} (1 - 1) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Notons que la deuxième égalité nous donne que $(\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \varphi_{n,\bar{\lambda}}^{(m)})_{L^2, \infty}$ est un réel strictement positif (puisque c'est une somme de deux intégrales positives non nulles et que $\lambda \neq 0$ par hypothèse). Cela aboutit à une contradiction. On conclut que

$$\bar{\lambda} = \lambda.$$

□

Dans ce théorème, nous montrons que les fonctions $L_{m,n}$ génèrent des vecteurs propres pour le Laplacien $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$.

Théorème 3.4. *Soit $m \in \mathbb{N}$, on a pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$ et $k \in \{0, 1, \dots, m\}$:*

$$(1 \otimes z^k, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi)_{L^2, \infty} = 0,$$

$$(\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi)_{L^2, \infty} = \frac{\lambda^2}{4} (\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \xi)_{L^2, \infty},$$

et

$$(\varphi_{-n+m,\lambda}^{(m)}, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi)_{L^2, \infty} = \frac{\lambda^2}{4} (\varphi_{-n+m,\lambda}^{(m)}, \xi)_{L^2, \infty},^{10}$$

pour tout $\xi \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$. En particulier,

$$\{0\} \cup \left\{ \frac{\lambda^2}{4} \mid \exists n \in \mathbb{N}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,n} \right\} \subset \text{Spec}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}).$$

Proof. La première assertion est une conséquence immédiate du 2.1.

¹⁰Notons que la deuxième égalité est bien définie, puisqu'on a montré dans 3.2 que $\mathcal{Z}_{m,n} = \mathcal{Z}_{-n+m}$.

Notons que $\varphi_{n,\lambda}^{(m)}$ et $\varphi_{-n+m,\lambda}^{(m)}$ sont linéairement dépendants si et seulement si m est pair et que $n = \frac{m}{2}$. En effet, (par définition de $\varphi_{n,\lambda}^{(m)}$, voir 25), ces deux vecteurs sont liés s'il existe $c \in \mathbb{C}$ tel que

$$J_n(\lambda r)e^{in\theta} = cJ_{-n+m}(\lambda r)e^{i(-n+m)\theta},$$

$$\text{et } \frac{J_n(\lambda)}{J_{n-m}(\lambda)}J_{n-m}(\lambda r)e^{in\theta} = c\frac{J_{-n+m}(\lambda)}{J_{-n}(\lambda)}J_{-n}(\lambda r)e^{i(-n+m)\theta} \quad \forall r \in [0, 1] \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

Donc,

$$J_n(\lambda r) = (-1)^{m-n}cJ_{n-m}(\lambda r)e^{i(-2n+m)\theta} \text{ et } J_{n-m}(\lambda r) = (-1)^{n-m}c\frac{J_{n-m}(\lambda)^2}{J_n(\lambda)^2}J_n(\lambda r)e^{i(-2n+m)\theta},$$

pour tout $r \in [0, 1]$ et pour tout $\theta \in \mathbb{R}$. On déduit que m est pair et que $n = \frac{m}{2}$.

Afin de montrer que $\varphi_{n,\lambda}^{(m)}$ est un vecteur propre, on aura besoin de l'expression locale de $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ sur $\mathbb{P}^1 \setminus \mathbb{S}^1$. Soit $f \in A^{0,0}(\mathbb{P}^1)$ et $k \in \{0, \dots, m\}$. D'après 5, on a sur $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$,

$$\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(f \otimes z^k) = -|z|^{-2k} \frac{\partial}{\partial z} (|z|^{2k} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} f) \otimes z^k = -z^{-k} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} (z^k f) \otimes z^k, \quad (26)$$

et sur $\{|z| > 1\}$,

$$\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(f \otimes z^k) = -|z|^{2m-2k+4} \frac{\partial}{\partial z} (|z|^{2k-2m} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} f) \otimes z^k = -\frac{|z|^4}{z^{k-m}} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} \left(\frac{f}{z^{m-k}} \right) \otimes z^k. \quad (27)$$

Fixons $n \in \mathbb{Z}$ et soit $\lambda \in \mathbb{R}^* \setminus \{x \mid J_{n-m}(x) = 0\}$. Soient $c, d \in \mathbb{R}$ deux constantes non nulles et posons $\tilde{f}_{n,\lambda}$ la fonction sur \mathbb{C} donnée comme suit:

$$\tilde{f}_{n,\lambda}(r, \theta) := \begin{cases} \tilde{f}_{n,\lambda,-}(r, \theta) := cJ_n(\lambda r)e^{in\theta} & \text{si } r \leq 1, \theta \in \mathbb{R} \\ \tilde{f}_{n,\lambda,+}(r, \theta) := d\frac{J_n(\lambda)}{J_{n-m}(\lambda)}r^m J_{n-m}(\frac{\lambda}{r})e^{in\theta} & \text{si } r > 1, \theta \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (28)$$

et on considère l'élément $\tilde{\varphi}_{n,\lambda}^{(m)}$ défini presque partout sur \mathbb{P}^1 par:

$$\tilde{\varphi}_{n,\lambda}^{(m)} := \tilde{f}_{n,\lambda} \otimes 1 \quad (29)$$

On va montrer l'équivalence suivante:

$$\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n} \Leftrightarrow (\tilde{\varphi}_{n,\lambda}^{(m)}, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} \xi)_\infty = \frac{\lambda^2}{4} (\tilde{\varphi}_{n,\lambda}^{(m)}, \xi)_\infty \quad \forall \xi \in A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$$

$$\text{avec } \begin{cases} c = d & \text{lorsque } m \geq 1 \\ c = d & \text{si } J'_n(\lambda) = 0 \text{ et } c = -d \text{ si } J_n(\lambda) = 0, \text{ lorsque } m = 0. \end{cases}$$

Pour cela, nous allons établir que pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}^* \setminus \{x \mid J_{n-m}(x) = 0\}$, on a:

$$(\tilde{f}_{n,\lambda} \otimes 1, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}(g \otimes z^l))_{L^2, \infty} = \frac{\lambda^2}{4} (\tilde{f}_{n,\lambda} \otimes 1, g \otimes z^l)_{L^2, \infty} + \int_{|z|=1} (\tilde{f}_{n,\lambda,+} - \tilde{f}_{n,\lambda,-}) d^c(\bar{z}^l \bar{g})$$

$$+ \int_{|z|=1} (d^c \tilde{f}_{n,\lambda,-} - d^c \tilde{f}_{n,\lambda,+}) \bar{z}^l \bar{g},$$

pour tout $g \in A^{0,0}(\mathbb{P}^1)$ et $l \in \{0, 1, \dots, m\}$.

On a

$$\begin{aligned} (\tilde{f}_{n,\lambda} \otimes 1, \Delta_{\mathcal{O}(m)_\infty} (g \otimes z^l))_{L^2, \infty} &= - \int_{|z| \leq 1} \tilde{f}_{n,\lambda} \bar{z}^{-l} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} (\bar{z}^l \bar{g}) \bar{z}^l dz \wedge d\bar{z} \\ &\quad - \int_{|z| \geq 1} \tilde{f}_{n,\lambda} \bar{z}^{m-l} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} \left(\frac{\bar{g}}{\bar{z}^{m-l}} \right) z^{-m} \bar{z}^{l-m} dz \wedge d\bar{z} \\ &= - \int_{|z| \leq 1} \tilde{f}_{n,\lambda} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} (\bar{z}^l \bar{g}) dz \wedge d\bar{z} - \int_{|z| \geq 1} \tilde{f}_{n,\lambda} z^{-m} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} \left(\frac{\bar{g}}{\bar{z}^{m-l}} \right) dz \wedge d\bar{z}. \end{aligned}$$

Par la formule de Green 5.1,

$$\begin{aligned} - \int_{|z| \leq 1} \tilde{f}_{n,\lambda} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} (\bar{z}^l \bar{g}) dz \wedge d\bar{z} &= - \int_{|z| \leq 1} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} (\tilde{f}_{n,\lambda,-}) \bar{z}^l \bar{g} dz \wedge d\bar{z} - \int_{|z|=1} \tilde{f}_{n,\lambda,-} d^c (\bar{z}^l \bar{g}) \\ &\quad + \int_{|z|=1} d^c (f_{\lambda,n,-}) \bar{z}^l \bar{g} \\ &= - \int_{|z| \leq 1} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} (\tilde{f}_{n,\lambda,-}) \bar{z}^l \bar{g} dz \wedge d\bar{z} - \int_{|z|=1} \tilde{f}_{n,\lambda,-} d^c (\bar{z}^l \bar{g}) \\ &\quad + \int_{|z|=1} d^c (\tilde{f}_{n,\lambda,-}) \bar{z}^l \bar{g}, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} - \int_{|z| \geq 1} \tilde{f}_{n,\lambda} z^{-m} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} \left(\frac{\bar{g}}{\bar{z}^{m-l}} \right) dz \wedge d\bar{z} &= \\ &\quad - \int_{|z| \geq 1} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} \left(\frac{\tilde{f}_{n,\lambda,+}}{z^m} \right) \frac{\bar{g}}{\bar{z}^{m-l}} dz \wedge d\bar{z} + \int_{|z|=1} \frac{\tilde{f}_{n,\lambda,+}}{z^m} d^c \left(\frac{\bar{g}}{\bar{z}^{m-l}} \right) \\ &\quad - \int_{|z|=1} d^c \left(\frac{\tilde{f}_{n,\lambda,+}}{z^m} \right) \frac{\bar{g}}{\bar{z}^{m-l}} \\ &= - \int_{|z| \geq 1} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} \left(\frac{\tilde{f}_{n,\lambda,+}}{z^m} \right) \frac{\bar{g}}{\bar{z}^{m-l}} dz \wedge d\bar{z} + \int_{|z|=1} \tilde{f}_{n,\lambda,+} d^c (\bar{z}^l \bar{g}) \\ &\quad + \int_{|z|=1} \bar{z}^l \bar{g} \tilde{f}_{n,\lambda,+} \left(\frac{1}{z^m} d^c \left(\frac{1}{\bar{z}^m} \right) - \frac{1}{\bar{z}^m} d^c \left(\frac{1}{z^m} \right) \right) - \int_{|z|=1} d^c (\tilde{f}_{n,\lambda,+}) \bar{z}^l \bar{g} \\ &= - \int_{|z| \geq 1} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} \left(\frac{\tilde{f}_{n,\lambda,+}}{z^m} \right) \frac{\bar{g}}{\bar{z}^{m-l}} dz \wedge d\bar{z} + \int_{|z|=1} \tilde{f}_{n,\lambda,+} d^c (\bar{z}^l \bar{g}) - \int_{|z|=1} d^c (\tilde{f}_{n,\lambda,+}) \bar{z}^l \bar{g} \end{aligned}$$

(On a utilisé le fait que $\frac{dz}{z} = -\frac{d\bar{z}}{\bar{z}}$ sur \mathbb{S}^1).

Observons que par 26 et 27, on a sur $\mathbb{P}^1 \setminus \mathbb{S}^1$:

$$\Delta_{\mathcal{O}(m)_\infty} (\tilde{f}_{n,\lambda} \otimes z^k) = \frac{\lambda^2}{4} \tilde{f}_{n,\lambda} \otimes z^k. \quad (30)$$

En regroupant tout cela, et après des simplifications évidentes, il vient que:

$$\begin{aligned}
& (\tilde{f}_{n,\lambda} \otimes 1, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (g \otimes z^l))_{L^2, \infty} = \\
& - \int_{|z| \leq 1} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} (\tilde{f}_{n,\lambda,-}) \bar{z}^l \bar{g} dz \wedge d\bar{z} - \int_{|z| \geq 1} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} \left(\frac{\tilde{f}_{n,\lambda,+}}{z^m} \right) \frac{\bar{g}}{\bar{z}^{m-l}} dz \wedge d\bar{z} \\
& \int_{|z|=1} (\tilde{f}_{n,\lambda,+} - \tilde{f}_{n,\lambda,-}) d^c(\bar{z}^l \bar{g}) + \int_{|z|=1} (d^c \tilde{f}_{n,\lambda,-} - d^c \tilde{f}_{n,\lambda,+}) \bar{z}^l \bar{g} \\
& = \frac{\lambda^2}{4} \int_{|z| \leq 1} \tilde{f}_{n,\lambda,-} \bar{z}^l \bar{g} dz \wedge d\bar{z} + \frac{\lambda^2}{4} \int_{|z| \geq 1} \frac{\tilde{f}_{n,\lambda,+}}{z^m |z|^4} \frac{\bar{g}}{\bar{z}^{m-l}} dz \wedge d\bar{z} \quad \text{par 30} \\
& + \int_{|z|=1} (\tilde{f}_{n,\lambda,+} - \tilde{f}_{n,\lambda,-}) d^c(\bar{z}^l \bar{g}) + \int_{|z|=1} (d^c \tilde{f}_{n,\lambda,-} - d^c \tilde{f}_{n,\lambda,+}) \bar{z}^l \bar{g} \\
& = \frac{\lambda^2}{4} (\tilde{f}_{n,\lambda} \otimes 1, g \otimes z^l)_{L^2, \infty} + \int_{|z|=1} (\tilde{f}_{n,\lambda,+} - \tilde{f}_{n,\lambda,-}) d^c(\bar{z}^l \bar{g}) + \int_{|z|=1} (d^c \tilde{f}_{n,\lambda,-} - d^c \tilde{f}_{n,\lambda,+}) \bar{z}^l \bar{g}.
\end{aligned}$$

Donc pour que $\frac{\lambda^2}{4} \in \text{Spec}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty})$ il faut et il suffit que

$$\int_{|z|=1} (\tilde{f}_{n,\lambda,+} - \tilde{f}_{n,\lambda,-}) d^c(\bar{z}^l \bar{g}) + \int_{|z|=1} (d^c \tilde{f}_{n,\lambda,-} - d^c \tilde{f}_{n,\lambda,+}) \bar{z}^l \bar{g} = 0 \quad \forall g \in A^{0,0}(\mathbb{P}^1), \forall l \in \{0, 1, \dots, m\}. \quad (31)$$

Ce qui est équivalent à:

$$\tilde{f}_{n,\lambda,+} = \tilde{f}_{n,\lambda,-} \quad \text{et} \quad d^c(f_{n,\lambda,-}) = d^c(f_{n,\lambda,+}) \quad \text{sur } \mathbb{S}^1. \quad (32)$$

Pour simplifier les notations on pose

$$\psi_-(r) = c J_n(\lambda r) \quad \text{et} \quad \psi_+(r) = d \frac{J_n(\lambda)}{J_{n-m}(\lambda)} r^m J_{n-m}\left(\frac{\lambda}{r}\right).$$

Donc, $\tilde{f}_{n,\lambda,-}(z) = \psi_- (|z|) \left(\frac{z}{|z|}\right)^n$ lorsque $|z| \leq 1$ et $\tilde{f}_{n,\lambda,+}(z) = \psi_+ (|z|) \left(\frac{z}{|z|}\right)^n$ si $|z| \geq 1$.

1. Soit $0 < |z| \leq 1$. Par un simple calcul, on a $\frac{\partial \tilde{f}_{n,\lambda,-}}{\partial z}(z) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\left(\frac{z}{|z|}\right)^n \right) \psi_- (|z|) + \left(\frac{z}{|z|}\right)^n \frac{\partial \psi_-}{\partial r} (|z|)$ et $\frac{\partial \tilde{f}_{n,\lambda,-}}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\left(\frac{z}{|z|}\right)^{n-k} \right) \psi_- (|z|) + \left(\frac{z}{|z|}\right)^{n-k} \frac{z}{2|z|} \frac{\partial \psi_-}{\partial r} (|z|)$. Sur \mathbb{S}^1 , on a alors

$$d^c f_{n,\lambda,-} = n \psi_-(1) e^{i(n-1)\theta} d\theta + \frac{\partial \psi_-}{\partial r}(1) e^{in\theta} d\theta. \quad (33)$$

Par un calcul semblable au précédent, on obtient sur \mathbb{S}^1 :

$$d^c f_{n,\lambda,+} = n \psi_+(1) e^{i(n-1)\theta} d\theta + \frac{\partial \psi_+}{\partial r}(1) e^{in\theta} d\theta \quad (34)$$

Donc 32 est équivalente à:

$$\psi_-(1) = \psi_+(1) \quad \text{et} \quad \frac{\partial \psi_-}{\partial r}(1) = \frac{\partial \psi_+}{\partial r}(1). \quad (35)$$

¹¹Notons que l'équation 31 peut s'écrire sous la forme suivante $\int_{\mathbb{S}^1} \phi_0 d^c \phi - \phi d^c \phi_0 = 0$ où $\phi_0 = \tilde{f}_{n,\lambda,+} - \tilde{f}_{n,\lambda,-}$ et $\phi = \bar{z}^l \bar{g}$. Le fait que $\frac{\lambda^2}{4} \in \text{Spec}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty})$ revient à établir que la fonction nulle est l'unique fonction sur \mathbb{S}^1 , solution de l'équation fonctionnelle $\int_{\mathbb{S}^1} \phi_0 d^c \phi - \phi d^c \phi_0 = 0$ pour toute fonction ϕ de classe C^∞ au voisinage de \mathbb{S}^1 . Ce qui est le cas, en effet, il suffit de considérer la fonction $|z|\phi$, ce qui nous donne $\int_{\mathbb{S}^1} \phi_0 \phi d^c |z| = 0$ pour tout ϕ .

On a $\frac{\partial \psi_+}{\partial r}(1) = d \frac{J_n(\lambda)}{J_{n-m}(\lambda)} \frac{d}{dr} (r^{m-k} J_{n-m}(\frac{\lambda}{r}))|_{r=1} = dm J_n(\lambda) - d \lambda \frac{J'_{n-m}(\lambda)}{J_{n-m}(\lambda)} J_n(\lambda)$, $\frac{\partial \psi_-}{\partial r}(1) = c \lambda J'_n(\lambda)$ et $c J_n(\lambda) = d J_n(\lambda)$. Par suite, 35 devient:

$$(c - d) J_n(\lambda) = 0 \quad \text{et} \quad dm J_n(\lambda) - d \lambda \frac{J'_{n-m}(\lambda)}{J_{n-m}(\lambda)} J_n(\lambda) = c \lambda J'_n(\lambda).$$

- (a) Si $m \geq 1$, on en déduit que $c = d$ (En effet, si $J_n(\lambda) = 0$, l'équation ci-dessus donne que $J'_n(\lambda) = 0$. Ce qui est impossible) par suite $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$.
- (b) Si $m = 0$, alors $\lambda \in \mathcal{Z}_{0,n}$ avec $c = d$ si λ vérifie $J'_n(\lambda) = 0$, et $c = -d$ si $J - n(\lambda) = 0$.

On a donc montré que $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$ si et seulement si

$$(\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)_\infty}} \xi)_{L^2, \infty} = \frac{\lambda^2}{4} (\varphi_{n,\lambda}^{(m)}, \xi)_{L^2, \infty} \quad \forall \xi \in A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m)).$$

Si l'on remplace n par $-n + m$, alors la dernière assertion devient: $\lambda \in \mathcal{Z}_{m, -n+m}$ si et seulement si

$$(\varphi_{-n+m,\lambda}^{(m)}, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)_\infty}} \xi)_{L^2, \infty} = \frac{\lambda^2}{4} (\varphi_{-n+m,\lambda}^{(m)}, \xi)_{L^2, \infty} \quad \forall \xi \in A^{0,0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m)).$$

Or $\mathcal{Z}_{m, -n+m} = \mathcal{Z}_{m,n}$ (voir 19). Cela complète la preuve du théorème. \square

Le théorème suivant sera utilisé de manière crucial dans l'étude du spectre du Laplacien $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)_\infty}}$:

Théorème 3.5. *Soit $\nu \in \mathbb{Z}$ et $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,\nu}$. On a*

$$L_{m,\nu}(\lambda) = 2 \frac{J_{\nu-m}(\lambda)}{J_\nu(\lambda)} (\varphi_{\nu,\lambda}^{(m)}, \varphi_{\nu,\lambda}^{(m)})_{L^2, \infty},$$

en particulier λ est un zéro simple de $L_{m,\nu}$.

Proof. Notons par $K_{m,\nu}$ la fonction définie sur \mathbb{C}^* comme suit:

$$K_{m,\nu}(z) = \frac{d}{dz} (z^{-m} J_{\nu-m}(z) J_\nu(z)).$$

On a $K'_{m,\nu}(z) = m(m+1)z^{-m-2} J_{\nu-m}(z) J_\nu(z) - 2mz^{-m-1} \frac{d}{dz} (J_{\nu-m}(z) J_\nu(z)) + z^{-m} \frac{d^2}{dz^2} (J_{\nu-m}(z) J_\nu(z))$. Sachant que J_ν vérifie $J''_\nu(z) + \frac{1}{z} J'_\nu(z) + (1 - \frac{\nu^2}{z^2}) J_\nu(z) = 0$, $\forall z \in \mathbb{C}^*$, alors par un simple calcul, on a $\frac{d^2}{dz^2} (J_{\nu-m}(z) J_\nu(z)) = -\frac{1}{z} (J'_\nu(z) J_{\nu-m}(z) + J'_{\nu-m}(z) J_\nu(z)) - (2 - \frac{(\nu-m)^2 + \nu^2}{z^2}) J_{\nu-m}(z) J_\nu(z) + 2J'_\nu(z) J'_{\nu-m}(z)$. En remplaçant dans l'expression de $K'_{m,\nu}$, on obtient:

$$K'_{m,\nu}(z) = z^{-m-2} \left((2m^2 + 2(\nu-m)^2 + (2(\nu-m) + 1)m - 2z^2) J_{\nu-m}(z) J_\nu(z) - (2m+1)z J'_\nu(z) J_{\nu-m}(z) - (2m+1)z J_\nu(z) J'_{\nu-m}(z) + 2z^2 J'_{\nu-m}(z) J'_\nu(z) \right) \quad \forall z \in \mathbb{C}^*. \quad (36)$$

Si l'on considère $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,\nu}$ (c-à-d $\frac{d}{dz} (z^{-m} J_\nu(z) J_{\nu-m}(z)) = 0$). Cela donne les deux identités suivantes:

$$\lambda (J_{\nu-m}(\lambda) J'_n(\lambda) + J_\nu(\lambda) J'_{\nu-m}(\lambda)) = m J_\nu(\lambda) J_{\nu-m}(\lambda), \quad (37)$$

et

$$\frac{J'_\nu(\lambda)^2}{J_\nu(\lambda)^2} + \frac{J'_{\nu-m}(\lambda)^2}{J_{\nu-m}(\lambda)^2} + 2 \frac{J'_\nu(\lambda) J'_{\nu-m}(\lambda)}{J_\nu(\lambda) J_{\nu-m}(\lambda)} = \left(\frac{J'_\nu(\lambda)}{J_\nu(\lambda)} + \frac{J'_{\nu-m}(\lambda)}{J_{\nu-m}(\lambda)} \right)^2 = \frac{m^2}{\lambda^2} \quad (38)$$

¹²Rappelons que $J_\nu(\lambda) J_{\nu-m}(\lambda) \neq 0$ lorsque $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$ (voir 20).

En utilisant 37, la formule 36 devient:

$$K'_{m,\nu}(\lambda) = \lambda^{-m-2} \left(2((\nu - m)\nu - \lambda^2) J_{\nu-m}(\lambda) J_\nu(\lambda) + 2\lambda^2 J'_{\nu-m}(\lambda) J'_\nu(\lambda) \right). \quad (39)$$

De 37 on en tire: Ce qui nous permet d'écrire que

$$\begin{aligned} K'_{m,\nu}(\lambda) &= \lambda^{-m-2} \left(2((\nu - m)\nu - \lambda^2) J_{\nu-m}(\lambda) J_\nu(\lambda) + 2\lambda^2 J'_{\nu-m}(\lambda) J'_\nu(\lambda) \right) \\ &= \lambda^{-m} J_{\nu-m}(\lambda) J_\nu(\lambda) \left(2 \left(\frac{(\nu - m)^2 + (\nu - m)m}{\lambda^2} - 1 \right) + 2 \frac{J'_\nu(\lambda) J'_{\nu-m}(\lambda)}{J_\nu(\lambda) J_{\nu-m}(\lambda)} \right) \\ &= \lambda^{-m} J_{\nu-m}(\lambda) J_\nu(\lambda) \left(2 \left(\frac{(\nu - m)^2 + (\nu - m)m}{\lambda^2} - 1 \right) + \frac{m^2}{\lambda^2} - \frac{J'_\nu(\lambda)^2}{J_\nu(\lambda)^2} - \frac{J'_{\nu-m}(\lambda)^2}{J_{\nu-m}(\lambda)^2} \right) \quad \text{par 38} \\ &= \lambda^{-m} J_{\nu-m}(\lambda) J_\nu(\lambda) \left(-\frac{J'_\nu(\lambda)^2}{J_\nu(\lambda)^2} - \frac{J'_{\nu-m}(\lambda)^2}{J_{\nu-m}(\lambda)^2} + \left(\frac{(\nu - m)^2 + \nu^2}{\lambda^2} - 2 \right) \right) \end{aligned}$$

Or on a déjà montré que (voir théorème 3.3):

$$(\varphi_{\nu,\lambda}^{(m)}, \varphi_{\nu,\lambda}^{(m)})_{L^2, \infty} = \frac{J_\nu(\lambda)^2}{2} \left(\frac{J'_\nu(\lambda)^2}{J_\nu(\lambda)^2} + \frac{J'_{\nu-m}(\lambda)^2}{J_{\nu-m}(\lambda)^2} \right) + \frac{J_\nu(\lambda)^2}{2} \left(2 - \frac{(\nu - m)^2 + \nu^2}{\lambda^2} \right).$$

Donc,

$$K'_{m,\nu}(\lambda) = -2\lambda^{-m} \frac{J_{\nu-m}(\lambda)}{J_\nu(\lambda)} (\varphi_{\nu,\lambda}^{(m)}, \varphi_{\nu,\lambda}^{(m)})_{L^2, \infty}.$$

Par suite,

$$L'_{m,\nu}(\lambda) = -m\lambda^{m-1} K_{m,\nu}(\lambda) - \lambda^m K'_{m,\nu}(\lambda) = -\lambda^m K'_{m,\nu}(\lambda) = 2 \frac{J_{\nu-m}(\lambda)}{J_\nu(\lambda)} (\varphi_{\nu,\lambda}^{(m)}, \varphi_{\nu,\lambda}^{(m)})_{L^2, \infty}.$$

Montrons maintenant que λ est un zéro simple de $L_{m,\nu}$. Cela découle du 20 et de la formule précédente. \square

4 Sur le Spectre de $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ (II)

Dans ce paragraphe on se propose de prouver que les valeurs propres de $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ calculées dans le théorème 3.4 sont les uniques valeurs propres possibles, en d'autres termes, on a:

Théorème 4.1. *Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$ admet un spectre discret, positif et infini, et on a*

$$\text{Spec}(\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}) = \{0\} \cup \left\{ \frac{\lambda^2}{4} \mid \exists \nu \in \mathbb{N}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,\nu} \right\}, \quad (40)$$

En plus, on a

1. Lorsque m est pair, alors la multiplicité de $\frac{\lambda^2}{4}$ est égale à 2 si $\lambda \in \mathcal{Z}_{m,n}$ si $n \geq m + 1$ ou $0 \leq n \leq \frac{m}{2} - 1$, et de multiplicité 1 si $\lambda \in \mathcal{Z}_{m, \frac{m}{2}}$.
2. Si m est impair, alors $\frac{\lambda^2}{4}$ est de multiplicité 2 si $n \geq m + 1$, et vaut 1 si $0 \leq n \leq m$.

Dans le théorème 3.4, nous avons associé à tout élément de $\mathcal{Z}_{m,\nu}$ un vecteur propre non nul pour le Laplacien $\Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty}$. Ce qui nous a permis de déduire une partie du spectre.

Afin, d'établir le théorème 2, il suffira alors d'établir le théorème suivant:

Théorème 4.2.

$$\{1 \otimes 1, 1 \otimes z, \dots, 1 \otimes z^m\} \cup \left\{ \varphi_{\nu,\lambda}^{(m)} \mid \nu \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,\nu} \right\}, \quad (41)$$

est une base hilbertienne pour $\mathcal{H}^{(m)}$.

Remarque 4.3. Notons que la famille $\{1 \otimes 1, 1 \otimes z, \dots, 1 \otimes z^m\} \cup \left\{ \varphi_{\nu,\lambda}^{(m)} \mid \nu \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,\nu} \right\}$ est orthogonale pour le produit $(\cdot)_{L^2,\infty}$. En effet, nous avons établi que $\left\{ \varphi_{\nu,\lambda}^{(m)} \mid \nu \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{m,\nu} \right\}$ est orthogonale (voir théorème 3.3), il reste à établir que $(1 \otimes z^k, \varphi_{\nu,\lambda}^{(m)})_{L^2,\infty} = 0, \forall k \in \{0, 1, \dots, m\}, \forall \nu \in \mathbb{Z}, \forall \lambda \in \mathcal{Z}_{m,\nu}$. D'après 3.4, $(\varphi_{\nu,\lambda}^{(m)}, \Delta_{\overline{\mathcal{O}(m)}_\infty} (1 \otimes z^k))_{L^2,\infty} = \frac{\lambda^2}{4} (\varphi_{\nu,\lambda}^{(m)}, 1 \otimes z^k)_{L^2,\infty}$. Or, le terme à gauche est nul (voir proposition 2.1). On conclut en rappelant que $\lambda \neq 0$.

Nous commençons par montrer que le cas $m = 0$ découle de la théorie des séries de Fourier-Bessel classique [11, §. 18] ou le paragraphe 4.1 pour un bref rappel.

Quant au cas $m \geq 1$, il sera l'application d'une théorie de séries de Fourier-Bessel généralisée adaptée que nous allons développer au paragraphe 4.2.

Le cas $m = 0$ est facile à traiter. En effet, on verra que l'étude du Laplacien $\Delta_{\overline{\mathcal{O}}_\infty}$ est équivalente à deux problèmes avec conditions au bord sur le disque unité classiques:

Théorème 4.4 (le cas $m = 0$).

$$\{1\} \cup \left\{ \varphi_{\nu,\lambda}^{(0)} \mid \nu \in \mathbb{Z}, \lambda \in \mathcal{Z}_{0,\nu} \right\},$$

est une base hilbertienne pour $\mathcal{H}^{(0)}$.

Proof. Soit $f \in \mathcal{H}^{(0)}$. Supposons que:

$$(f, 1)_{L^2,\infty} = (f, \varphi_{\nu,\lambda}^{(0)})_{L^2,\infty} = 0 \quad \forall \nu \in \mathbb{Z}, \forall \lambda \in \mathcal{Z}_{0,\nu},$$

et montrons qu'on a nécessairement $f = 0$ dans $\mathcal{H}^{(0)}$.

Fixons $\nu \in \mathbb{Z}$. Soit $\lambda \in \mathcal{Z}_{0,\nu}$, on a (voir notations 25):

$$\begin{aligned} (f, 1)_{L^2,\infty} &= \int_0^1 (f_\nu(r) + f_\nu(\frac{1}{r})) r dr \\ (f, \varphi_{\nu,\lambda}^{(0)})_{L^2,\infty} &= \int_0^1 (f_\nu(r) + f_\nu(\frac{1}{r})) J_\nu(\lambda r) r dr \quad \text{si } J'_\nu(\lambda) = 0 \\ (f, \varphi_{\nu,\lambda}^{(0)})_{L^2,\infty} &= \int_0^1 (f_\nu(r) - f_\nu(\frac{1}{r})) J_\nu(\lambda r) r dr \quad \text{si } J_\nu(\lambda) = 0, \end{aligned}$$

(où on a posé $f_\nu(r, \theta) := \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-i\nu\theta} d\theta$).

Il est bien connu que la famille $\{1, J_\nu(\lambda r) \mid J'_\nu(\lambda) = 0\}$ (resp. $\{J_\nu(\lambda r) \mid J_\nu(\lambda) = 0\}$) forme un système total pour l'espace des fonctions L^2 sur $[0, 1]$ vérifiant la condition de Neumann (resp. la condition de Dirichlet), voir par exemple [12, p.381]. On déduit que $\int_0^1 |f_\nu(r)|^2 r dr = \int_0^1 |f_\nu(\frac{1}{r})|^2 r dr = 0$ pour tout $\nu \in \mathbb{Z}$. On conclut que:

$$\|f\|_{L^2,\infty} = 0.$$

(on a utilisé 43, voir 4.9 pour les notations.) □

Établir le théorème 4.2 revient à montrer que pour toute fonction f sur \mathbb{P}^1 vérifiant $\|f \otimes 1\|_{L^2, \infty} < \infty$, alors on a

$$f \otimes 1 = \sum_{k=0}^m a_k (1 \otimes z^k) + \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} \sum_{\lambda \in \mathcal{Z}_{m, \nu}} a_{\nu, \lambda} \varphi_{\nu, \lambda}^{(m)},$$

dans $\mathcal{H}^{(m)}$ où $a_k = \frac{(f \otimes 1, 1 \otimes z^k)_{L^2, \infty}}{\|1 \otimes z^k\|_{L^2, \infty}^2}$ pour $k \in \{0, 1, \dots, m\}$ et $a_{\nu, \lambda} = \frac{(f \otimes 1, \varphi_{\nu, \lambda}^{(m)} \otimes 1)_{L^2, \infty}}{\|\varphi_{\nu, \lambda}^{(m)} \otimes 1\|_{L^2, \infty}^2} \forall \nu \in \mathbb{Z}, \forall \lambda \in \mathcal{Z}_{m, \nu}$.

Une autre manière équivalente est de montrer que 0 est l'unique élément de $\mathcal{H}^{(m)}$ orthogonal à cette famille (voir 5.2). C-à-d, si:

$$a_k = a_{\nu, \lambda} = 0, \forall k \in \{0, 1, \dots, m\}, \forall \nu \in \mathbb{Z}, \forall \lambda \in \mathcal{Z}_{m, \nu},$$

alors,

$$f \otimes 1 = 0 \quad \text{dans } \mathcal{H}^{(m)}.$$

Il est naturel de commencer par étudier le terme suivant:

$$(f \otimes 1, \varphi_{\nu, \lambda}^{(m)})_{L^2, \infty}.$$

Observons que

$$\begin{aligned} (f \otimes 1, \varphi_{\nu, \lambda}^{(m)})_{L^2, \infty} &= \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-i\nu\theta} d\theta \right) J_\nu(\lambda r) r dr \\ &\quad + \frac{J_\nu(\lambda)}{J_{\nu-m}(\lambda)} \int_1^\infty \left(\int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-i\nu\theta} d\theta \right) J_{\nu-m}\left(\frac{\lambda}{r}\right) \frac{r dr}{r^{4+m}} \\ &= (e^{i\nu\theta} f_\nu \otimes 1, \varphi_{\nu, \lambda}^{(m)})_{L^2, \infty}, \end{aligned}$$

(où on a noté par f_ν la fonction définie presque partout par $f_\nu(r, \theta) := \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-i\nu\theta} d\theta$). Cela nous amène à fixer le paramètre ν et de montrer le résultat suivant: Si pour tout $\lambda \in \mathcal{Z}_{m, \nu}$ on a $(e^{i\nu\theta} f_\nu \otimes 1, \varphi_{\nu, \lambda}^{(m)} \otimes 1)_{L^2, \infty} = 0$ alors

$$f_\nu \otimes 1 = 0.$$

En effet, cela est équivalent à notre problème de départ puisque $(f_\nu \otimes 1, \varphi_{\nu', \lambda'})_{L^2, \infty} = 0$ si $\nu \neq \nu'$ et qu'on dispose d'une correspondance bijective: $f \mapsto (f_\nu)_{\nu \in \mathbb{Z}}$ (voir 4.9 pour plus de détails).

La théorie des séries de Fourier-Bessel généralisée : Fixons $\nu \in \mathbb{Z}$. On sait que $\mathcal{Z}_{m, \nu}$ est un sous-ensemble discret de \mathbb{R}^* (voir théorème 3.3). On ordonne $\{\frac{\lambda^2}{4} \mid \lambda \in \mathcal{Z}_{m, \nu}\}$ par ordre croissant, et on note par λ_k le k -ème élément de cet ensemble et par $\varphi_{\nu, k}^{(m)}$, le vecteur $\varphi_{\nu, \lambda}^{(m)}$ tel que $\lambda_k = \frac{\lambda^2}{4}$. Au paragraphe 4.2 nous introduisons un nouveau espace hilbertien \mathcal{E}_m . Nous expliquons dans 4.9, son lien avec $\mathcal{H}^{(m)}$ et nous établissons un résultat précis (voir théorème 4.10) généralisant ainsi la théorie classique des séries de Fourier-Bessel. Ce théorème sera une conséquence du théorème 4.12 dont la preuve est une adaptation de la théorie classique à notre situation.

Le théorème 4.10 va nous permettre d'obtenir 4.2 comme un corollaire. En effet, soit f une fonction définie presque partout sur \mathbb{P}^1 , avec $\|f \otimes 1\|_{L^2, \infty} < \infty$. Si

$$(f \otimes 1, \varphi_{\nu, \lambda}^{(m)})_{L^2, \infty} = (f \otimes 1, 1 \otimes z^k)_{L^2, \infty} = 0 \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, m\}, \forall \nu \in \mathbb{Z}, \forall \lambda \in \mathcal{Z}_{m, \nu},$$

Par les notations du 4.2, en particulier 45, nous avons:

$$(f_\nu, \varphi_{\nu, k}^{(m)})_m = (f_k, x^k)_m = 0 \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, m\}, \forall \nu \in \mathbb{Z}, \forall \lambda \in \mathcal{Z}_{m, \nu},$$

Nous déduisons le théorème 4.2, en appliquant 4.10, combiné avec la remarque 4.9.

Afin de démontrer ce résultat, notre stratégie consiste à développer une théorie des séries de Fourier-Bessel généralisée adaptée au cas $m \geq 1$. Nous commençons par faire un rappel sur la théorie des séries de Fourier-Bessel classique en suivant la présentation du [11, §. 18].

4.1 Théorie des séries Fourier-Bessel classique

Les fonctions de Bessel jouent un rôle analogue à celui des fonctions trigonométriques dans la théorie des séries de Fourier. Dans cette première partie on va rappeler la théorie des séries de Fourier-Bessel et on énoncera le résultat principal de cette théorie à savoir une condition suffisante pour qu'une fonction f admette un développement en série en fonctions de Bessel. On suivra la présentation faite dans [11, §18].

Soit f une fonction réelle définie sur $[0, 1]$ et on suppose que $\int_0^1 |f(t)|t^{\frac{1}{2}}dt$ converge. Soit ν un réel supérieur à $\frac{1}{2}$. On appelle *série de fonctions de Bessel*, la fonction qui à tout x réel associe la somme suivante (lorsqu'elle converge):

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k J_{\nu}(j_k x),$$

où $(a_k)_{k \geq 1}$ est une suite de constantes indépendante de x et $(j_k)_{k \geq 1}$ est la suite des zéros positifs de J_{ν} ordonnée par ordre croissant. Si les coefficients de cette série sont donnés par

$$a_k = \frac{2}{J_{\nu+1}(j_k)^2} \int_0^1 f(t) J_{\nu}(j_k t) t dt,$$

alors cette série est dite *la série de Fourier-Bessel associée à $f(x)$* . Si, en plus, cette série converge vers $f(x)$ en tout point de l'intervalle ouvert $]0, 1[$ alors on parle du *développement de Fourier-Bessel* de f .

On peut aussi étudier la série: $\sum_{k=1}^{\infty} b_k J_{\nu}(\lambda_k x)$ où $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$ sont les zéros positifs non nuls de $z \mapsto z J'_{\nu}(z) + H J_{\nu}(z)$ appelée *la série de Dini des fonctions de Bessel*. Lorsque les coefficients b_k sont donnés par la formule suivante: $((\lambda_k^2 - \nu^2) + \lambda_k^2 J'_{\nu}(\lambda_k)^2) b_k = 2 \lambda_k^2 \int_0^1 f(t) J_{\nu}(\lambda_k t) t dt$ alors on dit que c'est *la série de Dini associée à $f(x)$* .

Remarque 4.5. Notons que Watson étudie le développement de fonctions en série de Fourier-Bessel et affirme dans [11, p. 582] que le cas général des développements en séries de Dini se traite de la même manière. Par analogie avec la théorie des séries de Fourier, il donne une condition suffisante pour l'existence du développement en série de Fourier-Bessel qu'on énoncera dans la suite et on en rappellera l'idée de la preuve.

Rappelons qu'une fonction réelle f sur un intervalle $[a, b]$ est dite à *variation bornée* si:

$$V_a^b(f) := \sup_{\sigma \in \mathcal{S}([a, b])} V(f, \sigma) < \infty$$

où $\mathcal{S}([a, b])$ est l'ensemble des subdivisions de $[a, b]$ de la forme $\sigma = (x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ et $V(f, \sigma) = \sum_{i=0}^{n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)|$.

D'après Watson, on dispose de quatre résultats majeurs sur la théorie des séries de Fourier-Bessel, à savoir une condition suffisante pour la convergence simple en un point intérieur de $]0, 1[$, la convergence uniforme sur un sous-intervalle fermé propre de $]0, 1[$, le comportement de la série de Fourier-Bessel aux voisinages de 0 (resp. de 1) et enfin l'unicité du développement en série de Fourier-Bessel. Ce dernier point s'interprète en langage moderne en disant que les fonctions de Bessel forment une famille totale dans un espace hilbertien donné.

Rappelons donc les principaux résultats de la théorie des séries de Fourier-Bessel.

Le résultat suivant nous fournit une condition suffisante pour la convergence simple de la série de Fourier-Bessel:

Proposition 4.6. *Soit f une fonction définie sur $[0, 1]$ et on suppose que $\int_0^1 |f(t)|t^{\frac{1}{2}}dt$ converge. Soit*

$$a_k := \frac{2}{J_{\nu+1}^2(j_k)} \int_0^1 f(t)J_{\nu}(j_k t)tdt,$$

avec $\nu \geq -\frac{1}{2}$.

Soit $x \in]a, b[$ avec $0 < a < b < 1$ et que f soit à variation bornée sur $[a, b]$. Alors la série

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k J_{\nu}(j_k x),$$

est convergente, de somme égale à $\frac{1}{2}(\lim_{y \rightarrow x^+} f(y) + \lim_{y \rightarrow x^-} f(y))$ ¹³.

Proof. Voir [11, §18.24]. □

En gardant les mêmes hypothèses et si l'on suppose en plus que f est continue sur $[a, b]$ alors on a convergence uniforme. Précisément, on a le résultat suivant

Proposition 4.7. *Si f est continue et vérifie les hypothèses de la proposition précédente, alors la série de Fourier-Bessel associée à f converge uniformément vers f sur l'intervalle $[a + \delta, b - \delta]$, où δ est un réel positif non nul arbitraire.*

Proof. Voir [11, §18.25]. □

Comme les sommes partielles de la série de Fourier-Bessel associée à une fonction f continue sont nulles en $x = 1$. Il est donc nécessaire de supposer que $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$ si l'on veut garantir la convergence uniforme de la série de Fourier-Bessel au voisinage de $x = 1$. On montre dans [11, §18.26] que la continuité de f sur $[a, 1]$, avec $a \geq 0$ et la condition $f(1) = 0$ suffisent pour assurer la convergence uniforme sur un intervalle de la forme $[a + \delta, 1]$ pour $\delta > 0$.

Le dernier résultat fondamental de la théorie des séries de Fourier-Bessel exposée dans [11, §18] est l'unicité du développement en série de Fourier-Bessel. On montre dans [11, §18.6], sous la condition de la convergence absolue de $\int_0^1 t^{\frac{1}{2}} f(t)dt$, que f est nulle presque partout si et seulement si tous les coefficients de la série de Fourier-Bessel associée sont nuls.

Le point clé de la théorie des séries de Fourier-Bessel classique réside en l'étude de la suite de fonctions suivante:

$$(x, t) \in [0, 1]^2 \mapsto T_n(t, x) = \sum_{k=1}^n \frac{2J_{\nu}(j_k x)J_{\nu}(j_k t)}{J_{\nu+1}(j_k)^2}.$$

Notons d'abord que:

$$\sum_{k=1}^n a_k J_{\nu}(j_k x) = \int_0^1 f(t)T_n(t, x)tdt \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq 1}.$$

¹³Comme f est à variation bornée alors on peut montrer (par l'absurde) que f admet une limite à droite et à gauche de x

Les fonction T_n jouent le même rôle que

$$(x, t) \mapsto \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)(x - t)\right)}{\sin(x - t)}, \quad x \neq t$$

pour la théorie des séries de Fourier.

Il est commode d'exprimer T_n comme étant l'intégrale sur le contour d'un rectangle contenant seulement j_1, \dots, j_n d'une fonction auxiliaire méromorphe dont les uniques pôles sont les zéros de J_ν et ayant un comportement asymptotique adéquat. Ce dernier point nous permettra d'étudier T_n pour n assez grand et de déduire la plupart des résultats de la théorie classique.

Nous allons rappeler quelques points techniques du [11, §18] dont le but de les adapter et les appliquer ultérieurement à notre situation. Dans les pages pp. 583-584, pour tous $0 < t \neq x < 1$, on introduit la fonction g donnée par

$$g(w) = \frac{2w}{t^2 - x^2} (tJ_\nu(xw)J_{\nu+1}(tw) - xJ_\nu(tw)J_{\nu+1}(xw)), \quad \forall w \in \mathbb{C},$$

et on montre que le résidu de $w \mapsto \frac{g(w)}{wJ_\nu(w)^2}$ en $w = j_k$ est égal à $2 \frac{J_\nu(xj_k)J_\nu(tj_k)}{J_{\nu+1}(j_k)^2}$ ¹⁴.

D'un autre coté, on a $\forall w \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dw} (wJ_\nu(xw)J_{\nu+1}(tw)) &= \frac{d}{dw} ((xw)^{-\nu} J_\nu(tw)(tw)^{\nu+1} J_{\nu+1}(tw)) \frac{x^\nu}{t^{\nu+1}} \\ &= -\frac{x^{\nu+1}}{t^{\nu+1}} (xw)^{-\nu} J_{\nu+1}(xw)(tw)^{\nu+1} J_{\nu+1}(tw) + \frac{x^\nu}{t^\nu} (xw)^{-\nu} J_\nu(xw)(tw)^{\nu+1} J_\nu(tw) \quad \text{par 67 et 68} \\ &= -xwJ_{\nu+1}(xw)J_{\nu+1}(tw) + twJ_\nu(xw)J_\nu(tw), \end{aligned}$$

et par symétrie, on en déduit que

$$\frac{d}{dw} (wJ_\nu(tw)J_{\nu+1}(xw)) = -twJ_{\nu+1}(tw)J_{\nu+1}(xw) + xwJ_\nu(tw)J_\nu(xw), \quad \forall w \in \mathbb{C}.$$

En regroupant tout cela on obtient:

$$g'(w) = 2wJ_\nu(xw)J_\nu(tw), \quad \forall w \in \mathbb{C}.$$

On conclut que le résidu de $w \mapsto \frac{g(w)}{wJ_\nu(w)^2}$ en j_k est

$$2 \frac{J_\nu(xj_k)J_\nu(tj_k)}{J_{\nu+1}(j_k)^2}.$$

On considère maintenant le rectangle de sommets iB , $-iB$, $A_n + iB$ et $A_n - iB$ où $B > 0$ et A_n est un réel tel que $j_n < A_n < j_{n+1}$. Remarquons enfin que $w \mapsto \frac{g(w)}{wJ_\nu(w)^2}$ est d'ordre 1 en $w = 0$ (on le vérifie

¹⁴On commence par noter que le résidu de $w \mapsto \frac{g(w)}{wJ_\nu(w)^2}$ en j_k est $\frac{g'(j_k)}{j_k J_\nu'(j_k)^2}$. Cela résulte du fait suivant: Si φ_1 et φ_2 sont deux fonctions holomorphes sur \mathbb{C} et λ est un zéro simple de φ_2 alors on peut montrer à l'aide d'un développement limité convenable au voisinage de λ que

$$\text{Res}_j \left(w \mapsto \frac{\varphi_1(w)}{w\varphi_2'(w)} \right) = \left(\frac{\varphi_1'(j)}{j\varphi_2'(j)^2} - \frac{\varphi_1(j)}{\varphi_2'(j)^2} \left(1 + j \frac{\varphi_2''(j)}{\varphi_2'(j)} \right) \right).$$

Mais on a ici $J_\nu(j) = 0$ et J_ν vérifie $J_\nu''(z) + \frac{1}{z}J_\nu'(z) + \left(1 - \frac{\nu^2}{z^2}\right)J_\nu(z) = 0$, donc $1 + j \frac{J_\nu''(j)}{J_\nu'(j)} = 0$.

en utilisant 65). Donc par cette discussion on peut affirmer que l'intégrale de $w \mapsto \frac{g(w)}{wJ_\nu(w)^2}$ le long de ce contour est égale à $T_n(t, x)$.

La suite utilise de manière cruciale les propriétés asymptotiques des fonctions de Bessel. En fait, le développement asymptotique des fonctions de Bessel, voir [11, §7.21], nous permet d'assurer que l'intégrale sur les cotés inférieurs et supérieurs du rectangle s'annulent si B tends vers l'infini, aussi puisque les intégrands sont impairs et sans singularités sur $[-Bi, Bi]$ donc leur intégrale sur ce segment est nulle. On conclut qu'on a

$$T_n(t, x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{A_n - \infty i}^{A_n + \infty i} \frac{g(w)}{wJ_\nu(w)^2} dw, \quad \forall 0 < x + t < 2, x \neq t.$$

En utilisant les deux inégalités suivantes:

$$|J_\nu(\theta w)| \leq c_1 \frac{\exp(|\operatorname{Im}(\theta w)|)}{\sqrt{|\theta w|}}, \quad |J_\nu(w)| \geq c_2 \frac{\exp(|\operatorname{Im}(w)|)}{\sqrt{|w|}}, \quad (42)$$

(ils découlent de l'expression du développement asymptotique donnée dans [11, §7.21]), avec θ est un réel positif non nul fixé, on déduit la plupart des inégalités énoncées dans la suite.

4.2 Théorie des séries de Fourier-Bessel généralisée

Soit m un entier positif. Soit E le sous-espace vectoriel des fonctions complexes sur \mathbb{R}^+ défini comme suit: $f \in E$ si les fonctions suivantes $x \in [0, 1] \mapsto f(x)$ et $x \in]0, 1] \mapsto f(\frac{1}{x})$ sont continues et bornées. On munit E de la norme scalaire $\|\cdot\|_m$ suivante:

$$\|f\|_m^2 := \int_0^1 |f(x)|^2 x dx + \int_1^\infty |f(x)|^2 \frac{dx}{x^{3+2m}} \quad \forall f \in E,$$

et nous notons par \mathcal{E}_m la complétion de E pour cette norme. Nous avons alors les propriétés suivantes:

Proposition 4.8. *On a,*

1. \mathcal{E}_0 est isométrique à $L^2([0, 1]) \oplus L^2([0, 1])$ ¹⁵.
2. $(\mathcal{E}_m)_{m \in \mathbb{N}}$ forme une suite d'espaces hilbertiens strictement croissante pour l'inclusion.
3. Soit $\nu \in \mathbb{Z}$. On considère la fonction P_ν définie presque partout sur \mathbb{R}^+ comme suit: $P_\nu(x) = x^\nu$ pour tout $x \in \mathbb{R}^{+*}$. Alors $P_\nu \in \mathcal{E}_m$ si et seulement si $\nu \in \{0, 1, \dots, m\}$.

Proof. 1. On considère l'application suivante $\Phi : f \in E \mapsto \Phi(f) = (f_1, f_2)$ où f_1 et f_2 sont deux fonctions définies presque partout sur $[0, 1]$ données par $f_1(x) = f(x)$ et $f_2(x) = f(\frac{1}{x})$ pour tout $x \in]0, 1]$. Φ définit alors une isométrie entre \mathcal{E}_0 et $L^2([0, 1])^{\oplus 2}$.

2. Soit $m < m' \in \mathbb{N}$. Donc $\|\cdot\|_{m'} \leq \|\cdot\|_m$, par conséquent $\mathcal{E}_m \subseteq \mathcal{E}_{m'}$. Soit α un réel strictement positif et g_α l'élément de E défini par: $g_\alpha(x) = 0$ si $x \in [0, 1]$ et $g_\alpha(x) = x^{-\alpha}$ si $x \geq 1$. En choisissant $m < \alpha < m'$, alors on vérifie $g_\alpha \in \mathcal{E}_{m'} \setminus \mathcal{E}_m$.

3. Soit $\nu \in \mathbb{Z}$ et on considère P_ν , la fonction définie presque partout sur \mathbb{R}^+ , par $P_\nu(x) = x^\nu$ pour tout $x \neq 0$. On a $\|P_\nu\|_m^2 = \int_0^1 x^{2\nu+1} dx + \int_1^\infty x^{2\nu-3-2m} dx$. Cette quantité est finie si et seulement si $\nu \in \{0, \dots, m\}$. □

¹⁵ Ici, $L^2([0, 1])$ désigne l'espace des fonctions complexes carré intégrables pour la mesure $x dx$ sur $[0, 1]$. Cet espace joue un rôle important dans la théorie des séries de Fourier-Bessel.

Remarque 4.9. Soit $\xi \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$. Il existe une fonction complexe g sur \mathbb{P}^1 telle que $\xi = g \otimes 1^{16}$. On vérifie que

$$\begin{aligned} \|\xi\|_{L^2, \infty}^2 &= \frac{i}{2\pi} \int_{|z| \leq 1} |g(z)|^2 dz \wedge d\bar{z} + \frac{i}{2\pi} \int_{|z| \geq 1} |g(z)|^2 \frac{dz \wedge d\bar{z}}{|z|^{4+2m}} \\ &= 2 \int_0^1 \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} |g(xe^{i\theta})|^2 d\theta \right) x dx + 2 \int_1^\infty \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} |g(xe^{i\theta})|^2 d\theta \right) \frac{dx}{x^{3+2m}} \\ &= 2 \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} \int_0^1 |g_\nu(x)|^2 x dx + 2 \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} \int_1^\infty |g_\nu(x)|^2 \frac{dx}{x^{3+2m}} \\ &= 2 \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} \|g_\nu\|_m^2, \end{aligned}$$

La 3ème égalité résulte de la théorie des séries de Fourier appliquée à la fonction $\theta \mapsto g(xe^{i\theta})$ qui est carré intégrable pour tout $x \neq 0$ (Ce dernier point provient du fait que g est continue sur $\mathbb{P}^1 \setminus \{0, \infty\}$). On peut alors écrire que:

$$\|g \otimes 1\|_{L^2, \infty}^2 = 2 \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} \|g_\nu\|_m^2. \quad (43)$$

Donc si $g \otimes 1 \in \mathcal{H}_m$ alors $g_\nu \in \mathcal{E}_m$ pour tout $\nu \in \mathbb{Z}$. Réciproquement, si l'on se donne $(g_\nu)_{\nu \in \mathbb{Z}}$ une suite d'éléments de \mathcal{E}_m telle que $\sum_{\nu \in \mathbb{Z}} \|g_\nu\|_m^2 < \infty$, alors cette suite définit un élément de \mathcal{H}_m .

Fixons $\nu \in \mathbb{Z}$. Comme $\mathcal{Z}_{m, \nu}$ est un sous-ensemble discret de \mathbb{R}^* alors on peut ordonner l'ensemble $\{\frac{\lambda^2}{4} \mid \lambda \in \mathcal{Z}_{m, \nu}\}$ et on note par λ_k la k -ème valeur de cet ensemble pour l'ordre croissant. On pose $\varphi_{\nu, k}^{(m)}$ la fonction sur \mathbb{R}^+ définie comme suit:

$$\varphi_{\nu, k}^{(m)}(x) = \begin{cases} J_n(\lambda_k x) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{J_n(\lambda_k)}{J_{n-m}(\lambda_k)} x^m J_{n-m}(\frac{\lambda_k}{x}) & \text{si } x > 1. \end{cases} \quad (44)$$

On vérifie que:

$$\varphi_{\nu, k}^{(m)} \in \mathcal{E}_m, \quad \|\varphi_{\nu, k}^{(m)}\|_{L^2, \infty}^2 = \|\varphi_{\nu, k}^{(m)}\|_m^2 \quad \text{et} \quad (f \otimes 1, \varphi_{\nu, k}^{(m)})_{L^2, \infty} = (f_\nu, \varphi_{\nu, k}^{(m)})_m \quad \forall f \otimes 1 \in \mathcal{H}^{(m)}. \quad (45)$$

Le théorème 4.2 sera un corollaire d'un résultat plus précis, à savoir le le théorème suivant:

Théorème 4.10. *En gardant les mêmes notations et hypothèses, la famille suivante:*

$$\{\varphi_{\nu, k}^{(m)} \mid k \in \mathbb{N}\} \quad (\text{resp. } \{1, x, \dots, x^m\} \cup \{\varphi_{\nu, k}^{(m)} \mid k \in \mathbb{N}\}),$$

forme une base hilbertienne dans \mathcal{E}_m lorsque $\nu \leq -1$ ou $\nu \geq m+1$ (resp. si $\nu \in \{0, 1, \dots, m\}$).

Remarque 4.11. *Notons que le cas $m = 0$ est équivalent à la théorie classique des séries de Fourier-Bessel. Par cela, on veut dire que la famille $\{1, J_\nu(\lambda r) \mid J'_\nu(\lambda) = 0\}$ (resp. $\{J_\nu(\lambda r) \mid J_\nu(\lambda) = 0\}$) forme un système total pour l'espace des fonctions L^2 sur $[0, 1]$ vérifiant la condition de Neumann (resp. la condition de Dirichlet) (voir la preuve du 4.4).*

Afin d'établir le théorème 4.10, alors il suffira de démontrer le théorème ci-dessous:

¹⁶Comme $\mathcal{O}(m)$ est engendré par ses sections globales, alors par une partition de l'unité on peut écrire $\xi = \sum_{j=0}^m g_j \otimes z^j$ où $g_j \in A^{(0,0)}(\mathbb{P}^1)$. On pose alors $g = \sum_{j=0}^m g_j z^j$.

Théorème 4.12. Soient $m \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, $\nu \in \mathbb{Z}$ et p, q deux entiers $\geq |\nu|$. Il existe deux suites réelles $(l_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(l'_k)_{k \in \mathbb{N}}$ telles que pour tout $f \in \mathcal{E}_m$, on a :

$$\delta_\nu(f, x^\nu)_m = \sum_{k=1}^{\infty} l'_k \frac{(f, \varphi_{\nu, k}^{(m)})_m}{2 \|\varphi_{\nu, k}^{(m)}\|_m^2} - \int_0^1 (x^{2p+2m-\nu+1} - x^{2q+2m-\nu+1}) f\left(\frac{1}{x}\right) dx$$

$$\delta_\nu(f, x^\nu)_m = \sum_{k=1}^{\infty} l_k \frac{(f, \varphi_{\nu, k}^{(m)})_m}{2 \|\varphi_{\nu, k}^{(m)}\|_m^2} - \int_0^1 (x^{2p+\nu+1} - x^{2q+\nu+1}) f(x) dx,$$

où $\delta_\nu = 0$ si $\nu \leq -1$ ou $\nu \geq m+1$.

En effet, si l'on fixe $m \in \mathbb{N}$ et $\nu \in \mathbb{Z}$, alors si $f \in \mathcal{E}_m$ tel que :

$$(f, x^k)_m = (f, \varphi_{\nu, \lambda}^{(m)})_m = 0 \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, m\}, \quad \forall \lambda \in \mathcal{Z}_{m, \nu},$$

alors par ce dernier théorème 4.12, nous déduisons que :

$$\int_0^1 (x^{2p+2m-\nu+1} - x^{2q+2m-\nu+1}) f\left(\frac{1}{x}\right) dx = \int_0^1 (x^{2p+\nu+1} - x^{2q+\nu+1}) f(x) dx = 0,$$

et cela pour tous p et q assez grand (pour ν fixé). Un théorème classique d'analyse nous permet alors de conclure que les deux fonctions définies presque partout sur $[0, 1]$: $x \mapsto f\left(\frac{1}{x}\right)$ et $x \mapsto f(x)$ sont nulles presque partout sur $[0, 1]$, ce qui est équivalent à :

$$f = 0,$$

dans \mathcal{E}_m .

La suite a pour but d'établir le théorème 4.12 ci-dessus. Soit $f \in \mathcal{E}_m$ une fonction sur \mathbb{R} . Nous considérons la somme partielle suivante :

$$S_n(x) := \sum_{k=1}^n \frac{(\varphi_{\nu, k}^{(m)}, f)_m}{\|\varphi_{\nu, k}^{(m)}\|_m^2} \varphi_{\nu, k}^{(m)}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

On pose pour tous $0 < t < 1$ et $0 < x < 1$:

$$\kappa_n^+(t, x) := \sum_{k=1}^n \frac{J_\nu(t\lambda_k) J_\nu(x\lambda_k)}{2 \|\varphi_{\nu, k}^{(m)}\|_m^2},$$

$$\kappa_n^-(t, x) := \sum_{k=1}^n \frac{J_{\nu-m}(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} \frac{J_{\nu-m}(x\lambda_k) J_{\nu-m}(\lambda_k t)}{\|\varphi_{\nu, k}^{(m)}\|_m^2},$$

$$\tau_n^+(t, x) := \sum_{k=1}^n \frac{J_\nu(\lambda_k)^2}{J_{\nu-m}(\lambda_k)^2} \frac{J_{\nu-m}(t\lambda_k) J_{\nu-m}(x\lambda_k)}{\|\varphi_{\nu, k}^{(m)}\|_m^2},$$

$$\tau_n^-(t, x) := \sum_{k=1}^n \frac{J_\nu(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} \frac{J_{\nu-m}(\lambda_k x) J_\nu(\lambda_k t)}{\|\varphi_{\nu, k}^{(m)}\|_m^2}.$$

On vérifie que

$$S_n(x) = \int_0^1 f(t) \kappa_n^+(t, x) t dt + \int_1^\infty \frac{f(t)}{t^m} \kappa_n^-\left(\frac{1}{t}, x\right) \frac{t dt}{t^4}, \quad \text{si } 0 \leq x \leq 1,$$

et

$$S_n(x) = \int_0^1 f(t)x^m \tau_n^-(t, \frac{1}{x}) t dt + \int_1^\infty \frac{f(t)}{t^m} x^m \tau_n^-(\frac{1}{t}, \frac{1}{x}) \frac{t dt}{t^4}, \quad \text{si } x \geq 1,$$

Donc, il est naturel d'étudier les fonctions κ_n^+ , κ_n^- , τ_n^+ et τ_n^- . Pour cela nous allons introduire les quatres fonctions méromorphes sur \mathbb{C} suivantes:

$$\begin{aligned} t_{+, \nu}(w) &= \frac{J_\nu(tw) J_\nu(xw) J_{\nu-m}(w)}{J_\nu(w) L_{m, \nu}(w)}, \\ t_{-, \nu}(w) &= \frac{J_\nu(xw) J_{\nu-m}(wt)}{L_{m, \nu}(w)}, \\ s_{+, \nu}(w) &= \frac{J_\nu(w)}{J_{\nu-m}(w)} \frac{J_{\nu-m}(xw) J_{\nu-m}(tw)}{L_{m, \nu}(w)}, \\ s_{-, \nu}(w) &= \frac{J_{\nu-m}(xw) J_\nu(tw)}{L_{m, \nu}(w)}. \end{aligned}$$

où $0 < t < 1$ et $0 < x < 1$.

Si l'on note par A_n un réel compris strictement entre λ_n et λ_{n+1} deux éléments consécutifs de $\mathcal{Z}_{m, \nu}$. Alors nous avons le théorème suivant:

Théorème 4.13. *Soit $\nu \in \mathbb{Z}$.*

1. *Si $\nu \leq -1$ ou $\nu \geq m+1$, alors on a pour tout $n \gg 1$:*

$$\frac{i}{2\pi} \int_{A_n - \infty i}^{A_n + \infty i} t_{+, \nu}(w) dw = \kappa_n^+(t, x) - \sum_{\substack{\alpha | J_\nu(\alpha) = 0 \\ 0 < \alpha < A_n}} \frac{J_\nu(t\alpha) J_\nu(x\alpha)}{J_{\nu+1}(\alpha)^2}, \quad (46)$$

$$\frac{i}{2\pi} \int_{A_n - \infty i}^{A_n + \infty i} t_{-, \nu}(w) dw = \kappa_n^-(t, x), \quad (47)$$

$$\frac{i}{2\pi} \int_{A_n - \infty i}^{A_n + \infty i} s_{+, \nu}(w) dw = \tau_n^+(t, x) - \sum_{\substack{\gamma | J_{\nu-m}(\alpha) = 0 \\ 0 < \gamma < A_n}} \frac{J_{\nu-m}(t\gamma) J_{\nu-m}(x\gamma)}{J_{\nu-m+1}(\gamma)^2}, \quad (48)$$

$$\frac{i}{2\pi} \int_{A_n - \infty i}^{A_n + \infty i} s_{-, \nu}(w) dw = \tau_n^-(t, x). \quad (49)$$

2. *Si $0 \leq \nu \leq m$, on a pour tout $n \gg 1$:*

$$\frac{i}{2\pi} \int_{A_n - \infty i}^{A_n + \infty i} t_{+, \nu}(w) dw = -2 \frac{(m - \nu + 1)(\nu + 1)}{(m + 2)} t^\nu x^\nu + \kappa_n^+(t, x) - \sum_{\substack{\alpha | J_\nu(\alpha) = 0 \\ 0 < \alpha < A_n}} \frac{J_\nu(t\alpha) J_\nu(x\alpha)}{J_{\nu+1}(\alpha)^2},$$

$$\frac{i}{2\pi} \int_{A_n - \infty i}^{A_n + \infty i} t_{-, \nu}(w) dw = -2 \frac{(m - \nu + 1)(\nu + 1)}{(m + 2)} t^{m-\nu} x^\nu + \kappa_n^-(t, x),$$

$$\frac{i}{2\pi} \int_{A_n - \infty i}^{A_n + \infty i} s_{+, \nu}(w) dw = -2 \frac{(m - \nu + 1)(\nu + 1)}{(m + 2)} t^{m-\nu} x^{m-\nu} + \tau_n^+(t, x) - \sum_{\substack{\alpha | J_{\nu-m}(\alpha) = 0 \\ 0 < \alpha < A_n}} \frac{J_{\nu-m}(t\alpha) J_{\nu-m}(x\alpha)}{J_{\nu-m+1}(\alpha)^2},$$

$$\frac{i}{2\pi} \int_{A_n - \infty i}^{A_n + \infty i} s_{-, \nu}(w) dw = -2 \frac{(m - \nu + 1)(\nu + 1)}{(m + 2)} t^\nu x^{m-\nu} + \tau_n^-(t, x).$$

Afin de démontrer ce théorème 4.13, nous commençons par calculer les résidus des fonctions $t_{+, \nu}, t_{-, \nu}, s_{+, \nu}$ et $s_{-, \nu}$ aux pôles respectifs et nous représenterons $\kappa^+(t, x), \kappa^-(t, x), \tau^+(t, x)$ et $\tau^-(t, x)$ comme intégrales des quatre premières fonctions le long d'un chemin précis. Nous aurons besoin de quelques estimations sur $L_{m, \nu}$ du type:

$$|L_{m, \nu}(\theta w)| \leq \frac{c_\nu}{(\theta|w|)} \exp(2\theta|Im(w)|), \quad |L_{m, \nu}(w)| \geq \frac{c'_\nu}{|w|} \exp(2|Im(w)|), \quad (50)$$

avec c_ν et c'_ν deux constantes réelles positives non nulles et w appartient à un ouvert contenant la droite verticale d'abscisse A_n (avec $0 < \theta < 1$). Cela sera une conséquence du lemme suivant:

Lemme 4.14. *On note par I_ν la fonction de Bessel modifiée d'ordre ν et on pose*

$$G_\nu(z) := I_{\nu+1}(z)I_{\nu-m}(z) + I_\nu(z)I_{\nu-m-1}(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

1. On a pour tout $z \in \mathbb{C}$ et tout $\nu \in \mathbb{Z}$

$$G_{-\nu}(z) = G_{m+\nu}(z), \quad (51)$$

$$L_{m, \nu}(iz) = i^{2\nu-m-1}G_\nu(z). \quad (52)$$

2. Pour z assez large avec $|\arg(z)| < \frac{\pi}{2}$, on a

$$G_{\nu+m}(z) = \frac{e^{2z}}{2\pi z} \left(1 - \frac{4\nu^2 + 2m^2 + 4\nu m + 2m + 1}{2z} + O\left(\frac{1}{z^2}\right) \right) \quad \text{si } \nu \in \mathbb{N}^*, \quad (53)$$

et

$$G_\nu(z) = \frac{e^{2z}}{2\pi z} \left(2 - \frac{2\nu^2 + m^2 - 2\nu m + m}{z} + O\left(\frac{1}{z^2}\right) \right) \quad \text{si } \nu \in \{0, 1, \dots, m\}. \quad (54)$$

Proof.

1. En utilisant les propriétés de récurrence des fonctions de Bessel, nous avons:

$$\begin{aligned} G_\nu(z) &= I_{\nu+1}(z)I_{\nu-m}(z) + I_\nu(z)I_{\nu-m-1}(z) \\ &= I_{-\nu-1}(z)I_{-\nu+m}(z) + I_{-\nu}(z)I_{-\nu+m+1}(z), \quad \text{puisque } I_{-n} = I_n, \text{ cf. [1, 9.6.6]} \\ &= I_{(m-\nu)+1}(z)I_{(m-\nu)-m}(z) + I_{(m-\nu)}(z)I_{(m-\nu)-m-1}(z) \\ &= G_{m-\nu}(z). \end{aligned}$$

Quant à l'identité 52, elle se déduit aisément de l'expression de G_ν et de la relation $I_n(iz) = i^n I_n(z)$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On a pour z assez grand avec $|\arg(z)| < \frac{\pi}{2}$:

$$I_n(z) = \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}} \left(1 - \frac{4n^2 - 1}{8z} + O\left(\frac{1}{z^2}\right) \right) \quad (\text{voir par exemple [1, 9.7.1]}) \quad (55)$$

Soit $\nu \in \mathbb{N}$. En utilisant 55, nous avons:

(a)

$$G_{\nu+m}(z) = \frac{e^{2z}}{2\pi z} \left(1 - \frac{4\nu^2 + 2m^2 + 4\nu m + 2m + 1}{2z} + O\left(\frac{1}{z^2}\right) \right) \quad \forall |z| \gg 1, |\arg(z)| < \frac{\pi}{2}.$$

- (b) Si $\nu \in \{0, 1, \dots, m\}$, on écrit $G_\nu(z) = I_{\nu+1}(z)I_{m-\nu} + I_\nu(z)I_{m+1-\nu}(z)$ (on a utilisé que $I_{-n} = I_n$). Alors on vérifie que:

$$G_\nu(z) = \frac{e^{2z}}{2\pi z} \left(2 - \frac{2\nu^2 + m^2 - 2\nu m + m}{z} + O\left(\frac{1}{z^2}\right) \right) \quad \forall |z| \gg 1, |\arg(z)| < \frac{\pi}{2}.$$

□

Maintenant on peut déduire les estimations 50 en utilisant 52, 53, 54 et 16.

Nous allons dresser la liste de tous les résidus possibles des fonctions $t_{+,\nu}$, $t_{-,\nu}$, $s_{+,\nu}$ et $s_{-,\nu}$ en leurs éventuels pÃ´les en fonction de ν (voir 1., 2. et 3. ci-dessous):

1. Soit $\nu \in \mathbb{Z}$. Afin de simplifier les notations, on note par λ un zéro positif de $L_{m,\nu}$, par α un zéro positif non nul de J_ν et par γ un zéro positif non nul de $J_{\nu-m}$. On sait que ces zéros sont simples et on vérifie que $L_{m,\nu}(\alpha) = -J_{\nu-m}(\alpha)J'_\nu(\alpha)$ et $L_{m,\nu}(\gamma) = -J_\nu(\gamma)J'_{\nu-m}(\gamma)$. Par conséquent:

$$\begin{aligned} \text{Res}_\lambda(t_{+,\nu}) &= \frac{J_\nu(t\lambda)J_\nu(x\lambda)J_{\nu-m}(\lambda)}{J_\nu(\lambda)L'_{m,\nu}(\lambda)} = \frac{J_\nu(t\lambda)J_\nu(x\lambda)}{2\|\varphi_{\nu,\lambda}^{(m)}\|_m^2} \quad (\text{on a utilisé 3.5 et 45}), \\ \text{Res}_\alpha(t_{+,\nu}) &= \frac{J_\nu(x\alpha)J_\nu(t\alpha)J_{\nu-m}(\alpha)}{J'_\nu(\alpha)L_{m,\nu}(\alpha)} = -\frac{J_\nu(t\alpha)J_\nu(x\alpha)}{J'_\nu(\alpha)^2}, \\ \text{Res}_\lambda(t_{-,\nu}) &= \frac{J_\nu(x\lambda)J_{\nu-m}(t\lambda)}{L'_{m,\nu}(\lambda)} = \frac{J_\nu(\lambda)}{J_{\nu-m}(\lambda)} \frac{J_\nu(x\lambda)J_{\nu-m}(\lambda t)}{\|\varphi_{\nu,\lambda}^{(m)}\|_m^2}, \\ \text{Res}_\lambda(s_{+,\nu}) &= \frac{J_\nu(\lambda)}{J_{\nu-m}(\lambda)} \frac{J_{\nu-m}(t\lambda)J_{\nu-m}(x\lambda)}{L'_{m,\nu}(\lambda)} = \frac{J_\nu(\lambda)^2}{J_{\nu-m}(\lambda)^2} \frac{J_{\nu-m}(t\lambda)J_{\nu-m}(x\lambda)}{\|\varphi_{\nu,\lambda}^{(m)}\|_m^2} \\ \text{Res}_\gamma(s_{+,\nu}) &= -\frac{J_\nu(\gamma)}{J'_{\nu-m}(\gamma)^2} \frac{J_{\nu-m}(t\gamma)J_{\nu-m}(x\gamma)}{J_\nu(\gamma)} = -\frac{J_{\nu-m}(t\gamma)J_{\nu-m}(x\gamma)}{J_{\nu-m+1}(\gamma)^2}, \\ \text{Res}_\lambda(s_{-,\nu}) &= \frac{J_\nu(\lambda)}{J_{\nu-m}(\lambda)} \frac{J_{\nu-m}(\lambda x)J_\nu(\lambda t)}{L'_\nu(w)} = \frac{J_\nu(\lambda)}{J_{\nu-m}(\lambda)} \frac{J_{\nu-m}(\lambda x)J_\nu(\lambda t)}{\|\varphi_{\nu,\lambda}^{(m)}\|_m^2}. \end{aligned} \tag{56}$$

2. Par contre ces fonctions ci-dessus peuvent, en fonction de ν , avoir un pÃ´le en $w = 0$. Comme J_p est d'ordre $|p|$ en zéro et en utilisant lemme 3.2, alors on peut calculer explicitement l'ordre de ces fonctions en $w = 0$ en fonction de ν . En effet, lorsque $\nu \leq -1$ ou $\nu \geq m + 1$, on a:

$$\begin{aligned} \text{Ord}_0(t_{+,\nu}) &= (2\nu + \nu + m) - (\nu + 2\nu + m - 1) = 1, \\ \text{Ord}_0(t_{-,\nu}) &= (2\nu + \nu + m) - (2\nu + m - 1) = 1, \\ \text{Ord}_0(s_{+,\nu}) &= 1, \\ \text{Ord}_0(s_{-,\nu}) &= 1. \end{aligned}$$

3. Si $\nu \in \{0, 1, \dots, m\}$. Nous montrons que $t_{+,\nu}$, $t_{-,\nu}$, $s_{+,\nu}$ et $s_{-,\nu}$ sont d'ordre -1 en $w = 0$ pour cela on va calculer leur résidu en $w = 0$. Les calculs suivants découlent directement de la formule 65 et du lemme 3.2. On établit que:

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}_0(t_{+, \nu}) &= 2 \frac{(m - \nu + 1)(\nu + 1)}{(m + 2)} t^\nu x^\nu, \\
\operatorname{Res}_0(t_{-, \nu}) &= 2 \frac{(m - \nu + 1)(\nu + 1)}{(m + 2)} t^{m-\nu} x^\nu, \\
\operatorname{Res}_0(s_{+, \nu}) &= 2 \frac{(m - \nu + 1)(\nu + 1)}{(m + 2)} t^{m-\nu} x^{m-\nu}, \\
\operatorname{Res}_0(s_{-, \nu}) &= 2 \frac{(m - \nu + 1)(\nu + 1)}{(m + 2)} t^\nu x^{m-\nu}.
\end{aligned} \tag{57}$$

Maintenant on se propose de démontrer le théorème 4.13. Soit $\nu \in \mathbb{Z}$. Commençons par exemple par $t_{+, \nu}$ (avec ν un entier quelconque). Soit A_n un réel positif strictement compris entre λ_n et λ_{n+1} deux zéros consécutifs de $L_{m, \nu}$, $B > 0$ et $0 < \varepsilon \ll 1$. On considère R_n le chemin fermé dans \mathbb{C} suivant: $[iB, A_n + iB] \cup [A_n + iB, A_n - iB] \cup [-iB, A_n - iB] \cup [-iB, -i\varepsilon] \cup D_\varepsilon \cup [i\varepsilon, iB]$ où D_ε est le demi-cercle de centre $w = 0$ à gauche de l'axe imaginaire et de rayon ε . On a par un simple calcul de résidus et en utilisant 56:

$$\int_{R_n} t_{+, \nu}(w) dw = -\operatorname{Res}_0(t_{+, \nu}) + \sum_{k=1}^n \frac{J_{\nu+m}(t\lambda_k) J_{\nu+m}(x\lambda_k)}{2 \|\varphi_{\nu, k}^{(m)}\|_m^2} - \sum_{\substack{\alpha | J_{\nu+m}(\alpha)=0 \\ 0 < \alpha < A_n}} \frac{J_{\nu+m}(t\alpha) J_{\nu+m}(x\alpha)}{J_{\nu+m+1}(\alpha)^2}.$$

On pose $w = u + iv$ avec $u, v \in \mathbb{R}$ et on suppose que $t, x > 0$ avec $0 < t + x < 2$. On obtient, en utilisant 50 et 42:

$$\begin{aligned}
|t_{+, \nu}(w)| &= \left| \frac{J_{\nu+m}(tw) J_{\nu+m}(xw) J_\nu(w)}{J_{\nu+m}(w) L_{m, \nu}(w)} \right| \\
&\leq \frac{c_{+, \nu}}{\sqrt{tx}} \exp(-(2 - (t + x))|v|),
\end{aligned} \tag{58}$$

pour tout w dans un voisinage ouvert de la droite verticale d'abscisse A_n ($c_{+, \nu}$ une constante réelle). Par conséquent

$$\lim_{B \rightarrow \infty} \int_{-Bi}^{A_n - Bi} t_{+, \nu}(w) dw = \lim_{B \rightarrow \infty} \int_{Bi}^{A_n + Bi} t_{+, \nu}(w) dw = 0$$

Quant à la contribution de $t_{+, \nu}$ sur la partie $[-iB, -i\varepsilon] \cup D_\varepsilon \cup [i\varepsilon, iB]$, nous utilisons le fait que $t_{+, \nu}$ est une fonction impaire (cela résulte de la relation 16 et que $J_p(-z) = (-1)^p J_p(z)$, $\forall p \in \mathbb{N}, \forall z \in \mathbb{C}$). Cela implique que l'intégrale le long du segment $[-Bi, -\varepsilon i] \cup D_\varepsilon \cup [i\varepsilon, iB]$ est donnée par $\operatorname{Res}_0(t_{+, \nu})$. En combinant tout cela, nous obtenons:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{A_n - \infty i}^{A_n + \infty i} t_{+, \nu}(w) dw = -\operatorname{Res}_0(t_{+, \nu}) + \sum_{k=1}^n \frac{J_{\nu+m}(t\lambda_k) J_{\nu+m}(x\lambda_k)}{2 \|\varphi_{\nu, k}^{(m)}\|_m^2} - \sum_{\substack{\alpha | J_{\nu+m}(\alpha)=0 \\ 0 < \alpha < A_n}} \frac{J_{\nu+m}(t\alpha) J_{\nu+m}(x\alpha)}{J_{\nu+m+1}(\alpha)^2}.$$

Et en utilisant 57 cela termine la preuve du théorème pour les formules en $t_{+, \nu}$ pour $\nu \in \mathbb{Z}$ quelconque.

De la même manière on peut établir qu'il existe des constantes réelles $c_{-, \nu}$, $d_{+, \nu}$ et $d_{-, \nu}$ telles que:

$$\begin{aligned} |t_{-, \nu}(w)| &\leq \frac{c_{-, \nu}}{\sqrt{tx}} \exp(-(2 - (t + x))|v|), \\ |s_{+, \nu}(w)| &\leq \frac{d_{+, \nu}}{\sqrt{tx}} \exp(-(2 - (t + x))|v|), \\ |s_{-, \nu}(w)| &\leq \frac{d_{-, \nu}}{\sqrt{tx}} \exp(-(2 - (t + x))|v|), \end{aligned}$$

valables pour tout w dans un domaine contenant la droite verticale d'abscisse A_n et on suit le même raisonnement pour trouver les formules restantes. Ce qui termine la preuve du théorème 4.13.

Lemme 4.15. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$. Si $\frac{k-2}{4} \in \mathbb{N}$ alors il existe des réels $b_{1,k}, \dots, b_{\frac{k-2}{4},k}$ tels que

$$\int_0^1 t^{k+1+n} J_n(tw) dt = \frac{J_{n+1}(w)}{w} - k \frac{J_{n+2}(w)}{w^2} + \sum_{i=1}^{\frac{k-2}{4}} b_{i,k} \frac{J_{n+i+2}(w)}{w^{i+2}}, \quad \forall w \in \mathbb{C}^*.$$

Proof. En utilisant la formule 68, on a par une intégration par parties:¹⁷

$$\begin{aligned} \int_0^w t^{k+n+1} J_n(t) dt &= [t^{k+n+1} J_{n+1}(t)]_0^w - k \int_0^w t^{k+n} J_{n+1}(t) dt \\ &= w^{k+n+1} J_{n+1}(w) - k [t^{k+n} J_{n+2}(t)]_0^w + k(k-2) \int_0^w t^{k+n-1} J_{n+2}(t) dt \\ &= w^{k+n+1} J_{n+1}(w) - k w^{k+n} J_{n+2}(w) \\ &\quad + k(k-2) [t^{k+n-1} J_{n+3}(t)]_0^w - k(k-2)(k-4) \int_0^w t^{k+n-2} J_{n+3}(t) dt \\ &= w^{k+n+1} J_{n+1}(w) + \sum_{i=0}^p (-1)^{i+1} k(k-2)(k-4) \cdots (k-2i) w^{k+n-i} J_{n+i+2}(w) \\ &\quad + (-1)^{p+1} k(k-2) \cdots (k-2(i+1)) \int_0^w t^{k+n-p-1} J_{n+p+2}(t) dt. \end{aligned}$$

On s'arrête lorsque $(k+n-p-1) - 1 = n+p+2$, c'est à dire lorsque $p = \frac{k-4}{2}$. On termine la preuve en notant que $\int_0^1 t^{k+n+1} J_n(tw) dt = \frac{1}{w^{k+n+2}} \int_0^w t^{k+n+1} J_n(t) dt$ pour tout $w \neq 0$. \square

Corollaire 4.16. Soient p et q deux entiers positifs supérieurs à 2. Il existe des constantes réelles $c_1, c_2, \dots, c_{\max(p-2, q-2)}$ telles que

$$\int_0^1 (t^{2p+n+1} - t^{2q+n+1}) J_n(tw) dt = 2 \frac{q-p}{w^2} J_{n+2}(w) + \sum_{i=1}^{\max(p-2, q-2)} c_i \frac{J_{n+i+2}(w)}{w^{i+2}}.$$

Proof. C'est une conséquence immédiate du lemme précédent. \square

En fonction de ν , nous allons établir que la fonction réelle $x \mapsto x^{2p+\nu+1} - x^{2q+\nu+1}$ admet un développement de type Bessel-Fourier dans le contexte de cet article. C'est l'objet des théorèmes 4.17 et 4.18 qui constitueront le noyau de la preuve du théorème 4.12.

¹⁷Le signe \int_0^w signifie l'intégration le long du segment $[0, w]$ dans le plan complexe.

Théorème 4.17. Soit $\nu \in \mathbb{Z}$. Si $\nu \leq -1$ ou $\nu \geq m+1$ alors pour $p, q \in \mathbb{N}$ assez grands, il existe des constantes réelles l_k et l'_k pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ telles qu'on a convergence uniforme sur $[0, 1]$ des séries suivantes:

1. (a)

$$\sum_{k=1}^{\infty} l_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu}(x\lambda_k)}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} = x^{2p+\nu+\frac{1}{2}} - x^{2q+\nu+\frac{1}{2}},$$

(b)

$$\sum_{k=1}^{\infty} l'_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu}(x\lambda_k)}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} = 0,$$

2. (a)

$$\sum_{k=1}^{\infty} l'_k \frac{J_{\nu}(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu-m}(x\lambda_k)}{\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} = x^{2p+\nu-m+\frac{1}{2}} - x^{2q+\nu-m+\frac{1}{2}},$$

(b)

$$\sum_{k=1}^{\infty} l_k \frac{J_{\nu}(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu-m}(x\lambda_k)}{\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} = 0.$$

Proof. Soit $\nu \in \mathbb{Z}$. On fixe p et q deux entiers supérieurs à $|\nu|$.

1. (a) D'après le corollaire 4.16, il existe des constantes réelles $c_{i,\nu}$ telles que pour tout w dans un ouvert ne contenant pas les pÃˆles de $t_{+,\nu}$, on a

$$\begin{aligned} \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) t_{+,\nu}(w) dt &= \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) J_{\nu}(tw) dt \frac{J_{\nu}(xw) J_{\nu-m}(w)}{J_{\nu}(w) L_{m,\nu}(w)}, \\ &= 2 \frac{q-p}{w^2} J_{\nu+2}(w) \frac{J_{\nu}(xw) J_{\nu-m}(w)}{J_{\nu}(w) L_{m,\nu}(w)} + \sum_{i=1}^{\max(p-2, q-2)} c_{i,\nu} \frac{J_{n+i+2}(w)}{w^{i+2}} \frac{J_{\nu}(xw) J_{\nu-m}(w)}{J_{\nu}(w) L_{m,\nu}(w)}. \end{aligned}$$

En utilisant 50, il existe une constante $c_{\nu,++}$ telle que:

$$\begin{aligned} \left| \int_{A_n-i\infty}^{A_n+i\infty} \frac{J_{n+i+2}(w)}{w^{i+2}} \frac{J_{\nu}(xw) J_{\nu-m}(w)}{J_{\nu}(w) L_{m,\nu}(w)} dw \right| &\leq \int_{A_n-i\infty}^{A_n+i\infty} \frac{c_{\nu,++}}{\sqrt{x}|w|^{i+2}} \exp(-(1-x)|v|) |dw| \\ &\leq \frac{c_{\nu,++}}{\sqrt{x}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(A_n^2 + v^2)} dv, \quad \text{puisque } 0 < x < 1 \\ &= \frac{\pi c_{\nu,++}}{\sqrt{x} A_n}. \end{aligned}$$

Par suite, il existe une constante C_{ν} telle que

$$\left| \int_{A_n-i\infty}^{A_n+i\infty} \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) x^{\frac{1}{2}} t_{+,\nu}(w) dt \right| \leq \frac{C_{\nu}}{A_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, x \in [0, 1]. \quad (59)$$

Notons que $\int_{A_n-i\infty}^{A_n+i\infty} \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) t_{+,\nu}(w) dt = \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) \int_{A_n-i\infty}^{A_n+i\infty} t_{+,\nu}(w) dt$. En effet, pour $x \in]0, 1[$ fixé, on a $t_{+,\nu}$ considérée comme une fonction en t et w est absolument intégrable (d'après 58).

On suppose que $\nu \leq -1$ ou $\nu \geq m + 1$. En utilisant 46 du théorème 4.13, 59 devient:

$$\left| \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) x^{\frac{1}{2}} \kappa_n^+(t, x) dt - \sum_{\substack{\alpha | J_\nu(\alpha) = 0 \\ 0 < \alpha < A_n}} \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) x^{\frac{1}{2}} \frac{J_\nu(t\alpha) J_\nu(x\alpha)}{J_{\nu+1}(\alpha)^2} dt \right| \leq \frac{C_\nu}{A_n}, \quad (60)$$

pour tout $x \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}$.

Montrons que la somme

$$\sum_{\substack{\alpha | J_\nu(\alpha) = 0 \\ 0 < \alpha < A_n}} \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) x^{\frac{1}{2}} \frac{J_\nu(t\alpha) J_\nu(x\alpha)}{J_{\nu+1}(\alpha)^2} dt,$$

converge uniformément vers la fonction $x \mapsto x^{2p+\nu+\frac{1}{2}} - x^{2q+\nu+\frac{1}{2}}$ sur $[0, 1]$ lorsque n tend vers l'infini. En effet, on a d'une part la fonction $x \mapsto x^{2p+\nu} - x^{2q+\nu}$ est dérivable sur $]0, 1[$ et s'annule en $x = 1$ alors (d'après [11, §18.26]) son développement en série de Fourier-Bessel converge uniformément vers cette fonction sur un intervalle de la forme $[1 - \delta, 1]$ avec $\delta > 0$ quelconque. D'autre part, le résultat du ([11, p. 617] voir premier paragraphe) nous fournit la convergence sur $[0, 1 - \delta]$, avec $\delta > 0$ arbitraire. En combinant cela avec 60, on déduit que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) x^{\frac{1}{2}} \kappa_n^+(t, x) dt = x^{2p+\nu+\frac{1}{2}} - x^{2q+\nu+\frac{1}{2}}, \quad (61)$$

uniformément sur $[0, 1]$.

Si l'on pose $l_k := \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) J_\nu(t\lambda_k) dt$. Alors, l'assertion précédente devient:

$$\sum_{k=1}^{\infty} l_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_\nu(x\lambda_k)}{2 \|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} = x^{2p+\nu+\frac{1}{2}} - x^{2q+\nu+\frac{1}{2}},$$

uniformément sur $[0, 1]$.

- (b) Si l'on considère $t_{-, \nu}$ et en utilisant le même raisonnement précédent et 47, on obtient avec le même raisonnement précédent que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) x^{\frac{1}{2}} \kappa_n^-(t, x) dt = 0, \quad (62)$$

uniformément sur $[0, 1]$. En posant $l'_k := \frac{J_\nu(\lambda_k)}{J_{m-\nu}(\lambda_k)} \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) J_{m-\nu}(t\lambda_k) dt$, la dernière assertion devient:

$$\sum_{k=1}^{\infty} l'_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_\nu(x\lambda_k)}{2 \|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} = 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

uniformément sur $[0, 1]$.

2. (a) Par application du 4.16, on montre aussi que:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (t^{2p+\nu+1} - t^{2q+\nu+1}) s_{+,\nu}(w) dt &= \int_0^1 (t^{2p+\nu-m+1} - t^{2q+\nu-m+1}) J_{\nu-m}(tw) dt \frac{J_\nu(w)}{J_{\nu-m}(w)} \frac{J_{\nu-m}(xw) J_{\nu-m}(w)}{J_{\nu-m}(w) L_{m,\nu}(w)}, \\ &= 2 \frac{q-p}{w^2} J_{\nu-m+2}(w) \frac{J_\nu(w)}{J_{\nu-m}(w)} \frac{J_{\nu-m}(xw) J_{\nu-m}(w)}{J_{\nu-m}(w) L_{m,\nu}(w)} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{\max(p-2, q-2)} c_{i,\nu-m} \frac{J_{\nu-m+i+2}(w)}{w^{i+2}} \frac{J_\nu(w)}{J_{\nu-m}(w)} \frac{J_{\nu-m}(xw) J_{\nu-m}(w)}{J_{\nu-m}(w) L_{m,\nu}(w)}. \end{aligned}$$

Et comme avant, on peut trouver C'_ν une constante réelle telle que:

$$\left| \int_{A_n-i\infty}^{A_n+i\infty} \int_0^1 (t^{2p+\nu-m+1} - t^{2q+\nu-m+1}) s_{+,\nu}(w) dt \right| \leq \frac{C_\nu}{\sqrt{x} A_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]0, 1[.$$

Cette dernière inégalité combinée avec 48, nous permet de déduire que:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (t^{2p+\nu-m+1} - t^{2q+\nu-m+1}) x^{\frac{1}{2}} \tau_n^+(t, x) dt \\ &= \sum_{\substack{\gamma | J_{\nu-m}(\gamma)=0 \\ 0 < \gamma}} \int_0^1 (t^{2p+\nu-m+1} - t^{2q+\nu-m+1}) J_{\nu-m}(t\gamma) dt x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu-m}(x\gamma)}{J_{\nu-m+1}(\gamma)^2} dt \\ &= x^{2p+\nu-m+\frac{1}{2}} - x^{2q+\nu-m+\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

uniformément sur $[0, 1]$. En d'autres termes, la somme suivante converge uniformément vers $x^{2p+\nu-m+\frac{1}{2}} - x^{2q+\nu-m+\frac{1}{2}}$ sur $[0, 1]$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} l'_k \frac{J_\nu(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu-m}(x\lambda_k)}{\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} = x^{2p+\nu-m+\frac{1}{2}} - x^{2q+\nu-m+\frac{1}{2}}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

où $l'_k = \frac{J_\nu(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} \int_0^1 (t^{2p+m-\nu+1} - t^{2q+m-\nu+1}) J_{m-\nu}(t\lambda_k) dt$.

(b) Pour la dernière formule, on considère $s_{-,\nu}$ et on montre comme avant que (en utilisant 49):

$$\sum_{k=1}^{\infty} l_k \frac{J_\nu(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} \frac{J_{\nu-m}(x\lambda_k)}{\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} = 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

avec convergence uniforme sur $[0, 1]$. □

Le théorème suivant traite le cas restant, c-à-d $\nu \in \{0, 1, \dots, m\}$:

Théorème 4.18. *Pour tout $\nu \in \{0, 1, \dots, m\}$, il existe $\delta_\nu \in \mathbb{R}^*$ tel que pour tout $x \in [0, 1]$:*

1. (a)

$$\delta_\nu x^{\nu+\frac{1}{2}} = \sum_{k=1}^{\infty} l_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_\nu(x\lambda_k)}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} - (x^{2p+\nu+\frac{1}{2}} - x^{2q+\nu+\frac{1}{2}}),$$

(b)

$$\delta_{m-\nu} x^{\nu+\frac{1}{2}} = \sum_{k=1}^{\infty} l'_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu}(x\lambda_k)}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2}.$$

2. (a)

$$\delta_{m-\nu} x^{m-\nu+\frac{1}{2}} = \sum_{k=1}^{\infty} l'_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu}(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} \frac{J_{\nu-m}(x\lambda_k)}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} - (x^{2p+m-\nu+\frac{1}{2}} - x^{2q+m-\nu+\frac{1}{2}}),$$

(b)

$$\delta_{\nu} x^{m-\nu+\frac{1}{2}} = \sum_{k=1}^{\infty} l_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu}(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} \frac{J_{\nu-m}(x\lambda_k)}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2},$$

En plus, on a convergence uniforme de ces sommes sur $[0, 1]$. (Les constantes l_k et l'_k sont les mêmes qu'au théorème 4.17.)

Proof. Soit $\nu \in \{0, 1, \dots, m\}$. En utilisant (2.) du théorème 4.13, alors la preuve de ce théorème suit le même raisonnement fait pour établir théorème 4.17. On trouve:

$$\begin{aligned} 2 \frac{(\nu+1)(m-\nu+1)(q-p)}{(m+2)(p+\nu+1)(q+\nu+1)} x^{\nu+\frac{1}{2}} &= \sum_{k=1}^{\infty} l_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu}(x\lambda_k)}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} - (x^{2p+\nu+\frac{1}{2}} - x^{2q+\nu+\frac{1}{2}}), \\ 2 \frac{(\nu+1)(m-\nu+1)(q-p)}{(m+2)(p+m-\nu+1)(q+m-\nu+1)} x^{\nu+\frac{1}{2}} &= \sum_{k=1}^{\infty} l'_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu}(x\lambda_k)}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2}, \\ 2 \frac{(\nu+1)(m-\nu+1)(q-p)}{(m+2)(p+m-\nu+1)(q+m-\nu+1)} x^{m-\nu+\frac{1}{2}} &= \sum_{k=1}^{\infty} l'_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu}(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} \frac{J_{\nu-m}(x\lambda_k)}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} - (x^{2p+m-\nu+\frac{1}{2}} - x^{2q+m-\nu+\frac{1}{2}}), \\ 2 \frac{(\nu+1)(m-\nu+1)(q-p)}{(m+2)(p+\nu+1)(q+\nu+1)} x^{m-\nu+\frac{1}{2}} &= \sum_{k=1}^{\infty} l_k x^{\frac{1}{2}} \frac{J_{\nu}(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} \frac{J_{\nu-m}(x\lambda_k)}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2}, \end{aligned}$$

avec convergence uniforme sur $[0, 1]$. On pose $\delta_{\nu} = 2 \frac{(\nu+1)(m-\nu+1)(q-p)}{(m+2)(p+\nu+1)(q+\nu+1)}$, $\forall \nu \in \{0, 1, \dots, m\}$. □

Maintenant, on se propose d'établir le théorème 4.12. Soit $\nu \in \mathbb{Z}$. Si $\nu \leq -1$ ou $\nu \geq m+1$ on pose $\delta_{\nu} = 0$, sinon δ_{ν} est le réel dans 4.18.

Soit $f \in \mathcal{E}_m$. D'après 4.17 et 4.18, nous avons montré qu'il existe des constantes réelles δ_{ν} qui ne dépendent pas de f vérifiant $\delta_{\nu} = 0$ si $\nu \leq -1$ ou $\nu \geq m+1$ telles que:

D'après 1.(a) et 2.(b) du théorème 4.17 (resp. 1.(a) et 2.(b) du théorème 4.18), on a pour tout $\nu \leq -1$ ou $\nu \geq m+1$ (resp. pour tout $\nu \in \{0, 1, \dots, m\}$):

$$\begin{aligned} \delta_{\nu} \int_0^1 x^{\nu+1} f(x) dx &= \sum_{k=1}^{\infty} l_k \frac{\int_0^1 f(x) J_{\nu}(x\lambda_k) x dx}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} - \int_0^1 (x^{2p+\nu+1} - x^{2q+\nu+1}) f(x) dx, \\ \delta_{\nu} \int_0^1 x^{2m-\nu+1} f\left(\frac{1}{x}\right) dx &= \sum_{k=1}^{\infty} l_k \frac{J_{\nu}(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} \frac{\int_0^1 x^m f\left(\frac{1}{x}\right) J_{\nu-m}(x\lambda_k) x dx}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2}, \end{aligned} \tag{63}$$

D'après 1.(b) et 2.(a) du théorème 4.17 (resp. 1.(b) et 2.(a) du théorème 4.18), on a pour tout $\nu \leq -1$ ou $\nu \geq m+1$ (resp. pour tout $\nu \in \{0, 1, \dots, m\}$):

$$\begin{aligned}
\delta_{m-\nu} \int_0^1 x^{2m-\nu+1} f\left(\frac{1}{x}\right) dx &= \sum_{k=1}^{\infty} l'_k \frac{J_\nu(\lambda_k)}{J_{\nu-m}(\lambda_k)} \frac{\int_0^1 x^m f\left(\frac{1}{x}\right) J_{\nu-m}(x\lambda_k) x dx}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} - \int_0^1 (x^{2p+2m-\nu+1} - x^{2q+2m-\nu+1}) f\left(\frac{1}{x}\right) dx, \\
\delta_{m-\nu} \int_0^1 x^{\nu+1} f(x) dx &= \sum_{k=1}^{\infty} l'_k \frac{\int_0^1 f(x) J_\nu(x\lambda_k) x dx}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2},
\end{aligned} \tag{64}$$

(Rappelons que si $\nu \in \{0, 1, \dots, m\}$, on a $(f, x^\nu)_m = \int_0^1 x^{\nu+1} f(x) dx + \int_0^1 x^{2m-\nu+1} f(x) dx$. Par contre lorsque $\nu \leq -1$ ou $\geq m+1$, on fait la convention suivante $(f, x^\nu)_m := 0$). En additionnant les deux équations du 63 (resp 64), on obtient:

$$\begin{aligned}
\delta_\nu(f, x^\nu)_m &= \sum_{k=1}^{\infty} l_k \frac{(f, \varphi_{\nu,k}^{(m)})_m}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} - \int_0^1 (x^{2p+\nu+1} - x^{2q+\nu+1}) f(x) dx, \\
\delta_{\nu-m}(f, x^\nu)_m &= \sum_{k=1}^{\infty} l'_k \frac{(f, \varphi_{\nu,k}^{(m)})_m}{2\|\varphi_{\nu,k}^{(m)}\|_m^2} - \int_0^1 (x^{2p+2m-\nu+1} - x^{2q+2m-\nu+1}) f\left(\frac{1}{x}\right) dx.
\end{aligned}$$

Ce termine la preuve du théorème 4.12.

5 Annexe

On rappelle le résultat suivant:

Proposition 5.1. (Formule de Green) Soit X une variété complexe de dimension d et $A \subset X$ un ouvert relativement compact tel que \bar{A} soit une sous-variété réelle à coins de X . Soient f et g deux formes différentielles de classes \mathcal{C}^2 au voisinage de \bar{A} de bidegrés (p, p) et (q, q) telles que $p + q = d - 1$. On a:

$$\int_A (f dd^c g - g dd^c f) = \int_{\partial A} (f d^c g - g d^c f)$$

Proof. Voir par exemple [4]. □

On rappelle qu'un ensemble $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de vecteurs orthogonaux deux à deux dans \mathcal{H} , un espace hilbertien, est dit total si et seulement si l'ensemble S formé des combinaisons linéaires finies $\sum_{k=1}^n a_k \varphi_k$ des φ_k est dense dans \mathcal{H} .

Proposition 5.2. Une suite orthogonale $(\phi_j)_{j \in \mathbb{N}}$ de vecteurs d'un espace de Hilbert H est totale si et seulement si le vecteur nul est l'unique vecteur orthogonal à tous les ϕ_j .

Proof. Voir par exemple [3, théorème 12, p.366]. □

La proposition suivante donne une description d'une extension maximale autoadjointe associée à un opérateur positif admettant une famille de vecteurs propres formant un système total.

Lemme 5.3. Soit H un espace de Hilbert avec produit hermitien noté (\cdot, \cdot) .

Soit $\Delta : D \subset H \rightarrow H$ un opérateur linéaire, où D est un sous-espace linéaire dense de H . Soit $(\phi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une base orthonormale de H , et on suppose qu'il existe $0 \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \dots$ une suite croissante de réels positifs tels que:

$$(\phi_k, \Delta \psi) = \lambda_k (\phi_k, \psi) \quad \forall \psi \in D, \forall k \in \mathbb{N}.$$

On pose $H_2 := \{\psi = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \phi_k \in H \mid a_k \in \mathbb{C}, \forall k \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k^2 |a_k|^2 < \infty\}$ et soit Q l'opérateur linéaire défini sur H_2 en posant:

$$Q(\psi) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k a_k \phi_k,$$

pour $\psi = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \phi_k \in H_2$.

Si $D \subset H_2$, alors Q est une extension maximale autoadjointe de Δ dans H_2 .

Proof. Vérifions d'abord que Q est une extension de Δ , soit $\psi \in D$ et montrons que $Q(\psi) = \Delta(\psi)$. Il existe deux suites de nombres complexes $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ telles que $\psi = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \phi_k$ et $\Delta\psi = \sum_{k=0}^{\infty} b_k \phi_k$. Donc, $\overline{b_k} = (\phi_k, \Delta\psi) = \lambda_k (\phi_k, \psi) = \lambda_k \overline{a_k}$, par suite $\Delta\psi = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k a_k \psi_k = Q(\psi)$.

$$(Q(\psi), \psi') = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k a_k \overline{a'_k} = (\psi, Q(\psi')), \quad \forall \psi, \psi' \in H_2.$$

donc Q est autoadjoint.

Maintenant, soit $T : D' \subset H \rightarrow H$ est un opérateur linéaire autoadjoint qui étend Q (c'est à dire $H_2 \subset D'$ et $T|_D = \Delta$). Soit $\psi \in D'$, il existe deux suites de nombres complexes $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ telles que $\psi = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \phi_k$ et $T\psi = \sum_{k \in \mathbb{N}} b_k \phi_k$. Comme T est autoadjoint, alors $(Tw, \psi) = (w, T\psi)$ pour tout $w \in D'$. En particulier, $(T\psi_k, \psi) = (\psi_k, T\psi)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. On en tire que $\lambda_k \overline{a_k} = \overline{b_k}$. Par suite, $\sum_{k \in \mathbb{N}} \lambda_k^2 |a_k|^2 = \sum_{k \in \mathbb{N}} |b_k|^2 < \infty$, donc $\psi \in H_2$. On a donc montré que $D' = H_2$. \square

5.1 Rappels sur la théorie des fonctions de Bessel

Quelques propriétés de fonctions de Bessel utilisées dans cet article. Dans cette introduction à la théorie des fonctions de Bessel, la principale référence sera le chapitre 17 du [12], on s'intéressera à une sous-classe de fonctions de Bessel à savoir les fonctions de Bessel d'ordre un entier.

Pour tout $z \in \mathbb{C}$ fixé, la fonction:

$$t \mapsto e^{\frac{1}{2}z(t - \frac{1}{t})}, \quad t \neq 0,$$

admet un développement en série de Laurent en t . Soit $n \in \mathbb{Z}$. Par définition, la fonction de Bessel d'ordre n est la fonction qui à tout $z \in \mathbb{C}$, associe le coefficient de t^n dans ce développement, on le note par $J_n(z)$. énonçons quelques propriétés de la fonction J_n :

- J_n est une fonction analytique sur \mathbb{C} telle que $J_{-n} = (-1)^n J_n$ et

$$J_n(z) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r (\frac{1}{2}z)^{n+2r}}{\Gamma(r+1)\Gamma(n+r+1)}, \quad \text{si } n \in \mathbb{N} \quad (65)$$

- J_n est une solution de l'équation différentielle linéaire suivante:

$$\frac{d^2 y}{dz^2} + \frac{1}{z} \frac{dy}{dz} + \left(1 - \frac{n^2}{z^2}\right) y = 0 \quad (66)$$

On a les relations de récurrence suivantes:

-

$$\frac{d}{dz}(z^{-n}J_n(z)) = -z^{-n}J_{n+1}(z). \quad (67)$$

-

$$\frac{d}{dz}(z^n J_n(z)) = z^n J_{n-1}(z) \quad (68)$$

- Les zéros de J_n sont réels.

- Pour tous $a \neq b$, on a:

$$\int_0^1 x J_n(ax) J_n(bx) dx = \frac{1}{b^2 - a^2} (a J_n(b) J'_n(a) - b J_n(a) J'_n(b)), \quad (69)$$

et

$$\int_0^1 x J_n(ax)^2 dx = \frac{1}{2} (J'_n(a)^2 + (1 - \frac{n^2}{a^2}) J_n(a)^2). \quad (70)$$

voir par exemple [12, p. 381, 18.]

Soient $Z_m = \{j_{m,1} < j_{m,2} < \dots\}$ l'ensemble des zéros positifs non nuls de J_m ordonnés par ordre croissant, voir par exemple [11, §15]. Soient $D_m := \{c_{m,1} < c_{m,2} < \dots\}$ les zéros positifs non nuls de J'_m ordonnés par ordre croissant. Comme les zéros de J_m sont simples, voir par exemple [11, §15.21], alors

$$Z_m \cap D_m = \emptyset. \quad (71)$$

References

- [1] Milton Abramowitz and Irene A. Stegun, editors. *Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables*. Dover Publications Inc., New York, 1992. Reprint of the 1972 edition.
- [2] Nicole Berline, Ezra Getzler, and Michèle Vergne. *Heat kernels and Dirac operators*. Grundlehren Text Editions. Springer-Verlag, Berlin, 2004. Corrected reprint of the 1992 original.
- [3] Garrett Birkhoff and Gian-Carlo Rota. *Ordinary differential equations*. John Wiley & Sons Inc., New York, fourth edition, 1989.
- [4] J.P. Demailly. *Complex analytic and differential geometry*.
- [5] H. Gillet and C. Soulé. Analytic torsion and the arithmetic Todd genus. *Topology*, 30(1):21–54, 1991. With an appendix by D. Zagier.
- [6] Mounir Hajli. The spectral theory of the generalized laplacians associated to integrable metrics on compact riemann surfaces. *Arxiv*.
- [7] Mounir Hajli. *Théorie spectrale pour certaines métriques singulières et Géométrie d'Arakelov*. PhD thesis, Université Pierre et Marie Curie, 2012.
- [8] Mounir Hajli. Sur la fonction zêta associée au laplacien singulier associé aux métriques canoniques sur la droite projective complexe. *arXiv.org*, arXiv:1301.1792 [math.NT], January 2013.

- [9] Akira Ikeda and Yoshiharu Taniguchi. Spectra and eigenforms of the Laplacian on S^n and $P^n(\mathbf{C})$. *Osaka J. Math.*, 15(3):515–546, 1978.
- [10] Xiaonan Ma and George Marinescu. *Holomorphic Morse inequalities and Bergman kernels*, volume 254 of *Progress in Mathematics*. Birkhäuser Verlag, Basel, 2007.
- [11] G. N. Watson. *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*. Cambridge University Press, Cambridge, England, 1944.
- [12] E. T. Whittaker and G. N. Watson. *A course of modern analysis. An introduction to the general theory of infinite processes and of analytic functions: with an account of the principal transcendental functions*. Fourth edition. Reprinted. Cambridge University Press, New York, 1962.

National Center for Theoretical Sciences, (Taipei Office)
National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan
e-mail: hajli@math.jussieu.fr