

*Memorias de la Primera Escuela de Astroestadística: Métodos Bayesianos en Cosmología  
9 al 13 Junio de 2014. Bogotá D.C., Colombia*

Editor: Héctor J. Hortúa

[Material suplementario](#)

## Implicaciones Cosmológicas del Colapso Gravitacional en Teorías de $f(R)$

Cosmological implications of gravitational collapse in  $F(R)$  theories

CÉSAR PERALTA <sup>1</sup> LEONARDO CASTAÑEDA <sup>2</sup>

### Resumen

Haremos una comparación entre la dinámica del colapso gravitacional esférico para un universo de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) de primer orden en el contexto de relatividad general, con el resultado correspondiente obtenido para el colapso gravitacional en el marco de la teoría de gravedad modificada  $f(R)$ . Este trabajo tiene como objetivo la creación de un modelo analítico que explique las fuentes de las estructuras a grandes escalas en el universo presentando una aproximación del modelo de colapso gravitacional esférico dentro del marco de las teorías de gravedad modificada  $f(R)$ .

**Palabras clave:** Colapso Gravitacional, Relatividad General, Teorías de  $f(R)$

### Abstract

We will make a comparison between the dynamics of spherical gravitational collapse for a perturbed FLRW universe to first order in the context of general relativity, with the corresponding results obtained for the gravitational collapse under theories of modified gravity  $f(R)$ . This work is aimed at obtaining an analytical model of explanation a source of large scale structures in the universe presenting an approximation of model spherical gravitational collapse under theories of modified gravity  $f(R)$ .

**Keywords:** Gravitational Collapse, General Relativity, Theories  $f(R)$  .

---

<sup>1</sup>Universidad Nacional de Colombia. E-mail: [cdperaltag@unal.edu.co](mailto:cdperaltag@unal.edu.co)

<sup>2</sup>Universidad Nacional de Colombia. E-mail: [lcastanedac@unal.edu.co](mailto:lcastanedac@unal.edu.co)

## 1 Introducción

La teoría de la relatividad general de Einstein se constituye como el paradigma científico más importante en el ámbito de la descripción gravitacional por sus aportes conceptuales, soportes experimentales de alta precisión en los diferentes test de evaluación que la teoría misma ha promovido y, recientemente, resultados en el ámbito de la simulación computacional que nos presenta un panorama virtual casi indistinguible al ojo humano de las observaciones más recientes del universo. Al mismo tiempo es, junto con la mecánica cuántica, la teoría más exacta jamás antes estudiada en toda la historia de la ciencia. De igual modo, presenta una descripción coherente del espacio, el tiempo, gravedad y materia a un nivel macroscópico. En el ámbito de la cosmología, la teoría de la relatividad general le da un nuevo soporte, dado que las ideas fundamentales sobre las percepciones del universo se van abriendo a nuevas posibilidades de exploración, medición y modelamiento. Desde el inicio de esta teoría, Einstein se preguntó si ésta era la teoría definitiva capaz de describir las interacciones gravitacionales. Comenzó así la carrera de verificar y probar la relatividad general. En las últimas tres décadas se empezaron a mostrar fallas fundamentales de la teoría en lo que respecta a la descripción de los problemas cosmológicos (Problema de planitud, monopolos magnéticos, paredes de dominio, horizonte) mediante el modelo de Big Bang, para lo cual se derivó un modelo que resuelve estos problemas en un escenario cósmico llamado inflación y la incapacidad de dar una descripción cuántica de la gravedad, Guth (1981). Estas razones han dado paso a varias propuestas teóricas para conseguir modelos que puedan reproducir las interacciones gravitacionales en estas escalas. Una de las más útiles presentadas son las teorías de gravedad extendidas, Capozziello & Francaviglia (2008), las cuales están basadas en las correcciones y ampliaciones a la teoría de Einstein. Dentro de estas teorías alternativas, se encuentran las que permiten que el Lagrangiano dependa de una familia de diferentes funciones del escalar de Ricci, conocidas como teorías de gravedad modificada  $f(R)$ .

Se encuentran en la literatura varias motivaciones para modificar la relatividad general. Entre ellas se incorporan completamente el principio de Mach en la teoría. Einstein sólo pudo introducir una de las ideas de Mach y a pesar de ello, esta idea admite una solución anti-Machiana, el universo de Gödel, Gödel (1949). De acuerdo con el principio de Mach, el marco de referencia inercial local está determinado por el movimiento promedio de los objetos astronómicos distantes. Esta característica implica que el acople gravitacional en un punto del espacio-tiempo no es absoluta, sino que está determinada por la materia circundante. Por tanto, se convierte en una función de la ubicación en el espacio-tiempo -un campo escalar- es decir, la constante gravitacional cambia de acuerdo a la época en la que se encuentre el universo. La teoría de Brans-Dicke fue la primera en plasmar completamente una alternativa a la relatividad general de Einstein dentro del marco de teorías de gravedad alternativa. Consiguió la variación del acople gravitacional acoplando un campo escalar no mínimamente a la geometría consiguiendo una implementación más adecuada del principio de Mach que en el caso de relatividad general Brans & Dicke (1961).

Por otro lado, las teorías de gravedad extendidas exhiben naturalmente un comportamiento inflacionario capaz de sobrellevar las fallas del modelo de Big Bang

basado en relatividad general Starobinsky (1980). Se ha demostrado que, por medio de transformaciones conformes, términos de alto orden en la curvatura y términos acoplados no mínimamente, siempre corresponden a gravedad de Einstein más un campo escalar mínimamente acoplado a la curvatura. De esta manera, se puede mostrar que gravedad  $f(R)$  es equivalente no sólo a una teoría tensor-escalar sino también a una teoría de Einstein, acoplada a un fluido ideal, propiedad que es útil en escenarios inflacionarios Peralta & Rodríguez (2012).

Además, el diagrama de Hubble de supernovas tipo Ia, mostró evidencia de que el universo está actualmente en una fase de expansión acelerada, Knop (2003). La explicación más simple, que mejor se ha ajustado a los datos, es el de la constante cosmológica  $\Lambda$ . Las observaciones sugieren que existe una especie de fluido desconocido de presión negativa, en la densidad de materia, que domina todo el universo (en un 68% de acuerdo a su medición más reciente Planck (2010)) conocida como energía oscura a la cual se le asocia la expansión acelerada. Sin embargo, el modelo de constante cosmológica falla al explicar por qué el valor inferido es pequeño en comparación con el valor típico predicho por la densidad de energía de vacío en el modelo estándar de partículas elementales (en 120 órdenes de magnitud por debajo lo cual es una catástrofe para la teoría). Una forma de aproximarnos a este problema es asumir que la aceleración no está asociada directamente al fluido desconocido sino que es una acción neta de la dinámica del espacio-tiempo. Desde este punto de vista, se intenta modificar las ecuaciones de Einstein desde su geometría para intentar ajustar los datos reportados sin necesidad de incluir fluidos exóticos en el modelo, es decir, sólo con materia estándar.

En el presente trabajo se estudia el colapso gravitacional en el marco de la teoría de gravedad modificada  $f(R)$ , Borisov (2009). Este trabajo se divide principalmente en cuatro partes. Inicialmente, se estudian las perturbaciones métricas de primer orden de la teoría usando un modelo de universo de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW), obteniendo así una ecuación tipo Poisson, la cual gobierna la dinámica del perfil de densidad. En segundo lugar, se estudia las ecuaciones de campo en teorías de gravedad modificada  $f(R)$ . En tercer lugar, se muestra las ecuaciones dinámicas modificadas. Finalmente, llevaremos la formulación de perturbaciones de primer orden para obtener la ecuación tipo Poisson correspondiente en el marco de la teoría de gravedad modificada  $f(R)$ .

## 2 Perturbaciones en Relatividad General

Tomando un gauge conforme Newtoniano, la métrica de FLRW resultante es

$$ds^2 = a^2(\tau) [-(1 + 2\phi)d\tau^2 + (1 - 2\psi)(dx^2 + dy^2 + dz^2),] \quad (1)$$

donde  $\psi$  y  $\phi$  son las perturbaciones escalares y

$$\tau \equiv \int_0^t dt'/a(t'), \quad (2)$$

el tiempo conforme. La dinámica del campo gravitacional está dada por la ecuación de campo de Einstein (ver Malik & Wands (2009), Bardeen (1980) y Hortúa et al.

(2013))

$$G_{\alpha\beta} = kT_{\alpha\beta}. \quad (3)$$

donde  $k = 8\pi G$  y  $c = 1$  son constantes. Usando una métrica tipo FLRW y tomando perturbaciones de primer orden, las componentes del tensor de Einstein son

$$G_{00} = 2\nabla^2\psi - 6\mathcal{H}\psi' + 3\mathcal{H}^2, \quad (4)$$

$$G_{0j} = 2\partial_j(\psi' + \mathcal{H}\phi), \quad (5)$$

$$G_{ij} = (-\mathcal{H}^2 - 2\mathcal{H}')\delta_{ij} + [2\psi'' - \nabla^2(\psi - \phi) + \mathcal{H}(2\phi' - 5\psi) - (2\mathcal{H}' + 4\mathcal{H}^2)(\phi + \psi)]\delta_{ij} + \partial_i\partial_j(\psi - \phi). \quad (6)$$

Adicionalmente, definimos un tensor de Energía-Momentum para un modelo de polvo

$$T^{\alpha\beta} = (\bar{\rho} + \delta\rho)u^\alpha u^\beta. \quad (7)$$

La componente 0 – 0 de las ecuaciones de campo obtenida es

$$\begin{aligned} \delta G_{00} &= 8\pi G\delta T_{00}, \\ 2\nabla^2\psi - 6\mathcal{H}\psi' &= 8\pi Ga^2(\delta\rho + 2\rho\phi), \\ \nabla^2\psi &= 3\mathcal{H}\psi' + 4\pi Ga^2\delta\rho + 8\pi Ga^2\rho\phi. \end{aligned} \quad (8)$$

de la componente 0 –  $j$  se obtiene la condición

$$\begin{aligned} \delta G_{0j} &= 8\pi G\delta T_{0j} = 0, \\ 2\partial_j(\psi' + \mathcal{H}\phi) &= 0, \\ \psi' + \mathcal{H}\phi &= 0, \\ \psi' &= -\mathcal{H}\phi. \end{aligned} \quad (9)$$

Tomando la ecuación (9) y reemplazando en la ecuación (8) obtenemos

$$\nabla^2\psi = -3\mathcal{H}^2\phi + 4\pi Ga^2\delta\rho + 8\pi Ga^2\rho\phi. \quad (10)$$

Por otro lado, la ecuación de Friedmann en el fondo es

$$\mathcal{H}^2 = \frac{8\pi G}{3}a^2\bar{\rho}. \quad (11)$$

Por la ecuación (10) obtenemos finalmente

$$\nabla^2\psi = 4\pi Ga^2\delta\rho. \quad (12)$$

Esta es la ecuación de campo de Einstein análoga a la ecuación de Poisson en gravedad Newtoniana. La solución de la ecuación (12) en coordenadas comóviles es

$$\psi(x, \tau) = -4\pi Ga(\tau)^2 \int \frac{\delta\rho(x', \tau)}{|x - x'|} d^3x', \quad (13)$$

y la ecuación de movimiento para partículas de materia oscura en tiempo conforme está dada por

$$\frac{d^2\mathbf{x}_c}{d\tau^2} + \mathcal{H}(\tau)\frac{d\mathbf{x}_c}{d\tau} = -\nabla_{\mathbf{x}}\psi. \quad (14)$$

### 3 Ecuaciones de Campo en Teorías de Gravedad Modificada $f(R)$

La acción general incluye un término de frontera  $S_{Bond}$ , esta se escribe como

$$S_{mod} = \frac{1}{2k} (S + S_{Bond}) + S_m, \quad (15)$$

con

$$S = \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} (R + f(R)), \quad (16)$$

el término de frontera descrito como

$$S_{Bond} = 2 \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3y \epsilon \sqrt{|h|} f_R(R), \quad (17)$$

y  $S_m$  es la acción de materia. Tomando las variaciones respectivas y evaluando apropiadamente los términos en la frontera, obtenemos (ver Guarnizo et al. (2010), Guarnizo et al. (2011))

$$G_{\alpha\beta} + f_R(R)R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}f(R)g_{\alpha\beta} + g_{\alpha\beta}\square f_R(R) - \nabla_\alpha \nabla_\beta f_R(R) = kT_{\alpha\beta}. \quad (18)$$

La traza de la ecuación (18) es

$$3\square f_R + f_R R - 2f = kT, \quad (19)$$

donde  $\square = \nabla_\alpha \nabla^\alpha$ , es el operador D'Alembertiano.

### 4 Ecuaciones Dinámicas Modificadas

Las ecuaciones dinámicas modificadas para la métrica de FLRW perturbada a primer orden y fluido perfecto son

- **Ecuación de Friedmann Modificada:**

$$3H^2 = \frac{1}{f_R} \left( k\rho + \frac{1}{2}(Rf_R - f) - 3Hf_{RR}\dot{R} \right). \quad (20)$$

- **Ecuación de Raychaudhuri Modificada:**

$$2\dot{H}^2 + 3H^2 = -\frac{1}{f_R} \left( kP + \frac{1}{2}(f - Rf_R) + f_{RR}\ddot{R} + f_{RRR}\dot{R}^2 \right). \quad (21)$$

- **Ecuación de Continuidad Modificada:**

$$k\rho_m \frac{f_{RR}\dot{R}}{f_R^2} = \dot{\rho}_{curv} + 3H\rho_{curv}(1 + \omega_{curv}), \quad (22)$$

donde se define

- $\rho_{curv} = \left( \frac{Rf_R - f}{2} - 3Hf_{RR}\dot{R} \right) / f_R.$
- $P_{curv} = \left( 2H\dot{R}f_{RR} + \frac{f - Rf_R}{2} + \ddot{R}f_{RR} + \dot{R}2f_{RRR} \right) / f_R.$
- $\omega_{curv} = \frac{\ddot{R}f_{RR} + \dot{R}2f_{RRR} - H\dot{R}f_{RR}}{\frac{Rf_R - f}{2} - 3Hf_{RR}\dot{R}} - 1.$

aquí el punto indica la derivada respecto del tiempo cosmológico.

## 5 Ecuaciones de Campo Perturbadas con $f(R)$ y Modelo de Polvo

La ecuación de campo (18) podemos escribirla así

$$(1 + f_R)R_{\alpha\beta} - g_{\alpha\beta} \left( \frac{R + f}{2} - \square f_R(R) \right) - \nabla_\alpha \nabla_\beta f_R(R) = kT_{\alpha\beta}. \quad (23)$$

Para continuar con nuestro análisis debemos considerar la teoría en el régimen cuasi-estático, en las que tendremos en cuenta las siguientes aproximaciones

- $\frac{f}{R} \ll 1,$
- $f_R \ll 1,$
- $f_R R \ll 1,$
- $\nabla f_R \gg f'_R.$

De modo que la ecuación (23) bajo estas aproximaciones queda de la siguiente forma

$$G_{\alpha\beta} + g_{\alpha\beta} \nabla^2 f_R - \nabla_\alpha \nabla_\beta f_R = kT_{\alpha\beta}, \quad (24)$$

cuya traza tiene la siguiente forma

$$\nabla^2 f_R = \frac{1}{3} [kT + R]. \quad (25)$$

Así para la componente 0 – 0 tenemos

$$G_{00} + g_{00} \nabla^2 f_R - \cancel{\nabla_0 \nabla_0 f_R} = kT_{00}. \quad (26)$$

Introduciendo las perturbaciones obtenemos

$$\bar{G}_{00} + \delta G_{00} - a^2 (1 + 2\phi) \left( \frac{1}{3} [-k(\bar{\rho} + \delta\rho) + \bar{R} + \delta R] \right) = a^2 k (\bar{\rho} + \delta\rho + 2\phi\bar{\rho}) \quad (27)$$

Sustrayendo el fondo FLRW resulta

$$2\nabla^2 \psi - 6\mathcal{H}\psi' - a^2 \left( \frac{1}{3} [-k(\delta\rho + \delta R)] + \frac{2\phi}{3} [-k\bar{\rho} + \bar{R}] \right) = a^2 k (\delta\rho + 2\phi\bar{\rho}) \quad (28)$$

De la componente  $0 - j$  del tensor de Einstein para el modelo de polvo se obtiene la condición

$$\psi' = -\mathcal{H}\phi. \quad (29)$$

Por su parte, la ecuación de Friedmann modificada a orden cero en el tiempo conforme bajo las condiciones de la aproximación cuasi-estática viene expresada como

$$3\mathcal{H}^2 = a^2 \left( k\bar{\rho} + \frac{1}{3} [-k\bar{\rho} + \bar{R}] \right), \quad (30)$$

por lo tanto, en la ecuación (28) queda escrita como

$$2\nabla^2\psi + \cancel{6\mathcal{H}^2\phi} - 2\phi a^2 \left( k\bar{\rho} + \frac{1}{3} [-k\bar{\rho} + \bar{R}] \right) = a^2 \left( k\delta\rho + \frac{1}{3} [-k\delta\rho + \delta R] \right). \quad (31)$$

De esta manera obtenemos una ecuación de tipo Poisson modificada en  $f(R)$  para el caso cuasi-estático

$$\boxed{\nabla^2\psi = a^2 \left( \frac{1}{3}k\delta\rho + \frac{1}{6}\delta R \right)}. \quad (32)$$

Note que en el límite de la relatividad general se obtiene que  $\delta R = 8\pi G\delta\rho$ . Finalmente la ecuación para el potencial gravitacional se reduce a la ecuación no modificada

$$\nabla^2\psi = 4\pi G a^2 \delta\rho. \quad (33)$$

## 6 Conclusiones

En el contexto de la relatividad general, al retirar el fondo y analizar solamente la parte neta perturbada de las ecuaciones de campo de Einstein de primer orden, obtuvimos que sus componentes se presentan en forma de ecuación tipo Poisson

$$\nabla^2\psi = 4\pi G a^2 \delta\rho. \quad (34)$$

Adicionalmente, la ecuación geodésica para materia oscura es

$$\frac{d^2\mathbf{x}_c}{d\tau^2} + \mathcal{H}(\tau)\frac{d\mathbf{x}_c}{d\tau} = -\nabla_{\mathbf{x}}\psi \quad (35)$$

Por su parte, Las componentes de las ecuaciones de campo en gravedad modificada perturbadas hasta primer orden bajo la aproximación cuasi-estática producen ecuaciones tipo Poisson que relacionan el potencial de la perturbación con el elemento de densidad perturbado más un término perturbado de la curvatura.

$$\nabla^2\psi = a^2 \left( \frac{1}{3}k\delta\rho + \frac{1}{6}\delta R \right) \quad (36)$$

Al comparar los escenarios de gravedad de Einstein con la de gravedad modificada  $f(R)$  bajo la aproximación cuasi-estática se recuperan las ecuaciones de campo perturbadas de primer orden en Relatividad General.

Esta ecuación junto a la ecuación de la traza

$$\nabla^2 f_R = \frac{1}{3} [kT + R] \quad (37)$$

Son las ecuaciones que dominan el colapso gravitacional en este contexto.

## Agradecimientos

Esta investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional de Colombia. Agradezco al profesor Leonardo Castañeda Colorado junto al Grupo de Gravitación y Cosmología por el desarrollo y conclusión de las ideas aquí plasmadas.

## Bibliografía

- J. M. Bardeen (1980). ‘Gauge-Invariant Cosmological Perturbations’. *Phys. Rev. D* **22**(2):1882.
- A. Borisov (2009). ‘Cosmological Implications of Modified Gravity: Spherical Collapse and Higher Order Correlations’. *Publicly Accessible Penn Dissertations, Paper* .
- C. H. Brans & R. H. Dicke (1961). ‘Mach’s Principle and a Relativistic Theory of Gravitation’. *Phys. Rev.* **124**:925.
- S. Capozziello & M. Francaviglia (2008). ‘Extended Theories of Gravity and their Cosmological and Astrophysical Applications’. *Gen. Rel. Grav.* **40**:357–420.
- K. Gödel (1949). ‘An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein’s Field Equations of Gravitation’. *Rev. Mod. Phys.* **21**:447.
- A. Guarnizo, et al. (2010). ‘Boundary Term in Metric  $f(R)$  Gravity: Field Equations in the Metric Formalism’. *Gen. Rel. Grav.* **42**:2713–2728.
- A. Guarnizo, et al. (2011). ‘Geodesic Deviation Equation in  $f(R)$  Gravity’. *Gen. Rel. Grav.* **43**:2713–2728.
- A. H. Guth (1981). ‘Inflationary Universe: A Possible Solution to the Horizon and Flatness Problems’. *Phys. Rev D* **23**:347.
- J. Hortúa, et al. (2013). ‘Evolution of Magnetic Fields Through Cosmological Perturbation Theory’. *Phys. Rev. D* **87**:103531.
- R. A. e. a. Knop (2003). ‘New Constraints on  $\Omega_M$ ,  $\Omega_\Lambda$ , and  $w$  from an Independent Set of Eleven High-Redshift Supernovae Observed with HST’. *Astrophys. J.* **598**:102.
- K. A. Malik & D. Wands (2009). ‘Cosmological Perturbations’. *Phys.Rept.* **475**:1–51.
- C. D. Peralta & Y. Rodríguez (2012). ‘Identificando el Inflatón con el Bosón de Higgs del Modelo Estándar’. *Rev. Acad. Colomb. Cienc.* **36**:25–36.

C. Planck (2010). 'PLANCK homepage'. <http://prof.planck.fr/> .

A. A. Starobinsky (1980). 'A New Type of Isotropic Cosmological Models Without Singularity'. *Phys. Lett. B* **91**:99.