

## СЛАБО ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕРЫ ГИББСА ДЛЯ НС-МОДЕЛИ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ДЕЛИТЕЛЯ ИНДЕКСА ЧЕТЫРЕ

In this paper is studied НС-model on a Cayley tree and under some conditions on parameters of the НС-model we prove existence of the weakly periodic (non periodic) Gibbs measures for normal divisor of the index four.

В данной статье изучается НС-модель на дереве Кэли. При некоторых условиях на параметры показано, что существуют слабо периодические (не периодические) меры Гиббса для нормального делителя индекса четыре.

**Ключевые слова:** дерево Кэли, конфигурация, НС-модель, мера Гиббса, периодические меры, слабо периодические меры.

**1. Введение.** Понятие меры Гиббса играет важную роль в статистической механике. Основной проблемой данного гамильтониана является описание всех отвечающих ему мер Гиббса. Определение меры Гиббса и других понятий, связанных с теорией мер Гиббса, можно найти, например, в работах [1]-[3]. Для модели Изинга на дереве Кэли эта задача изучена достаточно полностью. Так, например, в работе [4] построено несчетное множество крайних гиббсовских мер, а в работе [5] найдено необходимое и достаточное условие крайности неупорядоченной фазы модели Изинга на дереве Кэли.

В многочисленных работах (см. например [6]-[13]) на дереве Кэли изучены периодические меры Гиббса для различных моделей статистической механики. Эти меры, в основном, были трансляционно-инвариантными, либо периодическими с периодом два. Более того, для многих моделей на дереве Кэли доказано, что множество периодических мер Гиббса очень бедно, т.е., существуют *только* периодические гиббсовские меры с периодом два (см. например [8]-[12]).

Чтобы получить более широкое множество гиббсовских мер, в работах [14], [15] введены более общие понятия периодической меры Гиббса, т.е. слабо периодические гиббсовские меры и доказано существование таких мер для модели Изинга на дереве Кэли.

В работе [13] изучена НС (Hard Core)-модель на дереве Кэли и доказана, что трансляционно-инвариантная мера Гиббса для этой модели единственна. Кроме того, при некоторых условиях на параметры НС-модели доказана неединственность периодических мер Гиббса с периодом два.

В работе [17] изучены слабо периодические меры Гиббса для НС-модели для нормального делителя индекса два и при некоторых условиях на параметры показана единственность (трансляционно-инвариантность) слабо периодической меры Гиббса, а в работе [18] показана единственность (трансляционно-инвариантность) слабо периодической меры Гиббса для НС-модели при любых значениях параметров.

Эта работа посвящена изучению слабо периодических мер Гиббса НС-модели для нормального делителя индекса четыре на дереве Кэли и доказывается существование слабо периодических (не периодических) мер Гиббса на некоторых инвариантах при некоторых условиях на параметры.

**2. Предварительные сведения.** Дерево Кэли  $\tau^k$  порядка  $k \geq 1$  - бесконечное дерево, т.е. граф без циклов, из каждой вершины которого выходит ровно  $k + 1$  ребер. Пусть  $\tau^k = (V, L, i)$ , где  $V$  — есть множество вершин  $\tau^k$ ,  $L$  — его множество ребер и  $i$  — функция инцидентности, сопоставляющая каждому ребру  $l \in L$  его концевые точки  $x, y \in V$ . Если  $i(l) = \{x, y\}$ , то  $x$  и  $y$  называются *ближайшими соседями вершины* и обозначается  $l = \langle x, y \rangle$ . Расстояние  $d(x, y), x, y \in V$  на дереве Кэли определяется формулой

$$d(x, y) = \min\{d \mid \exists x = x_0, x_1, \dots, x_{d-1}, x_d = y \in V \text{ такие, что } \langle x_0, x_1 \rangle, \dots, \langle x_{d-1}, x_d \rangle\}.$$

Для фиксированного  $x^0 \in V$  обозначим

$$W_n = \{x \in V \mid d(x, x^0) = n\}, \quad V_n = \{x \in V \mid d(x, x^0) \leq n\}$$

Для  $x \in W_n$  обозначим

$$S(x) = \{y \in W_{n+1} : d(x, y) = 1\}.$$

Пусть  $\Phi = \{0, 1\}$  и  $\sigma \in \Phi^V$ -конфигурация, то есть  $\sigma = \{\sigma(x) \in \Phi : x \in V\}$ , где  $\sigma(x) = 1$  означает, что вершина  $x$  на дереве Кэли занята, а  $\sigma(x) = 0$  означает, что она свободная.

Конфигурация  $\sigma$  называется допустимой, если  $\sigma(x)\sigma(y) = 0$  для любых соседних  $\langle x, y \rangle$  из  $V(V_n$  или  $W_n$ , соответственно) и обозначим множество таких конфигураций через  $\Omega$  ( $\Omega_{V_n}$  и  $\Omega_{W_n}$ ). Ясно, что  $\Omega \subset \Phi^V$ .

Гамильтониан НС-модели определяется по формуле

$$H(\sigma) = \begin{cases} J \sum_{x \in V} \sigma(x), & \text{если } \sigma \in \Omega, \\ +\infty, & \text{если } \sigma \notin \Omega, \end{cases}$$

где  $J \in \mathbb{R}$ .

Пусть  $\mathbf{B}$ —  $\sigma$ - алгебра, порожденная цилиндрическими подмножествами  $\Omega$ . Для любого  $n$  обозначим через  $\mathbf{B}_{V_n} = \{\sigma \in \Omega : \sigma|_{V_n} = \sigma_n\}$  подалгебру  $\mathbf{B}$ , где  $\sigma|_{V_n}$ — сужение  $\sigma$  на  $V_n$ ,  $\sigma_n : x \in V_n \mapsto \sigma_n(x)$ — допустимая конфигурация в  $V_n$ .

**Определение 1.** Для  $\lambda > 0$  НС-мера Гиббса есть вероятностная мера  $\mu$  на  $(\Omega, \mathbf{B})$  такая, что для любого  $n$  и  $\sigma_n \in \Omega_{V_n}$

$$\mu\{\sigma \in \Omega : \sigma|_{V_n} = \sigma_n\} = \int_{\Omega} \mu(d\omega) P_n(\sigma_n | \omega_{W_{n+1}}),$$

где

$$P_n(\sigma_n | \omega_{W_{n+1}}) = \frac{e^{-H(\sigma_n)}}{Z_n(\lambda; \omega|_{W_{n+1}})} \mathbf{1}(\sigma_n \vee \omega|_{W_{n+1}} \in \Omega_{V_{n+1}}).$$

Здесь символ  $\vee$  означает объединение конфигураций и  $Z_n(\lambda; \omega|_{W_{n+1}})$  – нормировочный множитель с граничным условием  $\omega|_{W_n}$ :

$$Z_n(\lambda; \omega|_{W_{n+1}}) = \sum_{\tilde{\sigma}_n \in \Omega_{V_n}} e^{-H(\tilde{\sigma}_n)} \mathbf{1}(\tilde{\sigma}_n \vee \omega|_{W_{n+1}} \in \Omega_{V_{n+1}}).$$

Известно [6], [7], что  $\tau^k$  можно представить как  $G_k$  – свободное произведение  $k+1$  циклических групп второго порядка с образующими  $a_1, \dots, a_{k+1}$ , соответственно.

Пусть  $\widehat{G}_k$  – подгруппа группы  $G_k$ .

Если гиббсовская мера инвариантна относительно некоторой подгруппы конечного индекса  $\widehat{G}_k \subset G_k$ , то она называется  $\widehat{G}_k$  – периодической.

Известно [13], что каждой мере Гиббса для НС-модели на дереве Кэли можно сопоставлять совокупность величин  $z = \{z_x, x \in G_k\}$ , удовлетворяющих

$$z_x = \prod_{y \in S(x)} (1 + \lambda z_y)^{-1}, \quad (1)$$

где  $\lambda = e^J > 0$  – параметр.

**Определение 2.** Совокупность величин  $z = \{z_x, x \in G_k\}$  называется  $\widehat{G}_k$  – периодической, если  $z_{yx} = z_x$  для  $\forall x \in G_k, y \in \widehat{G}_k$ .

$G_k$  – периодические совокупности называются трансляционно-инвариантными.

Для любого  $x \in G_k$  множество  $\{y \in G_k : \langle x, y \rangle\} \setminus S(x)$  имеет единственный элемент, которого обозначим через  $x_{\downarrow}$  (см. [16], [14]).

Пусть  $G_k / \widehat{G}_k = \{H_1, \dots, H_r\}$  фактор группа, где  $\widehat{G}_k$  нормальный делитель индекса  $r \geq 1$ .

**Определение 3.** Совокупность величин  $z = \{z_x, x \in G_k\}$  называется  $\widehat{G}_k$  – слабо периодической, если  $z_x = z_{ij}$  при  $x \in H_i, x_{\downarrow} \in H_j$  для  $\forall x \in G_k$ .

Заметим, что слабо периодическая совокупность  $z$  совпадает с обычной периодической (см. определение 2), если значение  $z_x$  не зависит от  $x_{\downarrow}$ .

**Определение 4.** Мера  $\mu$  называется  $\widehat{G}_k$  – (слабо) периодической, если она соответствует  $\widehat{G}_k$  – (слабо) периодической совокупности величин  $z$ .

**3. Слабо периодические меры Гиббса.** Пусть  $H_{\{a_1\}} = \{x \in G_k : w_x(a_1) - \text{четное число}\}$ , где  $w_x(a_1)$  – число буквы  $a_1$  в слове  $x \in G_k$ ,  $G_k^{(2)} = \{x \in G_k : |x| - \text{четное число}\}$ , где  $|x|$  – длина слова  $x \in G_k$  и  $G_k^{(4)} = H_{\{a_1\}} \cap G_k^{(2)}$  – соответствующий ему нормальный делитель индекса 4.

Рассмотрим фактор-группу  $G_k^{(4)} = \{H_0, H_1, H_2, H_3\}$ , где

$$H_0 = \{x \in G_k : w_x(a_1) - \text{четно}, |x| - \text{четно}\}$$

$$H_1 = \{x \in G_k : w_x(a_1) - \text{нечетно}, |x| - \text{четно}\}$$

$$H_2 = \{x \in G_k : w_x(a_1) - \text{четно}, |x| - \text{нечетно}\}$$

$$H_3 = \{x \in G_k : w_x(a_1) - \text{нечетно}, |x| - \text{нечетно}\}$$

Тогда в силу (1)  $G_k$ -слабо периодическая совокупность  $z_x$  имеет вид

$$z_x = \begin{cases} z_1, & x \in H_3, x_{\downarrow} \in H_1 \\ z_2, & x \in H_1, x_{\downarrow} \in H_3 \\ z_3, & x \in H_3, x_{\downarrow} \in H_0 \\ z_4, & x \in H_0, x_{\downarrow} \in H_3 \\ z_5, & x \in H_1, x_{\downarrow} \in H_2 \\ z_6, & x \in H_2, x_{\downarrow} \in H_1 \\ z_7, & x \in H_2, x_{\downarrow} \in H_0 \\ z_8, & x \in H_0, x_{\downarrow} \in H_2, \end{cases}$$

где  $z_x$  удовлетворяет системе уравнений

$$\begin{cases} z_1 = \frac{1}{(1+\lambda z_4)^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^{k-i}} \\ z_2 = \frac{1}{(1+\lambda z_6)^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^{k-i}} \\ z_3 = \frac{1}{(1+\lambda z_4)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^{k-i+1}} \\ z_4 = \frac{1}{(1+\lambda z_3)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^{k-i+1}} \\ z_5 = \frac{1}{(1+\lambda z_6)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^{k-i+1}} \\ z_6 = \frac{1}{(1+\lambda z_5)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^{k-i+1}} \\ z_7 = \frac{1}{(1+\lambda z_5)^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^{k-i}} \\ z_8 = \frac{1}{(1+\lambda z_3)^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^{k-i}}. \end{cases} \quad (2)$$

Перепишем систему уравнений (2) в виде

$$\begin{cases} z_1 = \left(\frac{1+\lambda z_2}{1+\lambda z_4}\right)^i \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^k} \\ z_2 = \left(\frac{1+\lambda z_1}{1+\lambda z_6}\right)^i \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^k} \\ z_3 = \left(\frac{1+\lambda z_2}{1+\lambda z_4}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^k} \\ z_4 = \left(\frac{1+\lambda z_7}{1+\lambda z_3}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^k} \\ z_5 = \left(\frac{1+\lambda z_1}{1+\lambda z_6}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^k} \\ z_6 = \left(\frac{1+\lambda z_8}{1+\lambda z_5}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^k} \\ z_7 = \left(\frac{1+\lambda z_8}{1+\lambda z_5}\right)^i \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^k} \\ z_8 = \left(\frac{1+\lambda z_7}{1+\lambda z_3}\right)^i \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^k}. \end{cases} \quad (3)$$

Разделив в этой системе уравнений первое уравнение на третье, второе на пятое, шестое на седьмое, четвертое на восьмое, получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{z_1}{z_3} = \frac{1+\lambda z_2}{1+\lambda z_4} \\ \frac{z_2}{z_5} = \frac{1+\lambda z_1}{1+\lambda z_6} \\ \frac{z_6}{z_7} = \frac{1+\lambda z_5}{1+\lambda z_8} \\ \frac{z_4}{z_8} = \frac{1+\lambda z_3}{1+\lambda z_7}. \end{cases}$$

Используя эту систему уравнений, (3) можно переписать как:

$$\begin{cases} z_1 = \left(\frac{z_1}{z_3}\right)^i \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^k} \\ z_2 = \left(\frac{z_2}{z_5}\right)^i \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^k} \\ z_3 = \left(\frac{z_1}{z_3}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^k} \\ z_4 = \left(\frac{z_8}{z_4}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^k} \\ z_5 = \left(\frac{z_2}{z_5}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^k} \\ z_6 = \left(\frac{z_7}{z_6}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^k} \\ z_7 = \left(\frac{z_7}{z_6}\right)^i \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^k} \\ z_8 = \left(\frac{z_8}{z_4}\right)^i \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^k}. \end{cases} \quad (4)$$

Из первого уравнения системы (4) найдем  $z_3$ , из второго  $z_5$ , из седьмого  $z_6$ , из восьмого  $z_4$  и подставив их в восьмое, седьмое, второе и первое уравнения системы уравнений (2), соответственно, получим:

$$\begin{cases} z_1 = \frac{(1+\lambda z_7)^k}{((1+\lambda z_7)^{k/i} + \lambda z_8^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^{k-i}} \\ z_2 = \frac{(1+\lambda z_8)^k}{((1+\lambda z_8)^{k/i} + \lambda z_7^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^{k-i}} \\ z_7 = \frac{(1+\lambda z_1)^k}{((1+\lambda z_1)^{k/i} + \lambda z_2^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^{k-i}} \\ z_8 = \frac{(1+\lambda z_2)^k}{((1+\lambda z_2)^{k/i} + \lambda z_1^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^{k-i}} \end{cases} \quad (5)$$

Рассмотрим отображение  $W : R^4 \rightarrow R^4$ , определенное следующим образом:

$$\begin{cases} z'_1 = \frac{(1+\lambda z_7)^k}{((1+\lambda z_7)^{k/i} + \lambda z_8^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^{k-i}} \\ z'_2 = \frac{(1+\lambda z_8)^k}{((1+\lambda z_8)^{k/i} + \lambda z_7^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^{k-i}} \\ z'_7 = \frac{(1+\lambda z_1)^k}{((1+\lambda z_1)^{k/i} + \lambda z_2^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_8)^{k-i}} \\ z'_8 = \frac{(1+\lambda z_2)^k}{((1+\lambda z_2)^{k/i} + \lambda z_1^{1-1/i})^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^{k-i}} \end{cases} \quad (6)$$

Заметим, что (5) есть уравнение  $z = W(z)$ . Чтобы решить систему уравнений (5), надо найти неподвижные точки отображения  $z' = W(z)$ .

**Лемма 1.** *Отображение  $W$  имеет инвариантные множества следующих видов:*

$$I_1 = \{(z_1, z_2, z_7, z_8) \in R^4 : z_1 = z_2 = z_7 = z_8\}, \quad I_2 = \{(z_1, z_2, z_7, z_8) \in R^4 : z_1 = z_7, z_2 = z_8\},$$

$$I_3 = \{(z_1, z_2, z_7, z_8) \in R^4 : z_1 = z_2, z_7 = z_8\}, \quad I_4 = \{(z_1, z_2, z_7, z_8) \in R^4 : z_1 = z_8, z_2 = z_7\}.$$

**Доказательство.** Покажем инвариантность  $I_2$  (инвариантность  $I_i, i = 1, 3, 4$  доказывается аналогично). Ясно, что для любого  $z^* = (z_1^*, z_2^*, z_7^*, z_8^*) \in I_2$  имеет место  $z_1^* = z_7^*, z_2^* = z_8^*$ . Отсюда и из (6) имеем

$$\begin{cases} z'_1 = \frac{(1+\lambda z_1^*)^k}{[(1+\lambda z_1^*)^{k/i} + \lambda(z_2^*)^{1-1/i}]^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2^*)^{k-i}} \\ z'_2 = \frac{(1+\lambda z_2^*)^k}{[(1+\lambda z_2^*)^{k/i} + \lambda(z_1^*)^{1-1/i}]^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1^*)^{k-i}} \\ z'_7 = \frac{(1+\lambda z_1^*)^k}{[(1+\lambda z_1^*)^{k/i} + \lambda(z_2^*)^{1-1/i}]^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2^*)^{k-i}} \\ z'_8 = \frac{(1+\lambda z_2^*)^k}{[(1+\lambda z_2^*)^{k/i} + \lambda(z_1^*)^{1-1/i}]^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1^*)^{k-i}} \end{cases}$$

т.е.  $z'_1 = z'_7; z'_2 = z'_8$ , а это значит  $z' = W(z^*) \in I_2$ .

**Замечание 1.** Из определений 2 и 3 следует, что в случае  $I_2$  (или  $I_3$  или  $I_4$ ) слабо периодическая мера Гиббса не совпадает периодической, если из условий  $z_1 = z_7, z_2 = z_8$  (или  $z_1 = z_2, z_7 = z_8$  или  $z_1 = z_8, z_2 = z_7$ ) вытекает, что хотя бы одно из равенств  $z_1 = z_3, z_2 = z_5, z_4 = z_8, z_6 = z_7$  не выполняется, т.е. значение  $z_i$  зависит от  $x_\downarrow$ .

**Лемма 2.** *Если на инвариантных множествах  $I_2, I_3, I_4$  существуют слабо периодические меры Гиббса, то они являются либо трансляционно-инвариантными, либо слабо периодическими (не периодическими).*

**Доказательство.** Проверим для  $I_2$  (остальные доказываются аналогично.) Пусть  $z_1 = z_7, z_2 = z_8$ . Тогда из системы уравнений (2) при  $z_2 \neq z_4$  получим

$$z_1 = \frac{1}{(1+\lambda z_4)^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^{k-i}} \neq z_3 = \frac{1}{(1+\lambda z_4)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_2)^{k-i+1}},$$

а то, что  $z_2 \neq z_4$  можно увидеть из второго и четвертого уравнений той же системы (2).

**Случай  $I_2$ .** Перепишем систему (5) на  $I_2$  при  $k = 2, i = 1$

$$\begin{cases} z_1 = \frac{(1+\lambda z_1)^2}{(1+\lambda z_1)^2 + \lambda} \cdot \frac{1}{1+\lambda z_2} \\ z_2 = \frac{(1+\lambda z_2)^2}{(1+\lambda z_2)^2 + \lambda} \cdot \frac{1}{1+\lambda z_1} \end{cases} \quad (7)$$

После обозначений  $x = 1 + \lambda z_1$  и  $y = 1 + \lambda z_2$  из системы (7) имеем

$$\begin{cases} x = f(y) \\ y = f(x), \end{cases}$$

где  $f(x) = \frac{\lambda x^2}{(x^2 + \lambda)(x - 1)}$ . Рассмотрим производную

$$f'(x) = -\frac{x\lambda(x^3 - \lambda x + 2\lambda)}{(x^2 + \lambda)^2(x - 1)^2}$$

и по формуле Кардано найдем корни многочлена  $x^3 - \lambda x + 2\lambda$ . Этот многочлен имеет один вещественный отрицательный корень

$$x = \frac{1}{3} \sqrt[3]{-27\lambda + 3\lambda\sqrt{81 - 3\lambda}} + \frac{\lambda}{\sqrt[3]{-27\lambda + 3\lambda\sqrt{81 - 3\lambda}}} < 0$$

при  $\lambda \leq 27$ . Значит, при этом условии  $f'(x) < 0$  при  $x > 1$ , т.е. функция  $f(x)$  убывает на этом интервале и уравнение  $f(x) = x$  имеет единственное решение. Вообще говоря, уравнение  $f(x) = x$  имеет единственное решение при любых  $\lambda > 0$ , т.к. уравнение

$$x = \frac{\lambda x^2}{(x^2 + \lambda)(x - 1)} = f(x)$$

эквивалентно уравнению  $x^3 - x^2 - \lambda = 0$ , которое по известной теореме о количестве положительных корней многочлена имеет не более одного положительного решения, потому что знаки при коэффициентах меняются только один раз (Рис.1).




Рис. 1. Графики функций  $y = x$  и  $y = f(x)$  при  $\lambda = 35$

Очевидно, что это решение больше единицы. Кроме того, оно находится среди решений уравнения  $f(f(x)) = x$ . Поэтому рассмотрим уравнение

$$\frac{x - f(f(x))}{x - f(x)} = 0,$$

которое эквивалентно уравнению

$$h(x) = x^6 - (\lambda + 2)x^5 + (5\lambda + 1)x^4 - \lambda(2\lambda + 5)x^3 + 2\lambda(2\lambda + 1)x^2 - 3\lambda^2x + \lambda^2 = 0.$$

Из этого уравнения имеем  $h(1) = \lambda > 0$  и  $h(x) \rightarrow +\infty$  при  $x \rightarrow +\infty$ . Кроме того, график функции  $h(x)$  касается оси  $Ox$  при  $x = 2, \lambda = 4$ , т.к.  $h(2) = -(\lambda - 4)(5\lambda + 4)$ . Отсюда уравнение  $h(x) = 0$  не имеет решений при  $\lambda < 4$ , имеет одно решение при  $\lambda = 4$  и имеет по крайней мере два решения при  $\lambda > 4$  (Рис.2).




Рис. 2. График функции  $h(x)$  при  $k = 2, \lambda = 3.88$  (сверху), при критической  $\lambda = 4$  (по середине) и при  $\lambda = 4.15$  (снизу)

Итак, верно следующее

**Утверждение 1.** Система уравнений (7) имеет только одно решение при  $\lambda < 4$ , имеет два решения при  $\lambda = 4$  и имеет не менее трех решений при  $\lambda > 4$ .

**Замечание 2.** С помощью компьютерного анализа можно увидеть, что (7) имеет только три решения при  $\lambda > 4$  (Рис.2).



Обозначая  $x = 1 + \lambda z_1$ ,  $y = 1 + \lambda z_2$ , рассмотрим систему (5) на  $I_2$  при  $k = 3, i = 1$

$$\begin{cases} y^2 = \frac{\lambda x^3}{(x^3 + \lambda)(x - 1)} \\ x^2 = \frac{\lambda y^3}{(y^3 + \lambda)(y - 1)} \end{cases} \quad (8)$$

В этой системе уравнений найдем из первого уравнения  $y$  и подставим во второе уравнение. Тогда получим уравнение

$$\begin{aligned} f(x, \lambda) = & x^{16} - (\lambda + 4)x^{15} + 3(\lambda + 2)x^{14} - 4x^{13} + (1 - 14\lambda)x^{12} + 3\lambda(\lambda + 8)x^{11} - \\ & 16\lambda x^{10} - 4\lambda(5\lambda - 1)x^9 + 36\lambda^2 x^8 + \lambda^2(\lambda - 24)x^7 + \lambda^2(6 - 13\lambda)x^6 + \\ & 24\lambda^3 x^5 - 16\lambda^3 x^4 + \lambda^3(4 - 3\lambda)x^3 + 6\lambda^4 x^2 - 4\lambda^4 x + \lambda^4 = 0, \end{aligned}$$

для которого  $f(1, \lambda) = \lambda^2 > 0$ ,  $f(1.5, 1.8) = -0.5255524 < 0$ ,  $f(1.8, 1.8) = 9.30017 > 0$ ,  $f(2, 1.8) = -90.1232 < 0$  и  $f(x, \lambda) \rightarrow +\infty$  при  $x \rightarrow +\infty$ ,  $\lambda > 0$ . Следовательно, последнее уравнение имеет не менее четырех решений при  $x > 1$  (Рис.3).




Рис. 3. График функции  $f(x, \lambda)$  при  $\lambda = 1.8$

**Утверждение 2.** *Существует такая  $\lambda_0$ , что система уравнений (8) имеет не менее четырех решений при  $\lambda > \lambda_0$ .*

**Замечание 3.** С помощью компьютерного анализа можно увидеть, что существует  $\lambda_{cr}$ , такая, что (8) имеет два решения при  $\lambda < \lambda_{cr}$  и четыре решения при  $\lambda > \lambda_{cr}$ . При этом в каждом случае одно из решений соответствует трансляционно-инвариантной мере Гиббса.

**Случай  $I_3$ .** Перепишем систему (5) на  $I_3$  при  $k \geq 1, i = 1$

$$\begin{cases} z_1 = \frac{(1+\lambda z_7)^k}{(1+\lambda z_7)^{k+\lambda}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^{k-1}} \\ z_7 = \frac{(1+\lambda z_1)^k}{(1+\lambda z_1)^{k+\lambda}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_7)^{k-1}} \end{cases} \quad (9)$$

После обозначений  $x = 1 + \lambda z_1$  и  $y = 1 + \lambda z_7$  из системы (9) имеем

$$\begin{cases} x^k - x^{k-1} = \frac{\lambda y^k}{y^{k+\lambda}} \\ y^k - y^{k-1} = \frac{\lambda x^k}{x^{k+\lambda}}. \end{cases}$$

Вычитая из первого уравнения второе в этой системе, получим уравнение

$$(x - y)[(x^{k-1} + \dots + y^{k-1} - (x^{k-2} + \dots + y^{k-2}))(x^k + \lambda)(y^k + \lambda) + \lambda^2(x^{k-1} + \dots + y^{k-1})] = 0,$$

которое имеет только решение вида  $x = y$  при  $x > 1, y > 1$ . Заметим, что если  $x = y$ , то  $z_1 = z_2 = z_3 = z_4 = z_5 = z_6 = z_7 = z_8$  при  $i = 1$ . Действительно, пусть  $z_1 = z_2 = z_7 = z_8$ . Тогда из первого и второго уравнений (2) получим  $z_4 = z_6$ , а из седьмого и восьмого уравнений той же системы (2)  $z_3 = z_5$ . Далее, из третьего и четвертого уравнений имеем

$$z_3 = \frac{1}{(1 + \lambda z_4)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1 + \lambda z_1)^{k-i+1}}, \quad z_4 = \frac{1}{(1 + \lambda z_3)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1 + \lambda z_1)^{k-i+1}},$$

откуда следует, что  $z_3 = z_4$  при  $i = 1$ . Значит,  $z_3 = z_4 = z_5 = z_6$ . Следовательно, (2) можно переписать

$$\begin{cases} z_1 = \frac{1}{(1+\lambda z_3)^i} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^{k-i}} \\ z_3 = \frac{1}{(1+\lambda z_3)^{i-1}} \cdot \frac{1}{(1+\lambda z_1)^{k-i+1}}. \end{cases}$$

Разделив первое уравнение на второе в этой системе получим, что  $z_1 = z_3$ .

**Утверждение 3.** Пусть  $k \geq 1, i = 1$ . Тогда система уравнений (9) имеет единственное решение при  $\lambda > 0$ .

**Случай  $I_4$ .** Перепишем систему (5) на  $I_4$  при  $k \geq 1, i = 1$

$$\begin{cases} z_1 = \frac{1+\lambda z_2}{(1+\lambda z_2)^{k+\lambda}} \\ z_2 = \frac{1+\lambda z_1}{(1+\lambda z_1)^{k+\lambda}} \end{cases} \quad (10)$$

После обозначений  $x = 1 + \lambda z_1$  и  $y = 1 + \lambda z_2$  из системы (10) имеем

$$\begin{cases} x = f(y) \\ y = f(x), \end{cases}$$

где  $f(x) = \frac{\lambda x}{x^{k+\lambda}} + 1$ . Заметим, что  $f(0) = 1, f(1) = \frac{\lambda}{1+\lambda} + 1 > 1$ . Вычислим производную

$$f'(x) = -\lambda \frac{(k-1)x^k - \lambda}{(x^k + \lambda)^2}.$$

Отсюда функция  $f(x)$  возрастает при  $0 < x < \sqrt[k]{\frac{\lambda}{k-1}}$  и убывает при  $x > \sqrt[k]{\frac{\lambda}{k-1}}$ , т.е.  $x_{max} = \sqrt[k]{\frac{\lambda}{k-1}}$ . Из всего сказанного следует, что уравнение  $f(x) = x$  имеет единственное решение при  $x > 1, \lambda > 0$ . Это еще можно увидеть, аналогично случаю  $I_2$ , используя теорему о количестве положительных корней многочлена (Рис.4).




Рис. 4. Графики функций  $y = x$  и  $y = f(x)$  при  $k = 3, \lambda = 1.5$

Аналогично случаю  $I_2$  при  $k = 2, i = 1$  и  $k = 3, i = 1$  получим

$$h_1(x) = (\lambda + 1)x^2 + \lambda x + 2\lambda^2 + \lambda,$$

$$h_2(x) = (\lambda + 1)x^6 - \lambda x^5 + 2\lambda x^4 + 2\lambda(\lambda + 1)x^3 + 2\lambda^2 x + 2\lambda^3 + \lambda^2,$$

соответственно. Очевидно, что  $h_1(x) > 0, h_2(x) > 0$  при  $x > 1, \lambda > 0$ . Значит, (10) не имеет решений, кроме  $z_1 = z_2$ , т.е. справедливо

**Утверждение 4.** Система уравнений (10) имеет единственное решение при  $k = 2$  и  $k = 3$ .

В силу всех утверждений и Леммы 2 справедлива следующая

**Теорема.** Для НС-модели в случае нормального делителя индекса четыре верны следующие утверждения:

1. При  $k \geq 1, i \leq k$  на  $I_1$  слабо периодическая мера Гиббса единственна. Более того, эта мера совпадает с единственной трансляционно-инвариантной мерой Гиббса.

2. Пусть  $k = 2, i = 1, \lambda_{cr} = 4$ . Тогда на  $I_2$  при  $\lambda < \lambda_{cr}$  существует одна слабо периодическая мера Гиббса, которая является трансляционно-инвариантной,

при  $\lambda = \lambda_{cr}$  существуют две слабо периодические меры Гиббса, одна из которых является трансляционно-инвариантной, другая слабо периодической (не периодической) и при  $\lambda > \lambda_{cr}$  существуют не менее двух слабо периодических (не периодических) мер Гиббса.

3. Пусть  $k = 3, i = 1$ . Тогда существует  $\lambda_0$  такая, что на  $I_2$  при  $\lambda > \lambda_0$  существуют не менее четырех мер Гиббса, одна из которых является трансляционно-инвариантной, а остальные слабо периодическими (не периодическими) мерами Гиббса.

4. При  $k \geq 1, i = 1$  на  $I_3$  слабо периодическая мера Гиббса единственна.

5. При  $k = 2, 3, i = 1$  на  $I_4$  слабо периодическая мера Гиббса единственна.

**Замечание 4.** Компьютерный анализ показывает, что система (10) имеет только одно решение при  $k = 4, 5, 6$  и  $\lambda > 0$ . А при  $k \geq 7$  при некоторых значениях  $\lambda$  можно увидеть, что у системы (10) решение не единственно, т.е. существуют слабо периодические (не периодические) меры Гиббса для НС-модели (Рис.5).




Рис. 5. График функции  $h(x)$  при  $k = 7$ ,  $\lambda = 1.765$  (сверху), при  $\lambda \approx 1.768674523476329362$  (по середине) и при  $\lambda = 1.775$  (снизу)

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Георги Х.-О. Гиббсовские меры и фазовые переходы. Москва. "Мир"1992.
- [2] Preston C. J. Gibbs States on Countable Sets. Cambridge Tracts Math., 68, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1974.

- [3] *Синай Я. Г.* Теория фазовых переходов. Строгие результаты. Наука, М., 1980.
- [4] *Bleher P. M., Ganikhodjaev N. N.* On pure phases of the Ising model on the Bethe lattice // Theor. Probab. Appl., **35**:2 (1990), 216-227.
- [5] *Bleher P. M., Ruiz J., Zagrebnov V.A.* On the purity of the limiting Gibbs state for the Ising model on the Bethe lattice // J. Stat. Phys., **79**: 1-2 (1995), 473-482.
- [6] *Ганиходжаев Н.Н., Розиков У.А.* Описание периодических крайних гиббсовских мер некоторых решеточных моделей на дереве Кэли // ТМФ, **111**: 1 (1997), 109-117.
- [7] *Розиков У.А.* Структуры разбиений на классы смежности группового представления дерева Кэли по нормальным делителям конечного индекса и их применения для описания периодических распределений Гиббса // ТМФ, **112**: 1 (1997), 170-176.
- [8] *Rozikov U.A., Suhov Yu.M.* Gibbs measures for SOS model on a Cayley tree // Inf. Dim. Anal. Quant. Prob. RT, **9**: 3 (2006), 471-488.
- [9] *Martin J.B., Rozikov U.A., Suhov Yu.M.* A three state hard-core model on a Cayley tree // J. Nonlin. Math. Phys., **12**: 3 (2005), 432-448.
- [10] *Ganikhodjaev N.N., Rozikov U.A.* On Ising model with four competing interactions on Cayley tree // Math. Phys. Anal. Geom. **12**:2 (2009), 141-156.
- [11] *Mukhamedov F.M., Rozikov U.A.* On Gibbs measures of models with competing ternary and binary interactions and corresponding von Neumann algebras // J. Stat. Phys. **119**:1-2 (2005), 427-446.
- [12] *Розиков У.А., Шоюсупов Ш.А.* Плодородные НС-модели с тремя состояниями на дереве Кэли // ТМФ, **156**:3 (2008), 412-424.
- [13] *Suhov Yu.M., Rozikov U.A.* A hard-core model on a Cayley tree: an example of a loss network // Queueing Systems, **46** (2004), 197-212.
- [14] *Розиков У.А., Рахматуллаев М.М.* Описание слабо периодических мер Гиббса модели Изинга на дереве Кэли // ТМФ, **156**: 2 (2008), 292-302.
- [15] *Розиков У.А., Рахматуллаев М.М.* Слабо периодические основные состояния и меры Гиббса для модели Изинга с конкурирующими взаимодействиями на дереве Кэли // ТМФ, **160**: 3 (2009), 507-516.
- [16] *Zachary S.* Countable state space Markov random fields and Markov chains on trees // Ann. Probab., **11** (1983), 894-903.
- [17] *Розиков У.А., Хажимов Р.М.* Условие единственности слабопериодической гиббсовской меры для модели жесткой сердцевины // ТМФ **173**:1 (2012), 60-70.
- [18] *Хажимов Р.М.* Единственность слабо периодической гиббсовской меры для НС-модели // Математические заметки. 2013, т. 94, № 5, с.796-800.