

Об эффективных численных методах решения задач энтропийно-линейного программирования в случае разреженных матриц

А.В. Гасников¹, Е.В. Гасникова¹, Ю.Е. Нестеров^{1,2}

¹ Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании,

Факультет управления и прикладной математики МФТИ, Долгопрудный

² CORE UCL (Belgium)

Рассматривается задача энтропийно-линейного программирования (ЭЛП) [1]

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i \rightarrow \min_{x \in S_n(1); Ax=b}, \quad (1)$$

где $S_n(1) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, i=1, \dots, n, \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}$ – единичный симплекс в \mathbb{R}^n . Мы считаем

матрицу A разреженной с не более чем $s \ll n$ элементами в каждой строке. Число строк в матрице A есть $m \ll n$. Двойственная задача имеет вид

$$\varphi(\lambda) = \langle \lambda, b \rangle - \ln \left(\sum_{i=1}^n \exp \left(\left[A^T \lambda \right]_i \right) \right) \rightarrow \max_{\lambda \in \mathbb{R}^m}. \quad (2)$$

Решения прямой и двойственной задачи связаны: $x_i(\lambda) = \exp \left(\left[A^T \lambda \right]_i - 1 \right)$. Под $(\varepsilon_f, \varepsilon)$ -решением задачи (1) будем понимать такой вектор x , что $f(x) - f_* \leq \varepsilon_f$, $\|Ax - b\|_2 \leq \varepsilon$.

Лемма 1. Пусть $\langle \lambda, \nabla \varphi(\lambda) \rangle \geq -\varepsilon_f$, $\|\nabla \varphi(\lambda)\|_2 \leq \varepsilon$, тогда $x(\lambda)$ – $(\varepsilon_f, \varepsilon)$ -решением задачи (1).

Доказательство. Соотношение $\nabla \varphi(\lambda) = b - Ax(\lambda)$ следует из теоремы Демьянова–Данскина и следующего представления двойственной задачи

$$\varphi(\lambda) = \min_{x \in S_n(1)} \{ f(x) + \langle \lambda, b - Ax \rangle \}.$$

Обозначим через x^* решение задач (1). Тогда

$$f(x(\lambda)) + \langle \lambda, b - Ax(\lambda) \rangle \leq f(x^*) + \langle \lambda, b - Ax^* \rangle = f(x^*) = f_*.$$

Откуда

$$f(x(\lambda)) \leq f(x^*) - \langle \lambda, b - Ax^* \rangle = f_* - \langle \lambda, \nabla \varphi(\lambda) \rangle \leq f_* + \varepsilon_f.$$

Лемма 2 (см. [2]). $\|\nabla \varphi(\lambda_2) - \nabla \varphi(\lambda_1)\|_2 \leq L \|\lambda_2 - \lambda_1\|_2$, где $L = \max_{1 \leq i \leq n} \left\| \left[A^T \right]^{(i)} \right\|_2$.

К сожалению, несмотря на установленную в лемме 2 гладкость функционала (2), мы имеем лишь довольно грубые оценки его сильной вогнутости. Быстрый градиентный метод (БГМ) [3] (стартующий с $\lambda = 0$) для задачи (2) будет требовать $O\left(\sqrt{LR^2/\tilde{\varepsilon}}\right)$ итераций, где $R = \|\lambda\|_2$ – размер решения задачи (2) (Слейтеровские соображения позволяют считать R ограниченным сверху $(\ln n)/\varepsilon$ [4], [5]), $\tilde{\varepsilon} = \min\left\{\varepsilon^2/L, \varepsilon_f^2/(LR^2)\right\}$ – точность решения задачи (2), гарантирующая в виду леммы 1, что $x(\lambda) - (\varepsilon_f, \varepsilon)$ -решение задачи (1). Далее для упрощения формул будем считать, что $\varepsilon_f \leq R\varepsilon$. Тогда оценка на число итераций примет вид $O\left(LR^2/\varepsilon_f\right)$. Регуляризуем функционал (2) по А.Н. Тихонову, добавив к нему “ $-(\delta/2)\|\lambda\|_2^2$ ”, где так подбираем $\delta = \varepsilon_f/(2R^2)$, чтобы $\langle \delta\lambda, \lambda \rangle \leq \varepsilon_f/2$ (см. лемму 1). Соответствующая версия БГМ, учитывающая сильную выпуклость с параметром δ , даст после k итераций:

$$\frac{1}{2L} \|\nabla \varphi(\lambda_k)\|_2^2 \leq \varphi_* - \varphi(\lambda_k) \leq 2(\varphi_* - \varphi(0)) \exp\left(-k\sqrt{\frac{\delta}{L}}\right) \leq LR^2 \exp\left(-k\sqrt{\frac{\delta}{L}}\right).$$

Откуда можно получить следующую оценку $O\left(\sqrt{L/\delta} \ln(LR^2/\varepsilon_f)\right) = O\left(\sqrt{LR^2/\varepsilon_f} \ln(LR^2/\varepsilon_f)\right)$ на число итераций БГМ для регуляризованной задачи (2), выдающего такое λ , что $x(\lambda) - (\varepsilon_f, \varepsilon)$ -решение задачи (1). Эта оценка показывает выгоду регуляризации.

Если посчитать затраты на одну итерацию, то основной вклад вносит расчет градиента $\nabla \varphi(\lambda) = b - Ax(\lambda)$, требующий $O(n + sm)$ арифметических операций. Общие затраты будут $O\left((n + sm)\sqrt{LR^2/\varepsilon_f} \ln(LR^2/\varepsilon_f)\right)$. Остается только одна проблема: неизвестность R . Хотя в шаг БПГМ R явно не входит, R входит в δ , от которого размер шага уже зависит. Также в критерий останова метода (закрывающийся в выполнении точно рассчитанного числа итераций) также входит R . Далее описана процедура рестартов,

позволяющая справиться с этой сложностью. Полагаем $R = 1$, делаем предписанное этому R число итераций и проверяем критерий останова $\|\nabla\varphi(\lambda)\|_2 \leq \varepsilon_f/R$ (поскольку φ_* – не известно, то критерий останова записан таким образом). Если этот критерий не выполняется, то полагаем $R := 2R$ и повторяем процедуру. Через не более чем $\lceil \log_2(2R) \rceil$ перезапусков мы остановимся.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 13-01-12007-офи_м, 14-01-00722-а, Президента РФ № МК-5285.2013.9, Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании ФУПМ МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073.

Литература

1. *Fang S.-C., Rajasekera J.R., Tsao H.-S.J.* Entropy optimization and mathematical programming. Kluwer's International Series, 1997.
2. *Nesterov Y.* Smooth minimization of non-smooth function // Math. Program. Ser. A. 2005. V. 103. № 1. P. 127–152.
3. *Нестеров Ю.Е.* Введение в выпуклую оптимизацию. М.: МЦНМО, 2010.
4. *Devolder O., Glineur F., Nesterov Y.* Double smoothing technique for large-scale linearly constrained convex optimization // SIAM Journal of Optimization. 2012. V. 22. № 2. P. 702–727.
5. *Гасников А.В., Дорн Ю.В., Нестеров Ю.Е., Шпирко С.В.* О трехстадийной версии модели стационарной динамики транспортных потоков // Математическое моделирование. 2014. Т. 26:6. С. 34–70. [arXiv:1405.7630](https://arxiv.org/abs/1405.7630)