

# Asymptotic properties of one-step weighted $M$ -estimators and applications to some regression problems

Yu. Yu. Linke \*

*Summary:* We study asymptotic behavior of one-step weighted  $M$ -estimators based on samples from arrays of not necessarily identically distributed random variables and representing explicit approximations to the corresponding consistent weighted  $M$ -estimators. Sufficient conditions are presented for asymptotic normality of the one-step weighted  $M$ -estimators under consideration. As a consequence, we consider some well-known nonlinear regression models where the procedure mentioned allow us to construct explicit asymptotically optimal estimators.

*Key words and phrases:* one-step  $M$ -estimator,  $M$ -estimator, weighted  $M$ -estimator, asymptotic normality, Newton's method, preliminary estimator, nonlinear regression, heteroscedasticity.

## 1 Введение

**1.1.** Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — независимые не обязательно одинаково распределенные наблюдения произвольной природы, распределения которых зависят от неизвестного параметра  $\theta \in \Theta$ . Задача состоит в оценивании этого параметра по наблюдениям  $X_1, \dots, X_n$ . Одним из основных общих методов получения оценок принято считать  $M$ -оценивание (см., например, [1]). Определим  $M$ -оценки  $\tilde{\theta}_n$  как статистики  $\tilde{\theta}_n$ , которые определены с вероятностью, стремящейся к 1, и являются решениями уравнений вида

$$\sum_{i=1}^n M_i(t, X_i) = 0 \quad (1)$$

для некоторого набора функций  $M_i(t, x)$ ,  $i = 1, \dots, n$ , с условием  $\mathbf{E}M_i(\theta, X_i) = 0$  при всех  $i$ . Подчеркнем, что обычно функции  $\{M_i(t, x)\}$  в той или иной статистической постановке выбираются таким образом, чтобы обеспечить желаемые свойства (в том или ином смысле оптимальность) соответствующей  $M$ -оценки (см., например, [28], а также примеры в §3).

*З а м е ч а н и е* 1. Отметим, что далеко не все корни уравнения (1) можно определить на множестве выборок асимптотически полной меры. Так, например,

---

\*Sobolev Institute of Mathematics, 4 Academician Koptyug ave., Novosibirsk, 630090 Russia; Novosibirsk State University, 2 Pirogov str., 630090 Russia. E-mail: linke@math.nsc.ru

возможна ситуация, когда количество корней при любом  $n$  (и даже в пределе при  $n \rightarrow \infty$ , см. [38]) будет невырожденной случайной величиной, и лишь один корень можно определить с вероятностью, стремящейся к 1. Более того, возможны ситуации, когда несколько корней  $M$ -уравнения могут быть определены с вероятностью, стремящейся к 1, или таковых корней нет, но с ненулевой вероятностью другие корни могут существовать (см. подробности в [10]).

Хорошо известно, что вычисление  $M$ -оценок нередко связано с серьезными техническими трудностями (например, вычисление оценок максимального правдоподобия или оценок метода наименьших квадратов для задач нелинейной регрессии), особенно в случае существования большого числа корней уравнения (1). Ситуация существенно упрощается, если известна некоторая предварительная состоятельная оценка  $\theta_n^*$  параметра  $\theta$ , приближающая параметр с нужной нам скоростью сходимости. Оказывается, что в этом случае достаточно лишь одного шага метода Ньютона, чтобы в явном виде построить оценку, обладающую теми же асимптотическими свойствами, как и  $M$ -оценка. Так называемую *одношаговую  $M$ -оценку* определим соотношением

$$\theta_n^{**} = \theta_n^* - \sum_{i=1}^n M_i(\theta_n^*, X_i) / \sum_{i=1}^n M'_i(\theta_n^*, X_i), \quad (2)$$

где  $\theta_n^*$  (здесь и далее) — некоторая предварительная состоятельная оценка параметра  $\theta$ , а через  $M'_i(t, X_i)$  обозначены производные этих функций по первому аргументу.

Оценка  $\theta_n^{**}$  представляет собой одну итерацию метода Ньютона с начальной точкой  $t = \theta_n^*$  для приближенного вычисления корня уравнения (1). В силу состоятельности  $\theta_n^*$  этот корень в широких условиях будет ближайшим корнем к  $\theta$  (и этот корень, тем не менее, может не быть  $M$ -оценкой; см. [10], а также замечание 5). Отметим, что в литературе на протяжении нескольких последних десятилетий, начиная с работ П. Хьюбера, П. Бикела, Р. Серфлинга, Н. Веравербеке, П.-К. Сена, К. Мюллер, Х. Юречковой, Д. Руперта, Р. Кэрролла и др. (см. библиографию здесь и в [10]) для обозначения таких по сути *двухшаговых* оценок используется термин *одношаговые* оценки в том смысле, что при наличии некоторой *предварительной* оценки (существование которой зачастую лишь постулируется) именно *за один шаг* метода Ньютона или некоторых его модификаций происходит качественное улучшение этой начальной статистики. Следуя устоявшейся терминологии оценки такого типа будем называть *одношаговыми*.

При некоторых условиях регулярности (см., например, [1] и [10]) для  $M$ -оценки  $\tilde{\theta}_n$  из (1) и одношаговой  $M$ -оценки  $\theta_n^{**}$ , определенной в (2), имеют место сходимости

$$\frac{J_n}{\sqrt{I_n}}(\tilde{\theta}_n - \theta) \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1), \quad \frac{J_n}{\sqrt{I_n}}(\theta_n^{**} - \theta) \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1), \quad \text{где} \quad (3)$$

$$I_n := \sum_{i=1}^n \mathbf{E} M_i^2(\theta, X_i) > 0, \quad J_n := \sum_{i=1}^n \mathbf{E} M'_i(\theta, X_i) \neq 0,$$

а запись вида  $\eta_n \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$  означает слабую сходимость распределений  $\eta_n$  к стандартному нормальному закону (всюду пределы, если не оговорено противное, бе-

рутся при  $n \rightarrow \infty$ ). Таким образом, одношаговая  $M$ -оценка  $\theta_n^{**}$  оказывается асимптотически нормальной с той же асимптотической дисперсией, что и  $M$ -оценка  $\tilde{\theta}_n$ . При этом в (3) соотношение для  $\theta_n^{**}$  может иметь место, в то время как  $M$ -оценка  $\tilde{\theta}_n$  не существует или не состоятельна (впервые подобный эффект был отмечен Л.Ле Камом [35] в случае однородной выборки, подробности и комментарии в случае не обязательно одинаково распределенной выборки приведены в [10]).

**1.2.** Предположим теперь, что функции  $M_i(t, X_i)$  из (1) имеют вид

$$M_i(t, X_i) = h_i(t)\tilde{M}_i(t, X_i). \quad (4)$$

Подобная факторизация для функций  $M_i(t, X_i)$  естественным образом возникает в некоторых статистических задачах. Например, оценка метода наименьших квадратов в задаче нелинейной регрессии есть  $M$ -оценка  $\tilde{\theta}_n$ , являющаяся решением уравнения  $\sum_{i=1}^n f'_i(t)(X_i - f_i(t)) = 0$ , где  $f_i(\cdot)$  — известная регрессионная функция (см. подробности и др. примеры в §3). Тем самым, можно положить  $h_i(t) = f'_i(t)$  и  $\tilde{M}_i(t, X_i) = X_i - f_i(t)$ .

Если функции  $h_i(t)$  достаточно регулярные (скажем, удовлетворяют условию Гельдера), то в окрестности истинного значения параметра  $\theta$  функции  $M_i(t, X_i)$  вида (4) и  $h_i(\theta_n^*)\tilde{M}_i(t, X_i)$  будут в известном смысле близкими. Это позволяет надеяться, что в окрестности истинного значения параметра будут близки корни  $\tilde{\theta}_n$  уравнения (1) в случае (4) и корни  $\hat{\theta}_n$  уравнения

$$\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*)\tilde{M}_i(t, X_i) = 0. \quad (5)$$

Используя один шаг метода Ньютона с начальной точкой  $t = \theta_n^*$  для приближенного поиска состоятельного решения  $\hat{\theta}_n$  уравнения (5), получаем следующую одношаговую оценку для параметра  $\theta$ :

$$\tilde{\theta}_n^{**} = \theta_n^* - \frac{\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*)\tilde{M}_i(\theta_n^*, X_i)}{\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*)\tilde{M}'_i(\theta_n^*, X_i)}. \quad (6)$$

Корни  $\hat{\theta}_n$  уравнения вида (5), определенные с вероятностью, стремящейся к 1, будем называть *взвешенными  $M$ -оценками*, а оценки, определяемые соотношениями вида (6) — *одношаговыми взвешенными  $M$ -оценками*.

Отметим, что в случае (4) одношаговая  $M$ -оценка  $\theta_n^{**}$  из (2) имеет вид

$$\theta_n^{**} = \theta_n^* - \frac{\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*)\tilde{M}_i(\theta_n^*, X_i)}{\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*)\tilde{M}'_i(\theta_n^*, X_i) + \sum_{i=1}^n h'_i(\theta_n^*)\tilde{M}_i(\theta_n^*, X_i)}. \quad (7)$$

При выполнении некоторых условий регулярности эта одношаговая  $M$ -оценка является асимптотически нормальной с асимптотической дисперсией, определяемой

соотношением (см. (3) и (4))

$$I_n/J_n^2 \equiv \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) \mathbf{E} \widetilde{M}_i^2(\theta, X_i) / \left( \sum_{i=1}^n h_i(\theta) \mathbf{E} \widetilde{M}_i'(\theta, X_i) \right)^2, \quad (8)$$

где мы учли, что  $\mathbf{E} \widetilde{M}_i(\theta, X_i) = 0$ .

В данной работе изучаются одношаговые взвешенные  $M$ -оценки. Будет установлено, что при некоторых условиях регулярности одношаговая взвешенная  $M$ -оценка из (6) является асимптотически нормальной с той же асимптотической дисперсией (8), что и оценка  $\theta_n^{**}$  из (7). Отметим, что одношаговая взвешенная  $M$ -оценка из (6) проще, и ее конструкция не предполагает, в отличие от оценки  $\theta_n^{**}$  из (7), дифференцируемость функций  $h_i(t)$ . В частности, для отмеченной выше задачи одношагового приближения оценки метода наименьших квадратов последнее означает меньшие условия на гладкость регрессионной функции  $f_i(\theta)$ . Другие аргументы в пользу рассмотрения одношаговых взвешенных  $M$ -оценок мы приведем в §3.

**1.3.** Идея одношагового оценивания впервые была предложена Р. Фишером [27] в задаче приближенного поиска состоятельных оценок максимального правдоподобия в случае однородной выборки. Исследование одношаговых оценок Фишера, а также их уточнений и обобщений в случае одинаково распределенной выборки содержится в ряде монографий и статей (см., например, [1], [7], [29], [31], [8], [21], [35], [40], [42], [13], [9] и ссылки там же).

Возможность использования методологии одношагового оценивания в статистических задачах с разнораспределенными выборочными наблюдениями хорошо известна (см., например, монографии [1], [21], [32], [33], [28]) и успешно используется в различных специальных статистических задачах (см., например, [23], [21], [2], [30], [25], [22], [26], [32], [33], [37] и ссылки там же). По-видимому, впервые одношаговые оценки в случае разнораспределенных наблюдений были предложены в [23] для задачи робастного оценивания в линейных моделях. В работе автора [10] изучается асимптотическое поведение одношаговых  $M$ -оценок общего вида (функции, определяющие эти оценки, не связаны со специальной статистической задачей). Терминология одношаговых взвешенных  $M$ -оценок и взвешенных  $M$ -оценок использовалась, например, в [22] для схожих статистик в специальной обобщенной модели линейной регрессии, а также частично в [2] для одной частной регрессионной задачи.

Как правило, в литературе исследуются два аспекта, связанные с одношаговыми оценками: сближение одношаговых оценок и параметра (в частности, асимптотическая нормальность этих оценок), а также сближение одношаговой  $M$ -оценки и состоятельной  $M$ -оценки. Стоит отметить, что обычно при изучении одношаговых оценок в качестве предварительных оценок параметра рассматриваются  $\sqrt{n}$ -ограниченные оценки (т.е. оценки, удовлетворяющих соотношению  $\sqrt{n}(\theta_n^* - \theta) = O_p(1)$ ). Исключение составляют лишь монография [7] и работы [13], [30], [10], [9]. Тем не менее, задачи приближенного поиска  $M$ -оценок возникают и в случае, когда скорость сближения предварительной оценки и параметра оказывается медленнее, чем  $O(n^{-1/2})$  (см., например, [9], [13]). В работе автора [10] найдены условия асимптотической нормальности одношаговых  $M$ -оценок общего вида в широком спектре

ограничений на точность предварительной оценки. Более подробный библиографический обзор об одношаговом оценивании содержится в [10].

**1.4.** О структуре работы. В §2 при достаточно общих условиях (в том числе и на точность предварительной оценки  $\theta_n^*$ ) доказана асимптотическая нормальность одношаговых взвешенных  $M$ -оценок. Построены оценки для асимптотической дисперсии одношаговых взвешенных  $M$ -оценок и доказана сходимость к стандартному нормальному закону погрешностей оценивания при замене асимптотических дисперсий их оценками, что может быть полезным при построении доверительных интервалов и для проверки статистических гипотез. Проведена процедура оптимизации функций  $\{h_i(\cdot)\}$ , участвующих в построении одношаговых взвешенных  $M$ -оценок (а также взвешенных  $M$ -оценок).

В дальнейшем символ «тильда» у функций  $\widetilde{M}_i(t, X_i)$  в определении (6) одношаговых взвешенных  $M$ -оценок мы будем опускать, так что формально одношаговые взвешенные  $M$ -оценки можно рассматривать как некоторые обобщения классических одношаговых  $M$ -оценок (2). В разделе 2.3 в качестве следствия приведены условия асимптотической нормальности одношаговых  $M$ -оценок. Приведенные результаты в случае однородной выборки обобщают и утверждения из [40], [7], [8] и [13] об асимптотической нормальности оценок Фишера и одношаговых  $M$ -оценок, построенных по выборке одинаково распределенных наблюдений (см. подробности в [13] и [10]).

§3 целиком посвящен регрессионным приложениям. Наш интерес к одношаговому оцениванию в случае разнораспределенных наблюдений в первую очередь связан с возможностью эффективного применения этих процедур в различных задачах оптимального оценивания параметров в моделях нелинейной регрессии. В частности, при наличии некоторой явной предварительной оценки параметра одношаговые оценки позволяют находить явные асимптотически оптимальные оценки неизвестного параметра в гетероскедастических моделях нелинейной регрессии. Предлагаемая процедура оценивания иллюстрируется несколькими примерами известных задач нелинейной регрессии.

Доказательства всех утверждений отнесены в §4.

## 2 Основные результаты.

**2.1.** В этом разделе будут получены условия асимптотической нормальности одношаговых взвешенных  $M$ -оценок.

Нам потребуются следующие предположения.

(**R**<sub>1</sub>). Наблюдается выборка объема  $n$ , состоящая из независимых элементов  $X_1, X_2, \dots, X_n$  со значениями в произвольном измеримом пространстве  $\mathcal{X}$  и распределениями  $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, \dots, \mathcal{L}_n$ , зависящими от интересующего нас основного неизвестного параметра  $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$ , где  $\Theta$  — открытое множество. Кроме того, эти распределения зависят, вообще говоря, от  $n$ , и, возможно, зависят также от некоторых мешающих параметров произвольной природы.

(**R**<sub>2</sub>). На множестве  $\Theta$  при любом  $i$  заданы зависящие, вообще говоря, от  $n$  функции  $h_i(t)$ ,  $M_i(t, X_i)$  и  $M'_i(t, X_i)$ , при этом для каждого интервала  $(t_1, t_2)$ , це-

ликом лежащего в  $\Theta$ , с вероятностью 1 имеет место равенство

$$M_i(t_2, X_i) - M_i(t_1, X_i) = \int_{t_1}^{t_2} M_i'(t, X_i) dt \quad \forall (t_1, t_2) \subset \Theta, \quad (9)$$

справедливы соотношения

$$\mathbf{E}M_i(\theta, X_i) = 0, \quad \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i) < \infty, \quad \mathbf{E}|M_i'(\theta, X_i)| < \infty, \quad (10)$$

а функции  $h_i(\cdot)$  удовлетворяют условию Гельдера с показателем  $p \in (0, 1]$ :

$$|h_i(t_1) - h_i(t_2)| \leq \bar{h}_i |t_1 - t_2|^p \quad \forall t_1, t_2 \in \Theta. \quad (11)$$

(**R**<sub>3</sub>). Начиная с некоторого  $n$

$$I_{n,h} := \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i) > 0, \quad J_{n,h} := \sum_{i=1}^n h_i(\theta) \mathbf{E}M_i'(\theta, X_i) \neq 0 \quad (12)$$

и имеют место сходимости:  $|J_{n,h}|/\sqrt{I_{n,h}} \rightarrow \infty$ ,

$$\sum_{i=1}^n h_i(\theta) M_i'(\theta, X_i) / J_{n,h} \xrightarrow{p} 1, \quad \sum_{i=1}^n h_i(\theta) M_i(\theta, X_i) / \sqrt{I_{n,h}} \implies \mathcal{N}(0, 1). \quad (13)$$

Положим  $\bar{\tau}_i(\delta) := \mathbf{E}\tau_i(\delta, X_i)$ , где

$$\tau_i(\delta, X_i) := \begin{cases} \sup_{t: |t-\theta| \leq \delta} |M_i'(t, X_i) - M_i'(\theta, X_i)|, & \text{если } [\theta - \delta, \theta + \delta] \subset \Theta, \\ \infty, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (14)$$

(**R**<sub>4</sub>). Имеет место сходимоть

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (|h_i(\theta)| + \delta^p \bar{h}_i) \bar{\tau}_i(\delta) / |J_{n,h}| = 0.$$

(**R**<sub>5</sub>). Оценка  $\theta_n^*$  такова, что

$$|\theta_n^* - \theta| \sum_{i=1}^n (\bar{h}_i |\theta_n^* - \theta|^p + |h_i(\theta)|) \bar{\tau}_i(|\theta_n^* - \theta|) / \sqrt{I_{n,h}} \xrightarrow{p} 0, \quad (15)$$

$$|\theta_n^* - \theta|^p \sum_{i=1}^n \bar{h}_i \mathbf{E}|M_i'(\theta, X_i)| / |J_{n,h}| \xrightarrow{p} 0. \quad (16)$$

Обозначим через  $(R)$  группу условий, которая включает в себя предположения  $(R_1), \dots, (R_5)$ . Одношаговые взвешенные  $M$ -оценки определим соотношением

$$\theta_{n,M,h}^{**} = \theta_n^* - \sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*) M_i(\theta_n^*, X_i) / \sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*) M_i'(\theta_n^*, X_i). \quad (17)$$

Имеет место

**Теорема 1.** Пусть выполнено предположение (R) и условие

$$\delta_n^h := \sum_{i=1}^n (h_i(\theta_n^*) - h_i(\theta)) M_i(\theta, X_i) / \sqrt{I_{n,h}} \xrightarrow{p} 0. \quad (18)$$

Тогда одношаговая взвешенная  $M$ -оценка  $\theta_{n,M,h}^{**}$  определена с вероятностью, стремящейся к 1, и

$$\frac{J_{n,h}}{\sqrt{I_{n,h}}} (\theta_{n,M,h}^{**} - \theta) \implies \mathcal{N}(0, 1). \quad (19)$$

*З а м е ч а н и е 2.* Достаточные условия для выполнения соотношений (13), являющихся вариантами закона больших чисел и центральной предельной теоремы в схеме серий, хорошо известны (см., например, [1]). Для справедливости (R<sub>4</sub>) и (R<sub>5</sub>) достаточно, чтобы имели место следующие условия:

$$|M_i(t, X_i) - M_i(\theta, X_i)| \leq \overline{M}_i |t - \theta|^q \quad \text{при } q \in (0, 1], \quad n^{\frac{1}{2(1+q)}} (\theta_n^* - \theta) \xrightarrow{p} 0,$$

$$1/I_{n,h} + 1/|J_{n,h}| = O(1/n), \quad \sup_{n,i} \{|h_i(\theta)|, \overline{h}_i, \mathbf{E}\overline{M}_i, \mathbf{E}|M'_i(\theta, X_i)|\} < \infty, \quad p > 0. \quad (20)$$

*З а м е ч а н и е 3.* Обсудим подробно условие (18), используемое в теореме 1. Если функции  $h_i(t)$  достаточно гладкие, чтобы при выводе (18) воспользоваться формулой Тейлора, то не трудно получить простые достаточные условия для (18). В случае же, когда функции  $h_i(t)$  удовлетворяют лишь условию Гельдера, доказательство (18) представляет некоторую техническую трудность. Приведем два утверждения, содержащие достаточные условия для выполнения (18). В предложениях 1 и 2 считаем, что выполнено условие (R<sub>1</sub>), первые два соотношения в (10) и первое условие в (12). Без ограничения общности будем также считать, что функции  $h_i(t)$  продолжены на  $\mathbb{R}$  с выполнением условия Гельдера (11) на всей числовой прямой.

Из теоремы 3 в [11] нетрудно извлечь

*П р е д л о ж е н и е 1.* Пусть оценка  $\theta_n^*$  имеет следующую структуру

$$\theta_n^* - \theta = \sum_{i=1}^n u_{ni}(\theta, X_i) / \left(1 + \sum_{i=1}^n v_{ni}(\theta, X_i)\right), \quad (21)$$

при этом  $\mathbf{E}u_{ni}(\theta, X_i) = \mathbf{E}v_{ni}(\theta, X_i) = 0$ ,  $\mathbf{E}u_{ni}^2(\theta, X_i) < \infty$ ,  $\mathbf{E}v_{ni}^2(\theta, X_i) < \infty$  и

$$d_n + \sum_{i=1}^n \mathbf{E}v_{ni}^2(\theta, X_i) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad d_n^2 := \sum_{i=1}^n \mathbf{E}u_{ni}^2(\theta, X_i),$$

$$d_n^{2p} \left( \sum_{i=1}^n \left( \overline{h}_i^2 \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i) \right)^{1/(2-p)} \right)^{2-p} / I_{n,h} \rightarrow 0. \quad (22)$$

Тогда имеет место (18).

Подчеркнем, что во всех примерах §3 оценки  $\theta_n^*$  имеют структуру (21). Отметим еще, что для справедливости центрального условия (22) достаточно, чтобы выполнялись соотношения

$$n^{(1/p-1)/2}d_n \rightarrow 0, \quad 1/I_{n,h} = O(1/n), \quad \sup_{n,i}\{\bar{h}_i, \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i)\} < \infty. \quad (23)$$

В частности, первое условие в (23) выполнено в следующих трех случаях:

$$\sqrt{nd_n} = O(1) \text{ и } p > 1/2, \quad n^{1/4}d_n \rightarrow 0 \text{ и } p \geq 2/3, \quad d_n \rightarrow 0 \text{ и } p = 1.$$

В случае, когда  $\theta_n^*$  имеет дробно-линейную структуру, достаточные условия для (18) можно получать и в терминах сближения  $\theta_n^*$  и  $\theta$  по вероятности (т.е. в терминах условия  $n^{(1/p-1)/2}(\theta_n^* - \theta) \xrightarrow{p} 0$ ) (см. подробности в [12]).

Обозначим через  $\mathbf{E}_{\neq i}$  условное математическое ожидание, взятое при условии, что при всех  $j \neq i$  фиксированы значения  $X_j, j = 1, \dots, n$ . В следующем предложении достаточные условия для (18) не содержат предположения о дробно-линейной структуре  $\theta_n^*$ .

*Предложение 2. Если  $\mathbf{E}|\theta_n^*|^2 < \infty$  и*

$$(\mathbf{E}|\theta_n^* - \theta|^2)^p \sum_{i=1}^n \bar{h}_i^2 \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i) / I_{n,h} \rightarrow 0, \quad (24)$$

$$\sum_{i=1}^n \bar{h}_i (\mathbf{E}|\theta_n^* - \mathbf{E}_{\neq i}\theta_n^*|^2)^{p/2} (\mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i))^{1/2} / \sqrt{I_{n,h}} \rightarrow 0, \quad (25)$$

то имеет место (18). □

Положим

$$d_{n,M,h}^* = \sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*) M_i'(\theta_n^*, X_i) / \left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta_{n,M,h}^{**}) M_i^2(\theta_{n,M,h}^{**}, X_i) \right)^{1/2} \quad (26)$$

Следующее утверждение может быть полезным при построении доверительных интервалов и проверке гипотез, поскольку множитель  $d_{n,M,h}^*$ , нормирующий разность  $\theta_{n,M,h}^{**} - \theta$ , является статистикой.

**Теорема 2.** *Если выполнены условия теоремы 1 и*

$$\frac{\sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) M_i^2(\theta, X_i)}{I_{n,h}} \xrightarrow{p} 1, \quad \frac{\sum_{i=1}^n (\bar{h}_i^2 + h_i^2(\theta)) [M_i'(\theta, X_i)]^2}{J_{n,h}^2} \xrightarrow{p} 0, \quad \frac{\sum_{i=1}^n \bar{h}_i^2 M_i^2(\theta, X_i)}{J_{n,h}^{2p} I_{n,h}^{1-p}} \xrightarrow{p} 0, \quad (27)$$

то статистика  $d_{n,M,h}^*$  определена с вероятностью, стремящейся к 1 и

$$d_{n,M,h}^*(\theta_{n,M,h}^{**} - \theta) \implies \mathcal{N}(0, 1). \quad (28)$$



Дополнительные условия в теореме 2 не являются ограничительными, поскольку первая сходимост в (27) — это вариант закона больших чисел, а для справедливости двух других сходимостей из (27) достаточно, чтобы вместе с первым соотношением в (20) выполнялось условие  $\sup_{n,i} \{ |h_i(\theta)|, \bar{h}_i, \mathbf{E}|M'_i(\theta, X_i)|, \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i) \} < \infty$ .

**2.2.** Рассмотрим теперь вопрос оптимизации функций  $h_i(\cdot)$ , напрямую связанный с минимизацией асимптотической дисперсии  $I_{n,h}/J_{n,h}^2$ .

**Предложение 3.** Пусть  $J_{n,h} \equiv \sum_{i=1}^n h_i(\theta) \mathbf{E}M'_i(\theta, X_i) \neq 0$  начиная с некоторого  $n$ . В этом случае определена величина  $I_{n,h}/J_{n,h}^2$  и

$$\frac{I_{n,h}}{J_{n,h}^2} \geq \frac{I_{n,h^o}}{J_{n,h^o}^2} \equiv \left( \sum_{i=1}^n \frac{(\mathbf{E}M'_i(\theta, X_i))^2}{\mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i)} \right)^{-1} \quad \text{при} \quad h_i^o(\theta) = \frac{\mathbf{E}M'_i(\theta, X_i)}{\mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i)}. \quad (29)$$

Если дополнительно  $\text{sign}h_i(\theta) = \text{sign}h_i^o(\theta)$ , то справедливо неравенство:

$$1 \leq \frac{I_{n,h}/J_{n,h}^2}{I_{n,h^o}/J_{n,h^o}^2} \leq 1 + \frac{(\sqrt{H/h} - 1)^2}{2\sqrt{H/h}} \leq \sqrt{\frac{H}{h}}, \quad \text{где} \quad (30)$$

$$h := \min_{\{i: \mathbf{E}M'_i(\theta, X_i) \neq 0\}} h_i(\theta)/h_i^o(\theta) > 0, \quad H := \max_{\{i: \mathbf{E}M'_i(\theta, X_i) \neq 0\}} h_i(\theta)/h_i^o(\theta) < \infty. \quad (31)$$

Неравенство (30) можно интерпретировать как некоторое свойство устойчивости оценок с асимптотической дисперсией  $I_{n,h}/J_{n,h}^2$  как функционалов, зависящих от набора функций  $\{h_i(\cdot)\}$ : чем лучше  $h_i(\theta)$  приближают оптимальные  $h_i^o(\theta)$ , тем меньше асимптотическая дисперсия  $I_{n,h}/J_{n,h}^2$  отличается от оптимальной  $I_{n,h^o}/J_{n,h^o}^2$ . Ранее аналог неравенства (30) для асимптотических дисперсий специального вида был получен в [17] и [16].

Неравенство (30) позволяет сделать некоторые рекомендации по выбору функций  $h_i(\cdot)$ , участвующих в определении оценки  $\theta_{n,M,h}^{**}$ . Если оптимальные функции  $h_i^o(\cdot)$  нам известны (см., например, §3), то в качестве  $h_i(\cdot)$  разумно взять оптимальные функции, т.е. положить  $h_i(\cdot) = h_i^o(\cdot)$ . Но если, скажем, оптимальные функции  $h_i^o(\cdot)$  не удовлетворяют условиям теоремы 1, то можно использовать функции  $\tilde{h}_i^o(\cdot)$ , полученные в результате соответствующего сглаживания функций  $h_i^o(\cdot)$ . Кроме того, поскольку распределения  $\{\mathcal{L}_i\}$  могут зависеть от некоторых мешающих параметров, то оптимальные функции  $h_i^o(\cdot)$  могут быть не известны (см., например, замечание 7). В этом случае можно рекомендовать использовать некоторые функции  $\tilde{h}_i^o(\cdot)$ , которые должны, по-возможности, “не очень сильно отличаться” от неизвестных функций  $h_i^o(\cdot)$ . При этом соотношение (30) гарантирует, что асимптотическая дисперсия  $I_{n,\tilde{h}^o}/J_{n,\tilde{h}^o}^2$  одношаговой взвешенной  $M$ -оценки будет “не очень сильно отличаться” от оптимальной асимптотической дисперсии  $I_{n,h^o}/J_{n,h^o}^2$ .

Разумеется, приведенные здесь соображения по выбору функций  $h_i(\cdot)$  в полной мере относятся и к выбору этих функций при построении  $M$ -оценок в случае (4) и взвешенных  $M$ -оценок.

**2.3.** В качестве следствия из теоремы 1 можно получить условия асимптотической нормальности для одношаговых  $M$ -оценок (2). Чтобы привести соответствующее утверждение, нам потребуется аналог условия (R) при  $h_i(t) \equiv 1$  и  $\bar{h}_i \equiv 0$ .

Обозначим через  $(R^-)$  группу условий, включающую в себя условие  $(R_1)$ , условия (9) и (10) из  $(R_2)$  и приводимые далее условия  $(R_3^-)$ - $(R_5^-)$ .

$(R_3^-)$ . Начиная с некоторого  $n$   $I_n := \sum_{i=1}^n \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i) > 0$ ,  $J_n := \sum_{i=1}^n \mathbf{E}M_i'(\theta, X_i) \neq 0$  и имеют место сходимости:

$$|J_n|/\sqrt{I_n} \rightarrow \infty, \quad \sum_{i=1}^n M_i'(\theta, X_i)/J_n \xrightarrow{p} 1, \quad \sum_{i=1}^n M_i(\theta, X_i)/\sqrt{I_n} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

$(R_4^-)$ . Имеет место соотношение  $\lim_{\delta \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \bar{\tau}_i(\delta)/|J_n| = 0$ .

$(R_5^-)$ . Оценка  $\theta_n^*$  такова, что  $|\theta_n^* - \theta| \sum_{i=1}^n \bar{\tau}_i(|\theta_n^* - \theta|)/\sqrt{I_n} \xrightarrow{p} 0$ .

Из теоремы 1 нетрудно извлечь

**Следствие 1.** Пусть выполнено предположение  $(R^-)$ . Тогда одношаговая  $M$ -оценка (2) определена с вероятностью, стремящейся к 1, и

$$\frac{J_n}{\sqrt{I_n}}(\theta_n^{**} - \theta) \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

Если дополнительно  $\sum_{i=1}^n M_i^2(\theta, X_i)/I_n \xrightarrow{p} 1$  и  $\sum_{i=1}^n [M_i'(\theta, X_i)]^2/J_n^2 \xrightarrow{p} 0$ , то

$$d_n^*(\theta_{n,M}^{**} - \theta) \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{при} \quad d_n^* = \sum_{i=1}^n M_i'(\theta_n^*, X_i) / \left( \sum_{i=1}^n M_i^2(\theta_{n,M}^{**}, X_i) \right)^{1/2}.$$

*З а м е ч а н и е 4.* Условие  $(R_5)$  и его частный случай  $(R_5^-)$  являются некоторыми универсальными ограничениями, связывающими гладкость функций, определяющих одношаговую оценку, со скоростью сближения предварительной оценки  $\theta_n^*$  и параметра  $\theta$ , которые нужны для асимптотической нормальности одношаговых оценок. При этом точность предварительной оценки  $\theta_n^*$  и гладкость функций  $\{M_i(\cdot, X_i)\}$  обратно пропорциональны друг другу: чем меньше точность, тем больше должна быть гладкость (см. также замечание 2).

Например, для выполнения  $(R_5^-)$  достаточно, чтобы функции  $\{M_i(t, X_i)\}$  и оценка  $\theta_n^*$  одновременно удовлетворяли одному из следующих двух условий:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n \bar{\tau}_i(\delta)}{|J_n|} = o(\delta^\alpha) \text{ при } \delta \rightarrow 0, \quad \left( \frac{|J_n|}{\sqrt{I_n}} \right)^{1/(1+\alpha)} |\theta_n^* - \theta| = O_p(1), \quad 0 \leq \alpha < 1;$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n \bar{\tau}_i(\delta)}{|J_n|} = O(\delta^\alpha) \text{ при } \delta \rightarrow 0, \quad \left( \frac{|J_n|}{\sqrt{I_n}} \right)^{1/(1+\alpha)} |\theta_n^* - \theta| \xrightarrow{p} 0, \quad 0 < \alpha \leq 1.$$

В частности, в двух крайних случаях получаем следующие ограничения на точность  $\theta_n^*$ :  $\frac{|J_n|}{\sqrt{I_n}}|\theta_n^* - \theta| = O_p(1)$  при  $\alpha = 0$  и  $\frac{|J_n|^{1/2}}{I_n^{1/4}}|\theta_n^* - \theta| \xrightarrow{p} 0$  при  $\alpha = 1$ . Таким образом, если  $|J_n|/\sqrt{I_n} \sim \sqrt{n}$ , то указанные ограничения на точность  $\theta_n^*$  есть либо предположение о  $\sqrt{n}$ -ограниченности, либо об  $n^{1/4}$ -состоятельности предварительной оценки. Отметим еще, что для одношагового применения изучаемых оценок при широких ограничениях условие  $\frac{|J_n|^{1/2}}{I_n^{1/4}}|\theta_n^* - \theta| \xrightarrow{p} 0$  близко к минимальному достаточному условию на точность предварительной оценки (этот факт доказан в [9]). Таким образом, асимптотическая нормальность одношаговых оценок установлена в достаточно широком спектре ограничений на точность предварительной оценки  $\theta_n^*$ .  $\square$

*З а м е ч а н и е 5.* Отметим, что полученные в работе условия асимптотической нормальности одношаговых  $M$ -оценок не гарантируют не только состоятельность соответствующей  $M$ -оценки, но и даже ее существование. Дело в том, что при некоторых локальных и весьма слабых ограничениях (не гарантирующих даже существование  $M$ -оценки) в окрестности  $\theta$  с вероятностью, стремящейся к 1, существует и единственен корень  $\tilde{\theta}_n(\theta)$  уравнения (1) — ближайший к  $\theta$  корень этого уравнения, обладающий требуемой точностью. Указанную случайную величину  $\tilde{\theta}_n(\theta)$ , зависящую от  $\theta$  и не являющуюся статистикой, и приближают одношаговые  $M$ -оценки (подробнее объяснения отмеченному эффекту, а также библиографические ссылки, приведены в [10]). Аналогичное замечание имеет место и для одношаговых взвешенных  $M$ -оценок.

### 3 Приложения к задачам регрессии

Рассмотрим некоторые статистические приложения полученных здесь результатов. Отметим, что различные примеры статистических задач, в которых возникает  $M$ -оценивание в случае разнораспределенной выборки в схеме серий (и, как следствие, зачастую возникает и необходимость в применении одношаговых процедур) можно найти, например, в монографиях [1], [28], [21], [32], [33]. Здесь мы приведем несколько примеров, относящихся к оцениванию в классических задачах как гомоскедастической, так и гетероскедастической нелинейной регрессии.

**3.1.** Пусть наблюдения  $X_i$  представимы в виде

$$X_i = f_i(\theta) + \varepsilon_i \quad \text{при} \quad f_i(\cdot) = f(\cdot, a_i), \quad i = 1, \dots, n, \quad (32)$$

где  $f(\cdot, \cdot)$  — известная функция, при всех  $i$  значение (скалярного или векторного) аргумента  $a_i$  известно, погрешности  $\{\varepsilon_i\}$  — последовательность независимых случайных величин с нулевыми средними, а условие гомоскедастичности означает, что  $\mathbf{D}\varepsilon_i = \sigma^2$  при всех  $i$  (в противном случае говорят о гетероскедастичности модели).

Один из основных методов нахождения оценки параметра  $\theta$  в этой задаче — метод наименьших квадратов (МНК) — состоит в минимизации суммы квадратов ошибок  $\{\varepsilon_i\}$ , т.е. МНК-оценка есть  $\tilde{\theta}_n = \arg \min_{\theta} \sum_{i=1}^n (X_i - f_i(\theta))^2$ . При некоторых

условиях регулярности отыскание МНК-оценки сводится к решению уравнения

$$\sum_{i=1}^n f'_i(t)(X_i - f_i(t)) = 0 \quad (33)$$

Если функция  $f_i(\theta)$  линейна по  $\theta$ , то МНК-оценка считается в явном виде и обладает рядом оптимальных свойств: является наилучшей линейной несмещенной оценкой, а в случае нормально распределенных ошибок — наилучшей и в классе всех несмещенных оценок (см., например, [3], [5], [18]).

Если же зависимость наблюдений от параметра нелинейная, то уравнение (33), как правило, не может быть решено аналитически. Более того, свойства линейных МНК-оценок не переносятся автоматически на нелинейный случай: в общем случае, нелинейные МНК-оценки могут не существовать или не быть состоятельными (см., например, [3]). Тем не менее, при выполнении некоторых условий регулярности, нелинейные МНК-оценки все же обладают некоторыми оптимальными свойствами по крайней мере в асимптотике. Обоснованием точности нелинейного МНК в случае, когда ошибки имеют нормальное распределение, может служить совпадение в этом случае МНК-оценок и оценок метода максимального правдоподобия. Подробную библиографию публикаций, связанных с изучением свойств нелинейных МНК-оценок, можно найти, например, в [39]. Отметим, что при некоторых условиях регулярности асимптотическая дисперсия МНК-оценки есть

$$\sigma^2 / \sum_{i=1}^n (f'_i(\theta))^2. \quad (34)$$

Таким образом, в нелинейном МНК главная проблема касается вычислительной стороны: как отыскать оценку  $\hat{\theta}_n$ , определяемую уравнением (33), и являющуюся точкой глобального минимума соответствующей функции. Существует ряд приближенных численных методов решения этой задачи и выбор того или иного метода зависит от многих факторов, в том числе от вида функции  $f_i(\theta)$ . Зачастую проблема поиска нелинейной МНК-оценки связана с наличием большого числа локальных минимумов у минимизируемой функции, а потому при неудачном выборе начального приближения параметра итерационные процедуры обнаруживают лишь локальный минимум, ближайший к этой стартовой точке. Указанный факт существенно затрудняет задачу глобальной минимизации (подробнее о вопросах приближенного поиска нелинейной МНК-оценки и возникающих при этом трудностях см., например, [3], [4], [5], [39]).

Наличие некоторой достаточно хорошей предварительной оценки  $\theta_n^*$  позволяет, используя одношаговые процедуры, отыскать в явном виде асимптотически оптимальную оценку параметра  $\theta$  и избежать указанные выше вычислительные проблемы поиска нелинейной МНК-оценки.

На примере этой задачи проиллюстрируем еще раз идеи, изложенные во введении. С одной стороны, одношаговая  $M$ -оценка  $\theta_n^{**}$ , определенная в (2) и приближающаяся состоятельное решение  $\tilde{\theta}_n$  уравнения (33), примет следующий вид:

$$\theta_n^{**} = \theta_n^* + \sum_{i=1}^n (X_i - f_i(\theta_n^*)) f'_i(\theta_n^*) / \sum_{i=1}^n [(f'_i(\theta_n^*))^2 - (X_i - f_i(\theta_n^*)) f''_i(\theta_n^*)]. \quad (35)$$

При выполнении некоторых условий эта одношаговая  $M$ -оценка оказывается асимптотически нормальной с асимптотической дисперсией из (34) (см.[10] или следствие 1).

С другой стороны, в силу специфики уравнения (33), с целью упростить одношаговую оценку и ослабить условия на гладкость  $f_i(\theta)$ , вместо поиска решений и их приближений для уравнения (33), разумно рассматривать взвешенные  $M$ -оценки, определяемые уравнением

$$\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*) M_i(t, X_i) = 0 \quad \text{при} \quad h_i(t) = f_i'(t) \text{ и } M_i(t, X_i) = X_i - f_i(t). \quad (36)$$

В этом случае при некоторых дополнительных ограничениях одношаговая взвешенная  $M$ -оценка

$$\theta_{n,M,h}^{**} = \theta_n^* + \sum_{i=1}^n (X_i - f_i(\theta_n^*)) f_i'(\theta_n^*) / \sum_{i=1}^n (f_i'(\theta_n^*))^2 \quad (37)$$

оказывается асимптотически нормальной с асимптотической дисперсией из (34) (подчеркнем, что для функций  $M_i(t, X_i)$  из (36) функции  $h_i(t)$  из (36) есть оптимальные функции  $h_i^o(t)$ , определенные в предложении 3). Если при исследовании свойств оценки  $\theta_{n,M,h}^{**}$  из (37) воспользоваться теоремой 1, то относительно гладкости функций  $f_i(t)$  достаточно требовать, чтобы функции  $f_i'(t)$  удовлетворяли лишь условию Гельдера. Понятно, что при исследовании оценки  $\theta_n^{**}$  требования на гладкость функций  $f_i(t)$  оказываются сильнее (см. определение (35) и следствие 1). Таким образом, одношаговые оценки  $\theta_n^{**}$  и  $\theta_{n,M,h}^{**}$ , определенные в (35) и (37), асимптотически имеют одну и ту же точность, при этом одношаговая взвешенная  $M$ -оценка проще и является асимптотически нормальной при меньших условиях на гладкость функций  $f_i(t)$ .

Отметим еще, что если наблюдения  $\{X_i\}$  имеют нормальные распределения, то информация Фишера  $I_i(\theta)$ , соответствующая наблюдению  $X_i$ , есть  $I_i(\theta) = (f_i'(\theta))^2 / \sigma^2$ ; т.е. в этом случае асимптотическая дисперсия нелинейной МНК-оценки и одношаговых оценок  $\theta_n^{**}$  и  $\theta_{n,M,h}^{**}$ , определенных в (35) и (36), обратно пропорциональна суммарной информации Фишера, соответствующей  $\{X_i\}$  :

$$\sigma^2 / \sum_{i=1}^n (f_i'(\theta))^2 \equiv 1 / \sum_{i=1}^n I_i(\theta). \quad (38)$$

Принимая во внимание обобщение неравенства Рао-Крамера на случай неоднородных наблюдений (см., например, [1]), можно сделать вывод о точности соответствующих статистик.

*З а м е ч а н и е 6.* Нетрудно видеть, что сказанное выше очевидным образом переносится и на простейший случай гетероскедастической регрессии, когда

$$\forall i \quad \mathbf{E}\varepsilon_i = 0, \quad \mathbf{D}\varepsilon_i = \sigma^2 / w_i, \quad \text{где числа } \{w_i\} \text{ — известны.} \quad (39)$$

Для этого достаточно правую и левую часть уравнения (32) домножить на  $\sqrt{w_i}$ , что сводит задачу к рассмотренной выше модели гомоскедастической нелинейной

регрессии. В частности, в приведенных выше рассуждениях нужно вместо МНК-оценки рассматривать статистику  $\tilde{\theta}_n = \arg \min_{\theta} \sum_{i=1}^n w_i (X_i - f_i(\theta))^2$  (часто называемую взвешенной МНК-оценкой). В предположении (39) для одношаговой взвешенной  $M$ -оценки  $\theta_{n,M,h}^{**}$  с оптимальной асимптотической дисперсией  $I_{n,h^o}/J_{n,h^o}^2$  справедливы представления:

$$\theta_{n,M,h}^{**} = \theta_n^* + \frac{\sum_{i=1}^n w_i (X_i - f_i(\theta_n^*)) f_i'(\theta_n^*)}{\sum_{i=1}^n w_i (f_i'(\theta_n^*))^2}, \quad I_{n,h^o}/J_{n,h^o}^2 = \sigma^2 / \sum_{i=1}^n w_i (f_i'(\theta))^2. \quad (40)$$

*З а м е ч а н и е 7.* Предположим, что выполнено (32) и

$$\forall i \quad \mathbf{E}\varepsilon_i = 0, \quad \mathbf{E}\varepsilon_i^2 = \sigma_i^2, \quad \text{где значения } \{\sigma_i\} \text{ — не известны.}$$

В этом случае при  $M_i(\theta, X_i) = X_i - f_i(\theta)$  оптимальные весовые функции  $h_i^o(\theta)$ , определяемые с точностью до константы равенством

$$h_i^o(\theta) = \mathbf{E}M_i(\theta, X_i) / \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i)$$

(см. предложение 3), есть  $h_i^o(\theta) = f_i'(\theta)/\sigma_i^2$ , т.е. оптимальные функции  $h_i^o(\theta)$  не известны.

Регрессионные функции  $f(\cdot, \cdot)$  в примерах 1 и 2 взяты из монографии [4] и работ [6], [19]. Подчеркнем, что в [4] эти модели приведены в качестве примеров, когда вычисление МНК-оценки затруднено по тем или иным причинам.

**Пример 1.** Пусть регрессионная модель задается соотношениями:

$$X_i = \sqrt{1 + a_i\theta} + \varepsilon_i, \quad \mathbf{E}\varepsilon_i = 0, \quad \mathbf{D}\varepsilon_i = \sigma^2/w_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

где числа  $\{a_i > 0\}$  и  $\{w_i > 0\}$  известны. В [19] в качестве альтернативы для оптимальной МНК-оценки предложено (в случае  $w_i \equiv 1$ ) для параметра  $\theta > 0$  использовать статистику

$$\theta_n^* = \sum_{i=1}^n c_i X_i^2 / \sum_{i=1}^n c_i a_i, \quad \text{где } \sum_{i=1}^n c_i = 0. \quad (41)$$

В [19] доказана асимптотическая нормальность  $\theta_n^*$  с асимптотической дисперсией  $\sum_{i=1}^n c_i^2 \mathbf{D}X_i^2 / \left(\sum_{i=1}^n c_i a_i\right)^2$  и установлено, что ни при каком выборе констант  $\{c_i\}$  эта величина не совпадает с асимптотической дисперсией МНК-оценки.

Используя одношаговую оценку (37), точность оценивания из [19] может быть улучшена (см. формулы (43) и (44) при  $w_i \equiv 1$ ). Более того, оценку (41) можно обобщить на гетероскедастический случай (39), полагая

$$\theta_n^* = \sum_{i=1}^n c_i w_i (X_i^2 - 1) / \sum_{i=1}^n c_i w_i a_i, \quad \text{где } \sum_{i=1}^n c_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n c_i w_i a_i \neq 0. \quad (42)$$

Чтобы при соответствующих ограничениях доказать асимптотическую нормальность  $\theta_n^*$  из (42), нужно с очевидными изменениями повторить доказательство аналогичного утверждения из [19]. Подчеркнем, что оценка (42), как и (41), асимптотически нормальна, но не оптимальна. Асимптотически оптимальная оценка из (40) с асимптотической дисперсией взвешенной МНК-оценки

$$I_{n,h^0}/J_{n,h^0}^2 = \sigma^2 / \sum_{i=1}^n w_i (f'_i(\theta))^2 \equiv 4\sigma^2 / \sum_{i=1}^n w_i a_i^2 (1 + \theta a_i)^{-1} \quad (43)$$

примет здесь следующий вид:

$$\theta_{n,M,h}^{**} = \theta_n^* + 2 \sum_{i=1}^n (X_i / \sqrt{1 + a_i \theta_n^*} - 1) w_i a_i / \sum_{i=1}^n w_i a_i^2 (1 + a_i \theta_n^*)^{-1}. \quad (44)$$

В качестве предварительной оценки  $\theta_n^*$  можно использовать оценку из (42).  $\square$

**3.2.** С точки зрения приложений важную роль играют гетероскедастические регрессионные модели, в которых дисперсии наблюдений зависят не только от номера наблюдения, но и от основного неизвестного параметра. В этом разделе считаем, что параметр  $\theta$  нужно оценить по наблюдениям  $X_1, \dots, X_n$ , имеющим структуру (32), при этом на последовательность погрешностей  $\{\varepsilon_i\}$  накладывается ограничение

$$\mathbf{E}\varepsilon_i = 0, \quad \mathbf{D}\varepsilon_i = \sigma^2 / w_i(\theta), \quad i = 1, \dots, n, \quad (45)$$

где  $\{w_i(\cdot)\}$  — известные функции.

На первый взгляд, по аналогии с замечанием 6, в рассматриваемой ситуации было бы естественно также использовать оценки взвешенного МНК. Тем не менее, метод наименьших квадратов с весовыми коэффициентами не обеспечивает здесь нужной точности. Дело в том, что оптимальные веса метода наименьших квадратов должны в данной ситуации зависеть от параметра, но если веса, определяющие оценку взвешенного МНК, зависят от  $\theta$ , то такая оценка в общем случае оказывается несостоятельной (см., например, [20], [28]).

Один из подходов оценивания параметра  $\theta$  в данной ситуации состоит в использовании  $M$ -оценки  $\tilde{\theta}_n$ , определяемой так называемым уравнением *квази-правдоподобия* (см., например, [28]):

$$\sum_{i=1}^n w_i(t) f'_i(t) (X_i - f_i(t)) = 0. \quad (46)$$

$M$ -оценка  $\tilde{\theta}_n$  является наилучшей оценкой в классе статистик, являющихся решением (по  $t$ ) уравнений вида  $\sum_{i=1}^n h_i(t) (X_i - f_i(t)) = 0$  (см., например, [28], а также предложение 3). Стоит отметить, что  $M$ -оценка  $\tilde{\theta}_n$ , определяемая уравнением (46), не является МНК-оценкой (в случае, когда функции  $w_i(t)$  не постоянны).

Поиск оценки квази-правдоподобия связан со всеми теми вычислительными проблемами, которые затрагивались выше в разделе 3.1. Взвешенную  $M$ -оценку

$\widehat{\theta}_n$ , асимптотически имеющую точность оценки квази-правдоподобия, естественно определить как решение уравнения

$$\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*) M_i(t, X_i) = 0 \quad \text{при} \quad h_i(t) = w_i(t) f_i'(t) \quad \text{и} \quad M_i(t, X_i) = X_i - f_i(t). \quad (47)$$

Одношаговая взвешенная  $M$ -оценка  $\theta_{n,M,h}^{**}$  из (17) примет следующий вид:

$$\theta_{n,M,h}^{**} = \theta_n^* + \frac{\sum_{i=1}^n w_i(\theta_n^*) f_i'(\theta_n^*) (X_i - f_i(\theta_n^*))}{\sum_{i=1}^n w_i(\theta_n^*) (f_i'(\theta_n^*))^2}. \quad (48)$$

При этом в силу предложения 3 функции  $h_i(\cdot)$  из (47) есть оптимальные функции  $h_i^o(\cdot)$  для  $M_i(\cdot, X_i)$  из (47), а асимптотическая дисперсия  $I_{n,h^o}/J_{n,h^o}^2$  оценки квази-правдоподобия (46) и оценок  $\widehat{\theta}_n$ ,  $\theta_{n,M,h}^{**}$  из (47) и (48), определяется соотношением

$$I_{n,h^o}/J_{n,h^o}^2 \equiv \sigma^2 / \sum_{i=1}^n w_i(\theta) [f_i'(\theta)]^2. \quad (49)$$

Тем самым, достигнута та же точность (см. (40)), как и в случае, когда веса  $w_i = w_i(\theta)$  были известны и не зависели от  $\theta$  (см. также замечание 9).

*З а м е ч а н и е 8.* Стоит отметить, что взвешенная  $M$ -оценка, имеющая асимптотическую дисперсию (49), может быть определена и как решение следующего обобщения уравнения (47):

$$\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*) M_i(t, X_i) = 0, \quad \text{где} \quad h_i(t) = w_i(t) f_i'(t) g_i^{-1}(t), \quad M_i(t, X_i) = g_i(t) (X_i - f_i(t)) \quad (50)$$

для некоторых функций  $g_i(\cdot)$  (разумеется,  $h_i(t) = h_i^o(t)$  для функций  $M_i(t, X_i)$  из (50)). Удачный в том или ином смысле выбор функций  $g_i(t)$  зависит от специфики функций  $w_i(t)$  и  $f_i(t)$ , а уравнение (50) иногда может быть предпочтительнее, нежели уравнение (47) (см. пример 3). Далее, одношаговые взвешенные  $M$ -оценки можно строить исходя уже из уравнения (47). Таким образом, за счет выбора функций  $g_i(\cdot)$  можно предложить множество различных явных оценок, эквивалентных в смысле асимптотической точности. Кроме того, в [10] предложены некоторые другие одношаговые оценки (так называемые оценки скоринга), которые могут также определяться не однозначно и которые также эквивалентны предложенным здесь одношаговым взвешенным  $M$ -оценкам в смысле асимптотической точности.  $\square$

*З а м е ч а н и е 9.* Метод квази-правдоподобия не требует полной характеристики распределения: достаточно лишь знание первых двух моментов наблюдений  $\{X_i\}$  (как функций от неизвестных параметров). В случае же *нормально распределенных* наблюдений одношаговые приближения при выполнении (45) разумно находить для оценки максимального правдоподобия, которая оказывается несколько точнее, нежели оценка квази-правдоподобия (см. [10]).  $\square$



**Пример 2.** Пусть наблюдения  $X_i$  имеют следующую структуру:

$$X_i = a_i\theta + b_i g(\theta) + \varepsilon_i, \quad \mathbf{E}\varepsilon_i = 0, \quad \mathbf{D}\varepsilon_i = \sigma^2/w_i(\theta), \quad i = 1, \dots, n, \quad (51)$$

где  $\{a_i\}$  и  $\{b_i\}$  — известные числовые последовательности. В [6] в качестве альтернативы трудно вычисляемой МНК-оценки построена статистика  $\theta_n^* = \sum_{i=1}^n c_i X_i / \sum_{i=1}^n c_i a_i$ , где числа  $\{c_i\}$  таковы, что  $\sum_{i=1}^n c_i b_i = 0$  и  $\sum_{i=1}^n c_i a_i \neq 0$ . В [6] доказано, что при некоторых дополнительных ограничениях оценка  $\theta_n^*$  является асимптотически нормальной с асимптотической дисперсией  $\sigma^2 \sum_{i=1}^n c_i^2 w_i^{-1}(\theta) / \left( \sum_{i=1}^n c_i a_i \right)^2$ .

Используя обсуждаемый здесь подход точность оценивания из [6] можно улучшить, при этом статистика  $\theta_n^*$  из [6] может быть использована в качестве предварительной оценки для построения одношаговых оценок. В частности, одношаговая взвешенная  $M$ -оценка  $\theta_{n,M,h}$  из (48) определяется равенством

$$\theta_{n,M,h}^{**} = \theta_n^* + \frac{\sum_{i=1}^n w_i(\theta_n^*) (X_i - a_i \theta_n^* - b_i g(\theta_n^*)) (a_i + b_i g'(\theta_n^*))}{\sum_{i=1}^n w_i(\theta_n^*) (a_i + b_i g'(\theta_n^*))^2},$$

а асимптотическая дисперсия этой оценки, совпадающая с асимптотической дисперсией в некотором смысле оптимальной оценки квази-правдоподобия, есть  $I_{n,h^\circ} / J_{n,h^\circ}^2 \equiv \sigma^2 / \sum_{i=1}^n w_i(\theta) (a_i + b_i g'(\theta))^2$ . Нетрудно видеть, что ни при каком выборе констант  $\{c_i\}$  для оценки  $\theta_n^*$  из [6] не может быть достигнута эта точность.  $\square$

**Пример 3.** Рассмотрим одномерную гетероскедастическую модель Михаэлиса–Ментен, играющую важную роль в биохимии (см., например, [15], [36]). В этом случае наблюдения  $\{X_i\}$  имеют следующую структуру:

$$X_i = a_i / (1 + b_i \theta) + \varepsilon_i, \quad \mathbf{E}\varepsilon_i = 0, \quad \mathbf{D}\varepsilon_i = \sigma^2 / w_i(\theta), \quad i = 1, \dots, n, \quad (52)$$

где  $\{a_i > 0\}$  и  $\{b_i > 0\}$  — известные числовые последовательности. Согласно (48), явную асимптотически нормальную оценку  $\theta_{n,M,h}^{**}$  с минимальной асимптотической дисперсией  $I_{n,h^\circ} / J_{n,h^\circ}^2$  можно определить соотношениями:

$$\theta_{n,M,h}^{**} = \theta_n^* - \frac{\sum_{i=1}^n \left( X_i - \frac{a_i}{1 + b_i \theta_n^*} \right) \frac{w_i(\theta_n^*) a_i b_i}{(1 + b_i \theta_n^*)^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{w_i(\theta_n^*) a_i^2 b_i^2}{(1 + b_i \theta_n^*)^4}}, \quad \frac{I_{n,h^\circ}}{J_{n,h^\circ}^2} = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n w_i(\theta) a_i^2 b_i^2 / (1 + b_i \theta)^4}. \quad (53)$$

В качестве оценки  $\theta_n^*$  в (53) можно использовать следующую статистику (асимптотически нормальную при широких ограничениях), построенную и исследованную в [14]:

$$\theta_n^* = \sum_{i=1}^n c_i (a_i - X_i) / \sum_{i=1}^n c_i b_i X_i, \quad (54)$$

где  $\{c_i\}$  — некоторые числа. Тот факт, что асимптотическая дисперсия оценки  $\theta_n^*$  из (54), равная  $\sum_{i=1}^n c_i^2 (1 + b_i \theta)^2 \mathbf{D}\varepsilon_i / \left( \sum_{i=1}^n c_i a_i b_i (1 + b_i \theta)^{-1} \right)^2$ , при любом выборе констант  $\{c_i\}$  больше, чем оптимальная асимптотическая дисперсия из (53), установлен в [14].

Отметим еще, что в [14] для модели (52) построена следующая явная асимптотически нормальная с асимптотической дисперсией  $I_{n,h^o} / J_{n,h^o}^2$  из (53) оценка:

$$\tilde{\theta}_n^{**} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{a_i b_i w_i(\theta_n^*) (a_i - X_i)}{(1 + b_i \theta_n^*)^3}}{\sum_{i=1}^n \frac{a_i b_i^2 w_i(\theta_n^*) X_i}{(1 + b_i \theta_n^*)^3}} \equiv \theta_n^* - \frac{\sum_{i=1}^n \left( X_i - \frac{a_i}{1 + b_i \theta_n^*} \right) \frac{w_i(\theta_n^*) a_i b_i}{(1 + b_i \theta_n^*)^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{w_i(\theta_n^*) a_i b_i^2 X_i}{(1 + b_i \theta_n^*)^3}}. \quad (55)$$

В силу приведенного тождества статистика  $\tilde{\theta}_n^{**}$  отличается от одношаговой взвешенной  $M$ -оценки  $\theta_{n,M,h}^{**}$  из (53) знаменателем вычитаемой дроби.

Но как согласуется статистика  $\tilde{\theta}_n^{**}$  из (55) с методологией данной работы? Оказывается,  $\tilde{\theta}_n^{**}$  является одной из оценок, предлагаемых в данной статье. Статистика  $\tilde{\theta}_n^{**}$  есть взвешенная  $M$ -оценка  $\hat{\theta}_n$ , являющаяся решением уравнения (50) при  $g_i(t) = 1 + b_i t$ : при так определенных функциях  $g_i(t)$  уравнение (50) явно разрешается относительно  $t$ ! Более того,  $\tilde{\theta}_n^{**}$  есть еще и одношаговая взвешенная  $M$ -оценка, построенная по указанному уравнению. Отметим еще, что в [14] при построении улучшенных оценок не использовалась ни теория  $M$ -оценивания, ни идея приближенного поиска  $M$ -оценок и их модификаций и метод Ньютона. Использовались лишь некоторые эвристические соображения, связанные со специальным видом регрессионной функции  $f_i(\theta)$  из (52). Но эти соображения не позволяют отыскать, например, явные асимптотически оптимальные оценки в задачах из примеров 1 и 2, или найти явные оценки, эквивалентные оценке максимального правдоподобия. Предлагаемый здесь подход, в том числе в замечаниях 8 и 9, не ориентирован на специальное представление регрессионной функции и, как следствие, более универсален.  $\square$

Достаточные условия асимптотической нормальности одношаговых взвешенных  $M$ -оценок, указанных в этом параграфе, нетрудно получить из теоремы 1, поэтому все точные условия мы здесь опускаем.

## 4 Доказательства

**4.1.** Для вывода теорем 1 и 2 нам потребуется несколько вспомогательных обозначений и утверждений.

Положим  $u_n^* = \theta_n^* - \theta$ ,  $\rho_n^M(u) := \sum_{i=1}^n h_i(\theta) (M_i'(\theta + u, X_i) - M_i'(\theta, X_i))$ ,

$$\bar{\rho}_n^M(u) := \sum_{i=1}^n h_i(\theta) (M_i(\theta + u, X_i) - M_i(\theta, X_i) - uM_i'(\theta)),$$

$$\rho_n^{Mh}(u) := \sum_{i=1}^n (h_i(\theta + u) - h_i(\theta)) (M_i'(\theta + u, X_i) - M_i'(\theta, X_i)),$$

$$\bar{\rho}_n^{Mh}(u) := \sum_{i=1}^n (h_i(\theta + u) - h_i(\theta)) (M_i(\theta + u, X_i) - M_i(\theta, X_i) - uM_i'(\theta)),$$

$$\rho_n^h(u) := \sum_{i=1}^n (h_i(\theta + u) - h_i(\theta)) M_i'(\theta, X_i).$$

Нам также потребуются обозначения

$$\gamma_n(\delta) := \sum_{i=1}^n |h_i(\theta)| \tau_i(\delta, X_i), \quad \gamma_n^h(\delta) := \delta^p \sum_{i=1}^n \bar{h}_i \bar{\tau}_i(\delta, X_i)$$

и соотношения  $\mathbf{E}\gamma_n(\delta) = \sum_{i=1}^n |h_i(\theta)| \bar{\tau}_i(\delta)$  и  $\mathbf{E}\gamma_n^h(\delta) = \delta^p \sum_{i=1}^n \bar{h}_i \bar{\tau}_i(\delta)$  при  $\delta > 0$ .

**Лемма 1.** Пусть  $\alpha_n(\cdot) : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  – монотонно неубывающий случайный процесс,  $\beta_n(\cdot) = \mathbf{E}\alpha_n(\cdot)$  и  $\beta_n(\eta_n) \xrightarrow{p} 0$  для некоторой случайной величины  $\eta_n \geq 0$ . Тогда  $\alpha_n(\eta_n) \xrightarrow{p} 0$ .

Доказательство леммы 1 приведено в [10].

**Лемма 2.** Пусть выполнено предположение (R). Тогда

$$\rho_n^M(u_n^*)/J_{n,h} \xrightarrow{p} 0, \quad u_n^* \rho_n^M(u_n^*)/\sqrt{I_{n,h}} \xrightarrow{p} 0, \quad \bar{\rho}_n^M(u_n^*)/\sqrt{I_{n,h}} \xrightarrow{p} 0.$$

**Доказательство.** Заметим прежде всего, что при выполнении (R)

$$|u_n^*| \sum_{i=1}^n |h_i(\theta)| \bar{\tau}_i(|u_n^*|)/\sqrt{I_{n,h}} \xrightarrow{p} 0 \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^n |h_i(\theta)| \bar{\tau}_i(|u_n^*|)/J_{n,h} \xrightarrow{p} 0. \quad (56)$$

Действительно, первая сходимость в (56) следует из (15). Кроме того, с учетом этой сходимости для любого  $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}\left(\sum_{i=1}^n \frac{|h_i(\theta)| \bar{\tau}_i(|u_n^*|)}{|J_{n,h}|} > \varepsilon\right) &= \mathbf{P}\left(\sum_{i=1}^n \frac{|h_i(\theta)| \bar{\tau}_i(|u_n^*|)}{|J_{n,h}|} > \varepsilon, \frac{|J_{n,h}|}{\sqrt{I_{n,h}}} |u_n^*| \geq 1\right) + \\ \mathbf{P}\left(\sum_{i=1}^n \frac{|h_i(\theta)| \bar{\tau}_i(|u_n^*|)}{|J_{n,h}|} > \varepsilon, \frac{|J_{n,h}|}{\sqrt{I_{n,h}}} |u_n^*| < 1\right) &\leq \mathbf{P}\left(|u_n^*| \sum_{i=1}^n \frac{|h_i(\theta)| \bar{\tau}_i(|u_n^*|)}{I_{n,h}} > \varepsilon\right) + \\ \mathbf{P}\left(\sum_{i=1}^n \frac{|h_i(\theta)| \bar{\tau}_i(|u_n^*|)}{|J_{n,h}|} > \varepsilon, |u_n^*| < \frac{\sqrt{I_{n,h}}}{|J_{n,h}|}\right) &\rightarrow 0. \end{aligned} \quad (57)$$

При выводе сходимости в (57) мы также учли, что в силу монотонности функции  $\sum_{i=1}^n |h_i(\theta)\bar{\tau}_i(\cdot)|/|J_{n,h}|$  и условий  $(R_3)$  и  $(R_4)$  начиная с некоторых  $n$  в правой части (57) под знаком вероятности — невозможное событие. Далее, в силу  $(R_2)$

$$M_i(\theta + \delta, X_i) - M_i(\theta, X_i) - \delta M'_i(\theta, X_i) = \delta \int_0^1 (M'_i(\theta + v\delta, X_i) - M'_i(\theta, X_i)) dv,$$

а потому  $\bar{\rho}_n^M(u) = u \int_0^1 \rho_n^M(uv) dv$  и справедливы оценки

$$\frac{|\rho_n^M(u)|}{|J_{n,h}|} \leq \frac{\gamma_n(|u|)}{|J_{n,h}|}, \quad \frac{|u|\rho_n^M(u)|}{\sqrt{I_{n,h}}} \leq \frac{|u|\gamma_n(|u|)}{\sqrt{I_{n,h}}}, \quad \frac{|\bar{\rho}_n^M(u)|}{\sqrt{I_{n,h}}} \leq \frac{|u|\gamma_n(|u|)}{\sqrt{I_{n,h}}}. \quad (58)$$

Утверждения леммы следуют теперь из леммы 1 при  $\eta_n = |u_n^*|$ , если положить  $\alpha_n(|u|) = \gamma_n(|u|)/|J_{n,h}|$  или  $\alpha_n(|u|) = |u|\gamma_n(|u|)/\sqrt{I_{n,h}}$  и учесть сходимости (56).  $\square$ .

**Лемма 3.** *Если выполнены условия  $(R)$ , то*

$$\frac{\rho_n^{Mh}(u_n^*)}{J_{n,h}} \xrightarrow{p} 0, \quad \frac{u_n^* \rho_n^{Mh}(u_n^*)}{\sqrt{I_{n,h}}} \xrightarrow{p} 0, \quad \frac{\bar{\rho}_n^{Mh}(u_n^*)}{\sqrt{I_{n,h}}} \xrightarrow{p} 0, \quad \frac{\rho_n^h(u_n^*)}{J_{n,h}} \xrightarrow{p} 0.$$

*Доказательство* первых трех соотношений аналогично выводу утверждений леммы 2, поэтому подробные рассуждения мы опускаем. В силу  $(R_2)$

$$|\rho_n^h(u)|/|J_{n,h}| \leq |u|^p \sum_{i=1}^n \bar{h}_i |M'_i(\theta, X_i)|/|J_{n,h}|, \quad (59)$$

тем самым последнее утверждение леммы следует из (16) и леммы 1 при  $\eta_n = |u_n^*|$ , если в качестве  $\alpha_n(|u|)$  рассматривать правую часть в (59).  $\square$

*Доказательство* теоремы 1. Поскольку в силу (56) с вероятностью, стремящейся к 1 величина  $\sum_{i=1}^n |h_i(\theta)|\bar{\tau}_i(|\theta_n^* - \theta|)/|J_{n,h}|$  конечна, то  $\mathbf{P}(\theta_n^* \in \Theta) \rightarrow 1$ .

Следовательно, согласно условию  $(R_2)$ , с вероятностью, стремящейся к 1 определены функции  $\{h_i(\theta_n^*)\}$ ,  $\{M_i(\theta_n^*)\}$  и  $\{M'_i(\theta_n^*)\}$ , участвующие в представлении (17) для оценки  $\theta_{n,M,h}^{**}$ . В силу обозначений в начале раздела 4.1, справедливо равенство  $\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*) M'_i(\theta_n^*, X_i) = \sum_{i=1}^n h_i(\theta) M'_i(\theta, X_i) + \rho_n^M(u_n^*) + \rho_n^{Mh}(u_n^*) + \rho_n^h(u_n^*)$ , а потому, с учетом

лемм 2, 3 и условия  $(R_3)$ , выполнено  $\mathbf{P}\left(\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*) M'_i(\theta_n^*, X_i) \neq 0\right) \rightarrow 1$ . Таким образом, согласно определению (17), статистика  $\theta_{n,M,h}^{**}$  определена с вероятностью, стремящейся к 1. Далее, из определения (17) имеем

$$\theta_{n,M,h}^{**} - \theta = - \frac{\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*) M_i(\theta_n^*, X_i) - (\theta_n^* - \theta) \sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*) M'_i(\theta_n^*, X_i)}{\sum_{i=1}^n h_i(\theta_n^*) M'_i(\theta_n^*, X_i)}. \quad (60)$$

Используя представление (60) и обозначения, введенные перед леммой 1, получаем следующее тождество:  $\frac{J_{n,h}}{\sqrt{I_{n,h}}}(\theta_{n,M,h}^{**} - \theta) =$

$$\frac{\left( \sum_{i=1}^n h_i(\theta) M_i(\theta, X_i) - u_n^* \rho_n^M(u_n^*) + \bar{\rho}_n^M(u_n^*) - u_n^* \rho_n^{Mh}(u_n^*) + \bar{\rho}_n^{Mh}(u_n^*) \right) / \sqrt{I_{n,h}} + \delta_n^h}{\sum_{i=1}^n h_i(\theta) M_i'(\theta, X_i) / J_{n,h} + (\rho_n^M(u_n^*) + \rho_n^{Mh}(u_n^*) + \rho_n^h(u_n^*)) / J_{n,h}}. \quad (61)$$

Чтобы теперь из тождества (61) извлечь асимптотическую нормальность (19) оценки  $\theta_{n,M,h}^{**}$ , остается воспользоваться утверждениями лемм 2, 3 и условиями (13) и (18).  $\square$

**Лемма 4.** Пусть выполнены условия теоремы 2. Тогда

$$\delta_n^M := \left( \left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta_{n,M,h}^{**}) M_i^2(\theta_{n,M,h}^{**}, X_i) \right)^{1/2} - \left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) M_i^2(\theta, X_i) \right)^{1/2} \right) / \sqrt{I_{n,h}} \xrightarrow{p} 0.$$

**Доказательство.** Положим  $u_n^{**} := \theta_{n,M,h}^{**} - \theta$  и условимся у функций  $M_i(\cdot, X_i)$  опускать второй аргумент. Нам потребуются соотношения

$$J_{n,h} u_n^{**} / \sqrt{I_{n,h}} = O_p(1), \quad u_n^{**} \xrightarrow{p} 0, \quad \gamma_n(|u_n^{**}|) / J_{n,h} \xrightarrow{p} 0, \quad \gamma_n^h(|u_n^{**}|) / J_{n,h} \xrightarrow{p} 0. \quad (62)$$

Первое из этих соотношений следует из теоремы 1, второе – из условия  $(R_3)$  и первого соотношения. Остальные – из леммы 1 при  $\eta_n = |u_n^{**}|$  и  $\alpha_n(\cdot) = \gamma_n(\cdot) / |J_{n,h}|$  или  $\alpha_n(\cdot) = \gamma_n^h(\cdot) / |J_{n,h}|$ , если только еще учесть условие  $(R_4)$ . Далее, имеем

$$\sqrt{I_{n,h}} |\delta_n^M| \leq \left( \sum_{i=1}^n (h_i(\theta_{n,M,h}^{**}) M_i(\theta_{n,M,h}^{**}) - h_i(\theta) M_i(\theta))^2 \right)^{1/2} = \delta_{n1}^M + \delta_{n2}^M + \delta_{n3}^M, \quad (63)$$

$$\delta_{n1}^M := \left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) (M_i(\theta_{n,M,h}^{**}) - M_i(\theta))^2 \right)^{1/2},$$

$$\delta_{n2}^M := \left( \sum_{i=1}^n (h_i(\theta_{n,M,h}^{**}) - h_i(\theta))^2 (M_i(\theta_{n,M,h}^{**}) - M_i(\theta))^2 \right)^{1/2},$$

$$\delta_{n3}^M := \left( \sum_{i=1}^n (h_i(\theta_{n,M,h}^{**}) - h_i(\theta))^2 M_i^2(\theta) \right)^{1/2}.$$

Оценим отдельно каждую из введенных величин. В силу предположения  $(R_2)$

$$\begin{aligned} \delta_{n1}^M &\leq \left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) \left( \int_{\theta}^{\theta_{n,M,h}^{**}} M_i'(t) dt \right)^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{2} \left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) \left( \int_{\theta}^{\theta_{n,M,h}^{**}} (M_i'(t) - M_i'(\theta)) dt \right)^2 \right)^{1/2} + \\ &\sqrt{2} \left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) \left( \int_{\theta}^{\theta_{n,M,h}^{**}} M_i'(\theta) dt \right)^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{2} |u_n^{**}| \left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) \left( \sup_{t: |t-\theta| \leq |u_n^{**}|} |M_i'(t) - M_i'(\theta)| \right)^2 \right)^{1/2} + \\ &\sqrt{2} |u_n^{**}| \left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) (M_i'(\theta))^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{2} |u_n^{**}| \gamma_n(|u_n^{**}|) + \sqrt{2} |u_n^{**}| \left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) (M_i'(\theta))^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Следовательно, используя соотношения (62) условие (27), получаем

$$\frac{\delta_{n1}^M}{\sqrt{I_{n,h}}} \leq \sqrt{2} \frac{|J_{n,h}|}{\sqrt{I_{n,h}}} |u_n^{**}| \frac{\gamma_n(|u_n^{**}|)}{|J_{n,h}|} + \sqrt{2} \frac{|J_{n,h}|}{\sqrt{I_{n,h}}} |u_n^{**}| \left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) [M_i'(\theta)]^2 / J_{n,h}^2 \right)^{1/2} \xrightarrow{p} 0.$$

Проводя аналогичные рассуждения, имеем

$$\frac{\delta_{n2}^M}{\sqrt{I_{n,h}}} \leq \sqrt{2} \frac{|J_{n,h}|}{\sqrt{I_{n,h}}} |u_n^{**}| \frac{\gamma_n^h(|u_n^{**}|)}{|J_{n,h}|} + \sqrt{2} \frac{|J_{n,h}|}{\sqrt{I_{n,h}}} |u_n^{**}|^{1+p} \left( \sum_{i=1}^n \bar{h}_i^2 [M_i'(\theta)]^2 / J_{n,h}^2 \right)^{1/2} \xrightarrow{p} 0,$$

$$\frac{\delta_{n3}^M}{\sqrt{I_{n,h}}} \leq \left( \frac{|J_{n,h}| |u_n^{**}|}{\sqrt{I_{n,h}}} \right)^p \left( \sum_{i=1}^n \bar{h}_i^2 [M_i'(\theta)]^2 / (J_{n,h}^{2p} I_{n,p}^{1-p}) \right)^{1/2} \xrightarrow{p} 0.$$

Три последние сходимости, вместе с оценкой (63), завершают доказательство.  $\square$

**Д о к а з а т е л ь с т в о** теоремы 2. Поскольку  $\mathbf{P}(\theta_n^* \in \Theta) \rightarrow 1$  (см. доказательство теоремы 1) и  $\mathbf{P}(\theta_{n,M,h}^{**} \in \Theta) \rightarrow 1$  в силу (62) и  $(R_3)$ , то с вероятностью, стремящейся к 1 определены все величины в правой части равенства в (26). Кроме того, поскольку в силу леммы 4 и условия (27)

$$\frac{\left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta_{n,M,h}^{**}) M_i^2(\theta_{n,M,h}^{**}, X_i) \right)^{1/2}}{\sqrt{I_{n,h}}} \equiv \frac{\left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) M_i^2(\theta, X_i) \right)^{1/2}}{\sqrt{I_{n,h}}} + \delta_n^M \xrightarrow{p} 1, \quad (64)$$

то знаменатель в правой части равенства в (26) обращается в нуль с вероятностью, стремящейся к нулю. Таким образом, с учетом определения (26), статистика  $d_{n,M,h}^*$  определена с вероятностью, стремящейся к 1. Далее, учитывая представления (60), (61) и обозначения из (26), имеем  $d_{n,M,h}^*(\theta_{n,M,h}^{**} - \theta) =$

$$\frac{\left( \sum_{i=1}^n h_i(\theta) M_i(\theta, X_i) - u_n^* \rho_n^M(u_n^*) + \bar{\rho}_n^M(u_n^*) - u_n^* \rho_n^{Mh}(u_n^*) + \bar{\rho}_n^{Mh}(u_n^*) \right) / \sqrt{I_{n,h}} + \delta_n^h}{\left( \sum_{i=1}^n h_i^2(\theta) M_i^2(\theta, X_i) \right)^{1/2} / \sqrt{I_{n,h}} + \delta_n^M}.$$

Тот факт, что числитель в правой части этого представления по распределению сходится к стандартному нормальному закону, установлен при выводе теоремы 1. Отмеченная сходимость вместе с (64) доказывает (28).  $\square$

**4.2. Д о к а з а т е л ь с т в о** предложения 2. Положим

$$\theta_{ni}^* = \mathbf{E}_{\neq i} \theta_n^*, \quad \theta_{nij}^* := \mathbf{E}_{\neq i} \mathbf{E}_{\neq j} \theta_n^*, \quad i, j = 1, \dots, n, \quad j \neq i.$$

В дальнейшем не единожды, больше этого не оговаривая, будет использован тот факт, что величина  $\theta_{ni}^*$  не зависят от наблюдения  $X_i$ , а величина  $\theta_{nij}^*$  не зависят еще и от  $X_j$ . Заметим прежде всего, что при всех  $i$  и  $j \neq i$  справедливы оценки

$$\mathbf{E} |\theta_{ni}^* - \theta|^2 \leq 4\mathbf{E} |\theta_n^* - \theta|^2 \quad \mathbf{E} |\theta_{ni}^* - \theta_{nij}^*|^2 \leq \mathbf{E} |\theta_n^* - \theta_{nj}^*|^2. \quad (65)$$

Действительно,

$$\mathbf{E} |\theta_{ni}^* - \theta|^2 \leq 2\mathbf{E} |\theta_n^* - \theta|^2 + 2\mathbf{E} |\theta_n^* - \theta_{ni}^*|^2. \quad (66)$$

Кроме того, с учетом формулы полной вероятности,

$$\mathbf{E}|\theta_n^* - \theta_{ni}^*|^2 = \mathbf{E}\mathbf{E}_{\neq i}|\theta_n^* - \mathbf{E}_{\neq i}\theta_n^*|^2 \leq \mathbf{E}\mathbf{E}_{\neq i}|\theta_n^* - h_{\neq i}|^2, \quad (67)$$

где величина  $h_{\neq i}$  не зависит от  $X_i$ . В частности, полагая  $h_{\neq i} = \theta$ , из (66) и (67), извлекаем первое утверждение в (65). Еще раз используя формулу полной вероятности, получаем следующую цепочку соотношений:

$$\mathbf{E}|\theta_{ni}^* - \theta_{nij}^*|^2 = \mathbf{E}|\mathbf{E}_{\neq i}\theta_n^* - \mathbf{E}_{\neq i}\mathbf{E}_{\neq j}\theta_n^*|^2 \leq \mathbf{E}\mathbf{E}_{\neq i}|\theta_n^* - \mathbf{E}_{\neq j}\theta_n^*|^2 = \mathbf{E}|\theta_n^* - \theta_{nj}^*|^2,$$

которая доказывает второе утверждение в (65).

Имеем

$$\delta_n^h = \frac{\sum_{i=1}^n (h_i(\theta_n^*) - h_i(\theta_{ni}^*))M_i(\theta, X_i)}{\sqrt{I_{n,h}}} + \frac{\sum_{i=1}^n (h_i(\theta_{ni}^*) - h_i(\theta))M_i(\theta, X_i)}{\sqrt{I_{n,h}}} \equiv \delta_{n,1}^h + \delta_{n,2}^h. \quad (68)$$

В условиях предложения  $\sqrt{I_{n,h}}\mathbf{E}|\delta_{n,1}^h| \leq$

$$\sum_{i=1}^n \bar{h}_i \mathbf{E}(|\theta_n^* - \theta_{ni}^*|^p | M_i(\theta, X_i)) \leq \sum_{i=1}^n \bar{h}_i (\mathbf{E}|\theta_n^* - \theta_{ni}^*|^2)^{p/2} (\mathbf{E}|M_i(\theta, X_i)|^2)^{1/2}.$$

Следовательно, с учетом условия (25),  $\mathbf{E}|\delta_{n,1}^h| \rightarrow 0$ , а потому, в силу неравенства Чебышева с первым моментом,  $\delta_{n,1}^h \xrightarrow{P} 0$ .

Покажем, что  $\delta_{n,2}^h \xrightarrow{P} 0$ . Нам потребуются следующие оценки:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}((h_i(\theta_{ni}^*) - h_i(\theta))^2 M_i^2(\theta, X_i)) &= \mathbf{E}(h_i(\theta_{ni}^*) - h_i(\theta))^2 \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i) \leq \\ &\bar{h}_i^2 \mathbf{E}(|\theta_{ni}^* - \theta|^2)^p \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i) \leq 4^p \mathbf{E}(|\theta_n^* - \theta|^2)^p \bar{h}_i^2 \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i), \end{aligned} \quad (69)$$

$$\begin{aligned} &\mathbf{E}\left[(h_i(\theta_{ni}^*) - h_i(\theta))(h_j(\theta_{nj}^*) - h_j(\theta))M_i(\theta, X_i)M_j(\theta, X_j)\right] = \\ &\mathbf{E}\left[(h_i(\theta_{ni}^*) - h_i(\theta_{nij}^*) + h_i(\theta_{nij}^*) - h_i(\theta))(h_j(\theta_{nj}^*) - h_j(\theta_{nji}^*) + h_j(\theta_{nji}^*) - h_j(\theta)) \times \right. \\ &M_i(\theta, X_i)M_j(\theta, X_j)\left.] = \mathbf{E}\left[(h_i(\theta_{ni}^*) - h_i(\theta_{nij}^*))(h_j(\theta_{nj}^*) - h_j(\theta_{nji}^*))M_i(\theta, X_i)M_j(\theta, X_j)\right] + \\ &\mathbf{E}\left[(h_i(\theta_{ni}^*) - h_i(\theta_{nij}^*))(h_j(\theta_{nji}^*) - h_j(\theta))M_i(\theta, X_i)M_j(\theta, X_j)\right] + \\ &\mathbf{E}\left[(h_i(\theta_{nij}^*) - h_i(\theta))(h_j(\theta_{nj}^*) - h_j(\theta_{nji}^*))M_i(\theta, X_i)M_j(\theta, X_j)\right] + \\ &\mathbf{E}\left[(h_i(\theta_{nij}^*) - h_i(\theta))(h_j(\theta_{nji}^*) - h_j(\theta))M_i(\theta, X_i)M_j(\theta, X_j)\right] = \\ &\mathbf{E}\left[(h_i(\theta_{ni}^*) - h_i(\theta_{nij}^*))(h_j(\theta_{nj}^*) - h_j(\theta_{nji}^*))M_i(\theta, X_i)M_j(\theta, X_j)\right] \leq \\ &\left(\mathbf{E}(h_i(\theta_{ni}^*) - h_i(\theta_{nij}^*))^2 \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i)\right)^{1/2} \left(\mathbf{E}(h_j(\theta_{nj}^*) - h_j(\theta_{nji}^*))^2 \mathbf{E}M_j^2(\theta, X_j)\right)^{1/2} \leq \\ &\bar{h}_i \bar{h}_j (\mathbf{E}|\theta_n^* - \theta_{ni}^*|^2)^{p/2} (\mathbf{E}|\theta_n^* - \theta_{nj}^*|^2)^{p/2} (\mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i))^{1/2} (\mathbf{E}M_j^2(\theta, X_j))^{1/2}. \end{aligned}$$

При выводе этих соотношений были учтены еще неравенства из (65). Следовательно, с учетом условий (24) и (25)

$$\begin{aligned} \mathbf{E}|\delta_{n,2}^h|^2 &= \sum_{i=1}^n \mathbf{E}((h_i(\theta_{ni}^*) - h_i(\theta))^2 M_i^2(\theta, X_i))/I_{n,h} + \\ &\sum_{i,j=1, i \neq j}^n \mathbf{E}\left[(h_i(\theta_{ni}^*) - h_i(\theta))(h_j(\theta_{nj}^*) - h_j(\theta))M_i(\theta, X_i)M_j(\theta, X_j)\right]/I_{n,h} \leq \\ &\leq 4^p \mathbf{E}(|\theta_n^* - \theta|^2)^p \sum_{i=1}^n \bar{h}_i^2 \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i)/I_{n,h} + \\ &\left(\sum_{i=1}^n \bar{h}_i (\mathbf{E}|\theta_n^* - \theta_{ni}^*|^2)^{p/2} (\mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i))^{1/2} / \sqrt{I_{n,h}}\right)^2 \rightarrow 0 \end{aligned}$$

и доказательство предложения завершено.  $\square$

**Д о к а з а т е л ь с т в о** предложения 3. Соотношение (29) нетрудно извлечь из неравенства Коши-Буняковского. Положим  $K_n := \sum_{i=1}^n (h_i^o(\theta))^2$ . Поскольку по условиям теоремы при каждом  $i$  величины  $h_i(\theta)$  и  $h_i^o(\theta)$  имеют одинаковый знак, то справедливы неравенства (31). В частности, при каждом  $i$  значение  $h_i(\theta)$  лежит между  $hh_i^o(\theta)$  и  $Hh_i^o(\theta)$ . Значит для величин  $d_i := (h_i(\theta) - hh_i^o(\theta))(h_i(\theta) - Hh_i^o(\theta))$ ,  $i = 1, \dots, n$ , выполнено  $d_i \leq 0$ . Из этого факта с учетом обозначений из  $(R_3)$  получаем, что  $I_{n,h} - (H+h)J_{n,h} + hHK_n = \sum_{i=1}^n d_i \mathbf{E}M_i^2(\theta, X_i) \leq 0$ . А поскольку функция  $f(x) := f(x) = x^{-1} - Hh(H+h)^{-1}K_n x^{-2}$  достигает своего максимального значения при  $x = 2Hh(H+h)^{-1}K_n$ , то

$$\begin{aligned} I_{n,h}/J_{n,h}^2 &\leq (H+h)J_{n,h}^{-1} - HhK_n J_{n,h}^{-2} = (H+h)f(J_{n,h}) \leq \\ &(H+h)f\left(\frac{2HhK_n}{H+h}\right) = \frac{(H+h)^2}{4HhK_n} = \frac{I_{n,h^o}}{J_{n,h^o}^2} \frac{(H+h)^2}{4Hh}. \end{aligned}$$

Значит,  $\frac{I_{n,h}/J_{n,h}^2}{I_{n,h^o}/J_{n,h^o}^2} \leq \frac{H+h}{2\sqrt{Hh}} = \frac{H/h+1}{2\sqrt{H/h}} = 1 + \frac{(\sqrt{H/h}-1)^2}{2\sqrt{H/h}} \leq \sqrt{\frac{H}{h}}$  и доказательство предложения завершено.  $\square$

## Литература

1. Боровков А.А. Математическая статистика. Москва: Физматлит, 2007.
2. Гуревич В.А. О взвешенных М-оценках в нелинейной регрессии. — Теория вероятностей и ее применения, 1988, Т. 33, 2, 421-424.
3. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. М.: Финансы и статистика, 1981.



4. Демиденко Е.З. Оптимизация и регрессия. М.: Наука, 1989.
5. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Кн. 1,2. М.: Финансы и статистика. 1987.
6. Ермоленко К.В., Саханенко А.И. Явные асимптотически нормальные оценки неизвестного параметра частично-линейной регрессии. — Сиб. электрон. матем. изв., 2013, Т.10, 719-726.
7. Закс Ш. Теория статистических выводов. М.:Мир, 1975.
8. Леман Э. Теория точечного оценивания. М.: Наука, 1991.
9. Линке Ю.Ю. Об уточнении одношаговых оценок Фишера в случае медленно сходящихся предварительных оценок. — Теор. вероятн. и ее примен., 2015, Т.60, вып. 1, 80-98.
10. Линке Ю.Ю. Асимптотические свойства одношаговых  $M$ -оценок для разно-распределенных наблюдений. (сдана в печать) ArXiv: 1503.03393v8
11. Линке Ю.Ю. Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок. — Сиб. Матем. Жур., 2011, Т. 52. № 4, 841-860.
12. Линке Ю.Ю., Саханенко А.И. Об асимптотике распределения одного класса двухшаговых статистических оценок многомерного параметра. — Математические труды, 2013, Т. 16. № 1, 89-120.
13. Линке Ю.Ю., Саханенко А.И. Об условиях асимптотической нормальности одношаговых оценок Фишера для однопараметрических семейств распределений. — Сиб. электрон. матем. изв., 2014, Т.11, 464-475.
14. Линке Ю.Ю. Саханенко А.И. Асимптотически нормальное оценивание параметра в задаче дробно – линейной регрессии. — Сиб. Матем. Жур., 2000, Т. 41, № 1, 150-163.
15. Линке Ю.Ю. Саханенко А.И. Явное асимптотически нормальное оценивание параметров уравнения Михаэлиса–Ментен. — Сиб. Матем. Жур., 2001, Т. 42, № 3, 610-633.
16. Линке Ю.Ю., Саханенко А.И. Асимптотически оптимальное оценивание в задаче линейной регрессии при невыполнении некоторых классических предположений. — Сиб. Матем. Жур., 2009, Т. 50, № 2, 380-396.
17. Линке Ю.Ю. Саханенко А.И. Асимптотически нормальное оценивание параметра в задаче дробно – линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах. — Сиб. Матем. Жур., 2008, Т. 49, № 3, 592-619.
18. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. М.: Мир, 1980.

19. *Савинкина Е.М., Саханенко А.И.* Явные оценки неизвестного параметра в одной задаче степенной регрессии. — Сиб. электрон. матем. изв., 2014, Т.11, 725-733.
20. *Федоров В.В.* Теория оптимального эксперимента. М.: Наука, 1971.
21. *Хьюбер П.* Робастность в статистике. М.:Мир, 1984.
22. *Bergesioa A., Yohaia V.* Projection Estimators for Generalized Linear Models. — J. Amer. Stat. Assoc., 2011, V. 106(494), 661-671.
23. *Bickel P.J.* One-step Huber Estimates in the Linear Model. — J. Amer. Stat. Assoc. 1975, V. 70, 428-434.
24. *Carrol R.J., Ruppert D.* Robust estimation in heteroscedastic linear models. — Ann. Statist., 1982, V. 10, 2, 429-441.
25. *Fan J., and Chen, J.* One-step local quasi-likelihood estimation. — Journal of Royal Statistical Society B, 1999, 61, 927-943.
26. *Fan, J. and Jiang, J.* Variable bandwidth and one-step local M-estimator. — Science in China, 1999, (Series A), 29, 1-15.
27. *Fisher R.A.* Theory of statistical estimation. — Proc. Camb. Phil.Soc., 1925, Soc.22, 700-725.
28. *Heyde C.C.* Quasi-likelihood and its application: a general approach to optimal parameter estimation. 1997. Springer.
29. *Janssen P., Jureckova J., Veraverbeke N.* Rate of convergence of one- and two-step M-estimators with applications to maximum likelihood and Pitman estimators. — Ann. Stat., 1985, V. 13, N 3, 1222-1229.
30. *Jureckova J., Portnoy S.* Asymptotics for one-step M-estimators in regression with application to combining efficiency and high breakdown point. — Comm. Statist. Theory Methods, 1987, 16, 2187-2200.
31. *Jureckova J., Sen P.K.* Effect of the initial estimator on the asymptotic behavior of the one-step M-estimator. — Ann. Inst. Statist. Math. 1990, 42(2), 345-357.
32. *Jureckova J., Picek J.* Robust statistical methods with R. Chapman and Hall, 2006.
33. *Jureckova J., Sen P. K., Picek J.* Methodology in Robust and Nonparametric Statistics. Chapman and Hall, Boca Raton, London 2012.
34. *Jureckova J.* Tail-behavior of estimators and of their one-step versions. — Journal de la Societe Francaise de Statistique, 2012, V. 153 (1), 44-51.

35. *Le Cam L.* On the asymptotic theory of estimation and testing hypotheses. — Proceedings of the Third Berkeley Symposium on mathematical statistics and probability, 1956.
36. *Michaelis L., Menten M. L., Johnson K. A., Goody R. S.* The original Michaelis constant: translation of the 1913 Michaelis-Menten paper. — *Biochemistry*. 2011. V. 50(39), 8264-8269.
37. *Muller, Ch.H.* One-step-M-estimators in conditionally contaminated linear models. — *Stat. Decis.*, 1994, 12, 331-342.
38. *Reeds J.* Asymptotic numbers of roots of Cauchy location likelihood equation. — *Ann. Statist.*, 1985, 13, 775-784.
39. *Seber G.A.F., Wild C.J.* *Nonlinear Regression*. 2003. John Wiley and Sons.
40. *Serfling R.J.* *Approximation theorems of mathematical statistics*. John Willey and Song, 1980.
41. *Simpson, D. G., Ruppert, D. and Carroll, R. J.* On One-Step GM Estimates and Stability of Inferences in Linear Regression. — *J. Amer. Stat. Assoc.*, 1992, 87, 439-450.
42. *Verrill S.* Rate of convergence of k-step Newton estimators to efficient likelihood estimators. — *Statistics and Probability Letters*, 2007, 77, 1371-1376.
43. *Welsh A.H., Ronchetti E.* A journey in single steps: robust one-step M-estimation in linear regression. — *Journal of Statistical Planning and Inference*, 2002, V. 103 (1-2), 287-310.