

А. К. Уринов, Ш. Т. Каримов
РЕШЕНИЕ АНАЛОГА ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ ИТЕРИРОВАННОГО
МНОГОМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ КЛЕЙНА-ГОРДОНА-ФОКА С
ОПЕРАТОРОМ БЕССЕЛЯ

Аннотация

Исследуется аналог задачи Коши для итерированного многомерного уравнения Клейна-Гордона-Фока с оператором Бесселя, действующим по времени. Применяя обобщенный оператор Эрдейи-Кобера дробного порядка, поставленная задача сведена к задаче Коши для поливолнового уравнения. Построена явная формула решения этой задачи методом сферического среднего. На основе полученного решения найдено интегральное представление решения поставленной задачи.

Ключевые слова: Задача Коши, уравнения Клейна-Гордона-Фока, обобщенный оператор Эрдейи-Кобера, оператор Бесселя.

1 Введение. Постановка задачи

Предметом исследования является решение аналога задачи Коши для итерированного многомерного уравнения Клейна-Гордона-Фока с оператором Бесселя

$$L_{\gamma,\lambda}^m(u) \equiv (B_\gamma^t - \Delta + \lambda^2)^m u = 0, \quad (x, t) \in \Omega, \quad (1)$$

удовлетворяющего начальным условиям

$$\left. \frac{\partial^{2k} u}{\partial t^{2k}} \right|_{t=0} = \varphi_k(x), \quad \left. \frac{\partial^{2k+1} u}{\partial t^{2k+1}} \right|_{t=0} = 0, \quad x \in R^n, \quad k = \overline{0, m-1}, \quad (2)$$

$$\left. \frac{\partial^{2k} u}{\partial t^{2k}} \right|_{t=0} = 0, \quad \left. t^{2\gamma+1} \frac{\partial^{2k+1} u}{\partial t^{2k+1}} \right|_{t=0} = \psi_k(x), \quad x \in R^n, \quad k = \overline{0, m-1}, \quad (3)$$

где $u = u(x, t)$, $\Omega = \{(x, t) : x \in R^n, t \in R, t > 0\}$, $m \in N$, $L_{\gamma,\lambda}^m = L_{\gamma,\lambda}(L_{\gamma,\lambda}^{m-1})$, $B_\gamma^t \equiv \partial^2/\partial t^2 + [(2\gamma + 1)/t](\partial/\partial t)$, -оператор Бесселя, $\Delta \equiv \sum_{k=0}^n (\partial^2/\partial x_k^2)$ - оператор Лапласа, $\gamma, \lambda \in R$, $\gamma > -1/2$, $\varphi_k(x)$ и $\psi_k(x)$, $k = \overline{0, m-1}$ - заданные дифференцируемые функции.

Исследование итерированных уравнений высокого порядка представляет собой естественный дальнейший этап на пути теоретических обобщений. Ценность получаемых при этом теоретических результатов существенно возрастает в связи с тем, что подобные уравнения или их частные случаи встречаются в приложениях. Уравнение (1) при $m = 1$ и $\gamma = -1/2$, переходит в уравнение Клейна-Гордона-Фока, которое является релятивистской версией уравнения Шрёдингера и представляет собой дифференциальное уравнение в частных производных, относящееся к классу гиперболических уравнений второго порядка. Оно описывает динамику релятивистской квантовой системы [1]. Кроме того, оно является обобщением волнового уравнения, подходящего для описания без массовых скалярных и векторных полей.

В случае $\lambda = 0$, в работах [2], [3] получено представление решения поставленной задачи. При этом решение konstruировано, используя решение задачи Коши для уравнения Эйлера-Пуассона-Дарбу (ЭПД). Последнее основано на том факте, что среднее сферическое достаточно гладкой функции удовлетворяет уравнению Дарбу [4]. Отправляясь от этого факта [5], получают формулу Кирхгофа для решения уравнения ЭПД, в том числе, для волнового уравнения. Однако, когда $\lambda \neq 0$, этот факт не имеет места, поэтому этот подход неприменим.

В данной работе, в отличие от цитируемых источников, для решения поставленной задачи применим другой подход. А именно, учитывая специфику уравнений с сингулярными коэффициентами, используем обобщенный оператор интегрирования дробного порядка Эрдейи-Кобера. Данный подход для решения поставленной задачи при $m = 1$ применен в работе [6]. Применение обобщенного оператора интегрирования дробного порядка Эрдейи-Кобера позволяет сводить уравнения с младшим членом $\lambda^2 u$ и с сингулярным оператором Бесселя, который действует по одной или нескольким переменным, к не сингулярным уравнениям без младшего члена $\lambda^2 u$. Поэтому, сначала рассмотрим некоторые свойства данного оператора.

2 Обобщенный оператор Эрдейи - Кобера

В теории и приложениях широко используются различные модификации и обобщения классических операторов интегрирования и дифференцирования дробного порядка Римана - Лиувилля. К таким модификациям относятся, в частности, операторы Эрдейи - Кобера [7], [8]. Оказалось, что эти операторы очень полезны в приложениях к интегральным и дифференциальным уравнениям, а также в других вопросах науки и техники [9]. Их различные модификации, обобщения и приложения могут быть найдены в работах Эрдейи [10], [11], Снеддона [12], [13] и Кирьяковой [14].

В работе Лоундеса [15] был введен и исследован обобщенный оператор Эрдейи - Кобера с функцией Бесселя в ядре

$$J_\lambda(\eta, \alpha)f(x) = 2^\alpha \lambda^{1-\alpha} x^{-2\alpha-2\eta} \int_0^x t^{2\eta+1} \frac{J_{\alpha-1}(\lambda\sqrt{x^2-t^2})}{(x^2-t^2)^{(1-\alpha)/2}} f(t) dt, \quad (4)$$

где $\alpha, \eta, \lambda \in R$, $\alpha > 0$, $\eta \geq -(1/2)$, $J_\nu(z)$ - функция Бесселя первого рода порядка ν . Оператор (4) при $\lambda = 0$ совпадает с обычным оператором Эрдейи - Кобера [9]

$$I_{\eta,\alpha}f(x) = \frac{2x^{-2(\eta+\alpha)}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x^2-t^2)^{\alpha-1} t^{2\eta+1} f(t) dt, \quad (5)$$

где $\Gamma(\alpha)$ - гамма-функция Эйлера.

Основные свойства этих операторов можно найти в книге [9, с. 245, 535].

Свойства оператора (4) в весовых пространствах $L_p(0, \infty)$ было изучено в работах [16] и [17]. В этих работах обобщенные операторы Эрдейи-Кобера названы оператором Лоундеса.

В дальнейшем нам понадобится следующий вид оператора (4):

$$J_\lambda(\eta, \alpha)f(x) = \frac{2x^{-2(\alpha+\eta)}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x t^{2\eta+1} (x^2-t^2)^{\alpha-1} \bar{J}_{\alpha-1}(\lambda\sqrt{x^2-t^2}) f(t) dt, \quad (6)$$

где $\bar{J}_\nu(z)$ - функция Бесселя - Клиффорда, которая выражается через функции Бесселя $J_\nu(z)$ по формуле [9]:

$$\bar{J}_\nu(z) = \Gamma(\nu+1)(z/2)^{-\nu} J_\nu(z) = {}_0F_1(\nu+1; -z^2/4) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-z^2/4)^k}{(\nu+1)_k k!}. \quad (7)$$

В работах [19], [20] доказаны приводимые ниже теоремы.

Пусть $[B_\eta^x]^0 = E$, E - единичный оператор, $[B_\eta^x]^m = [B_\eta^x]^{m-1}[B_\eta^x]$ - m -ая степень оператора Бесселя. В дальнейшем m означает натуральное число.

Теорема 1. Пусть $\alpha > 0$, $\eta \geq -1/2$, $f(x) \in C^{2m}(0, b)$, $b > 0$, функции $x^{2\eta+1}[B_\eta^x]^{k+1}f(x)$ интегрируемы в нуле и $\lim_{x \rightarrow 0} x^{2\eta+1}(d/dx)[B_\eta^x]^k f(x) = 0$, $k = \overline{0, m-1}$. Тогда

$$[B_{\eta+\alpha}^x + \lambda^2]^m J_\lambda(\eta, \alpha) f(x) = J_\lambda(\eta, \alpha) [B_\eta^x]^m f(x),$$

в частности, если $\lambda = 0$, тогда

$$[B_{\eta+\alpha}^x]^m I_{\eta, \alpha} f(x) = I_{\eta, \alpha} [B_\eta^x]^m f(x).$$

Пусть функция $u(x, y) = u(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ непрерывно дифференцируема до порядка $2m$ включительно по переменной y и порядка не меньше чем m по x . $L^{(x)}$ - не зависящий от y линейный дифференциальный оператор конечного порядка по переменной $x \in R^n$.

Теорема 2. Пусть $\alpha > 0$, $\eta \geq -1/2$, функции $y^{2\eta+1}[B_\eta^y]^k u(x, y)$ интегрируемы при $y \rightarrow 0$ и $\lim_{y \rightarrow 0} y^{2\eta+1}(\partial/\partial y)[B_\eta^y]^k u(x, y) = 0$, $k = \overline{0, m-1}$. Тогда

$$(B_{\eta+\alpha}^y + \lambda^2 + L^{(x)})^m J_\lambda^{(y)}(\eta, \alpha) u(x, y) = J_\lambda^{(y)}(\eta, \alpha) (B_\eta^y + L^{(x)})^m u(x, y),$$

в частности, если $\lambda = 0$, тогда

$$(B_{\eta+\alpha}^y + L^{(x)})^m I_{\eta, \alpha}^{(y)} u(x, y) = I_{\eta, \alpha}^{(y)} (B_\eta^y + L^{(x)})^m u(x, y),$$

здесь верхние индексы в операторах означают переменные, по которым действуют эти операторы.

Следствие 1. Пусть $\eta = -1/2$, $\alpha > 0$, функции $\partial^{2k} u(x, y)/\partial y^{2k}$ интегрируемы при $y \rightarrow 0$ и $\lim_{y \rightarrow 0} (\partial^{2k+1} u(x, y)/\partial y^{2k+1}) = 0$, $k = \overline{0, m-1}$. Тогда

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{2\alpha}{y} \frac{\partial}{\partial y} + \lambda^2 + L^{(x)} \right)^m J_\lambda^{(y)} \left(-\frac{1}{2}, \alpha \right) u(x, y) = \\ & = J_\lambda^{(y)} \left(-\frac{1}{2}, \alpha \right) \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} + L^{(x)} \right)^m u(x, y). \end{aligned} \quad (8)$$

Пусть $D_\eta^0 = E$, $D_\eta = x^{-2\eta} (d/(xdx)) x^{2\eta}$, $D_\eta^m = D_\eta^{m-1} D_\eta = D_\eta D_\eta \dots D_\eta$ - m -ая степень оператора D_η , которая представима в виде $D_\eta^m = x^{-2\eta} (d/(xdx))^m x^{2\eta}$.

Теорема 3. Если $\alpha > 0$, $\eta \geq -1/2$, $f(x) \in C^m(0, b)$, $b > 0$, функции $x^{2\eta+1} D_\eta^{k+1} f(x)$ - интегрируемы в нуле и $\lim_{x \rightarrow 0} x^{2\eta} D_\eta^k f(x) = 0$, $k = \overline{0, m-1}$, то верно равенство

$$D_{\eta+\alpha}^m J_\lambda(\eta, \alpha) f(x) = J_\lambda(\eta, \alpha) D_\eta^m f(x).$$

Следствие 2. Пусть $\eta = 0$, $\alpha > 0$, $f(x) \in C^m(0, b)$, функции $\frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dx} \right)^k f(x)$ - интегрируемы в нуле и $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{d}{dx} \right)^k f(x) = 0$, $k = \overline{0, m-1}$. Тогда

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^m \int_0^x (x^2 - t^2)^{\alpha-1} \bar{J}_{\alpha-1} \left(\lambda \sqrt{x^2 - t^2} \right) f(t) t dt = \\ & = \int_0^x (x^2 - t^2)^{\alpha-1} \bar{J}_{\alpha-1} \left(\lambda \sqrt{x^2 - t^2} \right) \left[\left(\frac{1}{t} \frac{d}{dt} \right)^m f(t) \right] t dt \end{aligned} \quad (9)$$

в частности, если $\lambda = 0$, тогда

$$\left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\right)^m \int_0^x (x^2 - t^2)^{\alpha-1} f(t) t dt = \int_0^x (x^2 - t^2)^{\alpha-1} \left[\left(\frac{1}{t} \frac{d}{dt}\right)^m f(t) \right] t dt. \quad (10)$$

Теорема 4. Пусть $\alpha > 0$, $\eta \geq -1/2$, $f(x) \in C^{2m}(0, b)$, функции $x^{2\eta+1}[B_\eta^x]^{k+1}f(x)$ интегрируемы в нуле и $\lim_{x \rightarrow 0} x^{2\eta+1}(d/dx)[B_\eta^x]^k f(x) = 0$, $k = \overline{0, m-1}$. Тогда

$$\frac{d^{2m}}{dx^{2m}} J_\lambda(\eta, \alpha) f(x) = \sum_{j=0}^m a_{mj} x^{2j} J_\lambda(\eta, \alpha + m + j) (B_\eta^x - \lambda^2)^{m+j} f(x),$$

$$\frac{d^{2m+1}}{dx^{2m+1}} J_\lambda(\eta, \alpha) f(x) = \sum_{j=0}^m b_{mj} x^{2j+1} J_\lambda(\eta, \alpha + m + j + 1) (B_\eta^x - \lambda^2)^{m+j+1} f(x),$$

где постоянные a_{mj} и b_{mj} определяются из следующих рекуррентных соотношений $a_{00} = 1$, $b_{00} = 1/2$, $b_{mj} = (1/2)a_{mj} + 2(j+1)a_{m(j+1)}$, $0 \leq j \leq m$, $a_{mj} = 0$, $j > m$, $a_{(m+1)j} = (1/2)b_{m(j-1)} + (2j+1)b_{mj}$, $1 \leq j \leq m$, $b_{mj} = 0$, $j > m$, $a_{(m+1)0} = b_{m0} = = 2^{-(m+1)}(2m+1)!!$.

Теорема 5. Пусть $\alpha > 0$, $\eta \geq -1/2$, $f(x) \in C^{2m-1}[0, b] \cap C^{2m}(0, b)$, $\lim_{x \rightarrow 0} [B_\eta^x]^k f(x) = c_k$, $c_k = const$ и $\lim_{x \rightarrow 0} x^{2\eta+1}(d/dx)[B_\eta^x]^k f(x) = 0$, $k = \overline{0, m-1}$. Тогда

$$[B_{\eta+\alpha}^x]^m J_\lambda(\eta, \alpha) f(x) \Big|_{x=0} = \frac{(\alpha + \eta + 1)_m}{(1/2)_m} \frac{d^{2m}}{dx^{2m}} J_\lambda(\eta, \alpha) f(x) \Big|_{x=0},$$

$$\frac{d}{dx} [B_{\eta+\alpha}^x]^m J_\lambda(\eta, \alpha) f(x) \Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{d^{2m+1}}{dx^{2m+1}} J_\lambda(\eta, \alpha) f(x) \Big|_{x=0} = 0.$$

в частности, если $\lambda = 0$, тогда

$$[B_{\eta+\alpha}^x]^m I_{\eta, \alpha} f(x) \Big|_{x=0} = \frac{(\alpha + \eta + 1)_m}{(1/2)_m} \frac{d^{2m}}{dx^{2m}} I_{\eta, \alpha} f(x) \Big|_{x=0}$$

$$\frac{d}{dx} [B_{\eta+\alpha}^x]^m I_{\eta, \alpha} f(x) \Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{d^{2m+1}}{dx^{2m+1}} I_{\eta, \alpha} f(x) \Big|_{x=0} = 0.$$

Доказанные теоремы позволяют сводить сингулярные (или вырождающиеся) уравнения высокого как четного, так и нечетного порядка к не сингулярным уравнениям и тем самым поставить и исследовать корректные начальные и граничные задачи для таких уравнений.

3 Приложение оператора Эрдейи-Кобера к решению поставленной задачи

Предположим, что решение задачи $\{(1), (2)\}$ существует. Это решение будем искать в виде

$$u(x, t) = J_\lambda^{(t)}(\eta, \alpha) U(x, t) \quad (11)$$

где $\eta = -1/2$, $\alpha = \gamma + 1/2 > 0$, $U(x, t)$ - неизвестная функция.

Подставим (11) в начальные условия (2) и применим теоремы 4 и 5. Затем, подставляя в уравнение (1) и используя теорему 2, при $\eta = -1/2$, $L^{(x)} \equiv -\Delta$ получим следующую задачу нахождения решения $U(x, t)$ поливолнового уравнения

$$L_{0,0}^m(u) \equiv \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta \right)^m U(x, t) = 0, \quad (x, t) \in \Omega, \quad (12)$$

удовлетворяющего начальным условиям

$$\left. \frac{\partial^{2k} U}{\partial t^{2k}} \right|_{t=0} = \Phi_k(x), \quad \left. \frac{\partial^{2k+1} U}{\partial t^{2k+1}} \right|_{t=0} = 0, \quad x \in R^n, \quad k = \overline{1, m-1}, \quad (13)$$

где $\Phi_k(x) = \sum_{j=0}^k a_j C_k^j \lambda^{2(k-j)} \varphi_j(x)$, $a_j = \Gamma((2j+1)/2 + \alpha) / \Gamma((2j+1)/2)$, $C_k^j = k! / [j!(k-j)!]$ - биномиальный коэффициент, $j = \overline{0, k}$, $k = \overline{0, m-1}$.

Задача Коши для поливолнового уравнения изучалась в работах [21], [22], [23] и [24]. Однако построенные в этих работах формулы содержат весьма сложные кратные интегралы. Чтобы получить более простые формулы, аналогичные формулам Кирхгофа, в данной работе, задача Коши для поливолнового уравнения (12) решается методом сферических средних.

Для полноты изложения рассмотрим задачу Коши для поливолнового уравнения (12), удовлетворяющего начальным условиям

$$\left. \frac{\partial^{2k} U}{\partial t^{2k}} \right|_{t=0} = \Phi_k(x), \quad \left. \frac{\partial^{2k+1} U}{\partial t^{2k+1}} \right|_{t=0} = \Psi_k(x), \quad x \in R^n, \quad k = \overline{1, m-1}, \quad (14)$$

где $\Phi_k(x)$ и $\Psi_k(x)$, ($k = \overline{0, m-1}$) - заданные функции.

Пусть $U_0(x, t) = U(x, t)$ и $U_k(x, t) = \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta \right)^k U_0(x, t)$. Тогда задача {(12), (14)} эквивалентна следующей задаче о нахождении функций $U_k(x, t)$, $k = \overline{0, m-1}$, удовлетворяющих системе уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U_k}{\partial t^2} - \Delta U_k = U_{k+1}, & (x, t) \in \Omega, \quad k = \overline{0, m-2}, \\ \frac{\partial^2 U_{m-1}}{\partial t^2} - \Delta U_{m-1} = 0, & (x, t) \in \Omega \end{cases} \quad (15)$$

и начальным условиям

$$U_k(x, 0) = f_k(x), \quad \frac{\partial U_k(x, 0)}{\partial t} = g_k(x), \quad x \in R^n, \quad k = \overline{0, m-1}, \quad (16)$$

где

$$f_k(x) = \sum_{j=0}^k (-1)^j C_k^j \Delta^{k-j} \Phi_j(x), \quad g_k(x) = \sum_{j=0}^k (-1)^j C_k^j \Delta^{k-j} \Psi_j(x), \quad k = \overline{0, m-1}. \quad (17)$$

Для решения этой задачи применим метод сферических средних [5, с.694].

Пусть $S(x, r) = \{\xi : |\xi - x| = r\}$ - сфера радиуса $r > 0$ с центром в точке $x \in R^n$, где $|\xi - x|^2 = \sum_{k=1}^n (\xi_k - x_k)^2$ расстояние между точками ξ и x . Пусть, далее,

$$V_k(x, t, r) = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{|\xi-x|=r} U_k(\xi, t) d\sigma_\xi = \frac{1}{\omega_n} \int_{|\eta|=1} U_k(x + r\eta, t) d\sigma_\eta, \quad (18)$$

где $\omega_n = 2\pi^{(n/2)}/\Gamma(n/2)$, $S(0, 1) = \{\eta : |\eta| = 1\}$ - единичная сфера с центром в начале координат, $d\sigma_\xi$ - элемент поверхности сферы $S(x, r)$, а $d\sigma_\eta$, -элемент поверхности единичной сферы, причем $d\sigma_\xi = r^{n-1}d\sigma_\eta$, $\Gamma(z)$ - гамма - функция Эйлера.

Очевидно, что равенство (18) является средним арифметическим значением функций $U_k(x, t)$ на сфере $S(x, r)$.

Применяя классический метод сферических средних [5, с.694], можно показать, что если функции $U_k(x, t)$ являются решением задачи Коши для системы уравнений $\{(15), (16)\}$, то функции $V_k(x, t, r)$ будут решением системы уравнений

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^{n-1} \frac{\partial V_k}{\partial r} \right) = r^{n-1} \left(\frac{\partial^2 V_k}{\partial t^2} - V_{k+1} \right), \quad k = \overline{0, m-1}; \quad V_m(x, t) = 0, \quad r > 0, \quad t > 0, \quad (19)$$

удовлетворяющих начальным

$$V_k(x, t, 0) = F_k(x, r), \quad \left. \frac{\partial V_k}{\partial t} \right|_{t=0} = G_k(x, r), \quad x \in R^n, \quad r > 0, \quad k = \overline{0, m-1} \quad (20)$$

и граничным

$$\frac{\partial V_k(x, t, 0)}{\partial r} = 0, \quad x \in R^n, \quad t > 0, \quad k = \overline{0, m-1}$$

условиям, где

$$F_k(x, r) = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{|\xi-x|=r} f_k(\xi) d\sigma_\xi = \frac{1}{\omega_n} \int_{|\eta|=1} f_k(x + r\eta) d\sigma_\eta, \quad (21)$$

$$G_k(x, r) = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{|\xi-x|=r} g(\xi) d\sigma_\xi = \frac{1}{\omega_n} \int_{|\eta|=1} g(x + r\eta) d\sigma_\eta, \quad (22)$$

причем $\frac{\partial F_k}{\partial r}(x, 0) = 0$, $\frac{\partial G_k}{\partial r}(x, 0) = 0$, $k = \overline{0, m-1}$.

Каждое уравнение системы (19) перепишем в виде

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{n-1} \frac{\partial V_k}{\partial r} \right) - \frac{\partial^2}{\partial t^2} (r^{n-2} V_k) + (r^{n-2} V_{k+1}) = 0.$$

Пусть n - нечетное натуральное число: $n = 2p + 1$, $p \in N$. Тогда, применяя к последнему равенству оператор $\left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)^{p-1}$, получим

$$\left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)^p \left(r^{2p} \frac{\partial V_k}{\partial r} \right) - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)^{p-1} (r^{2p-1} V_k) \right] + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)^{p-1} (r^{2p-1} V_{k+1}) = 0. \quad (23)$$

Далее, воспользуемся следующей леммой [25]:

Лемма 1. Если $w(r) \in C^{p+1}$, $p = 1, 2, \dots$, то справедливы равенства

$$\frac{d^2}{dr^2} \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \right)^{p-1} (r^{2p-1} w) = \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \right)^p \left(r^{2p} \frac{dw}{dr} \right), \quad (24)$$

$$\left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \right)^{p-1} (r^{2p-1} w) = \sum_{j=0}^{p-1} A_j^p r^{j+1} \frac{d^j w}{dr^j}, \quad (25)$$

где $A_j^p = const$, причем $A_0^p = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2p-1) = (2p-1)!!$.

Введем обозначение

$$W_k(x, t, r) = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)^{p-1} (r^{2p-1} V_k), \quad k = \overline{0, m-1} \quad (26)$$

и учитывая лемму 1, из равенства (23), (24) и начальных условий (20) получим задачу о нахождении функций $W_k(x, t, r)$, $k = \overline{0, m-1}$, удовлетворяющих системе уравнений

$$\frac{\partial^2 W_k}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 W_k}{\partial r^2} = W_{k+1}, \quad k = \overline{0, m-1}; \quad W_m(x, t, r) = 0, \quad r > 0, \quad t > 0, \quad (27)$$

а также начальным

$$W_k(x, 0, r) = \Phi_k(x, r), \quad \frac{\partial W_k(x, 0, r)}{\partial t} = \Psi_k(x, r), \quad x \in R^n, \quad r > 0, \quad k = \overline{0, m-1} \quad (28)$$

и граничным

$$W_k(x, t, 0) = 0, \quad x \in R^n, \quad t > 0, \quad k = \overline{0, m-1} \quad (29)$$

условиям, где

$$\Phi_k(x, r) = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)^{p-1} (r^{2p-1} F_k(x, r)), \quad (30)$$

$$\Psi_k(x, r) = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)^{p-1} (r^{2p-1} G_k(x, r)). \quad (31)$$

Учитывая граничные условия (29), начальные функции $\Phi_k(x, r)$ и $\Psi_k(x, r)$ ($k = \overline{0, m-1}$) продолжим нечетным образом на полуинтервал $r < 0$ и продолженные функции обозначим через $\tilde{\Phi}_k(x, r)$ и $\tilde{\Psi}_k(x, r)$ соответственно.

Тогда, в области $\Omega_1 = \{(r, t) : -\infty < r < +\infty, 0 < t < +\infty\}$ получим задачу нахождения решений $W_k(x, t, r)$ системы уравнений (27), удовлетворяющих начальным условиям

$$W_k(x, 0, r) = \tilde{\Phi}_k(x, r), \quad \frac{\partial W_k(x, 0, r)}{\partial t} = \tilde{\Psi}_k(x, r), \quad x \in R^n, \quad r \in R^1, \quad k = \overline{0, m-1}. \quad (32)$$

Решение задачи {(27), (32)} имеет вид [26]:

$$\begin{aligned} W_0(x, t, r) = & \frac{1}{2} \left[\tilde{\Phi}_0(x, r+t) + \tilde{\Phi}_0(x, r-t) \right] + \frac{1}{2} \int_{r-t}^{r+t} \tilde{\Psi}_0(x, s) ds + \\ & + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{2^{2k+1}(k!)^2} \frac{\partial}{\partial t} \int_{r-t}^{r+t} [t^2 - (r-s)^2]^k \tilde{\Phi}_k(x, s) ds + \\ & + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{2^{2k+1}(k!)^2} \int_{r-t}^{r+t} [t^2 - (r-s)^2]^k \tilde{\Psi}_k(x, s) ds. \end{aligned} \quad (33)$$

Для нахождения решения задачи Коши {(12), (14)} воспользуемся следующим свойством среднее сферических [5, с. 694]:

$$U(x, t) = U_0(x, t) = \lim_{r \rightarrow 0} V_0(x, t, r). \quad (34)$$

Применяя (25), равенство (26) можно представить в виде

$$V_0(x, t, r) = \frac{W_0(x, t, r)}{A_0^p r} - o(r).$$

Учитывая это, из (34) получим

$$U(x, t) = \lim_{r \rightarrow 0} V_0(x, t, r) = \frac{1}{A_0^p} \lim_{r \rightarrow 0} \frac{W_0(x, t, r)}{r}. \quad (35)$$

В силу нечетности функций $\tilde{\Phi}_k(x, r)$ и $\tilde{\Psi}_k(x, r)$ относительно переменной r , из (33) следует, что $W_0(x, t, 0) = 0$.

Для вычисления предела (35) применим правило Лопиталля [27, с.270]. Тогда, после несложных преобразований, имеем

$$\begin{aligned} U(x, t) &= \frac{1}{A_0^p} \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\partial W_0}{\partial r} = \frac{1}{A_0^p} \left[\frac{\partial}{\partial t} \Phi_0(x, t) + \Psi_0(x, t) \right] + \\ &+ \frac{1}{A_0^p} \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{2^{2k-1}(k-1)!k!} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t (t^2 - s^2)^{k-1} s \Phi_k(x, s) ds + \\ &+ \frac{1}{A_0^p} \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{2^{2k-1}(k-1)!k!} \int_0^t (t^2 - s^2)^{k-1} s \Psi_k(x, s) ds. \end{aligned} \quad (36)$$

В силу (25) для функций $s^{2p-1}F_k(x, s)$ и $s^{2p-1}G_k(x, s)$ условия следствия 2 выполняются. Поэтому, применяя формулу (10) при $\alpha = k > 0$ к равенству (36), с учетом (30) и (31) получим

$$\begin{aligned} U(x, t) &= \frac{1}{A_0^p} \left[\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{p-1} (t^{2p-1} F_0(x, t)) + \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{p-1} (t^{2p-1} G_0(x, t)) \right] + \\ &+ \frac{1}{A_0^p} \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{2^{2k-1}(k-1)!k!} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{p-1} \int_0^t (t^2 - s^2)^{k-1} s^{2p} F_k(x, s) ds + \\ &+ \frac{1}{A_0^p} \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{2^{2k-1}(k-1)!k!} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{p-1} \int_0^t (t^2 - s^2)^{k-1} s^{2p} G_k(x, s) ds. \end{aligned} \quad (37)$$

Подставляя (21) и (22) в равенство (37), имеем

$$\begin{aligned} U(x, t) &= \gamma_n \left[\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{\frac{n-3}{2}} \left(\frac{1}{t} \int_{|\xi-x|=t} f_0(\xi) d\sigma_\xi \right) + \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{\frac{n-3}{2}} \left(\frac{1}{t} \int_{|\xi-x|=t} g_0(\xi) d\sigma_\xi \right) \right] + \\ &+ \gamma_n \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{2^{2k-1}(k-1)!k!} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{\frac{n-3}{2}} \int_{|\xi-x| \leq t} [t^2 - |\xi - x|^2]^{k-1} f_k(\xi) d\xi + \\ &+ \gamma_n \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{2^{2k-1}(k-1)!k!} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{\frac{n-3}{2}} \int_{|\xi-x| \leq t} [t^2 - |\xi - x|^2]^{k-1} g_k(\xi) d\xi, \end{aligned} \quad (38)$$

где $\gamma_n = [1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-2)\omega_n]^{-1}$, $f_k(x)$, $g_k(x)$, $k = \overline{0, m-1}$ - функции определяемые через заданные начальные данные равенствами (17).

Как и в случае волнового уравнения [5], можно показать, что если $\varphi_j(x) \in C^{q_1}(\Omega_n)$, $\psi_j(x) \in C^{q_2}(\Omega_n)$, $q_1 = [(n+1)/2] + 2(m-j) + 2$, $q_2 = [(n+1)/2] + 2(m-j) + 1$, $j = \overline{0, m-1}$, где $[(n+1)/2]$ - означает целую часть числа $(n+1)/2$, то функция $U(x, t)$, определяемая равенством (38), при нечетном n является классическим решением задачи Коши $\{(12), (14)\}$, из которого при $m = 1$ следует формула Кирхгофа для волнового уравнения.

При четном n , применяя метод спуска Адамара [5, с.682], [25, с.74], из формулы (38) также можно получить явную формулу решения задачи Коши $\{(12), (14)\}$, которая имеет вид:

$$U(x, t) = \tilde{\gamma}_n \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\Gamma^{-1}(k+1/2)}{2^{2k}k!} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{\frac{n-2}{2}} \int_{|\xi-x|<t} [t^2 - |\xi-x|^2]^{k-(1/2)} f_k(\xi) d\xi + \\ + \tilde{\gamma}_n \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\Gamma^{-1}(k+1/2)}{2^{2k}k!} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{\frac{n-2}{2}} \int_{|\xi-x|<t} [t^2 - |\xi-x|^2]^{k-(1/2)} g_k(\xi) d\xi, \quad (39)$$

где $\tilde{\gamma}_n = [\omega_{n+1} 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (n-1)]^{-1}$.

Аналогично, как и в случае нечетного n , можно показать, что если $\varphi_j(x) \in C^{q_1}(\Omega_n)$, $\psi_j(x) \in C^{q_2}(\Omega_n)$, $q_1 = [n/2] + 2(m-j) + 2$, $q_2 = [n/2] + 2(m-j) + 1$, $j = \overline{0, m-1}$, то функция $U(x, t)$, определяемая равенством (39), при четном n является классическим решением задачи Коши $\{(12), (14)\}$.

4 Решение основной задачи

Вернемся к исследованию задачи $\{(1), (2)\}$. Учитывая решение вспомогательной задачи $\{(12), (14)\}$ при нечетном $n = 2p + 1$, $p \in N$ и $\Psi_k(x) = 0$, из (37), имеем

$$U(x, t) = \frac{1}{A_0^p} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{p-1} (t^{2p-1} F_0(x, t)) + \\ + \frac{1}{A_0^p} \sum_{k=1}^{m-1} \frac{2^{-2k+1}}{(k-1)!k!} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{p-1} \int_0^t (t^2 - \tau^2)^{k-1} \tau^{2p} F_k(x, \tau) d\tau, \quad (40)$$

где функции $F_k(x, \tau)$ определяются равенством (21), $A_0^p = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2p-1) = (2p-1)!!$.

Подставляя (40) в (11), после несложных преобразований, получим

$$u(x, t) = \frac{t^{1-2\alpha}}{A_0^p \Gamma(\alpha)} Q_0(x, t) + \frac{t^{1-2\alpha}}{A_0^p \Gamma(\alpha)} \sum_{k=1}^{m-1} \frac{2^{-2k}}{(k-1)!k!} Q_k(x, t), \quad (41)$$

где

$$Q_0(x, t) = \int_0^t (t^2 - s^2)^{\alpha-1} \bar{J}_{\alpha-1} \left(\lambda \sqrt{t^2 - s^2} \right) \left[\frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \right)^{p-1} (s^{2p-1} F_0(x, s)) \right] ds,$$

$$Q_k(x, t) = \int_0^t (t^2 - s^2)^{\alpha-1} \bar{J}_{\alpha-1} \left(\lambda \sqrt{t^2 - s^2} \right) \times$$

$$\times \left[\frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \right)^{p-1} \int_0^s (s^2 - \tau^2)^{k-1} \tau^{2p} F_k(x, \tau) d\tau \right] ds.$$

В силу (25) для функций $s^{2p-1}F_0(x, s)$ и $s^{2p-1}\tilde{F}_k(x, s)$, где

$$\tilde{F}_k(x, s) = s^{2k} \int_0^1 (1 - z^2)^{k-1} z^{2p} F_k(x, sz) dz,$$

условия следствия 2 выполняются. Поэтому применяя формулу (9), имеем

$$\begin{aligned} Q_0(x, t) &= \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^p \int_0^t (t^2 - s^2)^{\alpha-1} \bar{J}_{\alpha-1} \left(\lambda \sqrt{t^2 - s^2} \right) s^{2p} F_0(x, s) ds, \\ Q_k(x, t) &= \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^p \int_0^t (t^2 - s^2)^{\alpha-1} \bar{J}_{\alpha-1} \left(\lambda \sqrt{t^2 - s^2} \right) s \times \\ &\quad \times \left[\int_0^s (s^2 - \tau^2)^{k-1} \tau^{2p} F_k(x, \tau) d\tau \right] ds \end{aligned} \quad (42)$$

Учитывая вид (21) функции $F_0(x, s)$, функцию $Q_0(x, t)$ можно написать в виде

$$Q_0(x, t) = \frac{1}{\omega_n} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{\frac{n-1}{2}} \int_{|\xi-x|<t} [t^2 - |\xi - x|^2]^{\alpha-1} \bar{J}_{\alpha-1} \left(\lambda \sqrt{t^2 - |\xi - x|^2} \right) f_0(\xi) d\xi \quad (43)$$

Произведя перестановку порядка интегрирования, из (42) получим

$$Q_k(x, t) = \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^p \int_0^t \tau^{2p} F_k(x, \tau) K(t, \tau) d\tau, \quad (44)$$

где

$$K(t, \tau) = \int_{\tau}^t (t^2 - s^2)^{\alpha-1} \bar{J}_{\alpha-1} \left(\lambda \sqrt{t^2 - s^2} \right) s (s^2 - \tau^2)^{k-1} ds.$$

Вычислим последний интеграл. Произведя замену переменных интегрирования по формуле $s^2 = \tau^2 + [t^2 - \tau^2]\mu$, получим

$$K(t, \tau) = (1/2)(t^2 - \tau^2)^{\alpha+k-1} \int_0^1 \mu^{k-1} (1 - \mu)^{\alpha-1} \bar{J}_{\alpha-1} \left(\lambda \sqrt{(t^2 - \tau^2)(1 - \mu)} \right) d\mu.$$

В правой части последнего равенства, пользуясь разложением функции Бесселя - Клиффорда в ряд (7) и равномерной сходимостью данного ряда при любых значениях аргумента, меняем порядок интегрирования и суммирования. Затем, вычислив полученный интеграл, имеем

$$K(t, \tau) = \frac{\Gamma(k)\Gamma(\alpha)}{2\Gamma(\alpha+k)} (t^2 - \tau^2)^{\alpha+k-1} \bar{J}_{\alpha+k-1} \left(\lambda \sqrt{t^2 - \tau^2} \right).$$

Принимая во внимание последнее равенство, из (44) получим

$$Q_k(x, t) = \frac{\Gamma(k)\Gamma(\alpha)}{2\Gamma(\alpha+k)} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t}\right)^p \int_0^t \tau^{2p} F_k(x, \tau) (t^2 - \tau^2)^{\alpha+k-1} \bar{J}_{\alpha+k-1} \left(\lambda\sqrt{t^2 - \tau^2}\right) d\tau. \quad (45)$$

Подставляя в (45) выражение (21) функций $F_k(x, s)$, находим

$$Q_k(x, t) = \frac{\Gamma(k)\Gamma(\alpha)}{2\omega_n\Gamma(\alpha+k)} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t}\right)^p \times \\ \times \int_{|\xi-x|<t} [t^2 - |\xi-x|^2]^{\alpha+k-1} \bar{J}_{\alpha+k-1} \left(\lambda\sqrt{t^2 - |\xi-x|^2}\right) f_k(\xi) d\xi. \quad (46)$$

Подставив (43) и (46) в (41) и принимая во внимание $\Gamma(k) = (k-1)!$, окончательно находим явную формулу решения задачи $\{(1), (2)\}$ при нечетном n :

$$u(x, t) = \bar{\gamma}_n t^{1-2\alpha} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-1}{2}} \int_{|\xi-x|<t} \frac{\bar{J}_{\alpha-1} \left(\lambda\sqrt{t^2 - |\xi-x|^2}\right)}{[t^2 - |\xi-x|^2]^{1-\alpha}} f_0(\xi) d\xi + \\ + \bar{\gamma}_n t^{1-2\alpha} \sum_{k=1}^{m-1} \frac{2^{-2k}}{k!(\alpha)_k} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-1}{2}} \int_{|\xi-x|<t} \frac{\bar{J}_{\alpha+k-1} \left(\lambda\sqrt{t^2 - |\xi-x|^2}\right)}{[t^2 - |\xi-x|^2]^{1-\alpha-k}} f_k(\xi) d\xi, \quad (47)$$

где $\bar{\gamma}_n = [1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-2)\omega_n\Gamma(\alpha)]^{-1}$.

При четном n , применяя метод спуска Адамара [5, с.682], [25, с.74], из формулы (47) также можно получить явную формулу решения задачи Коши $\{(1), (2)\}$, которое имеет вид

$$u(x, t) = \bar{\gamma}_n t^{1-2\alpha} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{2^{-2k}}{k!(\alpha+1/2)_k} \times \\ \times \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n}{2}} \int_{|\xi-x|<t} [t^2 - |\xi-x|^2]^{\alpha+k-(1/2)} \bar{J}_{\alpha+k-(1/2)} \left(\lambda\sqrt{t^2 - |\xi-x|^2}\right) f_k(\xi) d\xi. \quad (48)$$

Из теоремы 5 следует, что в задаче $\{(1), (2)\}$ вместо начального условия (2) можно взять начальные условия вида

$$[B_{\alpha-(1/2)}^t]^k u|_{t=0} = \varphi_k^*(x), \quad x \geq 0; \quad \frac{\partial}{\partial t} [B_{\alpha-(1/2)}^t]^k u \Big|_{t=0} = 0, \quad x > 0, \quad k = \overline{0, m-1}, \quad (49)$$

где $\varphi_k^*(x) = [(\alpha+1/2)_k / (1/2)_k] \varphi_k(x)$.

Кроме того, в силу теоремы 1 и 5, а также равенства (11) следует, что задачи $\{(1), (2)\}$ и $\{(1), (49)\}$ сводятся к одной и той же вспомогательной задаче $\{(12), (13)\}$. Отсюда следует справедливость следующего утверждения:

Лемма 2. *Решение задачи $\{(1), (2)\}$ является решением задачи $\{(1), (49)\}$, и наоборот.*

Данная лемма при $\lambda = 0$ в работах [2] и [3] доказана другим методом. Аналогичное утверждение имеет место и для задачи $\{(1), (3)\}$. В работах [2], [3] при $\lambda = 0$ доказано, что вместо начальных условий (3) можно взять начальные условия вида

$$[B_{\alpha-(1/2)}^t]^k u \Big|_{t=0} = 0, \quad x \geq 0; \quad t^{2\alpha} \frac{\partial}{\partial t} [B_{\alpha-(1/2)}^t]^k u \Big|_{t=0} = \psi_k^*(x), \quad x > 0, \quad k = \overline{0, m-1}, \quad (50)$$

где $\psi_k(x) = \prod_{j=1}^k (1 - (\alpha/j)) \psi_k^*(x)$.

Аналогично можно доказать справедливость следующего утверждения

Лемма 3. *При любом $\alpha < 1/2$ решение задачи $\{(1), (3)\}$ является решением задачи $\{(1), (50)\}$, и наоборот.*

Теперь рассмотрим задачу нахождения решения $u_2(x, t)$ уравнения (1), удовлетворяющего начальным условиям (50).

Лемма 4. *Если $u_1(x, t; 1 - \alpha)$ является решением уравнения $L_{1-\alpha, \lambda}^m(u_1) = 0$, удовлетворяющего условиям (49), в котором α заменяется на $1 - \alpha$, то функция $u_2(x, t; \alpha) = t^{1-2\alpha} u_1(x, t; 1 - \alpha)$ при $0 < \alpha < (1/2)$ будет решением уравнения $L_{\alpha, \lambda}^m(u_2) = 0$, удовлетворяющего условиям*

$$[B_{\alpha-(1/2)}^t]^k u_2 \Big|_{t=0} = 0, \quad x \geq 0; \quad t^{2\alpha} \frac{\partial}{\partial t} [B_{\alpha-(1/2)}^t]^k u_2 \Big|_{t=0} = (1 - 2\alpha) \varphi_k^*(x), \quad x > 0, \quad k = \overline{0, m-1}.$$

Доказательство. Методом математической индукции по m , докажем справедливость следующих равенств

$$L_{\alpha, \lambda}^m(u_2) = L_{\alpha, \lambda}^m(t^{1-2\alpha} u_1) = t^{1-2\alpha} L_{1-\alpha, \lambda}^m(u_1), \quad (51)$$

$$[B_{\alpha-(1/2)}^t]^m u_2 = [B_{\alpha-(1/2)}^t]^m t^{1-2\alpha} u_1 = t^{1-2\alpha} [B_{(1/2)-\alpha}^t]^m u_1. \quad (52)$$

При $m = 1$ справедливость формулы (51) следует из известной формулы соответствий [9, с.577]: $L_{\alpha, \lambda}^m(t^{1-2\alpha} u_1) = t^{1-2\alpha} L_{1-\alpha, \lambda}^m(u_1)$, а формула (52) проверяется непосредственным вычислением

$$\begin{aligned} [B_{\alpha-(1/2)}^t] t^{1-2\alpha} u_1 &= t^{-2\alpha} \frac{\partial}{\partial t} t^{2\alpha} \frac{\partial}{\partial t} t^{1-2\alpha} u_1 = t^{-2\alpha} \frac{\partial}{\partial t} \left[t \frac{\partial u_1}{\partial t} + (1 - 2\alpha) u_1 \right] = \\ &= t^{1-2\alpha} \left[\frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} + \frac{2(1 - \alpha)}{t} \frac{\partial u_1}{\partial t} \right] = t^{1-2\alpha} [B_{(1/2)-\alpha}^t] u_1. \end{aligned}$$

Предположим, что формулы (51) и (52) верны при $m = p$. Докажем их справедливость при $m = p + 1$.

Из равенства $L_{\alpha, \lambda}^{p+1}(t^{1-2\alpha} u_1) = L_{\alpha, \lambda}[L_{\alpha, \lambda}^p(t^{1-2\alpha} u_1)]$ в силу предположения индукции, имеем $L_{\alpha, \lambda}^{p+1}(t^{1-2\alpha} u_1) = L_{\alpha, \lambda}[t^{1-2\alpha} L_{1-\alpha, \lambda}^p(u_1)]$. Далее, применяя формулы соответствий, получим $L_{\alpha, \lambda}^{p+1}(t^{1-2\alpha} u_1) = t^{1-2\alpha} L_{1-\alpha, \lambda}^{p+1}(u_1)$. Из последнего равенства следует справедливость формулы (51). Аналогично доказывается равенство (52).

В равенстве (52) вычислив производную по t , имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} [B_{\alpha-(1/2)}^t]^k u_2 &= \frac{\partial}{\partial t} \{ t^{1-2\alpha} [B_{(1/2)-\alpha}^t]^k u_1 \} = \\ &= (1 - 2\alpha) t^{-2\alpha} [B_{(1/2)-\alpha}^t]^k u_1 + t^{1-2\alpha} \frac{\partial}{\partial t} [B_{(1/2)-\alpha}^t]^k u_1. \end{aligned}$$

Отсюда, в силу условий (50) в котором α заменено на $1 - \alpha$, следует, что

$$t^{2\alpha} \frac{\partial}{\partial t} [B_{\alpha-(1/2)}^t]^k u_2 \Big|_{t=0} = \left[(1 - 2\alpha) [B_{(1/2)-\alpha}^t]^k u_1 + t \frac{\partial}{\partial t} [B_{(1/2)-\alpha}^t]^k u_1 \right]_{t=0} = (1 - 2\alpha) \varphi_k^*(x).$$

Этим завершается доказательство леммы 4. □

Для решения задачи $\{(1), (50)\}$, применяя лемму 4, в силу (47) при нечетном n , имеем

$$u_2(x, t) = \bar{\gamma}_n \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{\frac{n-1}{2}} \int_{|\xi-x|<t} [t^2 - |\xi - x|^2]^{-\alpha} \bar{J}_{-\alpha} \left(\lambda \sqrt{t^2 - |\xi - x|^2} \right) g_0^*(\xi) d\xi +$$

$$+ \bar{\gamma}_n \sum_{k=1}^{m-1} \frac{2^{-2k}}{k!(1-\alpha)_k} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{\frac{n-1}{2}} \int_{|\xi-x|<t} \frac{\bar{J}_{-\alpha+k} \left(\lambda \sqrt{t^2 - |\xi - x|^2} \right)}{[t^2 - |\xi - x|^2]^{\alpha-k}} g_k^*(\xi) d\xi$$

где $g_k^*(s) = \sum_{j=0}^k (-1)^j C_k^j [B_{\alpha-1/2}^x]^j \Psi_{k-j}^*(x)$, $\Psi_k^*(x) = \sum_{j=0}^k a_j C_k^j \lambda^{2(k-j)} \psi_j^*(x)$, $k = \overline{0, m-1}$.

Аналогично, в случае четного n , из (48) имеем

$$u_2(x, t) = \bar{\gamma}_n \sum_{k=0}^{m-1} \frac{2^{-2k}}{k!((3/2)-\alpha)_k} \times$$

$$\times \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{\frac{n}{2}} \int_{|\xi-x|<t} [t^2 - |\xi - x|^2]^{(3/2)-\alpha+k} \bar{J}_{(3/2)-\alpha+k} \left(\lambda \sqrt{t^2 - |\xi - x|^2} \right) g_k^*(\xi) d\xi.$$

В заключении заметим, что данный метод решения поставленной задачи можно применить и в том случае, когда в уравнении (1) оператор Бесселя, действует по нескольким пространственным переменным.

Список литературы

- [1] Н. Н. Боголюбов, А. А. Логунов, А. И. Оксак, И. Т. Тодоров. *Общие принципы квантовой теории поля*. М.: Наука, 1987.
- [2] Л. А. Иванов. *Задача Коши для некоторых операторов с особенностями* // Дифференциальные уравнения. 1982. Т. 18. No 6. С. 1020–1028.
- [3] С. А. Алдашев. *О задаче Коши для операторов, распадающихся на множители с особенностями*. // Дифференциальные уравнения. 1981. Т. 17. No 2. С. 247–255.
- [4] A. Weinstein. *On the wave equation and the equation of Euler - Poisson* // Proc. Fifth Symp. Appl. Math., AMS, 1954 p. 137–147
- [5] Р. Курант. *Уравнения с частными производными*. М.: Мир. 1964. 830 с.
- [6] A. K. Urinov, Sh. T. Karimov. *Solution of the Cauchy Problem for Generalized Euler-Poisson-Darboux Equation by the Method of Fractional Integrals* // В сборнике: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. Сер. "Progress in Partial Differential Equations: Asymptotic Profiles, Regularity an Well-Posedness" 2013. С. 321–337.

- [7] A. Erdelyi. *On fractional integration and its application to the theory of Hankel transforms* // Quart. J. Math. Oxford ser. 1940. Vol. 11, N 44. P. 293–303.
- [8] A. Erdelyi, H. Kober. *Some remarks on Hankel transforms* // Quart. J. Math. Oxford ser. 1940. Vol. II, N 43. P. 212–221.
- [9] С. Г. Самко, А. А. Килбас, О. И. Маричев. *Интегралы и производные дробного порядка и их приложения*. Минск: Наука и техника, 1987. 702 с.
- [10] A. Erdelyi. *Some applications of fractional integration* // Boeing Sci. Res. Labor. Docum. Math. Note N 316, D1-82-0286, 1963. 23 p.
- [11] A. Erdelyi. *An application of fractional integrals* // J. Analyse Math. 1965. Vol 14. P. 113–126.
- [12] I. N. Sneddon. *Mixed Boundary Value Problems in Potential Theory*. North-Holland Publ., Amsterdam (1966).
- [13] I. N. Sneddon. *The use in mathematical analysis of Erdélyi-Kober' operators and of some of their applications*. In: Fractional Calculus and Its Applications, Proc., Publ. as: Lecture Notes in Mathematics 457, Springer-Verlag, New York (1975), P. 37–79.
- [14] V. Kiryakova. *Generalized Fractional Calculus and Applications*. Longman Sci. & Technical and J. Wiley & Sons, Harlow and N. York (1994).
- [15] J. S. Lowndes. *A generalization of the Erdélyi-Kober operators* // Proc. Edinb. Math. Soc. 1970. 17, 2. P. 139–148
- [16] P. Heywood. *Improved boundedness conditions for Lowndes' operators* // Proc. Roy. Soc. Edinburgh, A, 1975. 73,9. P. 291–199
- [17] P. Heywood and P. G. Rooney. *On the boundedness of Lowndes' operators* // J. London Math. Soc. 1975, 10, 2. P. 241–248
- [18] J. S. Lowndes. *An application of some fractional integrals* // Proc. Edinb. Math. Soc. 1979, 20, 1. P. 25–41
- [19] Ш. Т. Каримов. *Новые свойства обобщенного оператора Эрдейи-Кобера и их приложения* // Докл. АН РУз. - 2014. № 5. С. 11–13.
- [20] Ш. Т. Каримов. *О некоторых обобщениях свойств оператора Эрдейи-Кобера и их приложения* // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2017. № 2(18). С. 20–40. DOI: 10.18454/2079-6641-2017-18-2-20-40.
- [21] A. Weinstein. *On a class of partial differential equation of even order* // Ann. Math. Pura. Appl. 1995. 39. P. 245–254
- [22] D. Krahn. *On the iterated wave equation* // Proc. Ser. A, Math. Sciences, Amsterdam 1957. 60, 1. P. 492–505
- [23] С. А. Алдашев. *Задача Коши для одного уравнения $2n$ -го порядка* // Дифференциальные уравнения 1979, 15. 1. P. 2085–2087
- [24] С. А. Гальперин, В. Е. Кондрашов. *Задача Коши для дифференциальных операторов, распадающихся на волновые множители* // Труды Московского мат. общества, 1967. 16. P. 109–136

- [25] L. C. Evans. *Partial Differential Equation*. AMS, 1997. Berkeley.
- [26] Ш. Т. Каримов. *Об одном методе решения задачи Коши для одномерного поливолнового уравнения с сингулярным оператором Бесселя* // Изв. вузов. Матем. 2017. № 8. С. 27–41.
- [27] В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. *Основы математического анализа: В 2-х ч. Часть I: Учеб.: Для вузов. - 7-е изд.* 2005.М.: ФИЗМАТЛИТ

A.K.Urinov, Sh.T.Karimov

Solution of the analogue of the Cauchy problem for the iterated multidimensional Klein-Gordon-Fock equation with the Bessel operator

Abstract. An analogue of the Cauchy problem for the iterated multidimensional Klein-Gordon-Fock equation with a time-dependent Bessel operator is investigated. Applying the generalized Erdélyi-Kober operator of fractional order, the problem posed is reduced to the Cauchy problem for the poly-wave equation. An explicit formula for solving this problem is constructed by the spherical mean method. On the basis of the solution obtained, an integral representation of the solution of the problem is found.

Key Words: Cauchy problem, Klein-Gordon-Fock equation, generalized Erdélyi-Kober operator, Bessel operator.