

Е.А. Севостьянов (Житомирский государственный университет имени Ивана Франко)  
 Є.О. Севостьянов (Житомирський державний університет імені Івана Франка)  
 E.A. Sevost'yanov (Zhytomyr Ivan Franko State University)

О ГРАНИЧНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ ОТОБРАЖЕНИЙ С ВЕТВЛЕНИЕМ  
 НА РИМАНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

ПРО МЕЖОВУ І ГЛОБАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ ВІДОБРАЖЕНЬ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ  
 НА РІМАНОВИХ ПОВЕРХНЯХ

ON BOUNDARY AND GLOBAL BEHAVIOR OF MAPPINGS WITH BRANCHING ON  
 RIEMANNIAN SURFACES

### Аннотация

В статье исследованы негомеоморфные отображения римановых поверхностей класса Соболева. Установлены оценки искажения модуля семейств кривых, а, в качестве следствий, получены результаты о граничном поведении таких отображений между областями римановых поверхностей.

У статті досліджено негомеоморфні відображення рiманових поверхонь класу Соболева. Встановлено оцiнки спотворення модуля сiмей кривих, а, як наслiдок, отримано результати про межову поведiнку таких відображень між областями рiманових поверхонь.

In the present paper, we investigate non-homeomorphic mappings of Riemannian surfaces of Sobolev class. We have obtained some estimates of distortion of moduli of families of curves. As consequence, we have obtained results about the boundary behavior of such mappings between domains on Riemannian surfaces.

## 1 Введение

В недавней работе [1] рассмотрены проблемы граничного поведения одного класса гомеоморфизмов, действующих между областями двух римановых поверхностей. Приведенные здесь исследования базируются на некоторой оценке искажения модуля семейств кривых при гомеоморфизмах. Основная цель настоящей заметки – распространить указанные результаты на отображения с точками ветвления. Как и в [1], основным инструментом исследования является метод модулей.

Всюду далее мы считаем известными определения, связанные с римановыми поверхностями и близкими к ним (см., напр., [1]). Рассматриваемая ниже риманова поверхность  $\mathbb{S}$  будет предполагаться поверхностью *гиперболического типа*, т.е., поверхностью, конформно-эквивалентной единичному кругу  $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$  со «склеенными» точками (см. [2, § 6, разд. 1]). Другими словами, мы рассматриваем те и только

те римановы поверхности, которые являются конформно эквивалентными фактор пространству  $\mathbb{D}/G$ , где  $G$  – некоторая группа дробно-линейных автоморфизмов единичного круга на себя, не имеющая неподвижных точек и действующая разрывно в  $\mathbb{D}$ . Напомним, что каждый элемент  $p_0$  фактор-пространства  $\mathbb{D}/G$  является *орбитой* точки  $z_0 \in \mathbb{D}$ , т.е.,  $p = \{z \in \mathbb{D} : z = g(z_0), g \in G\}$ . В дальнейшем мы отождествляем риманову поверхность  $\mathbb{S}$  с её фактор-представлением  $\mathbb{D}/G$  через некоторую группу  $G$  дробно-линейных отображений  $g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ .

В дальнейшем в единичном круге  $\mathbb{D}$  используется так называемая *гиперболическая метрика*:

$$h(z_1, z_2) = \log \frac{1+t}{1-t}, \quad t = \frac{|z_1 - z_2|}{|1 - z_1 \bar{z}_2|}, \quad (1.1)$$

а также *гиперболические площадь* множества  $S \subset \mathbb{D}$  и длина кривой  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$ , которые задаются, соответственно, соотношениями

$$h(S) = \int_S \frac{4 dm(z)}{(1 - |z|^2)^2}, \quad s_h(\gamma) = \int_\gamma \frac{2 |dz|}{1 - |z|^2}, \quad z = x + iy \quad (1.2)$$

(см. [1, (2.4), (2.5)]). Прямые вычисления нетрудно убедиться, что гиперболические метрика, длина и площадь инвариантны относительно дробно-линейных отображений единичного круга на себя.

**Замечание 1.1.** Следуя [3, §.7.2], гиперболическое расстояние  $h(z_1, z_2)$  в единичном круге  $\mathbb{D}$  может быть эквивалентным образом определено как  $\inf$  гиперболических длин всех кусочно гладких кривых, соединяющих точки  $z_1, z_2$ . Под «гиперболической длиной» кривой  $\gamma$  мы понимаем величину  $s_h(\gamma)$  во втором равенстве в (1.2). Отметим, что указанный  $\inf$  вычисляется и в точности равен правой части в (1.1) (см. [3, теорема 7.2.1, соотношение (7.2.5)]).

Если же мы определим длину  $l(\gamma)$  кривой  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$  равенством

$$l(\gamma) := \sup_\pi \sum_{k=0}^n h(\gamma(t_k), \gamma(t_{k+1})), \quad (1.3)$$

где  $h$  из (1.1), а  $\pi = \{a = t_0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n = b\}$ , то для абсолютно непрерывных кривых мы имеем:  $l(\gamma) = s_h(\gamma)$ . Доказательство этого факта может быть проведено аналогично [4, теорема 1.3], и потому опускается. Далее, для спрямляемой кривой  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$  существует единственное нормальное представление  $\gamma_0 : [0, l(\gamma)] \rightarrow \mathbb{D}$  такое, что  $\gamma_0(s(t)) = \gamma(t)$  при каждом  $t \in [a, b]$ , где  $s(t)$  есть длина кривой  $\gamma$  на участке  $[0, t]$  (см., напр., [5, разд. 7.1] либо [4, разд. 2]). Если кривая лишь локально спрямляема, то  $l(\gamma) = \infty$  и, соответственно,  $\gamma_0 : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{D}$ ,  $\gamma_0(s(t)) = \gamma(t)$  при каждом  $t \in [a, b]$ . Пусть  $\rho : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$  – неотрицательная борелевская функция. Тогда интеграл по (локально спрямляемой) кривой  $\gamma$  от функции  $\rho$  может быть определён равенством

$$\int_\gamma \rho(x) ds_h(x) = \int_0^{l(\gamma)} \rho(\gamma_0(s)) ds. \quad (1.4)$$

Заметим, что интеграл в (1.4) совпадает с интегралом  $\int_{\gamma} \rho(z) \frac{2|dz|}{1-|z|^2} = \int_a^b \frac{2\rho(\gamma(t))|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2} dt$  для абсолютно непрерывных кривых  $\gamma$ , что может быть установлено аналогично доказательству [4, теорема 4.1].

Следует учесть, что нормальное представление  $\gamma_0(s)$  произвольной локально спрямляемой кривой  $\gamma(t)$  тривиальном образом абсолютно непрерывно относительно своего натурального параметра  $s \in [0, l(\gamma)]$ . В частности,

$$\int_0^{l(\gamma)} \rho(\gamma_0(s)) ds = \int_0^{l(\gamma)} \frac{2\rho(\gamma_0(s)) |\gamma_0'(s)|}{1-|\gamma_0(s)|^2} ds.$$

В силу сказанного выше, мы не будем делать различий между длиной кривой (интегралом по ней) в (1.3)–(1.4) и в (1.2), соответственно.

В дальнейшем для точки  $y_0 \in \mathbb{D}$  и числа  $r \geq 0$  определим *гиперболический круг*  $B_h(y_0, r)$  и *гиперболическую окружность*  $S_h(y_0, r)$  посредством равенств

$$B_h(y_0, r) := \{y \in \mathbb{D} : h(y_0, y) < r\}, S_h(y_0, r) := \{y \in \mathbb{D} : h(y_0, y) = r\}. \quad (1.5)$$

Римановы поверхности метризуемы, как показывают следующие рассуждения. Если  $p_1, p_2 \in \mathbb{D}/G$ , полагаем

$$\tilde{h}(p_1, p_2) := \inf_{g_1, g_2 \in G} h(g_1(z_1), g_2(z_2)), \quad (1.6)$$

где  $p_i = G_{z_i} = \{\xi \in \mathbb{D} : \exists g \in G : \xi = g(z_i)\}$ ,  $i = 1, 2$ . В последнем случае множество  $G_{z_i}$  будем называть *орбитой* точки  $z_i$ , а  $p_1$  и  $p_2$  назовём *орбитами* точек  $z_1$  и  $z_2$ , соответственно.

С целью упрощения исследований, введём в рассмотрение так называемое *фундаментальное множество*  $F$ . Определим его как подмножество  $\mathbb{D}$ , содержащее одну и только одну точку орбиты  $z \in G_{z_0}$  (см. [3, § 9.1, гл. 9]). *Фундаментальной областью*  $D_0$  называется область в  $\mathbb{D}$ , обладающая свойством  $D_0 \subset F \subset \overline{D_0}$  такая, что  $h(\partial D_0) = 0$  (см. там же). Существование фундаментальных множеств и фундаментальных областей обосновано наличием их примеров, важнейшим из которых является *многоугольник Дирихле*,

$$D_{\zeta} = \bigcap_{g \in G, g \neq I} H_g(\zeta), \quad (1.7)$$

где  $H_g(\zeta) = \{z \in \mathbb{D} : h(z, \zeta) < h(z, g(\zeta))\}$  (см. [1, соотношение (2.6)]). Пусть  $\pi$  – естественная проекция  $\mathbb{D}$  на  $\mathbb{D}/G$ , тогда  $\pi$  – аналитическая функция, конформная на  $D_0$  (см. также [3, предложение 9.2.2] и комментарии после (2.11) в [1]). Заметим, кроме того, что между точками  $F$  и  $\mathbb{D}/G$ , а значит, и между точками  $F$  и  $\mathbb{S}$ , существует взаимно однозначное соответствие. Для  $z_1, z_2 \in F$  положим

$$d(z_1, z_2) := \tilde{h}(\pi(z_1), \pi(z_2)), \quad (1.8)$$

где  $\tilde{h}$  определено в (1.6). Заметим, что по определению  $d(z_1, z_2) \leq h(z_1, z_2)$ . Покажем, что для любого компакта  $A \subset \mathbb{D}$  найдётся  $\delta = \delta(A) > 0$ :

$$d(z_1, z_2) = h(z_1, z_2), \quad \forall z_1, z_2 \in A : h(z_1, z_2) < \delta. \quad (1.9)$$

Предположим противное. Тогда для произвольного  $k \in \mathbb{N}$  найдутся комплексные числа  $x_k, z_k \in A$  такие, что  $h(z_k, x_k) < 1/k$  и, при этом,  $d(z_k, x_k) < h(z_k, x_k)$ . Тогда по определению метрики  $d$  и инвариантности метрики  $h$  при дробно-линейных отображениях, найдётся  $g_k \in G$  такое, что

$$d(z_k, x_k) \leq h(z_k, g_k(x_k)) < h(z_k, x_k) < 1/k, \quad g_k \in G, \quad k = 1, 2, \dots \quad (1.10)$$

Поскольку  $A$  – компакт в  $\mathbb{D}$ , мы можем считать, что  $x_k, z_k \rightarrow x_0 \in \mathbb{D}$  при  $k \rightarrow \infty$ . Тогда из (1.10) по неравенству треугольника имеем  $h(g_k(x_k), x_0) \leq h(g_k(x_k), z_k) + h(z_k, x_k) \rightarrow 0$ ,  $k \rightarrow \infty$ , и, значит,  $h(x_k, g_k^{-1}(x_0)) \rightarrow 0$ ,  $k \rightarrow \infty$ , поскольку метрика  $h$  инвариантна при дробно-линейном отображении. Но тогда также по неравенству треугольника  $h(g_k^{-1}(x_0), x_0) \leq h(g_k^{-1}(x_0), x_k) + h(x_k, x_0) \rightarrow 0$ ,  $k \rightarrow \infty$ . Последнее противоречит разрывности группы  $G$  в  $\mathbb{D}$ , что и доказывает (1.9).

Из соотношения (1.9) вытекает, что метрическое пространство  $(F, d)$  гомеоморфно  $(\mathbb{D}/G, \tilde{h})$ . Определим элементы длины и объёма на  $(F, d)$  согласно соотношениям (1.2), кроме того, определим также элементы  $ds_{\tilde{h}}$  и  $d\tilde{h}$  длины и площади на поверхности  $\mathbb{S}$ , соответственно, как элементы  $ds_h$  и  $dh$  в соответствующих локальных координатах. Этими локальными координатами могут быть, в частности, фундаментальные области  $D_0$  в  $\mathbb{D}$ . В силу  $d(z_1, z_2) \leq h(z_1, z_2)$  и (1.9) длины кривых в метриках  $h$  и  $d$  области  $D_0$  будут совпадать. Отметим, что расстояния, длины и площади на  $\mathbb{D}/G$  (а значит, и на  $\mathbb{S}$ ) не зависят от локальных координат, поскольку гиперболическая метрика  $h$  в (1.1), а также длина и площадь в (1.2), инвариантны при дробно-линейных отображениях.

Пусть  $D, D_*$  – области на римановых поверхностях  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно. Отображение  $f : D \rightarrow D_*$  будет называться *дискретным*, если прообраз  $f^{-1}(y)$  каждой точки  $y \in D_*$  состоит только из изолированных точек. Отображение  $f : D \rightarrow D_*$  будет называться *открытым*, если образ любого открытого множества  $U \subset D$  является открытым множеством в  $D_*$ . Определение отображений класса Соболева  $W_{\text{loc}}^{1,1}$  на римановой поверхности может быть найдено, напр., в работе [1]. В дальнейшем для отображений  $f : D \rightarrow D_*$  класса  $W_{\text{loc}}^{1,1}$  в локальных координатах  $f_{\bar{z}} = (f_x + if_y)/2$  и  $f_z = (f_x - if_y)/2$ ,  $z = x + iy$ . Кроме того, *норма* и *якобиан* отображения  $f$  в локальных координатах выражаются, соответственно, как  $\|f'(z)\| = |f_z| + |f_{\bar{z}}|$  и  $J_f(z) = |f_z|^2 - |f_{\bar{z}}|^2$ . *Дилатация* отображения  $f$  в точке  $z$  определяется соотношением

$$K_f(z) = \frac{|f_z| + |f_{\bar{z}}|}{|f_z| - |f_{\bar{z}}|} \quad (1.11)$$

при  $J_f(z) \neq 0$ ,  $K_f(z) = 1$  при  $\|f'(z)\| = 0$  и  $K_f(z) = \infty$  в остальных случаях. Путём непосредственных вычислений нетрудно убедиться, что величина  $K_f(z)$  не зависит от локальных координат. Отображение  $f : D \rightarrow D_*$  будет называться *отображением с конечным искажением*, если  $f \in W_{\text{loc}}^{1,1}(D)$  и, кроме того, найдётся почти всюду конечная функция  $K(z)$ , такая что  $\|f'(z)\|^2 \leq K(z) \cdot J_f(z)$  при почти всех  $z \in D$ .

Как обычно, кривая  $\gamma$  на римановой поверхности  $\mathbb{S}$  определяется как непрерывное отображение  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{S}$ , где  $I$  – конечный отрезок, интервал либо полуинтервал числовой прямой. Пусть  $\Gamma$  – семейство кривых в  $\mathbb{S}$ . Борелевская функция  $\rho : \mathbb{S} \rightarrow [0, \infty]$  будет

называться *допустимой* для семейства  $\Gamma$  кривых  $\gamma$ , если  $\int \rho(p) ds_{\tilde{h}}(p) \geq 1$  для всякой кривой  $\gamma \in \Gamma$ . Последнее коротко записывают в виде:  $\rho \in \text{adm } \Gamma$ . *Модулем* семейства  $\Gamma$  называется вещественнозначная функция  $M(\Gamma) := \inf_{\rho \in \text{adm } \Gamma} \int_{\mathbb{S}} \rho^2(p) d\tilde{h}(p)$ .

Пусть  $D$  и  $D_*$  — заданные области, лежащие в римановых поверхностях  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно. Для отображения  $f : D \rightarrow D_*$ , множества  $E \subset D$  и  $y \in D_*$ , определим *функцию кратности*  $N(y, f, E)$  как число прообразов точки  $y$  во множестве  $E$ , т.е.

$$N(y, f, E) = \text{card} \{p \in E : f(p) = y\}, \quad N(f, E) = \sup_{y \in \mathbb{S}_*} N(y, f, E). \quad (1.12)$$

Будем говорить, что измеримая относительно площади  $\tilde{h}$  функция  $\rho : \mathbb{S} \rightarrow [0, \infty]$  *обобщённо допустима* для семейства кривых  $\Gamma$ , сокр.  $\rho \in \text{ext adm } \Gamma$ , если соотношение

$$\int_{\gamma} \rho ds_{\tilde{h}}(p) \geq 1$$

выполнено для всех локально спрямляемых кривых  $\gamma \in \Gamma \setminus \Gamma_0$ , где  $M(\Gamma_0) = 0$ . Следующий класс отображений представляет собой обобщение квазиконформных отображений в смысле кольцевого определения по Герингу (см., напр., [9, глава 9]). Пусть  $D$  и  $D_*$  — заданные области, лежащие в римановых поверхностях  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно,  $Q : D \rightarrow (0, \infty)$  — измеримая функция относительно меры  $\tilde{h}$  на  $\mathbb{S}$ . Будем говорить, что  $f : D \rightarrow D_*$  — *нижнее  $Q$ -отображение в точке  $p_0 \in \overline{D}$* , если найдётся  $\varepsilon_0 = \varepsilon_0(p_0) > 0$ ,  $\varepsilon_0 < d_0 = \sup_{p \in D} \tilde{h}(p, p_0)$ , такое, что

$$M(f(\Sigma_\varepsilon)) \geq \inf_{\rho \in \text{ext adm } \Sigma_\varepsilon} \int_{D \cap \tilde{A}(p_0, \varepsilon, \varepsilon_0)} \frac{\rho^2(p)}{Q(p)} d\tilde{h}(p) \quad (1.13)$$

для каждого кольца  $\tilde{A}(p_0, \varepsilon, \varepsilon_0) = \{p \in \mathbb{S} : \varepsilon < \tilde{h}(p, p_0) < \varepsilon_0\}$ , где  $\Sigma_\varepsilon$  обозначает семейство всех пересечений окружностей  $\tilde{S}(p_0, r) = \{p \in \mathbb{S} : \tilde{h}(p, p_0) = r\}$  с областью  $D$ ,  $r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)$ .

Имеет место следующие утверждения, обобщающие [1, лемма 3.1 и теорема 6.1] на случай отображений с ветвлением.

**Теорема 1.1.** Пусть  $D$  и  $D_*$  — области римановых поверхностей  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно,  $\overline{D}_*$  — компакт в  $\mathbb{S}_*$  и  $p_0 \in \overline{D}$ . Тогда любое открытое дискретное отображение  $f : D \rightarrow D_*$  конечного искажения класса  $W_{\text{loc}}^{1,1}$  такое, что  $N(f, D) < \infty$ , является нижним  $Q$ -отображением в точке  $p_0$  при  $Q(p) = c \cdot N(f, D) \cdot K_f(p)$ , где  $K_f(p)$  определено соотношением (1.11), функция  $N(f, D)$  задана в (1.12), а  $c > 0$  — некоторая постоянная, зависящая только от точки  $p_0$  и области  $D_*$ .

Условимся говорить, что граница  $\partial G$  области  $G$  является *сильно достижимой* в точке  $p_0 \in \partial G$ , если для каждой окрестности  $U$  точки  $p_0$  найдётся компакт  $E \subset G$ , окрестность  $V \subset U$  этой же точки и число  $\delta > 0$  такие, что для любых континуумов  $F$  и  $G$ , пересекающих как  $\partial U$ , так и  $\partial V$ , выполняется неравенство  $M(\Gamma(E, F, G)) \geq \delta$ . Мы также будем говорить, что граница  $\partial G$  является *сильно достижима*, если она является

сильно достижимой в каждой своей точке. Заметим, что для открытого замкнутого отображения  $f : D \rightarrow D_*$  выполнено условие:  $N(f, D) < \infty$  (см. [6, теорема 5.5]).

Борелевская функция  $\rho : \mathbb{D} \rightarrow [0, \infty]$  будет называться *допустимой* для семейства  $\Gamma$  кривых  $\gamma$  в смысле евклидовой длины,  $\rho \in \text{adm}_e \Gamma$ , если  $\int_{\gamma} \rho(z) |dz| \geq 1$  для всякой кривой  $\gamma \in \Gamma$ . *Модулем* семейства  $\Gamma$  в евклидовом смысле называется величина  $M_e(\Gamma) := \inf_{\rho \in \text{adm}_e \Gamma} \int_{\mathbb{D}} \rho^2(z) dm(z)$ . Отображение  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $D \subset \mathbb{C}$ , будем называть *квазиконформным*, если  $f$  – гомеоморфизм и, кроме того, найдётся постоянная  $K \geq 1$  такая, что  $M_e(f(\Gamma)) \leq K \cdot M_e(\Gamma)$  для каждого семейства кривых  $\Gamma$  в  $D$ . Будем говорить, что граница области  $D$  в  $\mathbb{S}$  является *локально квазиконформной*, если каждая точка  $p_0 \in \partial D$  имеет окрестность  $U$  в  $\mathbb{S}$ , которая может быть отображена квазиконформным отображением  $\psi$  на единичный круг  $\mathbb{D} \subset \mathbb{C}$  так, что  $\psi(\partial D \cap U)$  является пересечением  $\mathbb{D}$  с прямой  $x = 0$ , где  $z = x + iy \in \mathbb{D}$ .

**Теорема 1.2.** Пусть  $D$  и  $D_*$  – заданные области, лежащие в римановых поверхностях  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно,  $\overline{D_*}$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ ,  $p_0 \in \partial D$  и  $Q : \mathbb{S} \rightarrow (0, \infty)$  – заданная измеримая относительно меры  $\tilde{h}$  функция,  $Q(p) \equiv 0$  в  $\mathbb{S} \setminus D$ . Пусть также  $f : D \rightarrow D_*$  – открытое дискретное замкнутое отображение конечного искажения класса  $W_{\text{loc}}^{1,1}$  и  $K_f(p) \leq Q(p)$  при почти всех  $p \in D$ ,  $f(D) = D_*$ . Предположим, область  $D$  имеет локально квазиконформную границу, а граница области  $\overline{D_*}$  сильно достижима. Если при некотором  $\varepsilon_0 > 0$  и всех  $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$  выполнены соотношения

$$\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{\|Q\|(t)} < \infty, \quad \int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{\|Q\|(t)} = \infty, \quad (1.14)$$

$\|Q\|(r) = \int_{\tilde{S}(p_0, r)} Q(p) ds_{\tilde{h}}(p)$  –  $L_1$ -норма функции  $Q$  над окружностью  $\tilde{S}(p_0, r)$ , то отображение  $f$  имеет непрерывное продолжение в точку  $p_0$ .

## 2 О нижних $Q$ -отображениях римановых поверхностей

Здесь и далее  $B(z_0, r)$  и  $S(z_0, r)$  обозначают евклидов круг и сферу на плоскости с центром в точке  $z_0 \in \mathbb{C}$  и радиуса  $r \geq 0$ , соответственно. Пусть  $p_0 \in \mathbb{S}$  и  $z_0 \in \mathbb{D}$  таково, что  $\pi(z_0) = p_0$ , где  $\pi$  – естественная проекция  $\mathbb{D}$  на  $\mathbb{D}/G$ . Обозначим через  $D_0$  многоугольник Дирихле с центром в точке  $z_0$ , и положим  $\varphi := \pi^{-1}$ . Заметим, что отображение  $\varphi$  является гомеоморфизмом  $(\mathbb{S}, \tilde{h})$  на  $(F, d)$ , где  $\tilde{h}$  – метрика на поверхности  $\mathbb{S}$ , а  $d$  – вышеопределённая метрика на фундаментальном множестве  $F$ ,  $D_0 \subset F \subset \overline{D_0}$ . Не ограничивая общности, можно также считать, что  $z_0 = 0$ . В самом деле, в противном случае рассмотрим вспомогательное отображение  $g_0(z) = (z - z_0)/(1 - z\bar{z}_0)$ , не имеющее неподвижных точек внутри единичного круга. Тогда, если  $G$  – группа дробно-линейных отображений, соответствующая поверхности  $\mathbb{S}$ , то  $G' = \{g_0 \circ g, g \in G\}$ , очевидно, также соответствует  $\mathbb{S}$  в том смысле, что поверхность  $\mathbb{S}$  снова является конформно эквивалентной фактор-пространству  $\mathbb{D}/G'$ . Выберем компактную окрестность  $V \subset \mathbb{D}$  точки  $0 \in F \subset \mathbb{D}$ , такую что  $d(x, z) = h(x, z)$  при всех  $x, z \in V$ , что возможно ввиду условия (1.9). Кроме того, выберем  $V$  так, чтобы  $V \subset B(0, r_0)$  при некотором  $0 < r_0 < 1$ .

Положим  $U := \pi(V)$ . Окрестность  $U$  в этом случае назовём *нормальной окрестностью точки*  $p_0$ . Заметим, что шару  $\tilde{B}(p_0, r) \subset U$  соответствует в этом случае множество  $B_h(0, r) \subset \mathbb{C}$ , точнее,

$$\begin{aligned} \tilde{B}(p_0, r) &:= \{p \in \mathbb{S} : \tilde{h}(p, p_0) < r\} = \{p \in \mathbb{S} : h(\varphi(p), 0) < r\} = \\ &= \left\{ p \in \mathbb{S} : |\varphi(p)| < \frac{e^r - 1}{e^r + 1} \right\} = \pi \left( B \left( 0, \frac{e^r - 1}{e^r + 1} \right) \right). \end{aligned} \quad (2.1)$$

где  $\varphi$  – указанное выше взаимно однозначное соответствие,  $\varphi : \mathbb{S} \rightarrow F$ , а  $h$  – гиперболическая метрика, см. (1.1). Аналогично,

$$\begin{aligned} \tilde{S}(p_0, r) &:= \{p \in \mathbb{S} : \tilde{h}(p, p_0) = r\} = \\ &= \left\{ p \in \mathbb{S} : |\varphi(p)| = \frac{e^r - 1}{e^r + 1} \right\} = \pi \left( S \left( 0, \frac{e^r - 1}{e^r + 1} \right) \right). \end{aligned} \quad (2.2)$$

Всюду в дальнейшем нормальную окрестность  $U$  точки  $p_0$ , а также отображение  $\varphi$  и фундаментальное множество  $F$  мы будем считать выбранными и фиксированными.

Имеет место следующий аналог теоремы Фубини для римановых поверхностей.

**Лемма 2.1.** Пусть  $U$  – некоторая нормальная окрестность точки  $p_0 \in \mathbb{S}$ ,  $Q : U \rightarrow [0, \infty]$  – измеримая по Лебегу функция,  $d_0 := \text{dist}(p_0, \partial U) := \inf_{p \in \partial U} \tilde{h}(p_0, p)$ . Тогда при каждом  $0 < r_0 \leq d_0$

$$\int_{\tilde{B}(p_0, r_0)} Q(p) d\tilde{h}(p) = \int_0^{r_0} \int_{\tilde{S}(p_0, r)} Q(p) ds_{\tilde{h}}(p) dr, \quad (2.3)$$

где  $d\tilde{h}(p)$  и  $ds_{\tilde{h}}$  – элементы гиперболической площади и длины на  $\mathbb{S}$ , соответственно, см. (1.2), а круг  $\tilde{B}(p_0, r_0)$  и окружность  $\tilde{S}(p_0, r)$  определены в (2.1) и (2.2).

Утверждение леммы 2.1 включает в себя измеримость по  $r$  внутренней функции  $\psi(r) := \int_{\tilde{S}(p_0, r)} Q(p) ds_{\tilde{h}}(p)$  в правой части интеграла в (2.3).

*Доказательство.* Согласно определению нормальной окрестности, шару  $\tilde{B}(p_0, r_0) \subset \mathbb{S}$  соответствует шар  $B_h(0, r_0) \subset F$  в гиперболической метрике  $h$ . Учитывая соотношение (2.1),  $B_h(0, r_0) = B \left( 0, \frac{e^{r_0} - 1}{e^{r_0} + 1} \right)$ . По определению

$$\int_{\tilde{B}(p_0, r_0)} Q(p) d\tilde{h}(p) = 4 \int_{B \left( 0, \frac{e^{r_0} - 1}{e^{r_0} + 1} \right)} \frac{Q(\varphi^{-1}(z))}{(1 - |z|^2)^2} dm(z). \quad (2.4)$$

Воспользуемся классической теоремой Фубини на плоскости (см., напр., [7, теорема 2.6.2] либо [8, теорема 8.1.III]). Используя полярные координаты и применяя эту теорему, будем иметь, что

$$4 \int_0^{\frac{e^{r_0} - 1}{e^{r_0} + 1}} \int_{S(0, r)} \frac{Q(\varphi^{-1}(z))}{(1 - |z|^2)^2} |dz| dr = 2 \int_0^{\frac{e^{r_0} - 1}{e^{r_0} + 1}} \frac{1}{1 - r^2} \int_{S(0, r)} \frac{2 Q(\varphi^{-1}(z))}{1 - |z|^2} |dz| dr. \quad (2.5)$$

В последнем соотношении учтено, что функция  $\int_{S(0,r)} \frac{2Q(\varphi^{-1}(z))}{1-|z|^2} |dz|$  измерима по  $r$  (что также является частью утверждения классической теоремы Фубини). Сделаем в последнем интеграле замену  $t = \log \frac{1+r}{1-r}$  в соответствии с [7, теорема 3.2.6]. Поскольку  $dt = \frac{2dr}{1-r^2}$ , мы получим:

$$\begin{aligned} 2 \int_0^{\frac{e^{r_0}-1}{e^{r_0}+1}} \frac{1}{1-r^2} \int_{S(0,r)} \frac{2Q(\varphi^{-1}(z))}{1-|z|^2} |dz| dr &= \int_0^{r_0} \int_{S(0, \frac{e^r-1}{e^r+1})} \frac{2Q(\varphi^{-1}(z))}{1-|z|^2} |dz| dr = \\ &= \int_0^{r_0} \int_{S_h(0,r)} Q(\varphi^{-1}(z)) ds_h(z) dr = \int_0^{r_0} \int_{\tilde{S}(p_0,r)} Q(p) ds_{\tilde{h}}(p) dr = \psi(r). \end{aligned} \quad (2.6)$$

В частности, [7, теорема 3.2.6] включает в себя утверждение об измеримости функции  $\psi(r)$  по  $r$ . Объединяя теперь между собой (2.4), (2.5) и (2.6), получаем:

$$\int_{\tilde{B}(p_0, r_0)} Q(p) d\tilde{h}(p) = \int_0^{r_0} \int_{\tilde{S}(p_0, r)} Q(p) ds_{\tilde{h}}(p) dr,$$

что и требовалось установить.  $\square$

Прежде, чем непосредственно переходить к изучению отображений на римановых поверхностях (в том числе, нижних  $Q$ -отображений), мы установим следующее утверждение, связывающее понятие «почти всех» относительно модуля семейств кривых и лебеговском смысле (см. также [10, лемма 4.1] в случае римановых многообразий).

**Лемма 2.2.** Пусть  $D$  — область римановой поверхности  $\mathbb{S}$ ,  $p_0 \in \overline{D}$  и  $U$  — некоторая нормальная окрестность точки  $p_0$ . Если некоторое свойство  $P$  имеет место для почти всех окружностей  $D(p_0, r) := \tilde{S}(p_0, r) \cap D$ , лежащих в  $U$ , где «почти всех» понимается в смысле модуля семейств кривых и, кроме того, множество

$$E = \{r \in \mathbb{R} \mid P \text{ имеет место для } \tilde{S}(p_0, r) \cap D\}$$

измеримо по Лебегу, то  $P$  также имеет место для почти всех окружностей  $D(p_0, r)$ , лежащих в  $U$  относительно линейной меры Лебега по параметру  $r \in \mathbb{R}$ . Обратно, пусть  $P$  имеет место для почти всех окружностей  $D(p_0, r) := \tilde{S}(p_0, r) \cap D$  относительно линейной меры Лебега по  $r \in \mathbb{R}$ , тогда  $P$  также имеет место для почти всех окружностей  $D(p_0, r) := \tilde{S}(p_0, r) \cap D$  в смысле модуля.

*Доказательство. Необходимость.* Пусть некоторое свойство  $P$  имеет место для почти всех окружностей  $D(p_0, r) := \tilde{S}(p_0, r) \cap D$ , где «почти всех» понимается в смысле модуля семейств кривых. Покажем, что  $P$  также имеет место для почти всех окружностей  $D(p_0, r)$  по отношению к параметру  $r \in \mathbb{R}$ . Прежде всего, заметим, что по определению нормальной окрестности  $\tilde{h}(U) < \infty$ .

Предположим, что заключение леммы не является верным. Тогда найдётся семейство  $\Gamma$  окружностей  $D(p_0, r) = \{p \in D : \tilde{h}(p, p_0) = r\}$ , лежащих в некоторой нормальной окрестности  $U$  точки  $p_0$ , для которого свойство  $P$  выполнено в смысле почти всех



кривых относительно модуля, однако, нарушается для некоторого множества индексов  $r \in \mathbb{R}$  положительной меры. Пусть  $\varphi$  – отображение из  $\mathbb{S}$  в  $F \subset \mathbb{D}$ , соответствующее определению нормальной окрестности  $U \subset \mathbb{S}$  точки  $p_0$ . Поскольку по определению окрестности  $U$  найдётся  $R > 0$  такое, что  $U \subset \tilde{B}(p_0, R)$  и  $\overline{\tilde{B}(p_0, R)}$  – компакт в  $\mathbb{S}$ , то  $\tilde{h}(U) \leq \tilde{h}(\overline{\tilde{B}(p_0, R)}) < \infty$ .

В дальнейшем мы условимся называть множество  $B \subset \mathbb{S}$  борелевым (измеримым), если  $\varphi(B)$  борелево (измеримо) в  $\mathbb{D}$ . Ввиду регулярности меры Лебега  $m_1$  найдётся борелевское множество  $B \subset \mathbb{R}$ , такое что  $m_1(B) > 0$  и свойство  $P$  нарушается для почти всех  $r \in B$ . Пусть  $\rho: \mathbb{S} \rightarrow [0, \infty]$  – допустимая функция для семейства  $\Gamma$ . Заметим, что множество  $E = \{p \in \tilde{B}(p_0, R) \mid \exists r \in B \cap [0, R] : \tilde{h}(p, p_0) = r\}$  является борелевым на  $\mathbb{S}$ , поскольку  $\varphi(E) = \{y \in B(0, \frac{e^R-1}{e^{R+1}}) : \exists r \in \varphi(B) \cap [0, \frac{e^R-1}{e^{R+1}}] : |y| = r\}$ , и  $\varphi(E)$  измеримо по Борелю ввиду [7, теорема 2.6.2].

Учитывая, что  $B$  – борелево, мы можем считать, что  $\rho \equiv 0$  вне множества  $E$ , поскольку в этом случае  $\rho$  сохранит свойство быть борелевой функцией. По неравенству Гёльдера

$$\int_E \rho(p) d\tilde{h}(p) \leq \left( \int_E \rho^2(p) d\tilde{h}(p) \right)^{1/2} \left( \int_E d\tilde{h}(p) \right)^{1/2}$$

и следовательно, по лемме 2.1,

$$\int_{\mathbb{S}} \rho^2(p) d\tilde{h}(p) \geq \frac{\left( \int_E \rho(p) d\tilde{h}(p) \right)^2}{\left( \int_E d\tilde{h}(p) \right)} \geq \frac{(m_1(B))^2}{c}$$

для некоторого  $c > 0$ , т.е.,  $M(\Gamma) > 0$ , что противоречит предположению леммы. Первая часть леммы 2.2 доказана.

*Достаточность.* Пусть  $P$  имеет место для почти всех  $r$  относительно меры Лебега и всех соответствующих этим  $r$  окружностей  $D(p_0, r)$ ,  $r \in \mathbb{R}$ . Покажем, что  $P$  также выполняется для почти всех окружностей  $D(p_0, r) := S(p_0, r) \cap D$  в смысле модуля семейств кривых.

Обозначим через  $\Gamma_0$  семейство всех пересечений  $D_r := D(p_0, r)$  окружностей  $S(p_0, r)$  с областью  $D$ , для которых  $P$  не имеет места. Пусть  $R$  обозначает множество всех  $r \in \mathbb{R}$  таких, что  $D_r \in \Gamma_0$ . Если  $m_1(R) = 0$ , то по лемме 2.1  $\tilde{h}(E) = 0$ , где  $E = \{p \in D \mid \tilde{h}(p, p_0) = r \in R\}$ . Рассмотрим функцию  $\rho_1: \mathbb{S} \rightarrow [0, \infty]$ , равную  $\infty$  при  $p \in E$ , и имеющую значение 0 во всех остальных точках. Отметим, что найдётся борелева функция  $\rho_2: \mathbb{S} \rightarrow [0, \infty]$ , совпадающая почти всюду с  $\rho_1$  (см. [7, раздел 2.3.5]). Таким образом,  $M(\Gamma_0) \leq \int_E \rho_2^2(p) d\tilde{h}(p) = \int_E \rho_1^2(p) d\tilde{h}(p) = 0$ , следовательно,  $M(\Gamma_0) = 0$ . Лемма 2.2 полностью доказана.  $\square$

Следующее утверждение установлено в [9, лемма 9.2].

**Предложение 2.1.** Пусть  $(X, \mu)$  – измеримое пространство с конечной мерой  $\mu$ ,

$q \in (1, \infty)$ , и пусть  $\varphi: X \rightarrow (0, \infty)$  — измеримая функция. Полагаем

$$I(\varphi, q) = \inf_{\alpha} \int_X \varphi \alpha^q d\mu, \quad (2.7)$$

где инфимум берется по всем измеримым функциям  $\alpha: X \rightarrow [0, \infty]$  таким, что  $\int_X \alpha d\mu = 1$ .

1. Тогда  $I(\varphi, q) = \left[ \int_X \varphi^{-\lambda} d\mu \right]^{-\frac{1}{\lambda}}$ , где  $\lambda = \frac{q'}{q}$ ,  $\frac{1}{q} + \frac{1}{q'} = 1$ , т.е.  $\lambda = 1/(q-1) \in (0, \infty)$ .

Точная нижняя грань в (2.7) достигается на функции  $\rho = \left( \int_X \varphi^{\frac{1}{1-\alpha}} d\mu \right)^{-1} \varphi^{\frac{1}{1-\alpha}}$ .

Во многих случаях требуется проверить свойство (1.13), избегая проверки бесконечной серии неравенств. Такую возможность даёт следующее утверждение (см. также [9, теорема 9.2] и [10, лемма 4.2]).

**Лемма 2.3.** Пусть  $D$  и  $D_*$  — заданные области в  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно,  $p_0 \in \overline{D}$  и  $Q: D \rightarrow (0, \infty)$  — заданная измеримая функция. Тогда отображение  $f: D \rightarrow D_*$  является нижним  $Q$ -отображением в точке  $p_0$  тогда и только тогда, когда найдётся  $0 < d_0 < \sup_{p \in D} \tilde{h}(p, p_0)$  такое, что

$$M(f(\Sigma_\varepsilon)) \geq \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dr}{\|Q\|(r)} \quad \forall \varepsilon \in (0, \varepsilon_0), \quad \varepsilon_0 \in (0, d_0), \quad (2.8)$$

где, как и выше,  $\Sigma_\varepsilon$  обозначает семейство всех пересечений окружностей  $\tilde{S}(p_0, r)$  с областью  $D$ ,  $r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)$ ,

$$\|Q\|(r) = \int_{D(p_0, r)} Q(p) ds_{\tilde{h}}(p)$$

—  $L_1$ -норма функции  $Q$  над пересечением  $D \cap \tilde{S}(p_0, r) = D(p_0, r) = \{p \in D : \tilde{h}(p, p_0) = r\}$ .

*Доказательство.* Не ограничивая общности, можно считать, что число  $d_0$  из условия леммы таково, что  $\overline{B}(p_0, d_0) \subset U$ , где  $U$  — некоторая нормальная окрестность точки  $p_0$ . Для удобства положим

$$P(p) = P(Q, \rho, p) := \frac{\rho^2(p)}{Q(p)}, \quad \psi(r) := \inf_{\alpha \in I(r)} \int_{D(p_0, r)} \frac{\alpha^2(p)}{Q(p)} ds_{\tilde{h}}(p),$$

где  $I(r)$  обозначает множество всех измеримых функций  $\alpha$  на сфере  $D(p_0, r) = \tilde{S}(p_0, r) \cap D$ , таких что  $\int_{D(p_0, r)} \alpha(p) ds_{\tilde{h}}(p) = 1$ . Мы можем также считать, что  $\|Q\|(r) < \infty$  при почти

всех  $r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)$ , поскольку в противном случае утверждение леммы очевидно. Зафиксируем  $\rho \in \text{ext adm } \Sigma_\varepsilon$ , и положим  $A_\rho(r) := \int_{D(p_0, r)} \rho(p) ds_{\tilde{h}}(p)$  и заметим, что  $A_\rho(r)$  —

измеримая по Лебегу функция относительно параметра  $r$  ввиду леммы 2.1. Следовательно, множество  $E \subset \mathbb{R}$  всех таких  $r > 0$ , для которых  $A_\rho(r) = \int_{D(p_0, r)} \rho(p) ds_{\tilde{h}}(p) \neq 0$ ,

измеримо по Лебегу и, значит, по лемме 2.2  $A_\rho(r) = \int_{D(p_0,r)} \rho(p) ds_{\tilde{h}}(p) \neq 0$  при почти всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$ . Пусть  $A_{\Sigma_\varepsilon}$  обозначает класс всех измеримых по Лебегу функций  $\rho: \mathbb{S} \rightarrow \overline{\mathbb{R}^+}$ , удовлетворяющих условию  $\int_{D(p_0,r)} \rho ds_{\tilde{h}}(p) = 1$  для почти всех  $r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)$ . Для удобства обозначим  $D_\varepsilon := D \cap \tilde{A}(p_0, \varepsilon, \varepsilon_0)$ . Поскольку  $A_{\Sigma_\varepsilon} \subset \text{ext adm } \Sigma_\varepsilon$ , мы получим, что

$$\inf_{\rho \in \text{ext adm } \Sigma_\varepsilon} \int_{D_\varepsilon} P(p) d\tilde{h}(p) \leq \inf_{\rho \in A_{\Sigma_\varepsilon}} \int_{D_\varepsilon} P(p) d\tilde{h}(p). \quad (2.9)$$

С другой стороны, для заданной функции  $\rho \in \text{ext adm } \Sigma_\varepsilon$  положим  $\beta_0(p) := \rho(p) \cdot \left( \int_{D(p_0,r)} \rho(p) ds_{\tilde{h}}(p) \right)^{-1}$ . Тогда  $\rho \in A_{\Sigma_\varepsilon}$ , и ввиду леммы 2.1 получим, что

$$\begin{aligned} & \inf_{\beta \in A_{\Sigma_\varepsilon}} \int_{D_\varepsilon} \beta^2(p) Q^{-1}(p) d\tilde{h}(p) \leq \\ & \leq \int_{D_\varepsilon} \beta_0^2(p) Q^{-1}(p) d\tilde{h}(p) = \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} (A_\rho(r))^{-2} \int_{D(p_0,r)} P(p) ds_{\tilde{h}}(p) dr \leq \\ & \leq \int_{D_\varepsilon} P(p) d\tilde{h}(p), \quad (2.10) \end{aligned}$$

поскольку  $A_\rho(r) \geq 1$  для почти всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$  ввиду леммы 2.2. (Здесь был использован тот факт, что точная нижняя грань любой величины не превосходит любого её фиксированного значения). Из (2.9) и (2.10) мы будем иметь, что

$$\inf_{\rho \in A_{\Sigma_\varepsilon}} \int_{D_\varepsilon} P(p) d\tilde{h}(p) = \inf_{\rho \in \text{ext adm } \Sigma_\varepsilon} \int_{D_\varepsilon} P(p) d\tilde{h}(p). \quad (2.11)$$

Покажем теперь, что

$$\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(r) dr = \inf_{\rho \in A_{\Sigma_\varepsilon}} \int_{D_\varepsilon} P(p) d\tilde{h}(p). \quad (2.12)$$

Прежде всего, ввиду предложения 2.1 мы будем иметь, что

$$\psi(r) = (\|Q\|(r))^{-1} = \left( \int_{D(p_0,r)} Q(p) ds_{\tilde{h}}(p) \right)^{-1}. \quad (2.13)$$

По лемме 2.1 функция  $\psi(r)$  измерима по  $r$ , так что интеграл в левой части (2.12) определён корректно. Пусть  $\rho \in A_{\Sigma_\varepsilon}$ , тогда функция  $\rho_r(p) := \rho|_{\tilde{S}(p_0,r)}$  измерима по отношению к линейной мере  $s_{\tilde{h}}$  для п.в.  $r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)$  ввиду леммы 2.1. Следовательно, по определению точней нижней грани и ввиду (2.13)  $\int_{D_\varepsilon} P(p) d\tilde{h}(p) = \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \int_{D(p_0,r)} \rho_r^2(p) Q^{-1}(p) ds_{\tilde{h}}(p) dr \geq$

$\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(r) dr$ , откуда, переходя к  $\inf$  по всем  $\rho \in A_{\Sigma_\varepsilon}$ , получаем:

$$\inf_{\rho \in A_{\Sigma_\varepsilon}} \int_{D_\varepsilon} P(p) d\tilde{h}(p) \geq \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(r) dr. \quad (2.14)$$

Докажем теперь верхнее неравенство в (2.12). Ввиду предложения 2.1 точная нижняя грань выражения  $\psi(\alpha, r) = \int_{D(p_0, r)} \alpha^2(p) Q^{-1}(p) ds_{\tilde{h}}(p)$  по всем  $\alpha \in I(r)$  достигается на

функции  $\alpha_0(p) := Q(p) \left( \int_{D(p_0, r)} Q(p) ds_{\tilde{h}}(p) \right)^{-1}$ . Заметим, что  $\alpha_0 \in A_{\Sigma_\varepsilon}$ , поскольку по предположению  $\|Q\|(r) < \infty$  при почти всех  $r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)$ . Значит,

$$\inf_{\rho \in A_{\Sigma_\varepsilon}} \int_{D_\varepsilon} P(p) d\tilde{h}(p) \leq \int_{D_\varepsilon} \alpha_0^2(p) Q^{-1}(p) d\tilde{h}(p) = \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(r) dr. \quad (2.15)$$

Из (2.14) и (2.15) следует равенство (2.12). Таким образом, из (2.13) и (2.12) вытекает, что

$$\inf_{\rho \in \text{ext adm } \Sigma_\varepsilon} \int_{D_\varepsilon} P(p) d\tilde{h}(p) = \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} (\|Q\|(r))^{-1} dr. \quad (2.16)$$

Желанное утверждение вытекает теперь прямо из (2.16).  $\square$

### 3 Об одной оценке искажения модуля семейств кривых в классах Соболева

Пусть  $D$  и  $D_*$  — заданные области, лежащие в римановых поверхностях  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно. Как и выше, через  $\tilde{h}$  обозначим метрику на римановой поверхности  $\mathbb{S}$ , а через  $\tilde{h}_*$  — на римановой поверхности  $\mathbb{S}_*$ . Элементы длины и объёма обозначаются на этих поверхностях, соответственно,  $ds_{\tilde{h}}$ ,  $d\tilde{h}$  и  $ds_{\tilde{h}_*}$ ,  $d\tilde{h}_*$ . Будем говорить, что множество  $A \subset \mathbb{S}$  имеет *лебегову меру нуль*, если  $A$  можно покрыть не более чем счётным числом окрестностей  $U_k \subset \mathbb{S}$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , таких, что  $\varphi_k(U_k) \rightarrow \mathbb{D}$ , где  $\varphi_k$  — некоторые гомеоморфизмы, связанные между собой конформным преобразованием, при этом,  $m(\varphi_k(U_k \cap A)) = 0$  при всех  $k = 1, 2, \dots$ ,  $m$  — мера Лебега в  $\mathbb{C}$ . Справедливы следующие утверждения.

**Предложение 3.1.** Пусть  $D$  и  $D_*$  — заданные области, лежащие в римановых поверхностях  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно, и пусть множество  $B_0 \subset D$  имеет нулевую лебегову меру. Пусть  $p_0 \in \overline{D}$ ,  $U$  — нормальная окрестность точки  $p_0$  и  $0 < \varepsilon_0 < \text{dist}(p_0, \partial U)$ . Тогда для почти всех окружностей  $S_r := \tilde{S}(p_0, r)$  с центром в точке  $p_0 \in \overline{D}$

$$\mathcal{H}^1(\varphi(B_0 \cap S_r)) = 0, \quad (3.1)$$

где  $\varphi$  — гомеоморфизм  $U$  в  $\mathbb{D}$ , соответствующий определению нормальной окрестности  $U$ ,  $\mathcal{H}^1$  — 1-мерная хаусдорфова мера в  $\mathbb{C}$ , а «почти всех» следует понимать относительно параметра  $r \in (0, \varepsilon_0)$ .

*Доказательство.* В самом деле, ввиду регулярности лебеговой меры найдутся борелево множество  $B \subset \mathbb{S}$  такое, что  $\varphi(B_0) \subset \varphi(B)$  и  $m(\varphi(B_0)) = m(\varphi(B)) = 0$ , где  $m$  – как обычно, мера Лебега в  $\mathbb{C}$ . Пусть  $g$  – характеристическая функция множества  $\varphi(B)$ . Согласно [7, теорема 3.2.5] при  $m = 1$ , будем иметь:

$$\int_{\gamma} g(z)|dz| = \mathcal{H}^1(\varphi(B \cap |\gamma|)), \quad (3.2)$$

где  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  – произвольная локально спрямляемая кривая,  $|\gamma|$  – носитель кривой  $\gamma$  в  $\mathbb{C}$ , а  $|dz|$  – элемент евклидовой длины. Рассуждая аналогично доказательству [4, теорема 33.1], положим

$$\rho(p) = \begin{cases} \infty, & p \in B, \\ 0, & p \notin B. \end{cases}$$

Заметим, что  $\rho$  – борелева функция. Пусть  $\Gamma$  – семейство всех окружностей  $S_r := \tilde{S}(p_0, r)$  с центром в точке  $p_0 \in \overline{D}$ , для которых  $\mathcal{H}^1(\varphi(B \cap S_r)) > 0$ . Ввиду (3.2) для каждой  $S_r \in \Gamma$  имеем:

$$\begin{aligned} \int_{S_r} \rho(p) ds_{\tilde{\gamma}}(p) &= \int_{S_h(0, r)} \rho(\varphi^{-1}(y)) ds_h(y) = 2 \int_{s(0, \frac{e^r-1}{e^r+1})} \frac{\rho(\varphi^{-1}(y))}{1-|y|^2} |dy| = \\ &= 2 \int_{s(0, \frac{e^r-1}{e^r+1})} \frac{g(y)\rho(\varphi^{-1}(y))}{1-|y|^2} |dy| = \infty. \end{aligned}$$

Тогда  $\rho \in \text{adm } \Gamma$ . Таким образом,  $M(\Gamma) \leq \int_{\mathbb{S}} \rho^2(p) d\tilde{h}(p) = 0$ . Пусть  $\Gamma^*$  состоит из всех сфер  $S_r := \tilde{S}(p_0, r)$  с центром в точке  $p_0 \in \overline{D}$ , для которых выполнено  $\mathcal{H}^1(\varphi(B_0 \cap S_r)) = 0$ . Заметим, что  $\Gamma^* \subset \Gamma$ , откуда  $M(\Gamma^*) = 0$ . Наконец, заметим, что функция  $\psi(r) := \mathcal{H}^1(\varphi(B_0 \cap S_r))$  измерима по Лебегу по классической теореме Фубини, так что (3.1) верно при почти всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$  ввиду леммы 2.2.  $\square$

Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{S}$  – (локально спрямляемая) кривая на римановой поверхности  $\mathbb{S}$ , тогда определим функцию  $l_{\gamma}(t)$  как длину кривой  $\gamma|_{[a, t]}$ ,  $a \leq t \leq b$  (где «длина» понимается в смысле римановой поверхности). Пусть теперь  $B \subset \mathbb{S}$  – произвольное множество, тогда положим

$$l_{\gamma}(B) = \text{mes}_1 \{s \in [0, l(\gamma)] : \gamma(s) \in B\}, \quad (3.3)$$

где, как обычно,  $\text{mes}_1$  обозначает линейную меру Лебега в  $\mathbb{R}$ , а  $l(\gamma)$  обозначает длину  $\gamma$ . Аналогично можно определить величину  $l_{\gamma}(B)$  для штриховой линии  $\gamma$ , т.е., когда  $\gamma : \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i) \rightarrow \mathbb{S}$ , где  $a_i < b_i$  при всех  $i \in \mathbb{N}$  и  $(a_i, b_i) \cap (a_j, b_j) = \emptyset$  при всех  $i \neq j$ .

**Предложение 3.2.** Пусть  $D$  и  $D_*$  – заданные области, лежащие в римановых поверхностях  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно, и пусть  $f : D \rightarrow D_*$  – отображение класса  $W_{\text{loc}}^{1,1}$ . Пусть  $p_0 \in \overline{D}$ ,  $U$  – нормальная окрестность точки  $p_0$  и  $0 < \varepsilon_0 < \text{dist}(p_0, \partial U)$ , и пусть

множество  $B_0 \subset D$  имеет нулевую лебегову меру. Тогда для почти всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$  в локальных координатах  $\mathcal{H}^1(f(B_0 \cap \widetilde{S}(p_0, r))) = 0$  и, кроме того,

$$l_{f(\widetilde{S}(p_0, r) \cap D)}(f(B_0)) = 0, \quad (3.4)$$

где функция  $l$  определена в (3.3).

*Доказательство.* Ввиду непрерывности отображения  $f$  можно покрыть область  $f(U)$  не более, чем счётным числом окрестностей  $V_k$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , таким, что  $V_k$  конформно гомеоморфно некоторой окрестности  $W_k \subset \mathbb{D}$ ,  $\overline{W_k}$  – компакт в  $\mathbb{D}$  и, при этом,  $f^{-1}(V_k) = U_k \subset U$ , где  $U_k$  – открытое множество. Можно также считать, что в  $V_k$  длина и площадь вычисляются через гиперболическую длину и гиперболическую площадь в  $W_k$ . В силу сказанного, не ограничивая общности, можно считать, что  $f(U)$  конформно гомеоморфно множеству  $W \subset \mathbb{D}$ , замыкание которого является компактом в  $\mathbb{D}$ . Пусть указанная конформная гомеоморфность осуществляется при помощи отображения  $\psi : f(U) \rightarrow W$ .

Пусть  $\varphi$  – гомеоморфизм  $U$  в  $\mathbb{D}$ , соответствующий определению нормальной окрестности  $U$ , и пусть  $\varphi(U) \subset B(0, r_0)$ , где  $\overline{B(0, r_0)}$  – компакт в  $\mathbb{D}$ . Рассмотрим разбиение множества  $B(0, r_0)$  на счётное число попарно непересекающихся кольцевых сегментов

$$A_m = \{z \in \mathbb{C} : z = Re^{i\alpha}, R \in (r_{m-1}, r_m], \alpha \in (\psi_{m-1}, \psi_m]\}, m = 1, 2, \dots \quad (3.5)$$

Пусть  $h_m$  – вспомогательная квазиизометрия, отображающая  $A_m$  на прямоугольник  $\widetilde{A}_m$  такой, что дуги окружностей с центром в нуле отображаются на отрезки прямых. Точнее, положим  $h_m(\omega) = \log \omega$ ,  $\omega \in A_m$ . Тогда при каждом  $m \in \mathbb{N}$  рассмотрим отображение

$$g_m := \psi \circ f \circ \varphi^{-1} \circ h_m^{-1}, \quad g_m : \widetilde{A}_m \rightarrow \mathbb{C}.$$

Заметим, что  $g_m \in W_{\text{loc}}^{1,1}(\widetilde{A}_m)$  (см. [11, разд. 1.1.7]), откуда, в частности  $g_m \in ACL$  (см. [11, теоремы 1 и 2, п. 1.1.3, § 1.1, гл. I]).

Положим, как и прежде,  $S_r := \widetilde{S}(p_0, r)$ . По предложению 3.1 и ввиду гладкости отображения  $h_m$ , получим

$$\mathcal{H}^1(\varphi(B_0 \cap S_r) \cap A_m) = \mathcal{H}^1(h_m(\varphi(B_0 \cap S_r) \cap A_m)) = 0$$

для всех  $r \in [0, \varepsilon_0] \setminus A_0$ , где  $\text{mes}_1 A_0 = 0$ . Положим  $D_r := D \cap S_r$ , тогда также

$$\mathcal{H}^1(\psi(f(B_0 \cap D_r \cap \varphi^{-1}(A_m)))) = \mathcal{H}^1(g_m(h_m(\varphi(B_0 \cap D_r) \cap A_m))) = 0, \quad r \in [0, \varepsilon_0] \setminus A_0, \quad (3.6)$$

поскольку абсолютная непрерывность отображения  $g_m$  на фиксированном отрезке влечёт  $N$ -свойство относительно линейной меры Лебега (см. [7, разд. 2.10.13]). Заметим, что  $U \subset \bigcup_{m=1}^{\infty} \varphi^{-1}(A_m)$ , так что из (3.6), ввиду счётной полуаддитивности меры Хаусдорфа,

$$\mathcal{H}^1(\psi(f(B_0 \cap D_r))) = 0, \quad r \in [0, \varepsilon_0] \setminus A_0. \quad (3.7)$$

Пусть  $\psi_i(f(D_r))$  – произвольная дуга штриховой линии  $\psi(f(D_r))$ . Тогда параметризуем  $\psi_i(f(D_r))$  в виде  $\gamma_i : [0, b_i] \rightarrow \mathbb{D}$ ,  $\gamma_i = \gamma_i(s)$ , где  $s$  – натуральный параметр на  $\gamma_i$  в смысле

евклидовой длины. Полагая  $m = 1$  в [7, теорема 3.2.5], мы получим ввиду (3.7), что множество  $B := \{s \in [0, b_i] : \gamma_i(s) \in \psi(f(B_0))\}$  имеет линейную меру нуль. Пусть  $\chi_{\psi(f(B_0))}(z)$  – характеристическая функция множества  $\psi(f(B_0))$ . Учитывая замечание 1.1, мы получим:

$$l_{f(\tilde{S}(p_0, r) \cap D)}(f(B_0)) = \sum_{i=1}^{\infty} 2 \int_0^{b_i} \frac{\chi_{\psi(f(B_0))}(\gamma_i(s)) ds}{1 - |\gamma_i(s)|^2} = 0$$

для почти всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$ , что и требовалось установить.  $\square$

**Предложение 3.3.** Пусть  $D$  и  $D_*$  – заданные области, лежащие в римановых поверхностях  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно, и пусть  $f : D \rightarrow D_*$  – открытое дискретное отображение класса  $W_{\text{loc}}^{1,1}$  с конечным искажением. Пусть  $p_0 \in \overline{D}$ ,  $U$  – нормальная окрестность точки  $p_0$  и  $0 < \varepsilon_0 < \text{dist}(p_0, \partial U)$ , и пусть множество  $B_* \subset D$  – множество таких точек области  $D$ , в которых отображение  $f$  дифференцируемо (в локальных координатах), однако,  $J_f(p) = 0$ . Тогда для всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$

$$l_{f(\tilde{S}(p_0, r) \cap D)}(f(B_*)) = 0, \quad (3.8)$$

где функция  $l$  определена в (3.3).

*Доказательство.* Заметим, что  $f$  дифференцируемо почти всюду в  $D$  локальных координатах (см. замечания, сделанные во введении в [1]). В частности, множество  $U$  может быть разбито на счётное число множеств  $B_k$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$ , таких что  $f|_{B_k}$  является билипшицевым гомеоморфизмом при  $k = 1, 2, \dots$ , а  $B_0$  имеет меру нуль (см. [7, пункты 3.2.2, 3.1.4 и 3.1.8]). Пусть, как и прежде,  $S_r := \tilde{S}(p_0, r)$  и  $D_r := S_r \cap D$ . По предложению 3.2  $\mathcal{H}^1(f(B_0 \cap D_r)) = 0$  для почти всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$  в локальных координатах, поэтому при почти всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$  имеет место 1-мерная замена переменных (см. [7, теорема 3.2.5]).

Повторяя рассуждения, приведённые при доказательстве предложения 3.2 и используя обозначения этого предложения, заключаем, что отображение  $h_m$  переводит  $\varphi(S_r)$  на сегмент  $I(m, R) = \{z \in \mathbb{C} : z = \log R + it, t \in (\psi_{m-1}, \psi_m), R = (e^r - 1)/(e^r + 1)\}$ . Поскольку  $f$  – конечного искажения,  $g'_m(\log R + it) = 0$  при всех  $t \in (\psi_{m-1}, \psi_m)$  таких, что  $\varphi^{-1}(h_m^{-1}(\log R + it)) \in B_*$ . Тогда в силу [7, теорема 3.2.5] с учётом сделанных выше замечаний

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^1(\psi(f(B_* \cap D_r \cap \varphi^{-1}(A_m)))) &= \mathcal{H}^1(g_m(h_m(\varphi(B_* \cap D_r) \cap A_m))) \leq \\ &\leq \int_{g_m(h_m(\varphi(B_* \cap D_r) \cap A_m))} N(y, g_m, h_m(\varphi(B_* \cap D_r) \cap A_m)) d\mathcal{H}^1 y \leq \\ &\leq \int_{\psi_{m-1}}^{\psi_m} \chi_{h_m(\varphi(B_*) \cap A_m)}(\log R + it) |g'_m(\log R + it)| dt = 0, \end{aligned}$$

где  $\chi_{h_m(\varphi(B_*) \cap A_m)}$  – характеристическая функция множества  $h_m(\varphi(B_*) \cap A_m)$ . Полуаддитивность по  $m$  одномерной хаусдорфовой меры в последней цепочке равенств даст

нам  $\mathcal{H}^1(\psi(f(B_* \cap D_r))) = 0$  при почти всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$ . Пусть  $\psi_i(f(D_r))$  – произвольная дуга штриховой линии  $\psi(f(D_r))$ . Параметризуем  $\psi_i(f(D_r))$  в виде  $\gamma_i : [0, b_i] \rightarrow \mathbb{D}$ ,  $\gamma_i = \gamma_i(s)$ , где  $s \in [0, b_i]$  – натуральный параметр. Полагая  $m = 1$  в [7, теорема 3.2.5], мы получим, что множество  $B_i := \{s \in [0, b_i] : \gamma_i(s) \in \psi(f(B_*))\}$  имеет линейную меру нуль. Пусть  $\chi_{\psi(f(B_*))}(z)$  – характеристическая функция множества  $\psi(f(B_*))$ . Учитывая замечание 1.1, мы получим:

$$l_{f(\tilde{S}(p_0, r) \cap D)}(f(B_*)) = \sum_{i=1}^{\infty} 2 \int_0^{b_i} \frac{\chi_{\psi(f(B_*))}(\gamma_i(s)) ds}{1 - |\gamma_i(s)|^2} = 0$$

для почти всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$ , что и требовалось установить.  $\square$

Дальнейшие исследования, как и в случае отображений на комплексной плоскости, опираются на связь классов Соболева с оценками искажения модуля (см., напр., [12, лемма 3.1] либо [13, теорема 3]).

*Доказательство теоремы 1.1.* Поскольку  $f$  открыто, то отображение  $f$  дифференцируемо почти всюду в  $D$  локальных координатах (см. замечания, сделанные во введении в [1]; см. также [14, теорема III.3.1]). Пусть  $B$  – борелево множество всех точек  $p \in D$ , где  $f$  имеет полный дифференциал  $f'(p)$  и  $J_f(p) \neq 0$  в локальных координатах. Заметим, что  $B$  может быть представлено в виде не более, чем счётного объединения борелевских множеств  $B_l$ ,  $l = 1, 2, \dots$ , таких что  $f|_{B_l}$  являются билипшецевыми гомеоморфизмами (см. [7, пункты 3.2.2, 3.1.4 и 3.1.8]). См. рисунок 1 для иллюстрации. Без ограничения общности, мы можем считать, что множества  $B_l$  попарно не пересека-




Рис. 1: К доказательству теоремы 1.1



ются. Обозначим также символом  $B_*$  множество всех точек  $p \in D$ , где  $f$  имеет полный дифференциал и  $f'(p) = 0$ .

Поскольку  $f$  – конечного искажения,  $f'(p) = 0$  для почти всех точек  $p$ , где  $J_f(p) = 0$ . Таким образом, по построению множество  $B_0 := D \setminus (B \cup B_*)$  имеет нулевую меру Лебега. Пусть  $U$  – нормальная окрестность точки  $p_0$  и  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{D}$  – отображение, соответствующее этой нормальной окрестности. Мы можем считать, что  $\varphi(U) \subset B(0, r_0)$ ,  $0 < r_0 < 1$ . Поскольку  $\overline{D_*}$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ , мы можем покрыть  $\overline{D_*}$  конечным числом окрестностей  $V_k$ ,  $k = 1, 2, \dots, m$ , таких, что  $\psi_k : V_k \rightarrow B(0, R_k)$ ,  $0 < R_k < 1$ , и  $\psi_k$  – конформные отображения. Пусть  $R_0 := \max_{1 \leq k \leq m} R_k$ . Тогда ввиду непрерывности отображения  $f$  множества  $U'_k := f^{-1}(V_k \cap D_*) \cap U$  являются открытыми в  $U$  и отображение

$$f_k := \psi_k \circ f \circ \varphi^{-1}$$

является отображением из  $\varphi(U'_k) \subset B(0, r_0)$  в  $\psi_k(V_k) \subset B(0, R_0)$ .

Положим теперь  $U_1 = U'_1$ ,  $U_2 = U'_2 \setminus U'_1$ ,  $U_3 = U'_3 \setminus (U'_1 \cup U'_2)$ ,  $\dots$ ,  $U_m = U'_m \setminus (U'_1 \cup U'_2 \cup \dots \cup U'_{m-1})$ . Заметим, что по определению  $U_m \subset U'_m$  при  $m \geq 1$  и  $U_s \cap U_k = \emptyset$  при  $s \neq k$ . Пусть  $\Gamma$  – семейство  $D_r := D \cap S_r$  всех пересечений окружностей  $S_r = \tilde{S}(p_0, r)$ ,  $r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)$ , с областью  $D$ . Зафиксируем допустимую функцию  $\rho_* \in \text{adm } f(\Gamma)$ ,  $\rho_* \equiv 0$  вне  $f(D)$ , и положим  $\rho \equiv 0$  вне  $U$  и на  $B_0$ , и

$$\rho(p) := \rho_*(f(p)) \|f'_k(\varphi(p))\| \quad \text{при } p \in U_k \setminus B_0,$$

где матричная норма производной  $\|g'(z)\|$  заданной функции  $g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\mathbb{D} \subset \mathbb{C}$ , как обычно, определена соотношением  $\|g'(z)\| = |g_z| + |g_{\bar{z}}|$ ,  $g_z = (g_x - ig_y)/2$ ,  $g_{\bar{z}} = (g_x + ig_y)/2$ ,  $z = x + iy \in \mathbb{C}$ . Заметим, что

$$D_r := D \cap S_r = \left( \bigcup_{\substack{1 \leq k \leq m \\ 1 \leq l < \infty}} D_{kl}^r \right) \cup \left( \bigcup_{k=1}^m S_r \cap U_k \cap B_* \right) \cup \left( \bigcup_{k=1}^m S_r \cap U_k \cap B_0 \right),$$

где  $D_{kl}^r = S_r \cap U_k \cap B_l$ . Тогда также

$$D_r^* = f(S_r \cap D) = \left( \bigcup_{\substack{1 \leq k \leq m \\ 1 \leq l < \infty}} f(D_{kl}^r) \right) \cup \left( \bigcup_{k=1}^m f(S_r \cap U_k \cap B_*) \right) \cup \left( \bigcup_{k=1}^m f(S_r \cap U_k \cap B_0) \right).$$

По предложениям 3.2 и 3.3 при каждом  $1 \leq k \leq m$  и почти всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$  выполнено  $l_{f(D_r)}(f(U_k \cap B_0)) = 0$  и  $l_{f(D_r)}(f(U_k \cap B_*)) = 0$ , и потому

$$\begin{aligned} 1 &\leq \int_{D_r^*} \rho_*(p_*) ds_{h_*}^{\sim}(p_*) \leq 2 \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^{\infty} \int_{\psi_k(f(D_{kl}^r))} \frac{\rho_*(\psi_k^{-1}(z))}{1 - |z|^2} d\mathcal{H}^1(z) \leq \quad (3.9) \\ &\leq \frac{2}{1 - R_0^2} \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^{\infty} \int_{\psi_k(f(D_{kl}^r))} \rho_*(\psi_k^{-1}(z)) d\mathcal{H}^1(z) \end{aligned}$$

при почти всех  $r \in (0, \varepsilon_0)$ . С другой стороны, рассуждая на каждом множестве  $D_{kl}^r$  в отдельности и используя [7, пункт 1.7.6, теорема 2.10.43 и теорема 3.2.6], мы получаем, что

$$\begin{aligned} \int_{D_{kl}^r} \rho(p) ds_{\tilde{h}}(p) &= 2 \int_{\varphi(D_{kl}^r)} \frac{\rho_*(\psi_k^{-1}(\psi_k \circ f \circ \varphi^{-1})(y)) \|(\psi_k \circ f \circ \varphi^{-1})'(y)\|}{1 - |y|^2} |dy| \geq \\ &2 \int_{\varphi(D_{kl}^r)} \rho_*(\psi_k^{-1}(\psi_k \circ f \circ \varphi^{-1})(y)) \|(\psi_k \circ f \circ \varphi^{-1})'(y)\| |dy| \geq \\ &\geq 2 \int_{\psi_k(f(D_{kl}^r))} \rho_*(\psi_k^{-1}(z)) d\mathcal{H}^1(z). \end{aligned} \quad (3.10)$$

Суммируя (3.10) по всем  $1 \leq k \leq m$  и  $1 \leq l < \infty$ , и учитывая (3.9), а также лемму 2.2, заключаем, что  $\rho/(1 - R_0^2) \in \text{ext adm } \Gamma$ .

Используя замену переменных на каждом  $B_l$ ,  $l = 1, 2, \dots$  (см., напр., [7, теорема 3.2.5]), свойство счётной аддитивности интеграла Лебега, а также учитывая (1.3), получаем оценку

$$\begin{aligned} &\frac{1}{(1 - R_0^2)^2} \int_D \frac{\rho^2(p)}{K_\mu(p)} d\tilde{h}(p) = \\ &= \frac{4}{(1 - R_0^2)^2} \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^{\infty} \int_{\varphi(U_k \cap B_l)} \frac{\rho_*^2(\psi_k^{-1}(\psi_k \circ f \circ \varphi^{-1}(z))) \|(\psi_k \circ f \circ \varphi^{-1})'(\varphi(z))\|^2}{(1 - |z|^2)^2 K_\mu(\varphi^{-1}(z))} dm(z) \leq \\ &\leq \frac{4}{(1 - r_0^2)^2 (1 - R_0^2)^2} \sum_{k=1}^m \sum_{l=0}^{\infty} \int_{\mathbb{S}_*} \rho_*^2(\psi_k^{-1}(y)) N(y, \psi_k \circ f \circ \varphi^{-1}, \varphi(U_k \cap B_l)) dm(y) \leq \\ &\leq \frac{4}{(1 - r_0^2)^2 (1 - R_0^2)^2} \sum_{k=1}^m \int_{\mathbb{S}_*} \rho_*^2(\psi_k^{-1}(y)) N(y, \psi_k \circ f \circ \varphi^{-1}, \varphi(U_k)) dm(y) \leq \\ &\leq \frac{4}{(1 - r_0^2)^2 (1 - R_0^2)^2} \sum_{k=1}^m \int_{\mathbb{S}_*} \frac{\rho_*^2(\psi_k^{-1}(y)) N(\psi_k^{-1}(y), f, U_k)}{(1 - |y|^2)^2} dm(y) = \\ &= \frac{1}{(1 - r_0^2)^2 (1 - R_0^2)^2} \sum_{k=1}^m \int_{\mathbb{S}_*} \rho_*^2(p_*) N(p_*, f, U_k) d\tilde{h}_*(p_*) \leq \\ &\leq \frac{N(f, D)}{(1 - r_0^2)^2 (1 - R_0^2)^2} \int_{\mathbb{S}_*} \rho_*^2(p_*) d\tilde{h}_*(p_*). \end{aligned}$$

Для завершения доказательства следует положить  $c := \frac{1}{(1 - r_0^2)^2 (1 - R_0^2)^2}$ .  $\square$

## 4 Об устранении особенностей нижних $Q$ -отображений

Отображение  $f : D \rightarrow D_*$ ,  $f(D) = D_*$ , будем называть *сохраняющим границу*, если  $C(f, \partial D) \subset \partial D_*$ , где, как обычно,  $C(f, \partial D) = \{p_* \in \mathbb{S}_* : \exists p_k \in D, p \in \partial D : p_k \rightarrow p, f(p_k) \rightarrow p_*, k \rightarrow \infty\}$ .

Аналогично, борелевская функция  $\rho : \mathbb{D} \rightarrow [0, \infty]$  будет называться *допустимой* для семейства  $\Gamma$  кривых  $\gamma$  в смысле гиперболической длины,  $\rho \in \text{adm}_h \Gamma$ , если  $\int_{\gamma} \rho(z) ds_h(z) \geq 1$  для всякой кривой  $\gamma \in \Gamma$ , где  $ds_h(z)$  – элемент гиперболической длины. *Модулем* семейства  $\Gamma$  в смысле гиперболической меры называется величина  $M_h(\Gamma) := \inf_{\rho \in \text{adm}_h \Gamma} \int_{\mathbb{D}} \rho^2(z) dh(z)$ , где  $dh(z)$  – элемент гиперболической площади. Имеет место следующее утверждение.

**Предложение 4.1.** Пусть  $\Gamma$  – семейство кривых в единичном круге  $\mathbb{D}$ . Тогда

$$M_h(\Gamma) = M_e(\Gamma).$$

*Доказательство.* Пусть  $\rho \in \text{adm}_e \Gamma$ . Тогда  $\int_{\gamma} \rho(z) |dz| \geq 1$  для всякой кривой  $\gamma \in \Gamma$ . Тогда функция  $\rho_1(z) := \frac{(1-|z|^2)\rho(z)}{2}$  принадлежит  $\text{adm}_h \Gamma$ , поскольку  $\int_{\gamma} \rho_1(z) ds_h(z) = \int_{\gamma} 2 \frac{(1-|z|^2)\rho(z)}{2(1-|z|^2)} |dz| \geq 1$  для всех  $\gamma \in \Gamma$ . Тем самым

$$M_h(\Gamma) \leq \int_{\mathbb{D}} 4 \frac{(1-|z|^2)^2 \rho^2(z)}{4(1-|z|^2)^2} dm(z) = \int_{\mathbb{D}} \rho^2(z) dm(z). \quad (4.1)$$

Переходя в (4.1) к  $\inf$  по всем допустимым функциям  $\rho \in \text{adm}_e \Gamma$ , получаем неравенство

$$M_h(\Gamma) \leq M_e(\Gamma). \quad (4.2)$$

Пусть теперь  $\rho \in \text{adm}_h \Gamma$ . Тогда  $\int_{\gamma} \rho(z) ds_h(z) = \int_{\gamma} \frac{2\rho(z)}{1-|z|^2} |dz| \geq 1$  для всякой кривой  $\gamma \in \Gamma$ . Тогда функция  $\rho_2(z) := \frac{2\rho(z)}{1-|z|^2}$  принадлежит  $\text{adm}_e \Gamma$ , поэтому

$$M_e(\Gamma) \leq \int_{\mathbb{D}} 4 \frac{\rho^2(z)}{(1-|z|^2)^2} dm(z) = \int_{\mathbb{D}} \rho^2(z) dh(z). \quad (4.3)$$

Переходя в (4.3) к  $\inf$  по всем допустимым функциям  $\rho \in \text{adm}_h \Gamma$ , получаем неравенство

$$M_e(\Gamma) \leq M_h(\Gamma). \quad (4.4)$$

Соотношения (4.2) и (4.4) приводят к желанному утверждению.  $\square$

Аналог следующего утверждения установлен для пространства  $\mathbb{R}^n$  в монографии Вайсяля [4, теорема 7.5].

**Предложение 4.2.** Пусть  $\mathbb{S}$  – риманова поверхность и  $p_0 \in \mathbb{S}$ . Пусть  $U$  – окрестность точки  $p_0$  такая, что  $\tilde{h}(p, p_0) = h(\varphi(p), \varphi(p_0))$ , где  $\varphi = \pi^{-1}$  и  $\pi$  – естественная проекция фундаментального многоугольника Дирихле  $D_0$  с центром в точке  $\varphi(p_0)$  на  $\mathbb{S}$ . Пусть

$0 < r_1 < r_2 < \text{dist}(p_0, \partial U)$ ,  $\tilde{S}_i = \tilde{S}(p_0, r_i)$ ,  $i = 1, 2$ ,  $\tilde{A}(p_0, r_1, r_2) = \{p \in \mathbb{S} : r_1 < \tilde{h}(p_0, p) < r_2\}$ . Если  $\Gamma = \Gamma(\tilde{S}_1, \tilde{S}_2, \tilde{A})$  – модуль семейства кривых, соединяющих  $\tilde{S}_1$  и  $\tilde{S}_2$  в  $\tilde{A}$ , то

$$M(\Gamma) = \frac{2\pi}{L(r_1, r_2)},$$

где  $L(r_1, r_2) = \left(\frac{e^{r_2}-1}{e^{r_2}+1}\right) : \left(\frac{e^{r_1}-1}{e^{r_1}+1}\right)$ .

*Доказательство.* По определению отображения  $\varphi$  и окрестности  $U$ ,  $M(\Gamma) = M_h(\Gamma^*)$ , где  $\Gamma^* = \Gamma(S_h(\varphi(p_0), r_1), S_h(\varphi(p_0), r_2), A_h)$ ,  $A_h := \{z \in \mathbb{D} : r_1 < h(z, \varphi(p_0)) < r_2\}$ . По предложению 4.1  $M(\Gamma) = M_e(\Gamma^*)$ . Необходимое заключение вытекает теперь из [16, следствие 5.18].  $\square$

Следующее утверждение в случае пространства  $\mathbb{R}^n$  установлено в [15, теорема 3.3].

**Предложение 4.3.** Пусть  $D$  и  $D_*$  – заданные области, лежащие в римановых поверхностях  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно. Пусть также  $f : D \rightarrow D_*$  – открытое дискретное замкнутое отображение в  $D$ . Тогда  $f$  сохраняет границу.

*Доказательство.* Так как  $f$  – открыто, то  $f(D)$  является областью. Покажем, что  $f$  сохраняет границу. Предположим противное, тогда найдутся  $p_0 \in \partial D$  и  $y \in f(D)$ , такие, что  $y \in C(f, p_0)$ . Тогда существует последовательность  $p_k \in D$ ,  $k = 1, 2, \dots$ ,  $p_k \xrightarrow{\tilde{h}} p_0$  при  $k \rightarrow \infty$ , такая, что  $f(p_k) \xrightarrow{\tilde{h}_*} y$  при  $k \rightarrow \infty$ .

Без ограничения общности, можно считать, что  $f(p_k) \neq y$  при всех  $k = 1, 2, \dots$ . Действительно, возможны два случая: либо  $f(p_k) \neq y$  для сколь угодно больших номеров  $k$ , либо  $f(p_k) = y$  при всех  $k \geq k_0$  и некотором натуральном  $k_0$ . В первом случае, по определению, существует подпоследовательность  $p_{k_l}$ ,  $l = 1, 2, \dots$ , сходящаяся к  $p_0$  при  $l \rightarrow \infty$ , такая, что  $f(p_{k_l}) \xrightarrow{\tilde{h}_*} y$  при  $l \rightarrow \infty$  и  $f(p_{k_l}) \neq y$ ,  $l = 1, 2, \dots$ . Во втором случае, если  $f(p_k) = y$  при всех  $k \geq k_0$  и некотором натуральном  $k_0$ , воспользуемся непрерывностью  $f$ : для каждого  $k \in \mathbb{N}$  найдётся  $\delta_k > 0$  такое, что

$$\tilde{h}_*(f(p), f(p_k)) < 1/k \quad \forall p \in B(p_k, \delta_k). \quad (4.5)$$

Можно считать, что  $B(p_k, \delta_k) \subset D$  и  $\delta_k < 1/k$ . Так как  $f$  дискретно, найдётся точка  $q_k \in B(p_k, \delta_k)$ , такая, что  $f(q_k) \neq y$ . Тогда по неравенству треугольника,

$$\tilde{h}(q_k, p_0) \leq \tilde{h}(q_k, p_k) + \tilde{h}(p_k, p_0) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty,$$

и одновременно, ввиду соотношения (4.5)

$$\begin{aligned} \tilde{h}_*(f(q_k), y) &\leq \tilde{h}_*(f(q_k), f(p_k)) + \tilde{h}_*(f(p_k), y) < \\ &< 1/k + \tilde{h}_*(f(p_k), y) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Таким образом,  $q_k \in D$ ,  $q_k \xrightarrow{\tilde{h}} p_0$  при  $k \rightarrow \infty$ ,  $f(q_k) \xrightarrow{\tilde{h}_*} y$  при  $k \rightarrow \infty$ , и  $f(q_k) \neq y$  для каждого  $k \in \mathbb{N}$ .

Далее, заметим, что множество  $\{p_k\}_{k=1}^{\infty}$  замкнуто в  $D$ , однако,  $\{f(p_k)\}_{k=1}^{\infty}$  не замкнуто в  $f(D)$ , поскольку  $y \in f(D)$  и  $y \notin \{f(p_k)\}_{k=1}^{\infty}$ . Следовательно,  $f$  не замкнуто в  $D$ , что противоречит сделанному предположению. Полученное противоречие указывает на то, что  $f$  сохраняет границу.  $\square$

Пусть  $\Omega$  – область в  $\mathbb{C}$ , либо область в  $\mathbb{S}$ . Согласно [18, пункт 3], связное множество  $E \subset \Omega$  будем называть *разрезом*, если  $E$  замкнуто в  $\Omega$ ,  $\overline{E} \cap \partial\Omega \neq \emptyset$  и  $\Omega \setminus E$  состоит из двух компонент, граница каждой из которых пересекает  $\partial\Omega$ . Последовательность разрезов  $E_1, E_2, \dots, E_k, \dots$  будет называться *цепью*, если  $E_k$  отделяет  $E_{k-1}$  от  $E_{k+1}$  в  $\Omega$ , т.е.,  $E_{k-1}$  и  $E_{k+1}$  принадлежат различным компонентам связности  $\Omega \setminus E_k$ . Из приведённых определений вытекает, что одна из подобластей  $\Omega \setminus E_k$  содержит все  $E_m$  при  $m > k$ . Эту подобласть обозначим  $d_k$ . Две цепи разрезов  $\{\sigma_m\}$  и  $\{\sigma'_k\}$  называются *эквивалентными*, если для каждого  $m = 1, 2, \dots$  область  $d_m$  содержит все области  $d'_k$  за исключением конечного числа, и для каждого  $k = 1, 2, \dots$  область  $d'_k$  также содержит все области  $d_m$  за исключением конечного числа.

Имеет место следующее утверждение.

**Предложение 4.4.** *Предположим, область  $D$  в  $\mathbb{S}$  имеет локально квазиконформную границу,  $p_0 \in \partial D$  и  $r_m > 0$  – произвольная последовательность такая, что  $r_m \rightarrow 0$  при  $m \rightarrow \infty$ . Пусть  $U$  – окрестность точки  $p_0$ , для которой найдётся квазиконформное отображение  $\psi : U \rightarrow \mathbb{D}$ ,  $\psi(\partial D \cap U) = \mathbb{D} \cap I$ ,  $I := (-1, 1) = \{z \in \mathbb{D} : x = 0, z = x + iy\}$ . Тогда:*

1) *найдётся стягивающаяся к точке  $p_0$  последовательность окрестностей  $U_k$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , этой точки, такая что  $\psi(U_k) = B(0, 1/2^k)$ ,  $\psi(U_k \cap D) = \{z = x + iy \in B(0, 1/2^k) : x > 0\}$ ;*

2) *множества  $\sigma_k := \partial U_k \cap D$  являются разрезами области  $D$ , при этом,  $\tilde{h}(\sigma_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ ,  $\tilde{h}(\sigma_k) := \sup_{x, y \in \sigma_k} \tilde{h}(x, y)$ , а соответствующая область  $d_k$  есть  $U_k \cap D$ ;*

3) *найдётся подпоследовательность  $r_{m_l} \rightarrow 0$ ,  $l \rightarrow \infty$ , и соответствующая последовательность дуг  $\gamma_l \subset \tilde{S}(p_0, r_{m_l}) \cap D$ ,  $l = 1, 2, \dots$ , образующая цепь разрезов, эквивалентную  $\sigma_k$ ,  $k = 1, 2, \dots$ .*

*Доказательство.* Рассуждая аналогично доказательству [4, теорема 17.10], покажем, что окрестность  $U$  в определении локально квазиконформной границы может быть выбрана сколь угодно малой. В самом деле, по определению, точка  $p_0 \in \partial D$  имеет окрестность  $U$ , которая может быть отображена квазиконформным отображением  $\psi$  на единичный круг  $\mathbb{D} \subset \mathbb{C}$  так, что  $\psi(\partial D \cap U) = I$ , где  $I := (-1, 1) = \{z \in \mathbb{D} : x = 0, z = x + iy\}$ . Поскольку  $\psi$  – гомеоморфизм, то либо  $\psi(U \cap D) = \mathbb{D}_+$ , либо  $\psi(U \cap D) = \mathbb{D} \setminus \overline{\mathbb{D}_+}$ , где  $\mathbb{D}_+ := \{z \in \mathbb{D} : x > 0, z = x + iy\}$ . Таким образом, без ограничения общности мы можем считать, что  $\psi(U \cap D) = \mathbb{D}_+$ . Выберем окрестность  $V \subset U$ , содержащую точку  $p_0$ . Если  $r < 1 - |\psi(p_0)|$ , то ввиду неравенства треугольника шар  $B(\psi(p_0), r)$  лежит строго внутри  $\mathbb{D}$ . Поскольку  $\psi$  – гомеоморфизм в  $U$ , то, в частности,  $\psi^{-1}$  – непрерывное отображение. В таком случае, найдётся  $r < 1 - |\psi(p_0)|$  со следующим свойством: из условия  $|\psi(p) - \psi(p_0)| < r$  вытекает, что  $p \in V$ . Кроме того, если  $\psi(p) \in \mathbb{D}_+ \cup I$  и  $|\psi(p) - \psi(p_0)| < r$ , то  $p \in V \cap \overline{D}$ . Полагая  $U_1 := \psi^{-1}(B(\psi(p_0), r))$ , мы заметим, что  $U_1 \subset V$  и  $U_1$  является окрестностью точки  $p_0$ , при этом,  $U_1 \cap \overline{D} = \psi^{-1}(B(\psi(p_0), r) \cap (\mathbb{D}_+ \cup I))$ . Полагая  $H(p) = (\psi(p) - \psi(p_0))/r$ , мы получим отображение  $H$  окрестности  $U_1$  на  $\mathbb{D}$  такое, что  $H(U_1 \cap \overline{D}) = \mathbb{D}_+ \cup I$  и  $H(p_0) = 0$ . Так как  $H$  – гомеоморфизм, отсюда следует, что  $H(U_1 \cap \partial D) = I$ . Ясно также, что если исходное отображение  $\psi$  было квазикон-

формным, то таковым же является и отображение  $H$ . Таким образом, окрестность  $U_1$  удовлетворяет всё тем же условиям, что и исходная окрестность  $U$ . В дальнейшем мы используем обозначение  $\psi$  вместо  $H$  и считаем, что  $\psi(p_0) = 0$ .

Из приведенных выше рассуждений вытекает, что найдётся убывающая последовательность окрестностей  $U_k$  точки  $p_0$ , для которых  $p_0 = \bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{U_k \cap D}$ ,  $\psi(U_k) = B(0, 1/2^k)$ ,  $\psi(\partial U_k \cap D) = S(0, 1/2^k) \cap \mathbb{D}_+$ . Путём непосредственных вычислений нетрудно убедиться, что последовательность  $\sigma_k := \partial U_k \cap D$  образует цепь разрезов области  $D$ . Имеем:  $\bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{U_k \cap D} = p_0$ , в частности,  $\tilde{h}(\sigma_k) \leq \tilde{h}(\overline{U_k \cap D}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ , где для множества  $A \subset \mathbb{S}$  мы используем обозначение  $\tilde{h}(A) := \sup_{x,y \in A} \tilde{h}(x,y)$ . Пункты 1) и 2) предложения 4.4 установлены. Осталось установить пункт 3). Рассмотрим в  $\mathbb{D}_+$  отрезок  $\beta(t) = it$ ,




Рис. 2: К доказательству предложения 4.4

$t \in (0, 1)$ . Положим  $\alpha(t) := \psi^{-1}(\beta(t))$ . Тогда  $\alpha$  – кривая в  $U \cap D$  с началом в точке  $p_0$ . Пусть  $m_1 \in \mathbb{N}$  таково, что  $\tilde{h}(p_0, \sigma_1) < r_{m_1}$ . Ввиду ввиду [17, теорема 1.1.5, § 46]  $\tilde{S}(p_0, r_{m_1}) \cap \alpha \neq \emptyset$ . Пусть  $\gamma_1$  – дуга множества  $\tilde{S}(p_0, r_{m_1}) \cap D$ , такая, что  $\alpha(t_1) \in \gamma_1$ , где  $t_1 := \min\{t \in (0, 1) : \alpha(t) \in \tilde{S}(p_0, r_{m_1})\}$  (см. рисунок 2). По построению, концы кривой  $\gamma_1$  лежат на  $\partial D$ , поэтому  $\psi(\gamma_1)$  – кривая, концы которой лежат на отрезке  $I \subset \mathbb{D}$ . Очевидно,  $\psi(\gamma_1)$  разбивает на две области  $\mathbb{D}_+$ , поэтому и  $\gamma_1$  разбивает на две области область  $D$ . Пусть  $d'_1$  – компонента  $D \setminus \gamma_1$ , содержащая кривую  $\alpha_1 := \alpha|_{(0, t_1)}$ . Заметим, что найдётся  $k_1 \in \mathbb{N}$  такое, что  $U_{k_1} \cap D \subset d'_1$ . В самом деле, по построению  $U_{k_1} \subset \tilde{B}(p_0, r_{m_1})$  при достаточно большом  $k_1 \in \mathbb{N}$  и точка  $\alpha_1(t)$  принадлежит  $U_{k_1} \cap D$  при достаточно малых  $t$ , так как  $U_{k_1}$  – окрестность точки  $p_0$ . Значит,  $U_{k_1} \cap D$  принадлежит некоторой компоненте  $D \setminus \gamma_1$ , содержащей  $\alpha_1$ , то есть,  $U_{k_1} \cap D \subset d'_1$ . Заметим, что  $\sigma_{k_1} \in d'_1$ , так как  $\sigma_{k_1} = \partial U_{k_1} \cap D \subset \overline{U_{k_1} \cap D} \subset \overline{d'_1}$  и  $\sigma_{k_1} \cap \partial d'_1 = \emptyset$ .

Заметим также, что  $\sigma_1 \notin d'_1$ , поскольку  $d'_1$  – одна из связных компонент  $D \setminus \sigma_1$ , не совпадающая с  $d'_1$ , в частности,  $d'_1 \subset D \setminus \sigma_1$ . Таким образом,  $\gamma_1$  отделяет  $\sigma_1$  от  $U_{k_1} \cap D$  в  $D$ ; в частности,  $\gamma_1$  отделяет  $\sigma_1$  от  $\sigma_{k_1}$  в  $D$ .

Пусть  $m_2 \in \mathbb{N}$ ,  $m_2 > m_1$ , таково, что  $\tilde{h}(p_0, \sigma_{k_1}) < r_{m_2}$ . Ввиду ввиду [17, теорема 1.1.5, § 46]  $\tilde{S}(p_0, r_{m_2}) \cap \alpha \neq \emptyset$ . Пусть  $\gamma_2$  – дуга множества  $\tilde{S}(p_0, r_{m_2}) \cap D$ , такая, что  $\alpha(t_2) \in \gamma_2$ , где  $t_2 := \min\{t \in (0, 1) : \alpha(t) \in \tilde{S}(p_0, r_{m_2})\}$ . По построению, концы кривой  $\gamma_2$  лежат на  $\partial D$ , поэтому  $\psi(\gamma_2)$  – кривая, концы которой лежат на отрезке  $I \subset \mathbb{D}$ . Очевидно,  $\psi(\gamma_2)$  разбивает на две области  $\mathbb{D}_+$ , поэтому и  $\gamma_2$  разбивает на две области область  $D$ . Пусть  $d'_2$  – компонента  $D \setminus \gamma_2$ , содержащая кривую  $\alpha_2 := \alpha|_{(0, t_2)}$ . Заметим, что найдётся  $k_2 \in \mathbb{N}$  такое, что  $U_{k_2} \cap D \subset d'_2$ . В самом деле, по построению  $U_{k_2} \subset \tilde{B}(p_0, r_{m_2})$  при достаточно большом  $k_2 \in \mathbb{N}$  и точка  $\alpha_2(t)$  принадлежит  $U_{k_2} \cap D$  при достаточно малых  $t$ , так как  $U_{k_2}$  – окрестность точки  $p_0$ . Значит,  $U_{k_2} \cap D$  принадлежит некоторой компоненте  $D \setminus \gamma_2$ , содержащей  $\alpha_2$ , то есть,  $U_{k_2} \cap D \subset d'_2$ . Заметим, что  $\sigma_{k_2} \in d'_2$ , так как  $\sigma_{k_2} = \partial U_{k_2} \cap D \subset \overline{U_{k_2} \cap D} \subset \overline{d'_2}$  и  $\sigma_{k_2} \cap \partial d'_2 = \emptyset$ .

Заметим также, что  $\sigma_{k_1} \notin d'_2$ , поскольку  $d'_2$  – одна из связных компонент  $D \setminus \sigma_{k_1}$ , не совпадающая с  $d'_2$ , в частности,  $d'_2 \subset D \setminus \sigma_{k_1}$ . Таким образом,  $\gamma_2$  отделяет  $\sigma_{k_1}$  от  $U_{k_2} \cap D$  в  $D$ ; в частности,  $\gamma_2$  отделяет  $\sigma_{k_1}$  от  $\sigma_{k_2}$  в  $D$ .

По тем же соображениям  $\gamma_1 \notin d'_2$ . В самом деле,  $d'_2$  – одна из связных компонент  $D \setminus \gamma_1$ , не совпадающая с  $d'_1$ , в частности,  $d'_2 \subset D \setminus \gamma_1$ . Таким образом,  $\gamma_2$  также отделяет  $\gamma_1$  от  $U_{k_2} \cap D$  в  $D$ ; в частности,  $\gamma_2$  отделяет  $\gamma_1$  от  $\sigma_{k_2}$  в  $D$ .

И так далее. В результате бесконечного процесса построена некоторая последовательность дуг  $\gamma_l \subset \tilde{S}(p_0, r_{m_l})$ ,  $l = 1, 2, \dots$ , отделяющих  $\sigma_{k_l}$  от  $\sigma_{k_{l-1}}$  в  $D$ , при этом,

- (1)  $U_{k_l} \cap D \subset d'_l$  и, кроме того,
- (2)  $\gamma_l$  отделяет  $\gamma_{l-1}$  от  $\sigma_{k_l}$  в  $D$ ,
- (3)  $\sigma_{k_l} \in d'_l$ .

Покажем, что  $\gamma_l$  отделяет  $\gamma_{l+1}$  от  $\gamma_{l-1}$  при всех  $l \in \mathbb{N}$ , точнее, покажем, что  $\gamma_{l+1} \subset d'_l$  и  $\gamma_{l-1} \subset D \setminus d'_l$ . В самом деле, по доказанному выше  $\gamma_{l+1}$  отделяет  $\sigma_{k_{l+1}}$  от  $\sigma_{k_l}$  в  $D$ , поэтому по определению  $\gamma_{l+1} \in U_{k_l} \cap D \subset d'_l$ . Так как по доказанному  $\gamma_l$  отделяет  $\gamma_{l-1}$  от  $\sigma_{k_l}$  в  $D$  и  $\sigma_{k_l} \in d'_l$  ввиду условия (3), то ввиду [17, теорема 1.1.5, § 46]  $\gamma_l \notin d'_l$ , т.е.,  $\gamma_l \in D \setminus d'_l$ , что и требовалось установить.

Из сказанного следует, что последовательность разрезов  $\gamma_l$ ,  $l = 1, 2, \dots$ , образует цепь. Заметим, что последовательности разрезов  $\gamma_l$  и  $\sigma_k$  эквивалентны. Действительно, при фиксированном  $l \in \mathbb{N}$  согласно свойству (1)  $U_{k_l} \cap D \subset d'_l$ , поэтому и  $U_k \cap D \subset d'_l$  при  $k \geq k_l$ . Обратно, зафиксируем  $k \in \mathbb{N}$  и рассмотрим для него соответствующий номер  $l = l(k) \in \mathbb{N}$  такой, что  $k_l \geq k$ , где  $k_l$ ,  $l = 1, 2, \dots$  – построенная выше подпоследовательность. Заметим, что  $d'_{l+1}$  принадлежит ровно одной из компонент связности  $D \setminus \sigma_{k_l}$ , а именно, либо  $d'_{l+1} \in U_{k_l} \cap D$ , либо  $d'_{l+1} \in D \setminus U_{k_l}$ . С другой стороны, по условию (3)  $\sigma_{k_{l+1}} \subset d'_{l+1}$ , кроме того,  $\sigma_{k_{l+1}} \subset U_{k_{l+1}-1} \cap D \subset U_{k_l} \cap D$ , так как  $\sigma_k$ ,  $k = 1, 2, \dots$  – цепь разрезов и, кроме того,  $k_{l+1} - 1 \geq k_l$ . В таком случае,  $d'_{l+1}$  принадлежит компоненте связности  $D \setminus \sigma_{k_l}$ , содержащей  $\sigma_{k_{l+1}}$ , то есть  $d'_l \subset U_{k_l} \cap D \subset U_k \cap D$ . Тогда также  $d'_l \subset U_k \cap D$  при всех  $l \geq l(k)$ . Эквивалентность цепей  $\gamma_l$  и  $\sigma_k$  установлена. Предложение 4.4 полностью доказано.  $\square$

**Лемма 4.1.** Пусть  $D$  и  $D_*$  – заданные области, лежащие в римановых поверхностях  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно,  $\overline{D}_*$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ ,  $p_0 \in \partial D$  и  $Q : D \rightarrow (0, \infty)$  – заданная изме-

римая относительно меры  $\tilde{h}$  функция. Пусть также  $f : D \rightarrow D_*$  – открытое дискретное замкнутое отображение области  $D$  на область  $f(D) = D_*$ . Предположим, область  $D$  имеет локально квазиконформную границу, а граница области  $\overline{D}_*$  сильно достижима.

Предположим  $p_0 \in \partial D$  и найдутся, по крайней мере, две последовательности  $p_i, p'_i \in D, i = 1, 2, \dots$ , такие, что  $p_i \rightarrow p_0, p'_i \rightarrow p_0$  при  $i \rightarrow \infty, f(p_i) \rightarrow y, f(p'_i) \rightarrow y'$  при  $i \rightarrow \infty$  и  $y' \neq y$ .

Тогда найдутся  $0 < \delta'_0 < d_0$  и  $l_0 > 0$  такие, что выполнено неравенство

$$l(f(\tilde{S}(p_0, r) \cap D)) \geq l_0, \quad \forall r \in (0, \delta'_0), \quad (4.6)$$

где  $l$  обозначает длину кривой (штриховой линии) на римановой поверхности  $\mathbb{S}_*$ .

*Доказательство.* По определению сильно достижимой границы в точке  $y \in \partial D_*$ , для окрестности  $U$  точки  $p_0$ , не содержащей точки  $y'$ , найдутся компакт  $C'_0 \subset D_*$ , окрестность  $V$  точки  $y, V \subset U$ , и число  $\delta > 0$  такие, что

$$M(\Gamma(C'_0, F, D_*)) \geq \delta > 0 \quad (4.7)$$

для произвольного континуума  $F$ , пересекающего  $\partial U$  и  $\partial V$ . По предложению 4.4 найдётся подпоследовательность окрестностей  $U_i, i = 1, 2, \dots$ , точки  $p_0$ , таких, что множество  $d_i := U_i \cap D$  связно. Не ограничивая общности, можно считать, что  $p_i$  и  $p'_i$  принадлежат  $d_i$ . В таком случае, соединим точки  $p_i$  и  $p'_i$  кривой  $\alpha_i$ , лежащей в  $d_i$ . Поскольку  $f(p_i) \in V$  и  $f(p'_i) \in D \setminus \overline{U}$  при всех достаточно больших  $i \in \mathbb{N}$ , найдётся номер  $i_0 \in \mathbb{N}$ , такой, что согласно (4.7)

$$M(\Gamma(C'_0, f(|\alpha_i|), D_*)) \geq \delta > 0 \quad (4.8)$$

при всех  $i \geq i_0 \in \mathbb{N}$  (см. рисунок 3). Проведём доказательство леммы 4.1 от противного.




Рис. 3: К доказательству леммы 4.1

Предположим, что (4.6) не имеет места. Тогда для каждого  $k \in \mathbb{N}$  найдётся  $r = r_k > 0$  :  $l(f(\tilde{S}(p_0, r_k) \cap D)) < 1/k, r_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ . По предложению 4.4 найдётся подпоследовательность  $r_{k_i}$  последовательности  $r_k$  и некоторая последовательность дуг  $\gamma_i \subset \tilde{S}(p_0, r_{k_i})$  таких, что  $d_i \subset d'_i$  и  $d'_i$  – соответствующая связная компонента множества  $D \setminus |\gamma_i|$ ,



$i = 1, 2, \dots$ . Пусть  $\zeta_i, i = 1, 2, \dots$ , – произвольная последовательность точек из  $f(|\gamma_i|)$ . Поскольку  $\overline{D}_*$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ , то мы без ограничения общности можем считать, что  $\zeta_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} \zeta_0, \zeta_0 \in \overline{D}_*$ . Заметим, что  $\zeta_i = f(p_i), p_i \in \tilde{S}(p_0, r_{k_i}) \cap D$ , так что  $\zeta_0 \in \partial D_*$  ввиду замкнутости отображения  $f$  и по предложению 4.3.

Заметим, что ввиду замкнутости отображения  $f$ , найдётся номер  $i_0 \in \mathbb{N}$  такой, что при  $i \geq i_0$

$$C'_0 \subset f(D) \setminus \overline{f(d'_i)}. \quad (4.9)$$

Действительно, если предположить, что включение (4.9) не выполняется при сколь угодно малых  $r > 0$ , то нашлась бы последовательность  $i_m > 0, m = 1, 2, \dots, i_m \rightarrow \infty$  при  $m \rightarrow \infty$ , и элементы  $y_m \in \overline{f(d'_{i_m})} \cap C'_0$ . Поскольку  $C'_0$  – компакт в  $f(D)$ , то можно считать, что  $y_m \rightarrow y_0 \in C'_0$  при  $m \rightarrow \infty$ . Так как  $y_m \in \overline{f(d'_{i_m})} \cap C'_0$ , то при каждом фиксированном  $m \in \mathbb{N}$  найдётся последовательность  $y_{kl} \in \overline{f(d'_{i_m})}$  такая, что  $y_{kl} \rightarrow y_l$  при  $l \rightarrow \infty$ . Заметим, что  $y_{kl} = f(p_{kl}), p_{kl} \in d'_{i_m}$ .

В силу сходимости  $y_{m1}$  к  $y_1$ , для числа  $1/2$  отыщется номер  $m_1$  такой, что  $\tilde{h}_*(y_1, y_{m_1 1}) < 1/2$ . Аналогично, в силу сходимости  $y_{m1}$  к  $y_2$ , для числа  $1/4$  отыщется номер  $m_2$  такой, что  $\tilde{h}_*(y_2, y_{m_2 2}) < 1/4$ . Вообще, в силу сходимости  $y_{kl}$  к  $y_l$  для числа  $1/2^l$  отыщется номер  $m_l$  такой, что  $\tilde{h}_*(y_l, y_{m_l l}) < 1/2^l$ . Но тогда, поскольку по построению  $y_l \rightarrow y_0$  при  $l \rightarrow \infty$ , для любого фиксированного  $\varepsilon > 0$  будем иметь

$$\tilde{h}_*(y_0, y_{m_l l}) \leq \tilde{h}_*(y_0, y_l) + \tilde{h}_*(y_l, y_{m_l l}) \leq \varepsilon + 1/2^l$$

при всех  $l \geq L = L(\varepsilon)$ , а это означает, что  $y_{m_l l} \rightarrow y_0$  при  $l \rightarrow \infty$ . Но, с другой стороны,  $y_{m_l l} = f(p_{m_l l}), p_{m_l l} \in d'_l$ , поэтому  $y_0 \in C(f, p_0)$ , что противоречит замкнутости отображения  $f$ . Действительно, по предложению 4.4 существует последовательность  $t_l > 0, t_l \xrightarrow{l \rightarrow \infty} 0$  такая, что  $d'_l \subset \tilde{B}(p_0, t_l)$ . Тогда  $y_0 \in C(f, \partial D) \subset \partial f(D)$  (см. предложение 4.3). В то же время,  $y_0 \in C'_0$ , т.е.,  $y_0$  – внутренняя точка области  $f(D)$ . Полученное противоречие указывает на справедливость включения (4.9).

Покажем теперь, что для произвольного  $i \in \mathbb{N}$

$$\partial f(d'_i) \cap f(D) \subset f(|\gamma_i|). \quad (4.10)$$

Действительно, пусть  $y_0 \in \partial f(d'_i) \cap f(D)$ , тогда найдётся последовательность  $y_m \in f(d'_i) \cap f(D)$  такая, что  $y_m \rightarrow y_0$  при  $m \rightarrow \infty$ , где  $y_m = f(\xi_m), \xi_m \in d'_i$ . Не ограничивая общности рассуждений, можно считать, что  $\xi_m \rightarrow \xi_0$  при  $m \rightarrow \infty$ . Заметим, что случай  $\xi_0 \in \partial D$  невозможен, поскольку в этом случае  $y_0 \in C(f, \partial D)$ , что противоречит замкнутости отображения  $f$ . Тогда  $\xi_0 \in D$ . Возможны две ситуации: 1)  $\xi_0 \in d'_i$  и 2)  $\xi_0 \in |\gamma_i|$ . Заметим, что случай 1) невозможен, поскольку, в этом случае,  $f(\xi_0) = y_0$  и  $y_0$  – внутренняя точка множества  $f(d'_i)$  по открытости отображения  $f$ , что противоречит выбору  $y_0$ . Таким образом, включение (4.10) установлено.

Заметим, что из предположения  $l(f(\tilde{S}(p_0, r_k) \cap D)) < 1/k, r_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ , вытекает, что

$$\tilde{h}_*(f(|\gamma_i|)) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0, \quad \tilde{h}_*(f(|\gamma_i|)) := \sup_{p_*, q_* \in f(|\gamma_i|)} \tilde{h}_*(p_*, q_*).$$

Тогда для каждого  $s \in \mathbb{N}$  найдётся номер  $i_s \in \mathbb{N}$  такой, что  $f(|\gamma_{i_s}|) \subset \tilde{B}(\zeta_0, 1/s)$ . Поскольку  $C'_0$  – компакт в  $D_*$ , найдётся  $s_0 \geq 1$  такое, что  $C'_0 \cap \tilde{B}(\zeta_0, 1/s_0) = \emptyset$ .

Тогда заметим, что  $\Gamma(f(|\gamma_{i_s}|), C'_0, D_*) > \Gamma(\tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0), \tilde{S}(\zeta_0, 1/s), D_*)$  при всех  $s > s_0$  (см. [17, теорема 1.1.5, § 46]). Отсюда ввиду минорирования и по предложению 4.2

$$M(\Gamma(f(|\gamma_{i_s}|), C'_0, D_*)) \leq M(\Gamma(\tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0), \tilde{S}(\zeta_0, 1/s), D_*)) \rightarrow 0, \quad s \rightarrow \infty. \quad (4.11)$$

С другой стороны, напомним, что  $|\alpha_{i_s}| \subset d_{i_s} \subset d'_{i_s}$ . Тогда для каждой кривой  $\beta \in \Gamma(f(|\alpha_{i_s}|), C'_0, D_*)$  ввиду (4.9) имеем:

$$|\beta| \cap f(d'_{i_s}) \neq \emptyset \neq |\beta| \cap (D_* \setminus f(d'_{i_s})),$$

ввиду чего по [17, теорема 1.1.5, § 46], учитывая включение (4.10),

$$\Gamma(f(|\alpha_{i_s}|), C'_0, D_*) > \Gamma(f(|\gamma_{i_s}|), C'_0, D_*).$$

Отсюда и по (4.11) получаем, что  $M(\Gamma(f(|\alpha_{i_s}|), C'_0, D_*)) \rightarrow 0$  при  $s \rightarrow \infty$ , что противоречит соотношению (4.8). Полученное противоречие указывает на справедливость неравенства (4.6)  $\square$ .

**Теорема 4.1.** Пусть  $D$  и  $D_*$  – заданные области, лежащие в римановых поверхностях  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно,  $\overline{D}_*$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ ,  $p_0 \in \partial D$  и  $Q : D \rightarrow (0, \infty)$  – заданная измеримая относительно меры  $\tilde{h}$  функция. Пусть также  $f : D \rightarrow D_*$  – открытое дискретное замкнутое нижнее  $Q$ -отображение в точке  $p_0$  области  $D$  на область  $f(D) = D_*$ . Предположим, область  $D$  имеет локально квазиконформную границу, а граница области  $\overline{D}_*$  сильно достижима. Если при некотором  $0 < \varepsilon_0$  и всех  $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$  выполнены соотношения

$$\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{\|Q\|(t)} < \infty, \quad \int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{\|Q\|(t)} = \infty, \quad (4.12)$$

$\|Q\|(r) := \int_{\tilde{S}(p_0, r)} Q(p) ds_{\tilde{h}}(p)$ , то отображение  $f$  имеет непрерывное продолжение в точку  $p_0$ .

*Доказательство.* Предположим противное. Тогда, поскольку  $\overline{D}_*$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ , найдутся, по крайней мере, две последовательности  $p_i, p'_i \in D$ ,  $i = 1, 2, \dots$ , такие, что  $p_i \rightarrow p_0$ ,  $p'_i \rightarrow p_0$  при  $i \rightarrow \infty$ ,  $f(p_i) \rightarrow y$ ,  $f(p'_i) \rightarrow y'$  при  $i \rightarrow \infty$  и  $y' \neq y$ . Положим  $\Gamma_i^\delta := \bigcup_{r \in (2^{-i}, \delta)} f(\tilde{S}(p_0, r) \cap D)$ , где объединение следует понимать не в теоретико-множественном смысле, а именно как семейство поверхностей «от  $2^{-i}$  до  $\delta$ ». По лемме 2.3, с учётом леммы 2.1, найдётся  $0 < d_0 < \sup_{p \in D} \tilde{h}(p, p_0)$  такое, что для всякого  $0 < \delta_0 < d_0$

$$M(\Gamma_i^{\delta_0}) \geq \int_{2^{-i}}^{\delta_0} \frac{dr}{\|Q\|(r)} \quad \forall i \in \mathbb{N}, \quad (4.13)$$

где  $\|Q\|(r) = \int_{D(p_0, r)} Q(p) ds_{\tilde{h}}(p)$  –  $L_1$ -норма функции  $Q$  над окружностью  $D(p_0, r) := \tilde{S}(p_0, r) \cap D$ . Из (4.13) с учётом (4.12) вытекает, что

$$M(\Gamma_i^{\delta_0}) \rightarrow \infty, \quad i \rightarrow \infty. \quad (4.14)$$

С другой стороны, по лемме 4.1 найдутся  $0 < \delta'_0 < d_0$  и  $l_0 > 0$  такие, что

$$l(f(\tilde{S}(p_0, r) \cap D)) \geq l_0, \quad \forall r \in (0, \delta'_0),$$

где  $l$  обозначает длину штриховой линии в  $\mathbb{S}_*$ . В таком случае, функция

$$\rho(p) = \begin{cases} 1/l_0, & p \in D_*, \\ 0, & p \notin D_* \end{cases}$$

является допустимой для семейства  $\Gamma_i^{\delta'_0} := \bigcup_{r \in (2^{-i}, \delta'_0)} f(\tilde{S}(p_0, r) \cap D)$  и некоторого  $0 < \delta'_0 < d_0$ , поэтому

$$M(\Gamma_i^{\delta'_0}) \leq 1/l_0^2 \cdot \tilde{h}_*(D_*) < \infty,$$

поскольку  $\overline{D_*}$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$  и, значит,  $\tilde{h}_*$ -площадь  $D_*$  конечна. Последнее соотношение противоречит соотношению (4.14) при  $\delta_0 := \delta'_0$ . Полученное противоречие опровергает предположение, связанное с отсутствием предела у отображения  $f$  в точке  $p_0$ .  $\square$

*Доказательство теоремы 1.2* непосредственно вытекает из утверждений теорем 1.1 и 4.1.  $\square$

Предположим,  $p_0 \in \mathbb{S}$  и функция  $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}$  интегрируема относительно меры  $\tilde{h}$  в некоторой окрестности  $U$  точки  $p_0$ . Следуя [19, разд. 2] (см. также [9, разд. 6.1, гл. 6]), будем говорить, что функция  $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}$  имеет *конечное среднее колебание* в точке  $p_0 \in D$ , пишем  $\varphi \in FMO(p_0)$ , если

$$\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\tilde{h}(\tilde{B}(p_0, \varepsilon))} \int_{\tilde{B}(p_0, \varepsilon)} |\varphi(p) - \bar{\varphi}_\varepsilon| d\tilde{h}(p) < \infty,$$

где  $\bar{\varphi}_\varepsilon = \frac{1}{\tilde{h}(\tilde{B}(p_0, \varepsilon))} \int_{\tilde{B}(p_0, \varepsilon)} \varphi(p) d\tilde{h}(p)$ .

Пусть  $\varphi : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\varphi(x) = 0$  при  $x \notin D$  – неотрицательная функция, имеющая конечное среднее колебание в точке  $p_0 \in \overline{D} \subset \mathbb{S}$ . По [3, теорема 7.2.2] поверхность  $\mathbb{S}$  является 2-регулярной по Альфорсу, так что по [20, лемма 3] для некоторого  $0 < \varepsilon_0 < \text{dist}(p_0, \partial U)$ ,  $U$  – некоторая нормальная окрестность точки  $p_0$ ,

$$\int_{\varepsilon < \tilde{h}(p, p_0) < \varepsilon_0} \frac{\varphi(p) d\tilde{h}(p)}{\left(\tilde{h}(p, p_0) \log \frac{1}{\tilde{h}(p, p_0)}\right)^2} = O\left(\log \log \frac{1}{\varepsilon}\right) \quad (4.15)$$

при  $\varepsilon \rightarrow 0$ . В дальнейшем нам понадобится следующее вспомогательное утверждение, которое для пространства  $\mathbb{R}^n$  (см., напр., [9, лемма 7.4, гл. 7] либо [21, лемма 3.7]), а также для случая римановых многообразий (см. [22, лемма 4.2]) было установлено ранее.

**Предложение 4.5.** Пусть  $p_0 \in \mathbb{S}$ ,  $U$  – некоторая нормальная окрестность точки  $p_0$ ,  $0 < r_1 < r_2 < \text{dist}(p_0, \partial U)$ ,  $Q(p)$  – измеримая относительно меры  $\tilde{h}$  функция,  $Q : \mathbb{S} \rightarrow [0, \infty]$ ,  $Q \in L^1(U)$ . Положим  $\tilde{A} = \tilde{A}(p_0, r_1, r_2) = \{p \in \mathbb{S} : r_1 < \tilde{h}(p, p_0) < r_2\}$ ,  $\|Q\|(r) = \int_{\tilde{S}(p_0, r)} Q(p) ds_{\tilde{h}}(p)$ ,

$$\eta_0(r) := \frac{1}{J \cdot \|Q\|(r)}, \quad (4.16)$$

где

$$J = J(p_0, r_1, r_2) := \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\|Q\|(r)}.$$

Тогда

$$\frac{1}{J} = \int_{\tilde{A}(p_0, r_1, r_2)} Q(p) \cdot \eta_0^2(\tilde{h}(p, p_0)) d\tilde{h}(p) \leq \int_{\tilde{A}(p_0, r_1, r_2)} Q(p) \cdot \eta^2(\tilde{h}(p, p_0)) d\tilde{h}(p) \quad (4.17)$$

для любой измеримой по Лебегу функции  $\eta : (r_1, r_2) \rightarrow [0, \infty]$  такой, что

$$\int_{r_1}^{r_2} \eta(r) dr = 1. \quad (4.18)$$

*Доказательство.* Если  $J = \infty$ , то левая часть в соотношении (4.17) равна нулю и неравенство в (4.17) в этом случае очевидно. Заметим, что  $J \neq 0$ , поскольку  $\|Q\|(r) < \infty$  для п.в.  $r \in (r_1, r_2)$  ввиду условия  $Q \in L^1(U)$  (см. лемму 2.1). Предположим, что  $J < \infty$ . Тогда из (4.16) следует, что  $\|Q\|(r) \neq 0$  и  $\eta_0(r) \neq \infty$  п.в. в  $(r_1, r_2)$ . Полагаем

$$\alpha(r) = \|Q\|(r) \cdot \eta(r), \quad w(r) = 1/\|Q\|(r).$$

При почти всех  $r \in (r_1, r_2)$  будем иметь:

$$\eta(r) = \alpha(r)w(r)$$

и на основании леммы 2.1

$$C := \int_A Q(x) \cdot \eta^2(\tilde{h}(p, p_0)) d\tilde{h}(p) = \int_{r_1}^{r_2} \alpha^2(r) \cdot w(r) dr.$$

Применяя неравенство Иенсена с весом к выпуклой функции  $\varphi(t) = t^2$ , заданной в интервале  $\Omega = (r_1, r_2)$  с вероятностной мерой  $\nu(E) = \frac{1}{J} \int_E w(r) dr$  (см. [23, Теорема 2.6.2]) и делая замену переменных относительно меры (см. [8, теорема 15.1, гл. I]), получаем, что получаем, что

$$\left( \frac{1}{J} \int_{r_1}^{r_2} \alpha^2(r) w(r) dr \right)^{1/2} \geq \frac{1}{J} \int_{r_1}^{r_2} \alpha(r) w(r) dr = \frac{1}{J},$$

где мы также использовали тот факт, что  $\eta(r) = \alpha(r)w(r)$  удовлетворяет соотношению (4.18). Отсюда получаем:

$$C \geq \frac{1}{J},$$

что и доказывает (4.17).  $\square$

Теперь сформулируем и докажем следующее утверждение.

**Теорема 4.2.** *Заключение теоремы 1.2 имеет место, если вместо условий (1.14) потребовать, чтобы  $Q \in FMO(p_0)$ .*

*Доказательство.* Положим  $0 < \psi(t) = \frac{1}{(t \log \frac{1}{t})}$ . Заметим также, что при достаточно малых  $\varepsilon > 0$  выполнено  $\psi(t) \geq \frac{1}{t \log \frac{1}{t}}$ , поэтому  $I(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt \geq \log \frac{\log \frac{1}{\varepsilon}}{\log \frac{1}{\varepsilon_0}}$ . Положим  $\eta(t) := \psi(t)/I(\varepsilon, \varepsilon_0)$ , тогда в силу соотношения (4.15) найдётся постоянная  $C > 0$  такая, что

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{A}(p_0, \varepsilon, \varepsilon_0)} Q(p) \cdot \eta^2(\tilde{h}(p, p_0)) d\tilde{h}(p) &= \frac{1}{I^2(\varepsilon, \varepsilon_0)} \int_{\varepsilon < \tilde{h}(p, p_0) < \varepsilon_0} \frac{Q(p) d\tilde{h}(p)}{\left(\tilde{h}(p, p_0) \log \frac{1}{\tilde{h}(p, p_0)}\right)^2} \leq \\ &\leq C \cdot \left(\log \frac{\log \frac{1}{\varepsilon}}{\log \frac{1}{\varepsilon_0}}\right)^{-1} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0. \end{aligned} \quad (4.19)$$

Тогда из (4.17) учётом (4.19) вытекают условия (1.14), ввиду чего необходимое заключение следует прямо из теоремы 1.2.  $\square$

## 5 Равностепенная непрерывность семейств гомеоморфизмов

Нашей ближайшей целью является доказательство равностепенной непрерывности классов отображений, состоящих из соболевских гомеоморфизмов конечного искажения. Прежде всего, выясним вопрос о равностепенной непрерывности семейств во внутренних точках заданной области. Напомним некоторые определения. Пусть  $(X, d)$  и  $(X', d')$  – метрические пространства с расстояниями  $d$  и  $d'$ , соответственно. Семейство  $\mathfrak{F}$  отображений  $f : X \rightarrow X'$  называется *равностепенно непрерывным в точке  $x_0 \in X$* , если для любого  $\varepsilon > 0$  найдётся  $\delta > 0$  такое, что  $d'(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$  для всех  $x$  таких, что  $d(x, x_0) < \delta$  и для всех  $f \in \mathfrak{F}$ . Семейство  $\mathfrak{F}$  *равностепенно непрерывно*, если  $\mathfrak{F}$  равностепенно непрерывно в каждой точке  $x_0 \in X$ . Всюду далее, если не оговорено противное,  $(X, d) = (\mathbb{S}, \tilde{h})$  и  $(X', d') = (\mathbb{S}_*, \tilde{h}_*)$  – римановы поверхности с метриками  $\tilde{h}$  и  $\tilde{h}_*$ , соответственно.

Пусть  $Q : \mathbb{S} \rightarrow [0, \infty]$  – измеримая относительно меры  $\tilde{h}$  функция,  $Q(x) \equiv 0$  при всех  $x \notin D \subset \mathbb{S}$ . Говорят, что отображение  $f : D \rightarrow \mathbb{S}_*$  есть *кольцевое  $Q$ -отображение в точке  $p_0 \in \overline{D}$* , если для некоторого  $r_0 = r(p_0)$  и произвольных кольца  $\tilde{A} = \tilde{A}(p_0, r_1, r_2) = \{p \in \mathbb{S} : r_1 < \tilde{h}(p, p_0) < r_2\}$  и любых континуумов  $E_1 \subset \tilde{B}(p_0, r_1) \cap D$ ,  $E_2 \subset (\overline{\mathbb{S}} \setminus \tilde{B}(p_0, r_2)) \cap D$ , отображение  $f$  удовлетворяет соотношению

$$M(f(\Gamma(E_1, E_2, D))) \leq \int_A Q(p) \cdot \eta^2(\tilde{h}(p, p_0)) d\tilde{h}(p) \quad (5.1)$$

для каждой измеримой функции  $\eta : (r_1, r_2) \rightarrow [0, \infty]$ , такой что

$$\int_{r_1}^{r_2} \eta(r) dr \geq 1. \quad (5.2)$$

Область  $D \subset \mathbb{S}$  называется *равномерной областью*, если для всякого  $r > 0$  найдётся  $\delta > 0$  такое, что  $M(\Gamma(F, F^*, D)) \geq \delta$  для всяких континуумов  $F$  и  $F^*$  в  $D$ , удовлетворяющих условиям  $\tilde{h}(F) \geq r$  и  $\tilde{h}(F^*) \geq r$ . Области  $D_i$ ,  $i \in I$ , называются *равностепенно равномерными*, если для каждого  $r > 0$  указанное выше неравенство выполнено для каждого  $D_i$  с одним и тем же числом  $\delta$ .

Для заданного  $\delta > 0$ ,  $D \subset \mathbb{S}$  и измеримой относительно меры  $\tilde{h}$  функции  $Q : D \rightarrow [0, \infty]$  обозначим через  $\mathfrak{R}_{Q,\delta}(D)$  семейство всех гомеоморфизмов  $f : D \rightarrow \mathbb{S}_* \setminus G_f$  класса  $W_{\text{loc}}^{1,1}$  с конечным искажением, таких, что  $K_f(p) \leq Q(p)$  для почти всех  $p \in D$ , где  $G_f$  – некоторый континуум в  $D$  и  $\tilde{h}_*(G_f) = \sup_{x,y \in G_f} \tilde{h}_*(x,y) \geq \delta$ . Имеет место следующее утверждение.

**Лемма 5.1.** *Семейство отображений  $\mathfrak{R}_{Q,\delta}(D)$  равностепенно непрерывно в  $D$ , если  $\mathbb{S}_*$  – равномерная область, кроме того,  $Q \in L_{\text{loc}}^1$  и в каждой точке  $p_0 \in D$  выполнено одной из следующих условий: либо имеют место соотношения (1.14), либо  $Q \in FMO(p_0)$ .*

*Доказательство.* Поскольку  $\mathbb{S}$  – многообразие,  $\mathbb{S}$  локально компактно и локально линейно связно. Кроме того, множество  $f(D)$  является областью в  $\mathbb{S}_*$  по теореме Брауэра, см. [24, теорема VI 9 и следствие].

Заметим, что для некоторой неотрицательной измеримой функции  $\psi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$  такой, что  $I(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt < \infty$  при некотором  $\varepsilon_0 > 0$  и всех  $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ , выполняется условие:

$$\int_{\varepsilon < \tilde{h}(p, p_0) < \varepsilon_0} Q(x) \cdot \psi^2(\tilde{h}(p, p_0)) d\tilde{h}(p) = o(I^2(\varepsilon, \varepsilon_0)), \quad \varepsilon \rightarrow 0. \quad (5.3)$$

В самом деле, если имеют место соотношения (1.14), то (5.3) вытекает из предложения 4.5 путём выбора функции  $I(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dr}{\|Q\|(r)}$ . Если же  $Q \in FMO(p_0)$  в каждой точке  $p_0 \in D$ , то по теореме 4.2 выполнены и условия (1.14), а, значит, по доказанному выше, имеет место (5.3).

Наконец, по [1, лемма 3.1] отображение  $f \in \mathfrak{R}_{Q,\delta}(D)$  является кольцевым  $Q$ -гомеоморфизмом в  $D$ , поэтому желанное заключение вытекает из [25, лемма 5.1].  $\square$

Вернёмся к вопросу о равностепенной непрерывности в замыкании области. Для этой цели, рассмотрим следующий класс отображений. Для заданного  $\delta > 0$ ,  $D \subset \mathbb{S}$ , континуума  $A \subset D$  и измеримой относительно меры  $\tilde{h}$  функции  $Q : D \rightarrow [0, \infty]$ , обозначим  $\mathfrak{F}_{Q,\delta,A}(D)$  семейство всех гомеоморфизмов класса Соболева с конечным искажением  $f : D \rightarrow \mathbb{S}_* \setminus G_f$  в  $D$ , таких что  $G_f \subset \mathbb{S}_*$  – некоторый континуум, удовлетворяющий условию  $\tilde{h}_*(G_f) = \sup_{x,y \in G_f} \tilde{h}_*(x,y) \geq \delta$ , при этом,  $\tilde{h}_*(f(A)) \geq \delta$ . Аналог следующей теоремы получен в [26, теорема 3.1].

**Лемма 5.2.** *Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{S}$  и  $Q : \mathbb{S} \rightarrow (0, \infty)$  – локально интегрируемая в  $D$  функция,  $Q(x) \stackrel{\mathbb{S} \setminus D}{\equiv} 0$ . Предположим, что для каждой точки  $p_0 \in \overline{D}$  найдутся  $\varepsilon_0 =$*

$\varepsilon_0(p_0) > 0$  и функция  $\psi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$  такие, что

$$I(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt < \infty \quad \forall \varepsilon \in (0, \varepsilon_0) \quad (5.4)$$

и, кроме того,

$$\int_{\varepsilon < \tilde{h}(p, p_0) < \varepsilon_0} Q(x) \cdot \psi^2(\tilde{h}(p, p_0)) d\tilde{h}(p) = o(I^2(\varepsilon, \varepsilon_0)), \quad \varepsilon \rightarrow 0. \quad (5.5)$$

Пусть также  $D$  локально линейно связна на  $\partial D$ ,  $\partial D_f = \partial f(D)$ ,  $\overline{D}_f$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$  при каждом  $f \in \mathfrak{F}_{Q, \delta, A}(D)$ , кроме того, области  $D_f$  и  $\mathbb{S}_*$  равностепенно равномерны по классу  $f \in \mathfrak{F}_{Q, \delta, A}(D)$ . Тогда каждое  $f \in \mathfrak{F}_{Q, \delta, A}(D)$  имеет непрерывное продолжение  $\bar{f} : \overline{D} \rightarrow \overline{D}_f$  и, кроме того, семейство  $\mathfrak{F}_{Q, \delta, A}(\overline{D})$ , состоящее из всех продолженных отображений  $\bar{f} : \overline{D} \rightarrow \overline{D}_f$ , равностепенно непрерывно в  $\overline{D}$ .

*Доказательство.* Заметим, что  $\partial D_f = \partial f(D)$  сильно достижима при каждом  $f \in \mathfrak{F}_{Q, \delta, A}(D)$ . В самом деле, пусть  $x_0 \in \partial D_f$  и  $U$  – произвольная окрестность точки  $x_0$ . Выберем  $\varepsilon_1 > 0$  таким, что  $V := \tilde{B}(x_0, \varepsilon_1)$ ,  $\overline{V} \subset U$ . Пусть  $\partial U \neq \emptyset$  и  $\partial V \neq \emptyset$ , тогда  $\varepsilon_2 := \tilde{h}_*(\partial U, \partial V) > 0$ . Поскольку области  $D_f$  равностепенно равномерны и, кроме того,  $\tilde{h}_*(F) \geq \varepsilon_2$  и  $\tilde{h}_*(G) \geq \varepsilon_2$ , то для произвольных континуумов  $F$  и  $G$  в  $D_f$ , удовлетворяющих условиям  $F \cap \partial U \neq \emptyset \neq F \cap \partial V$  и  $G \cap \partial U \neq \emptyset \neq G \cap \partial V$ , выполнено неравенство

$$M(\Gamma(F, G, D_f)) \geq \delta,$$

где  $\delta > 0$  – некоторое число, зависящее только от  $\varepsilon_2$ . Таким образом,  $\partial D_f = \partial f(D)$  сильно достижима. Тогда по [1, лемма 6.1] каждое  $f \in \mathfrak{F}_{Q, \delta, A}(D)$  имеет непрерывное продолжение  $f : \overline{D} \rightarrow \overline{D}_f$ .

Заметим, что  $\mathfrak{F}_{Q, \delta, A}(D) \subset \mathfrak{R}_{Q, \delta}(D)$ . Кроме того, из соотношений (5.4)–(5.5) вытекают условия расходимости (1.14). В самом деле, выберем в (4.17)  $\eta(t) = \psi(t)/I(\varepsilon, \varepsilon_0)$  и воспользуемся предложением 4.5. Тогда желанное заключение немедленно вытекает из (4.17). В таком случае, равностепенная непрерывность семейства  $\mathfrak{F}_{Q, \delta, A}(D)$  во внутренних точках области  $D$  следует прямо из леммы 5.1.

Осталось доказать равностепенную непрерывность семейства  $\mathfrak{F}_{Q, \delta, A}(\overline{D})$  на  $\partial D$ . Предположим противное, тогда найдётся  $p_0 \in \partial D$  и число  $a > 0$  такое, что для каждого  $m = 1, 2, \dots$  существуют точка  $p_m \in \overline{D}$  и элемент  $\bar{f}_m$  семейства  $\mathfrak{F}_{Q, \delta, A}(\overline{D})$  такие, что  $\tilde{h}(p_0, p_m) < 1/m$  и  $\tilde{h}_*(\bar{f}_m(p_m), \bar{f}_m(p_0)) \geq a$ . Поскольку  $f_m := \bar{f}_m|_D$  имеет непрерывное продолжение в точку  $p_0$ , мы можем считать, что  $p_m \in D$ . Ввиду тех же соображений, найдётся последовательность  $p'_m \in D$ ,  $p'_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} p_0$  такая, что  $\tilde{h}_*(f_m(p'_m), \bar{f}_m(p_0)) \leq 1/m$ . Таким образом,

$$\tilde{h}_*(f_m(p_m), f_m(p'_m)) \geq a/2 \quad \forall m \in \mathbb{N}. \quad (5.6)$$

Поскольку  $D$  локально связна в точке  $p_0 \in \partial D \subset \mathbb{S}$ , а  $\mathbb{S}$  является гладким многообразием, то  $D$  также локально линейно связна в  $p_0$  (см. [9, предложение 13.1]), другими словами, для любой окрестности  $U$  точки  $p_0$  найдётся окрестность  $V \subset U$  этой же точки, такая что  $V \cap D$  – линейно связное множество. Тогда найдётся последовательность

окрестностей  $V_m$  точки  $p_0$  с  $\tilde{h}(V_m) \rightarrow 0$  при  $m \rightarrow \infty$ , такие что множества  $D \cap V_m$  являются областями и  $D \cap V_m \subset \tilde{B}(p_0, 2^{-m})$ . Не ограничивая общности рассуждений, переходя к подпоследовательности, если это необходимо, мы можем считать, что  $p_m, p'_m \in D \cap V_m$ . Соединим точки  $p_m$  и  $p'_m$  кривой  $\gamma_m : [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}$  такой, что  $\gamma_m(0) = p_m$ ,  $\gamma_m(1) = p'_m$  и  $\gamma_m(t) \in V_m \cap D$  при  $t \in (0, 1)$ . Обозначим через  $C_m$  образ кривой  $\gamma_m(t)$  при отображении  $f_m$ . Из соотношения (5.6) вытекает, что

$$\tilde{h}_*(C_m) \geq a/2 \quad \forall m \in \mathbb{N}, \quad (5.7)$$

где  $\tilde{h}_*(C_m)$  обозначает диаметр множества  $C_m$  в метрике  $\tilde{h}_*$ . См. рисунок 4 для иллюстрации. Не ограничивая общности, можно считать, что континуум  $A$  из определения




Рис. 4: К доказательству леммы 5.2

семейства  $\mathfrak{F}_{Q,\delta,A}(D)$  таков, что  $\tilde{B}(p_0, \varepsilon_0) \cap A = \emptyset$  и  $B(p_0, 2^{-m}) \cap A = \emptyset$ ,  $m = 1, 2, \dots$ . Пусть  $\Gamma_m$  – семейство кривых, соединяющих  $\gamma_m$  и  $A$  в  $D$ . По [1, лемма 3.1] отображение  $f \in \mathfrak{R}_{Q,\delta}(D)$  является кольцевым  $Q$ -гомеоморфизмом в  $\bar{D}$ , так что

$$M(f_m(\Gamma_m)) \leq \int_{\tilde{A}(p_0, 2^{-m}, \varepsilon_0)} Q(p) \cdot \eta^2(\tilde{h}(p, p_0)) d\tilde{h}(p) \quad (5.8)$$

для каждой измеримой функции  $\eta : (2^{-m}, \varepsilon_0) \rightarrow [0, \infty]$ , такой что  $\int_{2^{-m}}^{\varepsilon_0} \eta(r) dr \geq 1$ .

Заметим, что функция

$$\eta(t) = \begin{cases} \psi(t)/I(2^{-m}, \varepsilon_0), & t \in (2^{-m}, \varepsilon_0), \\ 0, & t \in \mathbb{R} \setminus (2^{-m}, \varepsilon_0), \end{cases}$$

где  $I(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt$ , удовлетворяет условию нормировки (5.2) при  $r_1 := 2^{-m}$ ,  $r_2 := \varepsilon_0$ , поэтому из условий (5.4)–(5.5) и (5.8) вытекает, что

$$M_p(f_m(\Gamma_m)) \leq \alpha(2^{-m}) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0, \quad (5.9)$$

где  $\alpha(\varepsilon)$  – некоторая неотрицательная функция, стремящаяся к нулю при  $\varepsilon \rightarrow 0$ , которая существует ввиду (5.4)–(5.5).



С другой стороны, заметим, что  $f_m(\Gamma_m) = \Gamma(C_m, f_m(A), D_{f_m})$ , где  $\tilde{h}(f_m(A)) \geq \delta$  при всех  $m \in \mathbb{N}$  по определению класса  $\mathfrak{F}_{Q,\delta,A}(D)$ . Учитывая (5.7) и определение равностепенно равномерного семейства областей, мы заключаем, что существует  $\sigma > 0$  такое, что

$$M(f_m(\Gamma_m)) = M(\Gamma(C_m, f_m(A), D_{f_m})) \geq \sigma \quad \forall m \in \mathbb{N},$$

что противоречит условию (5.9). Полученное противоречие доказывает лемму.  $\square$

Из леммы 5.2 ввиду предложения 4.5 и теоремы 4.2 получаем следующее утверждение.

**Теорема 5.1.** Пусть  $D$  – область в  $\mathbb{S}$  и  $Q : \mathbb{S} \rightarrow (0, \infty)$  – локально интегрируемая в  $D$  функция,  $Q(x) \stackrel{\mathbb{S} \setminus D}{\equiv} 0$ . Предположим, что в каждой точке  $p_0 \in \overline{D}$  выполнено одной из следующих условий: либо имеют место соотношения (1.14), либо  $Q \in FMO(p_0)$ . Пусть также  $D$  локально линейно связна на  $\partial D$ ,  $\overline{D}_f = \overline{f(D)}$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$  при каждом  $f \in \mathfrak{F}_{Q,\delta,A}(D)$ , кроме того, области  $D_f$  и  $\mathbb{S}_*$  равностепенно равномерны по классу  $f \in \mathfrak{F}_{Q,\delta,A}(D)$ .

Тогда каждое  $f \in \mathfrak{F}_{Q,\delta,A}(D)$  имеет непрерывное продолжение  $\bar{f} : \overline{D} \rightarrow \overline{D}_f$  и, кроме того, семейство  $\mathfrak{F}_{Q,\delta,A}(\overline{D})$ , состоящее из всех продолженных отображений  $\bar{f} : \overline{D} \rightarrow \overline{D}_f$ , равностепенно непрерывно в  $\overline{D}$ .

## 6 Равностепенная непрерывность классов Соболева с ветвлением

Вопрос о локальном и глобальном поведении отображений с ветвлением выглядит значительно сложнее, поскольку для таких отображений оценки вида (5.1) не были установлены. Вместо этого, мы вправе воспользоваться лишь оценками (1.13) или (2.8), которые установлены в данной работе. Как и в предыдущем разделе, начнём с исследования отображений во внутренних точках. Докажем, прежде всего, следующее вспомогательное утверждение.

**Предложение 6.1.** Пусть  $(X, d)$  – произвольное метрическое пространство с метрикой  $d$ ,  $D$  – область в  $X$  и  $F_j$ ,  $j = 1, 2, \dots$ , – последовательность континуумов в области  $D$  такая, что

$$d(F_j) = \sup_{x,y \in F_j} d(x,y) \geq \delta \quad \forall j = 1, 2, \dots$$

Пусть  $x_0 \in \overline{D}$  и

$$B(x_0, \delta/4) = \{x \in X : d(x, x_0) < \delta/4\}.$$

Тогда найдётся  $\varepsilon_0 > 0$  и последовательность континуумов  $C_j$  такие, что  $C_j \subset F_j \setminus B(x_0, \delta/4)$  и

$$d(C_j) = \sup_{x,y \in C_j} d(x,y) \geq \delta/4, \quad \forall j = 1, 2, \dots$$

*Доказательство.* Зафиксируем  $j \in \mathbb{N}$ . Если  $F_j \cap B(x_0, \delta/4) = \emptyset$ , доказывать нечего. Пусть  $F_j \cap B(x_0, \delta/4) \neq \emptyset$ .

Поскольку  $F_j$  – континуум в  $X$ , найдутся  $x_j, y_j \in F_j$  такие, что  $d(F_j) = d(x_j, y_j)$ . В силу того, что  $d(F_j) \geq \delta$ , хотя бы одна из точек  $x_j$  или  $y_j$  не принадлежит  $B(x_0, \delta/4)$ , поскольку, в противном случае по неравенству треугольника  $d(x_j, y_j) \leq d(x_j, x_0) + d(x_0, y_j) < \delta$ . Пусть для определённости  $x_j \in D \setminus B(x_0, \delta/4)$ . Тогда возможны две ситуации:

1)  $y_j \in B(x_0, \delta/4)$ . Пусть  $C_j$  есть  $x_j$ -компонента  $F_j \setminus B(x_0, \delta/4)$ . Поскольку  $F_j$  связно и  $F_j \cap B(x_0, \delta/4) \neq \emptyset$ , то  $C_j \cap \overline{F_j} \setminus C_j \neq \emptyset$  (см., напр., [17, разд. I.5.46]). Заметим, что

$$F_j \setminus C_j = (F_j \cap B(x_0, \delta/4)) \cup \bigcup_{\alpha \in A} K_\alpha, \quad (6.1)$$

где  $A$  – некоторый набор индексов  $\alpha$  и  $\bigcup_{\alpha \in A} K_\alpha$  – объединение всех компонент связности  $F_j \setminus B(x_0, \delta/4)$ , за исключением  $C_j$ . По [17, теорема 1.III.46.5],  $K_\alpha$  и  $C_j$  являются замкнутыми непересекающимися множествами в  $F_j \setminus B(x_0, \delta/4)$ ,  $\alpha \in A$ . Тогда ввиду (6.1), соотношение  $C_j \cap \overline{F_j} \setminus C_j \neq \emptyset$  возможно тогда и только тогда, когда  $C_j \cap \overline{B(x_0, \delta/4)} \neq \emptyset$ . Тогда найдётся  $z_j \in C_j \cap S(x_0, \delta/4)$ . По неравенству треугольника

$$\delta \leq d(x_j, y_j) \leq d(x_j, z_j) + d(z_j, y_j) < d(C_j) + \delta/2,$$

откуда вытекает, что  $d(C_j) > \delta/2$ , что и требовалось. Рассмотрим вторую ситуацию:

2)  $y_j \in D \setminus B(x_0, \delta/4)$ . Пусть, как и прежде,  $C_j$  –  $x_j$ -компонента  $F_j \setminus B(x_0, \delta/4)$ . Пусть  $D_j$  –  $y_j$ -компонента  $F_j \setminus B(x_0, \delta/4)$ . Рассуждая аналогично изложенному выше, заключаем, что найдутся  $z_j \in C_j \cap S(x_0, \delta/4)$  и  $z'_j \in D_j \cap S(x_0, \delta/4)$ . Тогда по неравенству треугольника

$$\delta \leq d(x_j, y_j) \leq d(x_j, z_j) + d(z_j, z'_j) + d(z'_j, y_j) \leq d(C_j) + d(D_j) + \delta/2,$$

откуда следует, что либо  $d(C_j) \geq \delta/4$ , либо  $d(D_j) \geq \delta/4$ , что и требовалось доказать.  $\square$

Докажем ещё одно вспомогательное утверждение.

**Лемма 6.1.** *Предположим, область  $D_*$  равномерна и  $\overline{D_*}$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ . Пусть  $f_k : D \rightarrow D_* \setminus G_k$ ,  $k = 1, 2, \dots$  – семейство открытых в  $D$  отображений таких, что  $\tilde{h}_*(G_k) = \sup_{x, y \in G_k} \tilde{h}_*(x, y) \geq \delta$ , где  $G_k \subset D_*$  – некоторый континуум и число  $\delta$  не зависит от  $k$ .*

Предположим,  $p_0 \in D$ ,  $p_k \in D$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , и  $\delta_0$  такие, что  $p_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} p_0$  и

$$\tilde{h}_*(f_k(p_k), f_k(p_0)) \geq \delta_0 \quad k = 1, 2, \dots \quad (6.2)$$

Тогда найдутся  $l_0 > 0$  и  $r_0 > 0$  такие, что при некотором  $k_0 \geq 1$

$$l(f_k(\tilde{S}(p_0, r))) \geq l_0, \quad \forall r \in (\tilde{h}(p_0, p_k), r_0), \quad \forall k \geq k_0, \quad (6.3)$$

где  $l$  обозначает длину кривой на римановой поверхности  $\mathbb{S}_*$ .

*Доказательство.* Предположим противное. Тогда для каждого  $i \in \mathbb{N}$  найдутся  $k_i > i$  и  $\tilde{h}(p_0, p_{k_i}) < r_i < 1/i$  такие, что

$$l(f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i))) < 1/i, \quad i = 1, 2, \dots, \quad r_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0. \quad (6.4)$$

Не ограничивая общности можно считать, что последовательность номеров  $k_i$ ,  $i = 1, 2, \dots$  – возрастающая. Пусть  $\zeta_i$ ,  $i = 1, 2, \dots$ , – произвольная последовательность точек из  $f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i))$ . Поскольку  $\overline{D_*}$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ , то мы без ограничения общности можем считать, что  $\zeta_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} \zeta_0$ ,  $\zeta_0 \in \overline{D_*}$ . Заметим, что  $\zeta_i = f_{k_i}(p'_i)$ ,  $p'_i \in \tilde{S}(p_0, r_i)$ , и что

$$G_{k_i} \subset D_* \setminus \overline{f_{k_i}(\tilde{B}(p_0, r_i))}, \quad (6.5)$$

поскольку по условию  $G_k \subset D_* \setminus f_k(D)$  при каждом  $k \in \mathbb{N}$ . Так как при каждом  $i \in \mathbb{N}$  отображение  $f_{k_i}$  открыто, имеем:

$$\partial f_{k_i}(\tilde{B}(p_0, r_i)) \subset f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i)). \quad (6.6)$$

Из предположения (6.4) вытекает, что

$$\tilde{h}_*(f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i))) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0, \quad \tilde{h}_*(f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i))) := \sup_{p_*, q_* \in f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i))} \tilde{h}_*(p_*, q_*).$$

Тогда для каждого  $s \in \mathbb{N}$  найдётся номер  $i_s \in \mathbb{N}$  такой, что

$$f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i)) \subset \tilde{B}(\zeta_0, 1/s), \quad i \geq i_s. \quad (6.7)$$

По предложению 6.1 найдётся  $s_0 \in \mathbb{N}$  и последовательность континуумов  $E_{k_i}$  таких, что

$$E_{k_i} \subset G_{k_i} \setminus \tilde{B}(\zeta_0, 1/s_0), \quad \tilde{h}_*(E_{k_i}) \geq \delta/4, \quad i = 1, 2, \dots \quad (6.8)$$

Зафиксируем  $s > s_0$  и рассмотрим семейство кривых  $\Gamma(f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i)), E_{k_i}, D_*)$  при  $i \geq i_s$ , см. рисунок 5. Пусть  $\gamma \in \Gamma(f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i)), E_{k_i}, D_*)$ , т.е.,  $\gamma = \gamma(t)$ ,  $t \in (0, 1)$ ,  $\gamma(0) \in$




Рис. 5: К доказательству леммы 6.1

$f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i))$ ,  $\gamma(1) \in E_{k_i}$  и  $\gamma(t) \in D_*$  при  $t \in (0, 1)$ . Ввиду (6.7) и (6.8)  $|\gamma| \cap \tilde{B}(\zeta_0, 1/s) \neq \emptyset \neq |\gamma| \cap (D_* \setminus \tilde{B}(\zeta_0, 1/s))$ , поэтому согласно [17, теорема 1.1.5, § 46] найдётся  $t_1 \in (0, 1)$  :  $\gamma(t_1) \in \tilde{S}(\zeta_0, 1/s)$ . Не ограничивая общности можно считать, что  $\gamma(t) \in D_* \setminus \tilde{B}(\zeta_0, 1/s)$  при  $t > t_1$ . Положим  $\gamma_1 := \gamma|_{[t_1, 1]}$ . Снова по (6.7) и (6.8)  $|\gamma_1| \cap \tilde{B}(\zeta_0, 1/s_0) \neq \emptyset \neq |\gamma_1| \cap (D_* \setminus \tilde{B}(\zeta_0, 1/s_0))$ ,

поэтому согласно [17, теорема 1.I.5, § 46] найдётся  $t_2 \in (t_1, 1) : \gamma_1(t_2) \in \tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0)$ . Не ограничивая общности, можно считать, что  $\gamma_1(t) \in \tilde{B}(\zeta_0, 1/s_0)$  при  $t \in (t_1, t_2)$ . Положим  $\gamma_2 := \gamma_1|_{[t_1, t_2]}$ ,  $\gamma_2 \in \Gamma(\tilde{S}(\zeta_0, 1/s), \tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0), \tilde{A}(\zeta_0, 1/s, 1/s_0))$ ,  $\tilde{A}(\zeta_0, 1/s, 1/s_0) = \{p_* \in \mathbb{S}_* : 1/s < \tilde{h}_*(p_*, \zeta_0) < 1/s_0\}$ . Из сказанного следует, что

$$\Gamma(f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i)), E_{k_i}, D_*) > \Gamma(\tilde{S}(\zeta_0, 1/s), \tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0), \tilde{A}(\zeta_0, 1/s, 1/s_0)), \quad i \geq i_s,$$

и, значит, ввиду [27, теорема 1(c)] и по предложению 4.2 при  $i \geq i_s$

$$M(\Gamma(f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i)), E_{k_i}, D_*)) \leq M(\Gamma(\tilde{S}(\zeta_0, 1/s), \tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0), \tilde{A}(\zeta_0, 1/s, 1/s_0))) \xrightarrow{s \rightarrow \infty} 0. \quad (6.9)$$

Зафиксируем  $\varepsilon > 0$  и для него отыщем номер  $S = S(\varepsilon)$  такой, что

$$M(\Gamma(\tilde{S}(\zeta_0, 1/s), \tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0), \tilde{A}(\zeta_0, 1/s, 1/s_0))) < \varepsilon, \quad s > S(\varepsilon).$$

Положим  $I_0 = I_0(\varepsilon) := i_{S(\varepsilon)}$ , тогда из (6.9) вытекает, что

$$M(\Gamma(f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i)), E_{k_i}, D_*)) < \varepsilon, \quad i > I_0 = I_0(\varepsilon). \quad (6.10)$$

Поскольку  $\mathbb{S}$  – гладкое многообразие, мы можем считать, что шары  $\tilde{B}(p_0, r_i)$  линейно связны при каждом  $i \in \mathbb{N}$ . Пусть  $\alpha_i$  – кривая, соединяющая  $p_{k_i}$  и  $p_0$  в  $\tilde{B}(p_0, r_i)$ . В силу предположения (6.2)  $\tilde{h}_*(f_{k_i}(|\alpha_i|)) \geq \delta_0$ . Тогда по определению равномерной области

$$M(\Gamma(f_{k_i}(|\alpha_i|), E_{k_i}, D_*)) > \varepsilon_1, \quad \forall i \in \mathbb{N}. \quad (6.11)$$

С другой стороны, ввиду (6.5) и (6.6)  $\Gamma(f_{k_i}(|\alpha_i|), E_{k_i}, D_*) > \Gamma(f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i)), E_{k_i}, D_*)$ , откуда ввиду [27, теорема 1(c)] и по (6.11)

$$\varepsilon_1 < M(\Gamma(f_{k_i}(|\alpha_i|), E_{k_i}, D_*)) \leq M(\Gamma(f_{k_i}(\tilde{S}(p_0, r_i)), E_{k_i}, D_*)). \quad (6.12)$$

Неравенства (6.12) и (6.10) противоречат друг другу, что и доказывает (6.3).  $\square$

Пусть  $D \subset \mathbb{S}$  и  $D_* \subset \mathbb{S}_*$  – фиксированные области. Для заданного  $\delta > 0$  и измеримой относительно меры  $\tilde{h}$  функции  $Q : \mathbb{S} \rightarrow (0, \infty)$ ,  $Q(x) \stackrel{\mathbb{S} \setminus D}{\equiv} 0$ , обозначим через  $\mathfrak{G}_{Q, \delta}(D)$  семейство всех открытых нижних  $Q$ -отображений  $f : D \rightarrow D_* \setminus G_f$  в  $D$  таких, что  $\tilde{h}_*(G_f) = \sup_{x, y \in G_f} \tilde{h}_*(x, y) \geq \delta$ , где  $G_f \subset D_*$  – некоторый континуум.

**Лемма 6.2.** *Предположим,  $Q$  удовлетворяет соотношениям (1.14) в  $D$ , либо  $Q \in FMO(p_0)$  в каждой точке  $p_0 \in D$ . Если область  $D_*$  равномерна и  $\overline{D_*}$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ , то семейство  $\mathfrak{G}_{Q, \delta}(D)$  равностепенно непрерывно в каждой точке  $p_0 \in D$ .*

*Доказательство.* Ввиду теоремы 4.2 достаточно установить лемму 6.2 в случае, когда  $Q$  удовлетворяет соотношениям (1.14) в  $D$ .

Предположим противное. Тогда найдутся  $p_0 \in D$ ,  $p_k \in D$ ,  $k = 1, 2, \dots$ ,  $f_k \in \mathfrak{G}_{Q, \delta}(D)$  и  $\delta_0$  такие, что  $p_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} p_0$  и

$$\tilde{h}_*(f_k(p_k), f_k(p_0)) \geq \delta_0. \quad (6.13)$$

По лемме 6.1 найдутся  $l_0 > 0$  и  $r_0 > 0$  такие, что при некотором  $k_0 \geq 1$

$$l(f_k(\tilde{S}(p_0, r))) \geq l_0, \quad \forall r \in (\tilde{h}(p_0, p_k), r_0), \quad \forall k \geq k_0. \quad (6.14)$$

Не ограничивая общности можно считать, что  $r_0 < \varepsilon_0$ , где  $\varepsilon_0$  – число из (1.14), существующее по условию леммы. В таком случае, функция

$$\rho(p) = \begin{cases} 1/l_0, & p \in D_*, \\ 0, & p \notin D_* \end{cases}$$

является допустимой для семейства  $\Gamma_k^{r_0}$ , состоящего из объединения всех кривых вида  $f_k(\tilde{S}(p_0, r))$  по  $r \in (\tilde{h}(p_0, p_k), r_0)$ ,  $k = 1, 2, \dots$ . В таком случае, по определению модуля семейств кривых,

$$M(\Gamma_k^{r_0}) \leq (1/l_0^2) \cdot \tilde{h}_*(D_*) < \infty, \quad (6.15)$$

поскольку  $\overline{D_*}$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ . С другой стороны, по лемме 2.3 и ввиду условий (1.14)

$$M(\Gamma_k^{r_0}) \geq \int_{\tilde{h}(p_0, p_k)}^{r_0} \frac{dr}{\|Q\|(r)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty. \quad (6.16)$$

Соотношения (6.15) и (6.16) противоречат друг другу, что опровергает предположение, сделанное в (6.13).  $\square$

Для заданных чисел  $\delta > 0$ ,  $N \in \mathbb{N}$ , области  $D \subset \mathbb{S}$  и измеримой относительно меры  $\tilde{h}$  функции  $Q : \mathbb{S} \rightarrow (0, \infty)$ ,  $Q(x) \stackrel{\mathbb{S} \setminus D}{\equiv} 0$ , обозначим через  $\mathfrak{S}_{Q, \delta, N}(D)$  семейство всех открытых дискретных отображений  $f : D \rightarrow D_* \setminus G_f$  класса  $W_{\text{loc}}^{1,1}(D)$  с конечным искажением таких, что  $K_f(p) \leq Q(p)$  при почти всех  $p \in D$ ,  $N(f, D) \leq N$  и  $\tilde{h}_*(G_f) = \sup_{x, y \in G_f} \tilde{h}_*(x, y) \geq \delta$ , где  $G_f \subset D_*$  – некоторый континуум. Имеет место следующая

**Теорема 6.1.** *Предположим,  $Q$  удовлетворяет соотношениям (1.14) в  $D$ , либо  $Q \in FMO(p_0)$  в каждой точке  $p_0 \in D$ . Если область  $D_*$  равномерна и  $\overline{D_*}$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ , то семейство  $\mathfrak{S}_{Q, \delta, N}(D)$  равностепенно непрерывно в каждой точке  $p_0 \in D$ .*

*Доказательство* немедленно следует из леммы 6.2 и теоремы 1.1.  $\square$

Перейдём к изучению равностепенной непрерывности в точках границы. Прежде всего, аналогично лемме 6.1 докажем следующее утверждение.

**Лемма 6.3.** *Предположим  $D, D_*$  – области в  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно,  $p_0 \in \partial D$ ,  $p_k \in D$ ,  $k = 1, 2, \dots$ ,  $p_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} p_0$ , область  $D$  имеет локально квазиконформную границу, области  $D_k := f_k(D)$  и  $D_*$  равностепенно равномерны по  $k \in \mathbb{N}$  и  $\overline{D_*}$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ . Пусть  $f_k : \overline{D} \rightarrow \overline{D_*}$ ,  $k = 1, 2, \dots$  – семейство отображений, таких, что  $f_k|_D$  открыто и замкнуто в  $D$  и*

1) для каждого  $k \in \mathbb{N}$  найдётся континуум  $A_k \subset f_k(D)$ , такой что  $\tilde{h}_*(A_k) \geq \delta > 0$  и  $\tilde{h}(f_k^{-1}(A_k), \partial D) \geq \delta > 0$ ;

2) найдётся  $\delta_0 > 0$  такое, что

$$\tilde{h}_*(f_k(p_k), f_k(p_0)) \geq \delta_0 \quad \forall k = 1, 2, \dots \quad (6.17)$$

Тогда найдутся  $l_0 > 0$  и  $r_0 > 0$  такие, что при некотором  $k_0 \geq 1$

$$l(f_k(\tilde{S}(p_0, r) \cap D)) \geq l_0, \quad \forall r \in (\tilde{h}(p_0, p_k), r_0), \quad \forall k \geq k_0, \quad (6.18)$$

где  $l$  обозначает длину штриховой линии  $\tilde{S}(p_0, r) \cap D$  на римановой поверхности  $\mathbb{S}_*$ .

*Доказательство.* Предположим противное. Тогда для каждого  $i \in \mathbb{N}$  найдутся  $k_i > i$  и  $\tilde{h}(p_0, p_{k_i}) < r_i < 1/i$  такие, что

$$l(g_i(\tilde{S}(p_0, r_i) \cap D)) < 1/i, \quad i = 1, 2, \dots, \quad r_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0, \quad g_i := f_{k_i}. \quad (6.19)$$

Не ограничивая общности можно считать, что последовательность номеров  $k_i$ ,  $i = 1, 2, \dots$  – возрастающая. Обозначим также  $p_{k_i} := q_i$ .

Поскольку  $D$  – область с локально квазиконформной границей, по предложению 4.4 найдётся стягивающаяся к  $p_0$  последовательность окрестностей  $U_m$ ,  $m = 1, 2, \dots$ , точки  $p_0$  такая, что  $U_m \cap D$  связно и, при этом, для каждого  $m = 1, 2, \dots$ , найдётся разрез  $\gamma_m$  области  $D$  такой, что  $U_m \cap D \subset D \setminus |\gamma_m|$ ,  $|\gamma_m| \subset \tilde{S}(p_0, r_{i_m})$  для некоторой подпоследовательности  $r_{i_m}$  последовательности  $r_i$ ,  $i = 1, 2, \dots$ . Поскольку  $f_k$  непрерывно в  $\overline{D}$ , найдётся последовательность  $p'_k \in D$  такая, что  $\tilde{h}_*(f_k(p_0), f_k(p'_k)) < 1/k$ . Положим  $q'_i := p'_{k_i}$ . Тогда из (6.17) вытекает, что при  $i \geq i_0 \in \mathbb{N}$

$$\tilde{h}_*(g_i(q_i), g_i(q'_i)) \geq \delta_0/2. \quad (6.20)$$

Для каждого  $m \in \mathbb{N}$  найдём такое  $j_m \in \mathbb{N}$ ,  $j_m > i_0$ , что  $q_{j_m}, q'_{j_m} \in U_m$ . Тогда из (6.20) вытекает, что

$$\tilde{h}_*(g_{j_m}(q_{j_m}), g_{j_m}(q'_{j_m})) \geq \delta_0/2 \quad \forall m = 1, 2, \dots. \quad (6.21)$$

Покажем, что

$$A_{j_m} \subset D_* \setminus g_{j_m}(U_m) \quad \forall m \geq m_0. \quad (6.22)$$

В самом деле, если  $y_l \in A_{j_{m_l}} \cap g_{j_{m_l}}(U_{m_l})$  для сколь угодно больших  $l = 1, 2, \dots$  и некоторой возрастающей последовательности  $m_l$ ,  $l = 1, 2, \dots$ , то  $y_l = g_{j_{m_l}}(x_l)$ ,  $x_l \in U_{m_l}$  и, одновременно,  $x_l \in g_{j_{m_l}}^{-1}(A_{j_{m_l}})$ . Так как  $U_{m_l}$  стягиваются к  $p_0 \in \partial D$  по построению, что  $x_l \rightarrow p_0$  при  $l \rightarrow \infty$ ,  $x_l \in g_{j_{m_l}}^{-1}(A_{j_{m_l}})$ , что противоречит условию  $\tilde{h}(f_k^{-1}(A_k), \partial D) \geq \delta > 0$ ,  $g_{j_{m_l}} = f_{k_{j_{m_l}}}$ . Таким образом, (6.22) имеет место.

Пусть теперь  $d_m$  – компонента связности  $D \setminus |\gamma_m|$ , содержащая  $U_m$ . Покажем, что для произвольного  $m = 1, 2, \dots$

$$\partial g_{j_m}(d_m) \cap g_{j_m}(D) \subset g_{j_m}(|\gamma_m|). \quad (6.23)$$

Зафиксируем  $m \in \mathbb{N}$  и рассмотрим  $y_m \in \partial g_{j_m}(d_m) \cap g_{j_m}(D)$ . Тогда найдётся  $y_{mk} \in g_{j_m}(d_m)$ ,  $y_{mk} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} y_m$ . Поскольку  $f_k$  открыты по условию, то  $g_{j_m}(D)$  – область, поэтому можно считать, что  $y_{mk} \in g_{j_m}(d_m) \cap g_{j_m}(D)$ . Так как  $y_{mk} \in g_{j_m}(d_m)$ , то  $y_{mk} = g_{j_m}(\eta_{mk})$ ,  $\eta_{mk} \in d_m$ . По предложению 4.4  $d_n \subset U_m$  при всех  $n \geq n(M)$ , поэтому  $d_m$  также стягиваются к точке  $p_0$  при  $m \rightarrow \infty$ . Таким образом, мы можем считать, что  $\overline{d_m}$  – компакт в  $\mathbb{S}$ , и что  $\eta_{mk} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \eta_0$ . Заметим, что случай  $\eta_0 \in \partial D$  невозможен, поскольку в этом случае по замкнутости отображения  $g_{j_m} = f_{k_{j_m}}$  имеем:  $y_m \in C(g_{j_m}, \partial D) \subset \partial g_{j_m}(D)$ , что противоречит выбору  $y_m$ . Тогда  $\eta_0 \in D$ . Возможны две ситуации: 1)  $\eta_0 \in d_m$  и 2)  $\eta_0 \in |\gamma_m|$ . Заметим, что случай 1) невозможен, поскольку, в этом случае,  $g_{j_m}(\eta_0) = y_m$  и  $y_m$  – внутренняя точка множества  $g_{j_m}(d_m)$  по открытости отображения  $g_{j_m}$ , что также противоречит выбору  $y_m$ . Таким образом, включение (6.23) установлено.

Пусть  $\xi_m$ ,  $m = 1, 2, \dots$ , – произвольная последовательность точек из  $|\gamma_m|$ . Поскольку  $\overline{D_*}$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ , то мы без ограничения общности можем считать, что  $\zeta_m := g_{j_m}(\xi_m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \zeta_0$ ,  $\zeta_0 \in \overline{D_*}$ . Из предположения (6.19) вытекает, что

$$\tilde{h}_*(g_{j_m}(|\gamma_m|)) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0, \quad \tilde{h}_*(g_{j_m}(|\gamma_m|)) := \sup_{p_*, q_* \in g_{j_m}(|\gamma_m|)} \tilde{h}_*(p_*, q_*).$$

Тогда для каждого  $s \in \mathbb{N}$  найдётся номер  $m_s \in \mathbb{N}$  такой, что

$$g_{j_m}(|\gamma_m|) \subset \tilde{B}(\zeta_0, 1/s), \quad m \geq m_s. \quad (6.24)$$

По предложению 6.1 найдётся  $s_0 \in \mathbb{N}$  и последовательность континуумов  $E_{j_m}$  таких, что

$$E_{j_m} \subset A_{j_m} \setminus \tilde{B}(\zeta_0, 1/s_0), \quad \tilde{h}_*(E_{j_m}) \geq \delta/4, \quad i = 1, 2, \dots \quad (6.25)$$

Зафиксируем  $s > s_0$  и рассмотрим семейство кривых  $\Gamma(g_{j_m}(|\gamma_m|), E_{j_m}, g_{j_m}(D))$  при  $m \geq m_s$ . Пусть  $\gamma \in \Gamma(g_{j_m}(|\gamma_m|), E_{j_m}, g_{j_m}(D))$ , т.е.,  $\gamma = \gamma(t)$ ,  $t \in (0, 1)$ ,  $\gamma(0) \in f_{k_i}(g_{j_m}(|\gamma_m|))$ ,  $\gamma(1) \in E_{j_m}$  и  $\gamma(t) \in g_{j_m}(D)$  при  $t \in (0, 1)$ . Ввиду (6.24) и (6.25)  $|\gamma| \cap \tilde{B}(\zeta_0, 1/s) \neq \emptyset \neq |\gamma| \cap (g_{j_m}(D) \setminus \tilde{B}(\zeta_0, 1/s))$ , поэтому согласно [17, теорема 1.I.5, § 46] найдётся  $t_1 \in (0, 1) : \gamma(t_1) \in \tilde{S}(\zeta_0, 1/s)$ . Не ограничивая общности можно считать, что  $\gamma(t) \in g_{j_m}(D) \setminus \tilde{B}(\zeta_0, 1/s)$  при  $t > t_1$ . Положим  $\gamma_1 := \gamma|_{[t_1, 1]}$ . Снова по (6.24) и (6.25)  $|\gamma_1| \cap \tilde{B}(\zeta_0, 1/s_0) \neq \emptyset \neq |\gamma_1| \cap (g_{j_m}(D) \setminus \tilde{B}(\zeta_0, 1/s_0))$ , поэтому согласно [17, теорема 1.I.5, § 46] найдётся  $t_2 \in (t_1, 1) : \gamma_1(t_2) \in \tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0)$ . Не ограничивая общности, можно считать, что  $\gamma_1(t) \in \tilde{B}(\zeta_0, 1/s_0)$  при  $t \in (t_1, t_2)$ . Положим  $\gamma_2 := \gamma_1|_{[t_1, t_2]}$ ,  $\gamma_2 \in \Gamma(\tilde{S}(\zeta_0, 1/s), \tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0), \tilde{A}(\zeta_0, 1/s, 1/s_0))$ ,  $\tilde{A}(\zeta_0, 1/s, 1/s_0) = \{p_* \in \mathbb{S}_* : 1/s < \tilde{h}_*(p_*, \zeta_0) < 1/s_0\}$ , см. рисунок 6. Из сказанного




Рис. 6: К доказательству леммы 6.3

следует, что при  $i \geq i_s$

$$\Gamma(g_{j_m}(|\gamma_m|), E_{j_m}, g_{j_m}(D)) > \Gamma(\tilde{S}(\zeta_0, 1/s), \tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0), \tilde{A}(\zeta_0, 1/s, 1/s_0)), \quad m \geq m_s,$$

и, значит, ввиду [27, теорема 1(с)] и по предложению 4.2 при  $m \geq m_s$

$$M(\Gamma(g_{j_m}(|\gamma_m|), E_{j_m}, g_{j_m}(D))) \leq M(\Gamma(\tilde{S}(\zeta_0, 1/s), \tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0), \tilde{A}(\zeta_0, 1/s, 1/s_0))), \quad (6.26)$$

$$M(\Gamma(\tilde{S}(\zeta_0, 1/s), \tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0), \tilde{A}(\zeta_0, 1/s, 1/s_0))) \xrightarrow{s \rightarrow \infty} 0.$$

Зафиксируем  $\varepsilon > 0$  и для него отыщем номер  $S = S(\varepsilon)$  такой, что

$$M(\Gamma(\tilde{S}(\zeta_0, 1/s), \tilde{S}(\zeta_0, 1/s_0), \tilde{A}(\zeta_0, 1/s, 1/s_0))) < \varepsilon, \quad s > S(\varepsilon).$$

Положим  $M_0 = M_0(\varepsilon) := m_{S(\varepsilon)}$ , тогда из (6.9) вытекает, что

$$M(\Gamma(g_{j_m}(|\gamma_m|), E_{j_m}, g_{j_m}(D))) < \varepsilon, \quad m > M_0 = M_0(\varepsilon). \quad (6.27)$$

Соединим теперь точки  $q_{j_m}$  и  $q'_{j_m}$  кривой  $\alpha_m \subset U_m$ . В силу предположения (6.20)  $\tilde{h}_*(g_{j_m}(|\alpha_m|)) \geq \delta_0/2$ . Тогда по определению равномерной области существует  $\varepsilon_1 > 0$  такое, что

$$M(\Gamma(g_{j_m}(|\alpha_m|), E_{j_m}, g_{j_m}(D))) > \varepsilon_1, \quad m \in \mathbb{N} \quad (6.28)$$

С другой стороны, по (6.22) и (6.23)  $\Gamma(g_{j_m}(|\alpha_m|), E_{j_m}, g_{j_m}(D)) > \Gamma(g_{j_m}(|\gamma_m|), E_{j_m}, g_{j_m}(D))$ , откуда ввиду [27, теорема 1(с)] и по (6.11)

$$\varepsilon_1 < M(\Gamma(g_{j_m}(|\alpha_m|), E_{j_m}, g_{j_m}(D))) \leq M(\Gamma(g_{j_m}(|\gamma_m|), E_{j_m}, g_{j_m}(D))), \quad m = 1, 2, \dots \quad (6.29)$$

Неравенства (6.29) и (6.27) противоречат друг другу, что и доказывает (6.18).  $\square$

Пусть  $D, D_*$  – области в  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно. Для заданного  $\delta > 0$  и измеримой относительно меры  $\tilde{h}$  функции  $Q : \mathbb{S} \rightarrow (0, \infty)$ ,  $Q(x) \stackrel{\mathbb{S} \setminus D}{\equiv} 0$ , обозначим через  $\mathfrak{L}_{Q, \delta}(D)$  семейство всех открытых дискретных замкнутых нижних  $Q$ -отображений  $f : D \rightarrow D_*$ , для которых: 1) существует континуум  $G_f \subset D_*$  такой, что  $f : D \rightarrow D_* \setminus G_f$  и  $\tilde{h}_*(G_f) := \sup_{x, y \in G_f} \tilde{h}_*(x, y) \geq \delta$ ; 2) существует континуум  $A_f \subset f(D)$  такой, что  $\tilde{h}_*(A_f) \geq \delta$  и  $\tilde{h}(f^{-1}(A_f), \partial D) \geq \delta$ . Имеет место следующая

**Теорема 6.2.** *Предположим, выполнены следующие условия:*

1)  $Q$  локально интегрируема в  $D$  и либо удовлетворяет (1.14), либо  $Q \in FMO(p_0)$  в каждой точке  $p_0 \in \overline{D}$ ;

2) области  $D_f = f(D)$  и  $D_*$  равномерно равномерно по  $f \in \mathfrak{L}_{Q, \delta}(D)$ ;

3) область  $D$  имеет локально квазиконформную границу;

4) множество  $\overline{D}_*$  является компактом в  $\mathbb{S}_*$ .

Тогда каждое отображение  $f \in \mathfrak{L}_{Q, \delta}(D)$  имеет непрерывное продолжение  $\bar{f} : \overline{D} \rightarrow \overline{D}_*$  и семейство  $\mathfrak{L}_{Q, \delta}(\overline{D})$ , состоящее из всех продолженных отображений  $\bar{f}$ , равномерно непрерывно в  $\overline{D}$ .

*Доказательство.* Рассуждая аналогично началу доказательства леммы 5.2, заключаем, что область  $D_f = f(D)$ ,  $f \in \mathfrak{L}_{Q, \delta}(D)$ , имеет сильно достижимую границу. В таком случае, возможность непрерывного продолжения  $\bar{f} : \overline{D} \rightarrow \overline{D}_*$  вытекает из теоремы 4.1,



а равностепенная непрерывность  $\mathfrak{L}_{Q,\delta}(\overline{D})$  в  $D$  – из леммы 6.2, поскольку  $\mathfrak{L}_{Q,\delta}(D) \subset \mathfrak{G}_{Q,\delta}(D)$ . Осталось показать равностепенную непрерывность семейства  $\mathfrak{L}_{Q,\delta}(\overline{D})$  в  $\partial D$ .

Предположим противное. Тогда найдутся  $p_0 \in \partial D$ ,  $p_k \in \overline{D}$ ,  $k = 1, 2, \dots$ ,  $f_k \in \mathfrak{L}_{Q,\delta}(\overline{D})$  и  $\delta_0$  такие, что  $p_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} p_0$  и

$$\tilde{h}_*(f_k(p_k), f_k(p_0)) \geq \delta_0. \quad (6.30)$$

По теореме 4.1 мы можем считать, что  $p_k \in D$ , кроме того, по лемме 6.1 найдутся  $l_0 > 0$  и  $r_0 > 0$  такие, что при некотором  $k_0 \geq 1$

$$l(f_k(\tilde{S}(p_0, r))) \geq l_0, \quad \forall r \in (\tilde{h}(p_0, p_k), r_0), \quad \forall k \geq k_0, \quad (6.31)$$

где  $l$  обозначает длину кривой на римановой поверхности  $\mathbb{S}_*$ . Не ограничивая общности можно считать, что  $r_0 < \varepsilon_0$ , где  $\varepsilon_0$  – число из (1.14), существующее по условию леммы. В таком случае, функция

$$\rho(p) = \begin{cases} 1/l_0, & p \in D_*, \\ 0, & p \notin D_* \end{cases}$$

является допустимой для семейства  $\Gamma_k^{r_0}$ , состоящего из объединения по  $r \in (\tilde{h}(p_0, p_k), r_0)$  всех штриховых линий вида  $f_k(\tilde{S}(p_0, r))$ ,  $k = 1, 2, \dots$ . В таком случае, по определению модуля семейств кривых,

$$M(\Gamma_k^{r_0}) \leq (1/l_0^2) \cdot \tilde{h}_*(D_*) < \infty, \quad (6.32)$$

поскольку  $\overline{D}_*$  – компакт в  $\mathbb{S}_*$ . С другой стороны, по лемме 2.3 и ввиду условий (1.14)

$$M(\Gamma_k^{r_0}) \geq \int_{\tilde{h}(p_0, p_k)}^{r_0} \frac{dr}{\|Q\|(r)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty. \quad (6.33)$$

Соотношения (6.32) и (6.33) противоречат друг другу, что опровергает предположение, сделанное в (6.30).  $\square$

Пусть  $D, D_*$  – области в  $\mathbb{S}$  и  $\mathbb{S}_*$ , соответственно. Для заданного  $\delta > 0$ , натурального числа  $N \geq 1$  и измеримой относительно меры  $\tilde{h}$  функции  $Q : \mathbb{S} \rightarrow (0, \infty)$ ,  $Q(x) \stackrel{\mathbb{S} \setminus D}{\equiv} 0$ , обозначим через  $\mathfrak{M}_{Q,\delta,N}(D)$  семейство всех открытых дискретных замкнутых отображений  $f : D \rightarrow D_*$  класса  $W_{\text{loc}}^{1,1}(D)$  с конечным искажением, для которых: 1) существует континуум  $G_f \subset D_*$  такой, что  $f : D \rightarrow D_* \setminus G_f$  и  $\tilde{h}_*(G_f) := \sup_{x,y \in G_f} \tilde{h}_*(x,y) \geq \delta$ ; 2) существует континуум  $A_f \subset f(D)$  такой, что  $\tilde{h}_*(A_f) \geq \delta$  и  $\tilde{h}(f^{-1}(A_f), \partial D) \geq \delta$ ; 3)  $K_f(p) \leq Q(p)$  для почти всех  $p \in D$ ; 4)  $N(f, D) \leq N$ .

Имеет место следующая

**Теорема 6.3.** *Предположим, выполнены следующие условия:*

1)  $Q$  локально интегрируема в  $D$  и либо удовлетворяет (1.14), либо  $Q \in FMO(p_0)$  в каждой точке  $p_0 \in \overline{D}$ ;

2) области  $D_f = f(D)$  и  $D_*$  равностепенно равномерны по  $f \in \mathfrak{M}_{Q,\delta,N}(D)$ ;

3) область  $D$  имеет локально квазиконформную границу;

4) множество  $\overline{D}_*$  является компактом в  $\mathbb{S}_*$ .

Тогда каждое отображение  $f \in \mathfrak{M}_{Q,\delta,N}(D)$  имеет непрерывное продолжение  $\bar{f} : \overline{D} \rightarrow \overline{D}_*$  и семейство  $\mathfrak{M}_{Q,\delta,N}(\overline{D})$ , состоящее из всех продолженных отображений  $\bar{f}$ , равномерно непрерывно в  $\overline{D}$ .

Доказательство теоремы 6.3 немедленно вытекает из теорем 6.2 и 1.1.  $\square$

## Список литературы

- [1] *Ryazanov V., Volkov S.* On the Boundary Behavior of Mappings in the Class  $W_{loc}^{1,1}$  on Riemann Surfaces // Complex Analysis and Operator Theory. – 2017. – **11**. – P. 1503–1520.
- [2] *Крушкаль С.Л., Апанасов Б.Н., Гусевский Н.А.* Униформизация и клейновы группы. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, 1979.
- [3] *Бердон А.* Геометрия дискретных групп. – Москва: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 304 с.
- [4] *Väisälä J.* Lectures on  $n$ -Dimensional Quasiconformal Mappings. – Lecture Notes in Math. 229, Berlin etc.: Springer-Verlag, 1971.
- [5] *Heinonen J.* Lectures on Analysis on metric spaces. – New York: Springer Science+Business Media, 2001.
- [6] *Väisälä J.* Discrete open mappings on manifolds // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A 1 Math. – 1966. – V. **392**. – P. 1–10.
- [7] *Федерер Г.* Геометрическая теория меры. – Москва: Наука, 1987.
- [8] *Сакс С.* Теория интеграла. – М.: ИЛ, 1949.
- [9] *Martio O., Ryazanov V., Srebro U. and Yakubov E.* Moduli in Modern Mapping Theory. – New York: Springer Science + Business Media, LLC, 2009.
- [10] *Ильютко Д.П., Севостьянов Е.А.* Об открытых дискретных отображениях с неограниченной характеристикой на римановых многообразиях // Мат. Сборник. – 2016. – Т. **207**, № 4. – С. 65–112.
- [11] *Мазья В.Г.* Пространства Соболева. – Издательство ленинградского университета, Ленинград, 1985.
- [12] *Lomako T., Salimov R., Sevost'yanov E.* On equicontinuity of solutions to the Beltrami equations // Ann. Univ. Bucharest (math. series). – 2010. – V. **LIX**, no. 2. – P. 263–274.
- [13] *Севостьянов Е.А.* О локальном поведении открытых дискретных отображений классов Орлича-Соболева // Укр. матем. ж. – 2016. – Т. **68**, № 9. – С. 1259–1272; translation "On the local behavior of Open Discrete Mappings from the Orlicz-Sobolev Classes" in Ukr. Math. J. – 2017. – V. **68**, no. 9. – P. 1447–1465.

- [14] *Lehto O., Virtanen O.* Quasiconformal Mappings in the Plane. – Springer: New York etc., 1973.
- [15] *Vuorinen M.* Exceptional sets and boundary behavior of quasiregular mappings in  $n$ -space // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A 1. Math. Dissertationes. – 1976. – V. **11**. – P. 1–44.
- [16] *Vuorinen M.* Conformal Geometry and Quasiregular Mappings. – Berlin etc.: Springer-Verlag, 1988.
- [17] *Кураатовский К.* Топология, т. 2. – М.: Мир, 1969.
- [18] *Näkki R.* Prime ends and quasiconformal mappings // J. Anal. Math. – 1979. – V. **35**. – P. 13–40.
- [19] *Игнатъев А., Рязанов В.* Конечное среднее колебание в теории отображений // Укр. матем. вестник. – 2005. – Т. **2**, № 3. – С. 395–417.
- [20] *Смолова Е.С.* Граничное поведение кольцевых  $Q$ -гомеоморфизмов в метрических пространствах // Укр. матем. ж. – 2010. – Т. **62**, № 5. – С. 682–689.
- [21] *Ryazanov V., Sevost'yanov E.* Toward the theory of ring  $Q$ -homeomorphisms // Israel J. Math. – 2008. – V. **168**. – P. 101–118.
- [22] *Афанасьева Е.С., Рязанов В.И., Салимов Р.Р.* Об отображениях в классах Орлика–Соболева на римановых многообразиях // Укр. мат. вестник. – 2011. – **8**, по. 3. – С. 319–342.
- [23] *Ransford Th.* Potential Theory in the Complex Plane. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995.
- [24] *Hurewicz W., Wallman H.* Dimension Theory. – Princeton: Princeton Univ. Press, 1948.
- [25] *Sevost'yanov E.* On boundary extension of mappings in metric spaces in terms of prime ends // Ann. Acad. Sci. Fenn. (accepted for print).
- [26] *Näkki R. and Palka B.* Uniform equicontinuity of quasiconformal mappings // Proc. Amer. Math. Soc. – 1973. – **37**, no. 2. – P. 427–433.
- [27] *Fuglede B.* Extremal length and functional completion // Acta Math. – 1957. – V. **98**. – P. 171–219.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Евгений Александрович Севостьянов**

Житомирский государственный университет им. И. Франко

кафедра математического анализа, ул. Большая Бердичевская, 40

г. Житомир, Украина, 10 008

тел. +38 066 959 50 34 (моб.), e-mail: esevostyanov2009@gmail.com