

Spectra of Cayley graphs *

W. Guo, D. V. Lytkina, V. D. Mazurov, D. O. Revin

Abstract

Let G be a group and $S \subseteq G$ its subset such that $S = S^{-1}$, where $S^{-1} = \{s^{-1} \mid s \in S\}$. Then the Cayley graph $\text{Cay}(G, S)$ is an undirected graph Γ with the vertex set $V(\Gamma) = G$ and the edge set $E(\Gamma) = \{(g, gs) \mid g \in G, s \in S\}$. A graph Γ is said to be *integral* if every eigenvalue of the adjacency matrix of Γ is integer. In the paper, we prove the following theorem: *if a subset $S = S^{-1}$ of G is normal and $s \in S \Rightarrow s^k \in S$ for every $k \in \mathbb{Z}$ such that $(k, |s|) = 1$, then $\text{Cay}(G, S)$ is integral. In particular, if $S \subseteq G$ is a normal set of involutions, then $\text{Cay}(G, S)$ is integral. We also use the theorem to prove that if $G = A_n$ and $S = \{(12i)^{\pm 1} \mid i = 3, \dots, n\}$, then $\text{Cay}(G, S)$ is integral. Thus, we give positive solutions for both problems 19.50(a) and 19.50(b) in “Kourovka Notebook”.*

Key words: Cayley graph, adjacency matrix of a graph, spectrum of a graph, integral graph, complex group algebra, irreducible module, character of a group.

1 Введение

Мы рассматриваем только конечные группы и графы и используем термины “группа” и “граф” в значении “конечная группа” и “конечный граф”. Символами G и Γ соответственно всегда обозначаются некоторая группа и некоторый граф. При этом $V = V(\Gamma)$ и $E = E(\Gamma)$ — множества вершин и ребер графа Γ . Матрицей смежности графа Γ с множеством вершин V и множеством ребер E называется матрица $(a_{ij}) \in M_{|V|}(\mathbb{C})$, в которой строки и столбцы индексированы элементами множества V и

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & (i, j) \in E; \\ 0, & (i, j) \notin E \end{cases} \quad \text{для всех } i, j \in V.$$

Граф Γ называется *целочисленным*, если его спектр, т. е. спектр его матрицы смежности, состоит из целых чисел.

Пусть $S \subseteq G$. Граф Кэли $\text{Cay}(G, S)$ группы G , ассоциированный с множеством S , — это граф Γ с множеством вершин $V(\Gamma) = G$ и множеством ребер $E(\Gamma) = \{(g, gs) \mid g \in G, s \in S\}$. Далее мы будем предполагать, что множество S , с которым ассоциирован граф $\text{Cay}(G, S)$,

- не содержит 1, что равносильно отсутствию петель в $\text{Cay}(G, S)$, и

*Исследования первого автора поддержаны Национальным естественно-научным фондом Китая (NNSF of China), грант #11771409. Исследования четвертого автора поддержаны Президентом Китайской академии наук (CAS President’s International Fellowship Initiative, PIFI), грант #2016VMA078.

- *симметрично*, т. е. $S = S^{-1}$, где $S^{-1} = \{s^{-1} \mid s \in S\}$.

Последнее условие позволяет нам рассматривать граф $\text{Cay}(G, S)$ как неориентированный граф.

Мы будем рассматривать только неориентированные графы без петель. Матрица смежности такого графа симметрична, и поэтому ее спектр состоит из действительных чисел.

Нам понадобятся еще два определения для формулировки основных результатов.

Подмножество $S \subseteq G$ называется *нормальным*, если $S = S^G = \{s^g \mid g \in G\}$ (здесь $s^g = g^{-1}sg$ — элемент, сопряженный с s с помощью элемента $g \in G$).

Известно, что для элемента $s \in G$ порядка m множество порождающих элементов циклической группы $\langle s \rangle$ совпадает с множеством

$$\{s^k \mid k \in \mathbb{Z}, (k, m) = 1\} = \{s^k \mid 0 \leq k \leq m - 1, (k, m) = 1\}$$

и его мощность равна $\phi(m)$, где ϕ — функция Эйлера, принимающая на натуральном числе m с каноническим примарным разложением $m = p_1^{\alpha_1} \dots p_t^{\alpha_t}$ значение

$$\phi(m) = p_1^{\alpha_1 - 1}(p_1 - 1) \dots p_t^{\alpha_t - 1}(p_t - 1).$$

Подмножество $S \subseteq G$ назовем *эйлеровым*, если множество

$$\{x \in G \mid \langle x \rangle = \langle s \rangle\} = \{s^k \mid 0 \leq k \leq |s| - 1, (k, |s|) = 1\}$$

содержится в S для любого $s \in S$. Заметим, что всякое эйлерово множество симметрично, поскольку $\langle s \rangle = \langle s^{-1} \rangle$ для любого $s \in G$. Если симметричное множество $S \subseteq G$ таково, что $\phi(|s|) \leq 2$ или, что то же самое, $|s| \in \{2, 3, 4, 6\}$ для любого $s \in S$, то оно эйлерово.

В “Коуровской тетради” [1] записаны следующие две проблемы.

Проблема 1 [1, вопрос 19.50(a)] *Верно ли, что если $S \subseteq G$ — нормальное множество элементов порядка 2, то граф $\text{Cay}(G, S)$ целочисленный?*

Проблема 2 [1, вопрос 19.50(b)] *Верно ли, что если A_n — знакопеременная группа степени n и $S = \{(12i)^{\pm 1} \mid i = 3, \dots, n\}$, то граф $\text{Cay}(A_n, S)$ целочисленный?*

В данной заметке мы выведем положительный ответ на оба эти вопроса из следующего утверждения.

Теорема 1 *Если S — эйлерово нормальное подмножество в группе G , то граф $\text{Cay}(G, S)$ целочисленный.*

Доказательство этой теоремы дается методами теории характеров и не зависит от каких-либо других результатов о целочисленности графов.

Частным случаем теоремы 1 оказывается [3, теорема 1] — результат, аналогичный теореме 1, но с дополнительным предположением о нильпотентности группы G .

Положительное решение проблемы 1 дает

Следствие 1 *Если порядки элементов нормального симметричного подмножества S в группе G принадлежат множеству $\{2, 3, 4, 6\}$, то граф $\text{Cay}(G, S)$ целочисленный.*

Частным случаем нормального множества элементов порядка 2 (которое автоматически будет симметричным) является множество всех транспозиций в симметрической группе. Поэтому мы получаем независимое доказательство следующего утверждения, установленного в [3, теорема 2] с помощью целочисленности так называемого *звездного графа* $\text{Ca}_y(G, S)$, где $G = S_n$ — симметрическая группа степени n , а $S = \{(1i) \mid 1 < i \leq n\}$ [4, теорема 1], [5, следствие 2.1].

Следствие 2 *Граф $\text{Ca}_y(G, S)$, где $G = S_n$, а $S = \{(ij) \mid 1 \leq i < j \leq n\}$, является целочисленным.*

Независимое от [4, теорема 1] и [5, следствие 2.1] доказательство целочисленности самого звездного графа вытекает из следствия 2 и еще одного следствия теоремы 1:

Следствие 3 *Пусть R — эйлерово нормальное подмножество в группе G и H — подгруппа в G . Положим $S = R \setminus (R \cap H)$. Тогда граф $\text{Ca}_y(G, S)$ целочисленный.*

Следствие 4 *Граф $\text{Ca}_y(G, S)$, где $G = S_n$, а $S = \{(1i) \mid 1 < i \leq n\}$, является целочисленным.*

Аналогичные соображения позволяют также получить положительное решение проблемы 2.

Следствие 5 *Граф $\text{Ca}_y(G, S)$, где $G = A_n$ — знакопеременная группа степени n , а $S = R \cup R^{-1}$ для $R = \{(12i) \mid i = 3, \dots, n\}$, является целочисленным.*

Сочетание следствий 1 и 3, по-видимому, может быть полезно для нахождения новых целочисленных графов Кэли.

2 Обозначения

Мы будем использовать стандартные сведения, понятия и обозначения из теории представлений и характеров, которые могут быть найдены читателем в [2].

$\mathbb{C}G$ — комплексная групповая алгебра группы G .

$\text{Irr}(G)$ — множество неприводимых обыкновенных характеров группы G .

V_χ — некоторый $\mathbb{C}G$ -модуль, отвечающий (необязательно неприводимому) характеру χ группы G .

\mathfrak{X}_χ — представление группы G и алгебры $\mathbb{C}G$, отвечающее характеру χ .

a_V для $\mathbb{C}G$ -модуля V и элемента $a \in \mathbb{C}G$ — линейное преобразование пространства V , задаваемое правилом $v \mapsto va$.

a_χ для элемента $a \in \mathbb{C}G$ — линейное преобразование a_{V_χ} пространства V_χ .

$[\varphi]_B$ для линейного преобразования φ векторного пространства V с базисом B — матрица преобразования φ в базисе B .

$[\varphi]$ для линейного преобразования φ векторного пространства V — матрица преобразования φ в некотором базисе пространства V .

ω_χ для $\chi \in \text{Irr}(G)$ — гомоморфизм комплексных алгебр $Z(\mathbb{C}G) \rightarrow \mathbb{C}$, такой, что $[a_\chi] = \omega_\chi(a)I$ для любого $a \in Z(\mathbb{C}G)$ [2, стр. 35]. Здесь I — единичная матрица размера $\chi(1) \times \chi(1)$.

\bar{S} для множества S элементов группы G — элемент $\sum_{s \in S} s \in \mathbb{C}G$.

Под *спектром элемента* $a \in \mathbb{C}G$ на $\mathbb{C}G$ -модуле V будем понимать спектр линейного преобразования a_V .

Любой элемент $a \in \mathbb{C}G$ мы отождествляем с умножением справа на a элементов регулярного модуля. В частности, по умолчанию *спектр элемента* $a \in \mathbb{C}G$ — это спектр a на регулярном модуле.

3 Предварительные результаты

Напомним, что комплексное число называется *алгебраическим целым*, если оно является корнем некоторого многочлена с целыми коэффициентами и старшим коэффициентом 1. Известно, что алгебраические целые числа образуют подкольцо в \mathbb{C} [2, следствие 3.5] и что число $\alpha \in \mathbb{Q}$ является алгебраическим целым тогда и только тогда, когда $\alpha \in \mathbb{Z}$ [2, лемма 3.2].

Лемма 1 Пусть $\mathfrak{X} : G \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{C})$ — представление группы G с характером χ и $g \in G$ — элемент порядка m . Тогда

- (1) матрица $\mathfrak{X}(g)$ подобна диагональной матрице $\text{diag}(\zeta_1, \dots, \zeta_n)$, такой, что $\zeta_i^m = 1$ для всех $i = 1, \dots, n$.
- (2) $\chi(g) = \zeta_1 + \dots + \zeta_n$ — алгебраическое целое число.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение (1) доказано в [2, лемма 2.15]. Утверждение (2) следует из (1) и того, что алгебраические целые числа образуют подкольцо в \mathbb{C} . \square

Лемма 2 Пусть $g \in G$ — элемент, порядок которого делит $m \in \mathbb{Z}$, χ — характер группы G и ζ — примитивный комплексный корень степени m из 1. Тогда:

- (1) $\chi(g) \in \mathbb{Q}(\zeta)$;
- (2) $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$ — нормальное расширение;
- (3) для любого автоморфизма σ поля $\mathbb{Q}(\zeta)$ существует такое $k \in \mathbb{Z}$, что $(k, m) = 1$ и $\zeta^\sigma = \zeta^k$;
- (4) $\chi(g)^\sigma = \chi(g^k)$ для таких σ и k .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение (1) следует из леммы 1 (1) и того, что ζ — примитивный корень степени m из 1. Утверждение (2) вытекает из того, что $\mathbb{Q}(\zeta)$ — поле разложения многочлена $x^m - 1$. Утверждение (3) справедливо, поскольку автоморфизм поля $\mathbb{Q}(\zeta)$ должен переводить ζ в некоторый примитивный корень степени m из 1, т. е. в число вида ζ^k , где $(k, m) = 1$. Теперь если $\chi(g) = \zeta_1 + \dots + \zeta_n$, где ζ_i выбраны как в лемме 1 (1), то они являются корнями степени m из 1, и каждое из чисел ζ_i является степенью числа ζ . Поэтому $\zeta_i^\sigma = \zeta_i^k$. Как следует из леммы 1,

$$\chi(g)^\sigma = \zeta_1^k + \dots + \zeta_n^k = \chi(g^k).$$

Утверждение (4) доказано. □

Лемма 3 Пусть $\chi \in \text{Irr}(G)$. Тогда для любого $x \in G$ число $\omega_\chi(\overline{x^G})$ целое алгебраическое и

$$\omega_\chi(\overline{x^G}) = \frac{\chi(x)|x^G|}{\chi(1)}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. См. [2, стр. 36, в частности, теорема (3.7)]. □

Лемма 4 Пусть $S \subseteq G$ — симметричное множество, $H = \langle S \rangle$ и $|G : H| = n$. Положим $\Gamma = \text{Cay}(G, S)$ и $\Delta = \text{Cay}(H, S)$. Обозначим через f_G и f_H соответственно характеристические многочлены матриц смежности графов Γ и Δ . Справедливы следующие утверждения.

- (1) Граф Γ связан тогда и только тогда, когда $G = H$.
- (2) Если $H \neq G$, то у графа Γ каждая компонента связности изоморфна Δ и число компонент равно n .
- (3) $f_G = f_H^n$; в частности, спектры графов Γ и Δ совпадают.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение (2) доказано в [3, лемма 1]. Из утверждения (2) следуют утверждение (3) и несвязность графа Γ при $G \neq H$ в утверждении (1). Для завершения доказательства (1) достаточно заметить, что любой элемент $g \in G$ представляется в виде произведения элементов множества S , если граф Γ связан. Связность Γ влечет существование пути

$$(x_0, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{m-1}, x_m) \in E(\Gamma), \text{ где } x_0 = 1 \text{ и } x_m = g.$$

По определению графа Кэли для любого $i = 1, \dots, m$ существует элемент $s_i \in S$, такой, что $x_i = x_{i-1}s_i$. Таким образом,

$$g = x_m = x_0s_1s_2 \dots s_m = s_1s_2 \dots s_m.$$

□

4 Спектры элементов групповой алгебры

Предложение 1 Пусть G — конечная группа и $S \subseteq G$ — такое подмножество, что $S = S^{-1}$. Тогда справедливы следующие утверждения.

- (1) Матрица смежности графа $\text{Cay}(G, S)$ совпадает с матрицей $[\overline{S}]_G$. Спектр графа $\text{Cay}(G, S)$ совпадает со спектром элемента \overline{S} на регулярном модуле.
- (2) Для любого элемента $a \in \mathbb{C}G$ матрица $[a]_G$ подобна блочно-диагональной матрице с блоками $[a_\chi]$ на диагонали, где $\chi \in \text{Irr}(G)$, и каждый блок $[a_\chi]$ встречается $\chi(1)$ раз.
- (3) Для любого элемента $a \in \mathbb{C}G$ спектр матрицы $[a]_G$ совпадает с объединением спектров матриц $[a_\chi]$ по всем $\chi \in \text{Irr}(G)$.
- (4) Для любого элемента $a \in \mathbb{C}G$ эквивалентны утверждения:

- (i) спектр элемента a целочисленный (на регулярном $\mathbb{C}G$ -модуле);
- (ii) спектр элемента a целочисленный на любом неприводимом $\mathbb{C}G$ -модуле;
- (iii) спектр элемента a целочисленный на любом $\mathbb{C}G$ -модуле.

(5) Если λ — собственное значение матрицы $[a]_G$, то кратность λ равна

$$\sum_{\chi \in \text{Irr}(G)} \chi(1) m_\chi(\lambda),$$

где $m_\chi(\lambda)$ — кратность (возможно, нулевая) λ как собственного значения преобразования a_χ .

(6) Для нормального множества S группы G элемент \bar{S} лежит в центре алгебры $\mathbb{C}G$.

(7) Для любого элемента $a \in Z(\mathbb{C}G)$ спектр матрицы $[a]_G$ равен

$$\{\omega_\chi(a) \mid \chi \in \text{Irr}(G)\}.$$

(8) Пусть $x_1, \dots, x_t \in G$ — попарно несопряженные элементы и

$$S = \bigcup_{i=1}^t K_i, \quad \text{где} \quad K_i = x_i^G.$$

Тогда спектр матрицы $[\bar{S}]_G$ равен

$$\left\{ \sum_{i=1}^t \omega_\chi(\bar{K}_i) \mid \chi \in \text{Irr}(G) \right\} = \left\{ \sum_{i=1}^t \frac{\chi(x_i) |K_i|}{\chi(1)} \mid \chi \in \text{Irr}(G) \right\}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение (1) легко проверить непосредственными вычислениями на основе соответствующих определений. Утверждение (2) следует из теоремы Машке [2, теорема 1.9] и хорошо известного разложения регулярного модуля полупростой алгебры в прямую сумму неприводимых модулей [2, следствие 1.17]. Утверждения (3), (4) и (5) вытекают из (2). Утверждение (6) следует из [2, теорема 2.4]. Известно, что матрица $[a_\chi]$ скалярна для любого $\chi \in \text{Irr}(G)$ и равна $\omega_\chi(a)I$ (см. [2, стр. 35]). Поэтому (7) вытекает из (3). Поскольку отображение

$$\omega_\chi : Z(\mathbb{C}G) \rightarrow \mathbb{C}G$$

является гомоморфизмом алгебр [2, стр. 35], в силу утверждений (1), (3), (6), (7) и леммы 3 получаем (8). \square

5 Доказательство теоремы 1

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1. Пусть S — нормальное эйлерово подмножество в G и

$$a = \bar{S} \in \mathbb{C}G.$$

В силу утверждений (1), (3), (6) и (7) предложения 1 достаточно показать, что $\omega_\chi(a) \in \mathbb{Z}$ для любого $\chi \in \text{Irr}(G)$. Пусть x_1, \dots, x_t — представители всех классов сопряженности, объединением которых является S . Тогда

$$\omega_\chi(a) = \sum_{i=1}^t \frac{\chi(x_i)|x_i^G|}{\chi(1)}. \quad (*1)$$

Из леммы 2 следует, что $\omega_\chi(a) \in \mathbb{Q}(\zeta)$, где ζ — примитивный корень степени m из 1, а m — наименьшее общее кратное чисел $|x_i|$. Возьмем произвольный автоморфизм σ поля $\mathbb{Q}(\zeta)$. Из леммы 2 следует, что существует такое число k , что $(m, k) = 1$ и $\chi(x_i)^\sigma = \chi(x_i^k)$ для всех $i = 1, \dots, t$. Поскольку множество S эйлерово, $x_i^k \in S$ для всех i . Ввиду нормальности множества S элемент x_i^k сопряжен с некоторым x_j . При этом

$$\chi(x_i)^\sigma = \chi(x_i^k) = \chi(x_j).$$

Отображение $x \mapsto x^k$ является биекцией между классами x_i^G и x_j^G , поэтому

$$|x_i^G| = |x_j^G|.$$

Таким образом, автоморфизм σ переставляет слагаемые в правой части равенства (*1). Тем самым $\omega_\chi(a)^\sigma = \omega_\chi(a)$ для любого автоморфизма σ поля $\mathbb{Q}(\zeta)$, и значит, $\omega_\chi(a) \in \mathbb{Q}$. Поскольку число $\omega_\chi(a)$ — сумма целых алгебраических чисел по лемме 3, оно само является алгебраическим целым и, значит, просто целым. \square

6 Доказательство следствий

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СЛЕДСТВИЙ 1 и 2. Поскольку симметричное множество S , для которого $\{|s| \mid s \in S\} \subseteq \{2, 3, 4, 6\}$, является эйлеровым, утверждение следствия 1 прямо вытекает из теоремы 1. Следствие 2 является частным случаем следствия 1. \square

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СЛЕДСТВИЯ 3. В групповой алгебре $\mathbb{C}G$ рассмотрим элементы

$$a = \overline{S}, \quad b = \overline{R} \quad \text{и} \quad c = \overline{H \cap R}.$$

Ясно, что $a = b - c$. В силу утверждения (6) предложения 1 $b \in Z(\mathbb{C}G)$, поэтому элементы a , b и c попарно коммутируют. Поскольку их матрицы симметричны, регулярный модуль V групповой алгебры обладает базисом из общих собственных векторов элементов a , b и c . Следовательно, любое собственное значение α элемента a равно разности $\beta - \gamma$ некоторых собственных значений β и γ элементов b и c соответственно. Спектр элемента b на V целый по теореме 1. Множество $H \cap R$ является нормальным эйлеровым подмножеством в группе H . По теореме 1 элемент c имеет целый спектр на регулярном модуле групповой алгебры $\mathbb{C}H$. Поскольку мы можем рассматривать любой $\mathbb{C}G$ -модуль (в частности, V) как $\mathbb{C}H$ -модуль с согласованным действием, в силу утверждения (4) предложения 1 элемент c имеет на V целый спектр. Значит, спектр элемента a на V тоже целый, и граф $\text{Cay}(G, S)$ целочисленный по утверждению (1) предложения 1. \square

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СЛЕДСТВИЯ 4. Пусть $G = S_n$, $R = \{(ij) \mid 1 \leq i < j \leq n\}$ и $H \cong S_{n-1}$ — множество всех подстановок в группе $G = S_n$, оставляющих символ 1 на месте. Тогда легко заметить, что

$$S = \{(1i) \mid 1 < i \leq n\} = R \setminus (R \cap H).$$

Как и в следствии 2, R — нормальное эйлерово подмножество в G . Ввиду следствия 3 граф $\text{Caу}(G, S)$ целочисленный. \square

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СЛЕДСТВИЯ 5. В силу леммы 4 достаточно показать, что целочисленным будет граф $\text{Caу}(G^*, S)$, где $G^* = S_n$. В групповой алгебре $\mathbb{C}G^*$ рассмотрим элементы

$$\begin{aligned} a &= \bar{S} = \sum_{i=3}^n ((12i) + (21i)), \\ b &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} (ij), \\ c &= \sum_{3 \leq i < j \leq n} (ij) \text{ и} \\ d &= (12). \end{aligned}$$

Согласно предложению 1 достаточно показать, что спектр элемента a на регулярном $\mathbb{C}G^*$ -модуле целый. Очевидно, что элементы c и d коммутируют. Элемент b , сумма всех транспозиций, является центральным в алгебре $\mathbb{C}G^*$, поэтому b , c и d попарно перестановочны. Непосредственно проверяется, что

$$a = (12) \left(\sum_{i=3}^n (1i) + \sum_{i=3}^n (2i) \right) = d(b - c - d).$$

Регулярный $\mathbb{C}G^*$ -модуль обладает базисом из общих собственных векторов элементов b , c и d , который будет также базисом из собственных векторов элемента a . При этом, если для такого вектора v и чисел $\beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$ выполняются равенства

$$vb = \beta v, \quad vc = \gamma v \quad \text{и} \quad vd = \delta v,$$

то очевидно, что

$$va = \delta(\beta - \gamma - \delta)v.$$

Для завершения доказательства достаточно показать, что спектры элементов b , c и d целые.

Спектр b целый ввиду следствия 1 и утверждения (1) в предложении 1, так как $b = \bar{T}$, где T — множество всех транспозиций в G^* . Поскольку d — элемент порядка 2, его спектр содержится среди корней многочлена $x^2 - 1$ и состоит из чисел ± 1 . Пусть, наконец, H — подгруппа в группе G^* , изоморфная S_{n-2} и состоящая из всех подстановок, оставляющих неподвижными символы 1 и 2. Тогда $H \cap T$ — нормальное эйлерово подмножество в H , $c = \overline{H \cap T}$ и, как и в доказательстве следствия 3, получаем целочисленность спектра элемента c . Значит, элемент a также имеет целочисленный спектр. Следствие доказано. \square

Список литературы

- [1] Unsolved Problems in Group Theory, The Kourovka Notebook, 19th edn., Sobolev Institute of Mathematics SO RAN, Novosibirsk (2018); <http://math.nsc.ru/alglog/19tkt.pdf>, <https://arxiv.org/pdf/1401.0300.pdf>
- [2] I. M. Isaacs, Character theory of finite groups. AMS Chelsea Pub., Providence, Rhode Island, 1976.

- [3] E. V. Konstantinova, D. V. Lytkina, On integral Cayley graphs of finite groups, in preperation.
- [4] R. Krakovski, B. Mohar, Spectrum of Cayley Graphs on the Symmetric Group generated by transpositions, Linear Algebra and its applications, 437 (2012), 1033–1039.
- [5] G. Charuy, V. Feray, A note on a Cayley graph of Sym_n , 2012, 3 pp., arXiv: 1202.4976v2.

Адреса авторов:

Wenbin Guo
Department of Mathematics,
University of Science and Technology of China,
Hefei, 230026, P. R. China
e-mail: wguo@ustc.edu.cn

Лыткина Дарья Викторовна
Новосибирский государственный университет
ул. Пирогова, 2,
Новосибирск, 630090 Россия;
Сибирский университет телекоммуникаций и информатики,
ул. Кирова, 86,
Новосибирск, 630102 Россия.
e-mail: daria.lytkin@gmail.com

Мазуров Виктор Данилович
Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН,
пр. акад. Коптюга, 4,
Новосибирск, 630090, Россия;
Новосибирский государственный университет
ул. Пирогова, 2,
Новосибирск, 630090, Россия.
e-mail: mazurov@math.nsc.ru

Ревин Данила Олегович
Department of Mathematics,
University of Science and Technology of China,
Hefei 230026, P. R. China;
Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН,
пр. акад. Коптюга, 4,
Новосибирск, 630090, Россия;
Новосибирский государственный университет
ул. Пирогова, 2,
Новосибирск, 630090, Россия.
e-mail: revin@math.nsc.ru