

MOORE GRAPH WITH PARAMETERS (3250,57,0,1) DOES NOT EXIST

(in Russian, English abstract)

A. A. Makhnev^{1,2}

¹Krasovskii Institute of Mathematics and Mechanics UB RAS,

²Ural Federal University

makhnev@imm.uran.ru

Abstract. If regular graph of degree k and diameter d has v vertices then

$$v \leq 1 + k + k(k-1) + \dots + k(k-1)^{d-1}.$$

Graphs with $v = 1 + k + k(k-1) + \dots + k(k-1)^{d-1}$ is called Moore graphs. Damerell proved that Moore graph of degree $k \geq 3$ has diameter 2. In this case $v = k^2 + 1$, graph is strongly regular with $\lambda = 0$, $\mu = 1$ and either degree k is equal 2 (pentagon), 3 (Petersen graph), 7 (Hoffman-Singleton graph) or 57. The existence of Moore graph with degree 57 was unknown.

Jurishich and Vidali note that the existence Moore graph of degree $k > 3$ is equivalent to existence distance-regular graph with intersection array $\{k-2, k-3, 2; 1, 1, k-3\}$ (in the case $k = 57$ we have graph with intersection array $\{55, 54, 2; 1, 1, 54\}$).

In this paper it is proved that distance-regular graph with intersection array $\{55, 54, 2; 1, 1, 54\}$ does not exist. As a corollary Moore graph of degree 57 does not exist.

Keywords: distance-regular graph, Moore graph.

Введение

Мы рассматриваем неориентированные графы без петель и кратных ребер. Если a, b — вершины графа Γ , то через $d(a, b)$ обозначается расстояние между a и b , а через $\Gamma_i(a)$ — подграф графа Γ , индуцированный множеством вершин, которые находятся на расстоянии i в Γ от вершины a . Подграф $\Gamma_1(a)$ называется *окрестностью вершины a* и обозначается через $[a]$, если граф Γ фиксирован.

Определение дистанционно регулярного графа с массивом пересечений $\{b_0, \dots, b_{d-1}; c_1, \dots, c_d\}$ можно найти в [1].

Для графа Γ диаметра d и $i \in \{2, \dots, d\}$ через Γ_i обозначим граф на том же множестве вершин, в котором вершины u, w смежны, если расстояние между ними в Γ равно i .

Если регулярный граф степени k и диаметра d имеет v вершин, то выполняется неравенство:

$$v \leq 1 + k + k(k-1) + \dots + k(k-1)^{d-1}.$$

Графы, для которых это нестрогое неравенство превращается в равенство, называются графами Мура (1960). Это определение принадлежит Хофману и Синглтону [?], которые описали графы Мура диаметра 2 и 3. Простейший пример графа Мура доставляет $(2d+1)$ -угольник.

Дамерелл [2] (см. также [?]) доказал, что граф Мура степени $k \geq 3$ имеет диаметр 2. В этом случае $v = k^2 + 1$, граф сильно регулярен с $\lambda = 0$ и $\mu = 1$, а степень k равна 2 (пятиугольник), 3 (граф Петерсена), 7 (граф Хофмана-Синглтона) или 57. Существование графа Мура степени $k = 57$ ранее было неизвестно.

Ашбахер [3] доказал, что графа Мура степени 57 не является дистанционно транзитивным (по этому граф Мура степени 57 иногда называют графом Ашбахера). Камерон [4, теорема 3.13] доказал, что граф Мура степени 57 не является вершинно симметричным. А.А. Махнев и Д.В. Падучих [5] и [6] изучили возможные автоморфизмы графа Мура степени 57.

Юришич и Видали [7] заметили, что существование графа Мура степени $k > 3$ равносильно существованию дистанционно регулярного графа с массивом пересечений $\{k-2, k-3, 2; 1, 1, k-3\}$ (в случае $k = 57$ получим граф с массивом пересечений $\{55, 54, 2; 1, 1, 54\}$). А.А. Махнев и Д.В. Падучих [8] нашли возможные автоморфизмы дистанционно регулярного графа с массивом пересечений $\{55, 54, 2; 1, 1, 54\}$.

В работе изучены свойства графа с массивом пересечений $\{55, 54, 2; 1, 1, 54\}$, с помощью которых получена

ТЕОРЕМА 1. *Дистанционно регулярный граф с массивом пересечений $\{55, 54, 2; 1, 1, 54\}$ не существует.*

Естественным образом получается

СЛЕДСТВИЕ 1. *Сильно регулярный граф Мура с параметрами $(3250, 57, 0, 1)$ не существует.*

Этот результат ставит заключительную точку в 60-летних исследованиях графов Мура.

Основные методы, использованные в доказательстве полученных результатов:

метод тройных чисел пересечений, примененный к графу без условия Q -полиномиальности;

метод симметризации массива тройных чисел пересечений (предложен А.А. Махневым, аналог симметризации тензоров).

Вспомогательные результаты

Наши обозначения и терминология в основном стандартны, их можно найти в [1].

В доказательстве теоремы используются тройные числа пересечений [9].

Пусть Γ — дистанционно регулярный граф диаметра d . Если u_1, u_2, u_3 — вершины графа Γ , r_1, r_2, r_3 — неотрицательные целые числа, не большие d . Через $\left\{ \begin{smallmatrix} u_1 u_2 u_3 \\ r_1 r_2 r_3 \end{smallmatrix} \right\}$ обозначим множество вершин $w \in \Gamma$ таких, что $d(w, u_i) = r_i$, а через $\left[\begin{smallmatrix} u_1 u_2 u_3 \\ r_1 r_2 r_3 \end{smallmatrix} \right]$ — число вершин в $\left\{ \begin{smallmatrix} u_1 u_2 u_3 \\ r_1 r_2 r_3 \end{smallmatrix} \right\}$. Числа $\left[\begin{smallmatrix} u_1 u_2 u_3 \\ r_1 r_2 r_3 \end{smallmatrix} \right]$ называются тройными числами пересечений. Для фиксированной тройки вершин u_1, u_2, u_3 вместо $\left[\begin{smallmatrix} u_1 u_2 u_3 \\ r_1 r_2 r_3 \end{smallmatrix} \right]$ будем писать $[r_1 r_2 r_3]$. К сожалению, для чисел $[r_1 r_2 r_3]$ нет общих формул. Однако, в [9] предложен метод вычисления некоторых чисел $[r_1 r_2 r_3]$.

Пусть u, v, w — вершины графа Γ , $W = d(u, v)$, $U = d(v, w)$,

$V = d(u, w)$. Так как имеется точно одна вершина $x = u$ такая, что $d(x, u) = 0$, то число $[0jh]$ равно 0 или 1. Отсюда $[0jh] = \delta_{jW} \delta_{hV}$. Аналогично, $[i0h] = \delta_{iW} \delta_{hU}$ и $[ij0] = \delta_{iU} \delta_{jV}$.

Другое множество уравнений можно получить, фиксируя расстояние между двумя вершинами из $\{u, v, w\}$ и сосчитав число вершин, находящихся на всех возможных расстояниях от третьей:

$$\sum_{l=1}^d [ljh] = p_{jh}^U - [0jh], \sum_{l=1}^d [ilh] = p_{ih}^V - [i0h], \sum_{l=1}^d [ijl] = p_{ij}^W - [ij0] (+)$$

При этом некоторые тройки исчезают. При $|i - j| > W$ или $i + j < W$ имеем $p_{ij}^W = 0$, поэтому $[ijh] = 0$ для всех $h \in \{0, \dots, d\}$.

Положим $S_{ijh}(u, v, w) = \sum_{r,s,t=0}^d Q_{ri} Q_{sj} Q_{th} \left[\begin{smallmatrix} uvw \\ rst \end{smallmatrix} \right]$. Если параметр Крейна $q_{ij}^h = 0$, то $S_{ijh}(u, v, w) = 0$.

Зафиксируем вершины u, v, w дистанционно регулярного графа Γ диаметра 3 и положим $\{ijh\} = \left\{ \begin{smallmatrix} uvw \\ ijh \end{smallmatrix} \right\}$, $[ijh] = \left[\begin{smallmatrix} uvw \\ ijh \end{smallmatrix} \right]$, $[ijh]' = \left[\begin{smallmatrix} uvw \\ ihj \end{smallmatrix} \right]$, $[ijh]^* = \left[\begin{smallmatrix} uvw \\ jih \end{smallmatrix} \right]$ и $[ijh]^\sim = \left[\begin{smallmatrix} wvu \\ hji \end{smallmatrix} \right]$. В случаях $d(u, v) = d(u, w) = d(v, w) = 2$ или $d(u, v) = d(u, w) = d(v, w) = 3$ вычисление параметров $[ijh]' = \left[\begin{smallmatrix} uvw \\ ihj \end{smallmatrix} \right]$, $[ijh]^* = \left[\begin{smallmatrix} uvw \\ jih \end{smallmatrix} \right]$ и $[ijh]^\sim = \left[\begin{smallmatrix} wvu \\ hji \end{smallmatrix} \right]$ (симметризация массива тройных чисел пересечений) может дать новые соотношения, позволяющие доказать несуществование графа.

Свойства графа $\Gamma_3(u)$

В этом разделе Γ является дистанционно регулярным графом с массивом пересечений $\{55, 54, 2; 1, 1, 54\}$. Тогда Γ имеет спектр $55^1, 7^{1617}, -1^{110}, -8^{1408}, 1 + 55 + 2970 + 110 = 3136$ вершин и дуальную матрицу собственных значений

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1617 & 110 & 1408 \\ 1 & \frac{1029}{5} & -2 & -\frac{1024}{5} \\ 1 & -\frac{49}{15} & -2 & \frac{64}{15} \\ 1 & -\frac{147}{5} & 54 & -\frac{128}{5} \end{pmatrix}.$$

Далее, граф Γ_3 является 56×56 -решеткой и окрестность вершины в Γ_3 является объединением двух изолированных 55-клик.

ЛЕММА 1. *Числа пересечений графа Γ равны*

- (1) $p_{11}^1 = 0, p_{12}^1 = 54, p_{22}^1 = 2808, p_{23}^1 = 108, p_{33}^1 = 2;$
- (2) $p_{11}^2 = 1, p_{12}^2 = 52, p_{22}^2 = 2, p_{23}^2 = 2811, p_{33}^2 = 106, p_{33}^2 = 2;$
- (3) $p_{12}^3 = 54, p_{13}^3 = 1, p_{22}^3 = 2862, p_{23}^3 = 54, p_{33}^3 = 54.$

Доказательство. Прямые вычисления, согласно [1, лемма 4.1.7].

Зафиксируем вершины u, v, w графа Γ и положим $\{ijh\} = \left\{ \begin{smallmatrix} uvw \\ ijh \end{smallmatrix} \right\}$, $[ijh] = \left[\begin{smallmatrix} uvw \\ ijh \end{smallmatrix} \right]$. Пусть $\Delta = \Gamma_2(u)$ и $\Lambda = \Delta_2$. Тогда Λ — регулярный граф степени $p_{22}^2 = 2811$ на $k_2 = 2970$ вершинах.

ЛЕММА 2. Пусть $d(u, v) = 2, d(u, w) = d(v, w) = 1$. Тогда тройные числа пересечений равны:

- (1) $[122] = 52, [132] = 2;$
- (2) $[212] = 52, [221] = 53, [222] = r_1 + 2650, [223] = -r_1 + 108, [232] = -r_1 + 106, [233] = r_1;$
- (3) $[312] = 2, [322] = -r_1 + 106, [323] = [332] = r_1, [333] = -r_1 + 2,$
где $r_1 \in \{0, 1, 2\}$.

Доказательство. Компьютерные упрощения формул (+).

По лемме 2 степень вершины в μ -подграфе графа Γ_2 не меньше 2650, но не больше 2652.

ЛЕММА 3. Пусть $d(u, v) = d(u, w) = 2, d(v, w) = 1$. Тогда тройные числа пересечений равны:

- (1) $[122] = 51, [123] = [132] = 0, [133] = 2;$
- (2) $[212] = [221] = 51, [222] = 2654, [223] = [232] = 106, [233] = 0;$
- (3) $[312] = [321] = 2, [322] = 102, [323] = [332] = 2, [333] = 0.$
Далее, $[222] = 2654$.

Доказательство. С помощью компьютерных упрощений формул (+) получим равенства

$$\begin{aligned} [122] &= r_3, [123] = [132] = -r_3 + 51, [133] = r_3 - 49; \\ [212] &= [221] = 51, [222] = -r_2 - r_3 + 2705, [223] = [232] = r_2 + r_3 + 55, [233] = -r_2 - r_3 + 51; \\ [312] &= [321] = 2, [322] = r_2 + 102, [323] = [332] = -r_2 + 2, [333] = r_2, \end{aligned}$$

где $r_2 \in \{0, 1, 2\}, r_3 \in \{49, 50, 51\}$.

В 56×56 -решетке Γ_3 подграф $\Gamma_3(u) \cap \Gamma_3(w)$ является 2-кликкой, не пересекающей $\Gamma_3(v)$. Поэтому $[333] = r_2 = 0$.

Отсюда $2654 \leq [222] = -r_3 + 2705 \leq 2656$. Так как Λ содержит по $2811 - [222]$ вершин из $\Lambda(v)$ и из $\Lambda(w)$, то $[222] = 2654$, в частности, $r_3 = 51$.

ЛЕММА 4. Пусть $d(u, v) = d(u, w) = 2, d(v, w) = 3$. Тогда тройные числа пересечений равны:

- (1) $[112] = 1 - r_6, [113] = r_6, [121] = 1 - r_5, [122] = r_7, [123] = 51 - r_7 + r_5, [131] = r_5, [132] = r_6 - r_7 + 51, [133] = -r_6 + r_7 - r_5 - 49;$
- (2) $[212] = [221] = 52, [213] = [231] = 0, [222] = 2756 + r_5 + r_6 - r_7, [223] = -r_5 - r_6 + r_7 + 3, [233] = 102 + r_5 + r_6 - r_7;$
- (3) $[312] = r_6 + 1, [313] = -r_6 + 1, [321] = r_5 + 1, [322] = -r_5 - r_6 + 5, [323] = r_6, [331] = -r_5 + 1, [332] = r_5, [333] = 1,$
где $r_5, r_6 \in \{0, 1\}, r_7 \in \{49, \dots, 52\}, r_9 \in \{2706, \dots, 2707\}$.
Далее, $2706 \leq [222] \leq 2707$.

Доказательство. С помощью компьютерных упрощений формул (+) получим равенства

$$\begin{aligned} [112] &= -r_6 + 1, [113] = r_6, [121] = -r_4 - r_8 + 54, [122] = r_7, [123] = r_4 - r_7 + r_8 - 2, [131] = r_4 + r_8 - 53, \\ [132] &= r_6 - r_7 + 51, [133] = -r_4 - r_6 + r_7 - r_8 + 4; \\ [212] &= r_5 + r_6 - r_7 - r_9 + 2808, [213] = -r_5 - r_6 + r_7 + r_9 - 2756, [221] = r_4, [222] = r_9, [223] = \\ &= -r_4 - r_9 + 2811, [231] = -r_4 + 52, [232] = -r_5 - r_6 + r_7 + 3, [233] = r_4 + r_5 + r_6 - r_7 + 50; \\ [312] &= -r_5 + r_7 + r_9 - 2755, [313] = r_5 - r_7 - r_9 + 2757, [321] = r_8, [322] = -r_7 - r_9 + 2861, \\ [323] &= r_7 - r_8 + r_9 - 2755, [331] = -r_8 + 2, [332] = r_5, [333] = -r_5 + r_8, \end{aligned}$$

где $r_4 \in \{51, 52\}, r_5 \in \{0, 1, 2\}, r_6 \in \{0, 1\}, r_7 \in \{49, \dots, 52\}, r_8 \in \{0, 1, 2\}, r_9 \in \{2705, \dots, 2710\}$.
Отсюда $2705 \leq [222] = r_9 \leq 2710$.

В 56×56 -решетке Γ_3 подграф $\Gamma_3(u) \cap \Gamma_3(v)$ является 2-кликкой, пересекающей $\Gamma_3(w)$ по единственной вершине, поэтому $[333] = -r_5 + r_8 = 1$ и $r_5 \in \{0, 1\}$. Аналогично, $\Gamma_3(v) \cap \Gamma_3(w)$ является 54-кликкой, пересекающей $\Gamma(u)$ не более чем по одной вершине, поэтому $[133] = -r_4 - r_6 + r_7 - r_5 + 3 \leq 1$.

Подсчитаем число d пар вершин (y, z) на расстоянии 3 в графе Λ , где $y \in \left\{ \begin{smallmatrix} uv \\ 21 \end{smallmatrix} \right\}$ и $z \in \left\{ \begin{smallmatrix} uv \\ 23 \end{smallmatrix} \right\}$. С одной стороны, по лемме 3 имеем $[233] = 0$ и $d = 0$. С другой стороны, имеем $[213] = -r_5 - r_6 + r_7 + r_9 - 2756 = 0$, поэтому $r_9 = 2756 + r_5 + r_6 - r_7$. Отсюда

$$\begin{aligned} [112] &= 1 - r_6, [113] = r_6, [121] = -r_4 - r_5 + 53, [122] = r_7, [123] = r_4 - r_7 + r_5 - 1, [131] = r_4 + r_5 - 52, \\ [132] &= r_6 - r_7 + 51, [133] = -r_4 - r_6 + r_7 - r_5 + 3; \\ [212] &= 52, [213] = 0, [221] = r_4, [222] = r_9, [223] = -r_4 - r_9 + 2811, [231] = -r_4 + 52, [232] = \\ &= -r_5 - r_6 + r_7 + 3, [233] = r_4 + r_5 + r_6 - r_7 + 50; \end{aligned}$$

$$[312] = r_6 + 1, [313] = -r_6 + 1, [321] = r_5 + 1, [322] = -r_5 - r_6 + 5, [323] = r_6, [331] = -r_5 + 1, [332] = r_5, [333] = 1.$$

Симметризация. Для тройки вершин (u, v, w) имеем $r_7 = r'_7$, $-r_6 + 1 = [112] = [121]' = -r'_4 - r'_5 + 53$, $r_4 - r_7 + r_5 - 1 = [123] = [132]' = r'_6 - r'_7 + 51$ и $r_4 + r_5 = r'_6 + 52$. Далее, $r_9 = r'_9$, $52 = [212] = [221]' = r'_4$, $-r_4 - r_9 + 2811 = [223] = [232]' = -r'_5 - r'_6 + r'_7 + 3$. Наконец, $r_6 = [323] = [332]' = r'_5$, $r_4 = 52$ и $-r_9 + 2759 = -r_5 - r_6 + r_7 + 3$. Отсюда следуют равенства из заключения леммы.

Если $r_9 \geq 2708$, то $r_7 \leq 48 + r_5 + r_6$ и равенство $[133] = -r_6 + r_7 - r_5 - 49$ дает противоречие. Если $r_9 = 2705$, то $r_7 = 51 + r_5 + r_6$, противоречие с тем, что $[133] = -r_6 + r_7 - r_5 - 49 \leq 1$.

$$(1) [112] = 1 - r_6, [113] = r_6, [121] = 1 - r_5, [122] = r_7, [123] = 51 - r_7 + r_5,$$

$$\text{Итак, } 2706 \leq [222] = r_9 \leq 2707.$$

Лемма доказана.

Для числа ребер e между $\Lambda(v)$ и $\Lambda_2(v)$ в графе Λ выполняются неравенства $424844 = 52 \cdot 2654 + 106 \cdot 2706 \leq e \leq 52 \cdot 2654 + 106 \cdot 2707 = 424950$, поэтому $151.136 \leq 2810 - \lambda \leq 151.174$ и $2658.826 \leq \lambda \leq 2658.864$, где λ — среднее значение параметра $\lambda(\Lambda)$.

ЛЕММА 5. Пусть $d(u, v) = d(u, w) = (v, w) = 2$. Тогда тройные числа пересечений равны:

$$[111] = -r_{16} - r_{11} + 1, [112] = r_{11}, [113] = r_{16}, [121] = r_{14}, [122] = -r_{12} - r_{14} + 52, [123] = r_{12}, [131] = -r_{14} + r_{16} + r_{11}, [132] = r_{12} + r_{14} - r_{11}, [133] = -r_{12} - r_{16} + 2;$$

$$[211] = r_{15} + r_{16} - r_{17} + 50, [212] = r_{17}, [213] = -r_{15} - r_{16} + 2, [221] = -r_{15} - r_{16} + r_{17} - r_{10} + 2, [222] = r_{12} + r_{16} - r_{17} + r_{10} + 2704, [223] = -r_{12} + r_{15} + 104, [231] = r_{10}, [232] = -r_{12} - r_{16} - r_{10} + 106, [233] = r_{12} + r_{16};$$

$$[311] = -r_{15} + r_{17} + r_{11} - 50, [312] = -r_{17} - r_{11} + 52, [313] = r_{15}, [321] = -r_{14} + r_{15} + r_{16} - r_{17} + r_{10} + 50, [322] = r_{14} - r_{16} + r_{17} - r_{10} + 54, [323] = -r_{15} + 2, [331] = r_{14} - r_{16} - r_{10} - r_{11} + 2, [332] = -r_{14} + r_{16} + r_{10} + r_{11}, [333] = 0,$$

$$\text{где } r_{10}, r_{12}, r_{15} \in \{0, 1, 2\}, r_{11}, r_{14}, r_{16} \in \{0, 1\}, r_{17} \in \{49, \dots, 52\}.$$

$$\text{Далее, } 2652 \leq [222] = r_{12} + r_{16} - r_{17} + r_{10} + 2704 \leq 2659.$$

Доказательство. С помощью компьютерных упрощений формул (+) получим равенства:

$$[111] = -r_{16} - r_{11} + 1, [112] = r_{11}, [113] = r_{16}, [121] = r_{14}, [122] = -r_{12} - r_{14} + 52, [123] = r_{12}, [131] = -r_{14} + r_{16} + r_{11}, [132] = r_{12} + r_{14} - r_{11}, [133] = -r_{12} - r_{16} + 2;$$

$$[211] = r_{15} + r_{16} - r_{17} + 50, [212] = r_{17}, [213] = -r_{15} - r_{16} + 2, [221] = -r_{15} - r_{16} + r_{17} - r_{10} + 2, [222] = r_{12} - r_{13} + r_{16} - r_{17} + r_{10} + 2704, [223] = -r_{12} + r_{13} + r_{15} + 104, [231] = r_{10}, [232] = -r_{12} + r_{13} - r_{16} - r_{10} + 106, [233] = r_{12} - r_{13} + r_{16};$$

$$[311] = -r_{15} + r_{17} + r_{11} - 50, [312] = -r_{17} - r_{11} + 52, [313] = r_{15}, [321] = -r_{14} + r_{15} + r_{16} - r_{17} + r_{10} + 50, [322] = r_{13} + r_{14} - r_{16} + r_{17} - r_{10} + 54, [323] = -r_{13} - r_{15} + 2, [331] = r_{14} - r_{16} - r_{10} - r_{11} + 2, [332] = -r_{13} - r_{14} + r_{16} + r_{10} + r_{11}, [333] = r_{13},$$

$$\text{где } r_{10}, r_{12}, r_{13}, r_{15} \in \{0, 1, 2\}, r_{11}, r_{14}, r_{16} \in \{0, 1\}, r_{17} \in \{49, \dots, 52\}.$$

В 56×56 -решетке Γ_3 подграф $\Gamma_3(u) \cap \Gamma_3(w)$ является 2-кликкой, не пересекающей $\Gamma_3(v)$. Поэтому $[333] = r_{13} = 0$. Отсюда следуют требуемые равенства.

$$\text{Заметим, что } r_{12} + r_{16} \leq 2, \text{ поэтому } 2652 \leq [222] = r_{12} + r_{16} - r_{17} + r_{10} + 2704 \leq 2659.$$

ЛЕММА 6. Пусть $d(u, v) = d(u, w) = (v, w) = 2$. Тогда выполняются следующие утверждения:

$$(1) \text{ верны равенства: } r_{11} = r'_{14}, r'_{10} = [213] = r^*_{12}, r_{15} + r_{16} + r'_{10} = 2 \text{ и } -r_{17} + 52 = r^*_{12} + r^*_{14};$$

$$(2) \text{ если } r'_{10} = 2, \text{ то } r_{10} = 2,$$

либо $r_{11} = 0$ и

$$[111] = 1, [112] = [113] = [121] = [131] = 0, [122] = 50, [123] = [132] = 2, [133] = 0;$$

$$[211] = 0, [212] = r_{17} = 50, [213] = [231] = 2, [221] = 50, [222] = 2658, [223] = [232] = 102, [233] = 2;$$

$$[311] = 0, [312] = [321] = 2, [313] = 0, [322] = 102, [323] = [332] = 2, [331] = [333] = 0,$$

либо $r_{11} = 1$ и

$$[111] = 0, [112] = [121] = 1, [113] = [131] = 0, [122] = 49, [123] = [132] = 2, [133] = 0;$$

$$[211] = 1, [212] = [221] = r_{17} = 49, [213] = [231] = 2, [222] = 2659, [223] = [232] = 102, [233] = 2;$$

$$[311] = 0, [312] = [321] = 2, [313] = [331] = 0, [322] = 102, [323] = [332] = 2, [333] = 0.$$

Доказательство. Симметризация. Так как $[111] = -r_{16} - r_{11} + 1$, то $r_{16} + r_{11} = r'_{16} + r'_{11} = r^*_{16} + r^*_{11} = r_{16} + r_{11}$. Далее, $[112] = r_{11} = r^*_{11}$, $[113] = r_{16} = r^*_{16}$, $[121] = r_{14} = r_{14}$, $[212] = r_{17} = r_{17}$, $[313] = r_{15} = r_{15}$, $r_{11} = [112] = [121]' = r'_{14}$, $r'_{10} = [213] = r^*_{12}$.

Имеем $[122] = -r_{12} - r_{14} + 52$, поэтому $r_{12} + r_{14} = r'_{12} + r'_{14}$, $[233] = r_{12} + r_{16} = r'_{12} + r'_{16}$, $r_{10} = [231] = [213]' = -r'_{15} - r'_{16} + 2$ и $r'_{10} + r_{15} + r_{16} = 2$

Аналогично, $-r_{17} - r_{11} + 52 = [312] = [132]^* = r_{12}^* + r_{14}^* - r_{11}^*$ и $-r_{17} + 52 = r_{12}^* + r_{14}^*$. Утверждение (1) доказано.

Допустим, что $r'_{10} = 2$. Тогда $r_{12}^* = 2$, $r_{15} + r_{16} = 0$ и $r_{17} + r_{14}^* = 50$. Так как $[131] = -r_{14} + r_{11}$, то в случае $r_{11} = 0$ имеем $r_{14} = 0$, $[132] = r_{12} + r_{14} - r_{11} = r_{12} = r'_{12}$, $[211] = -r_{17} + 50$, $[311] = r_{17} - 50$. Теперь $-r_{12} - r_{10} + 106 = [232] = [223]' = -r'_{12} + 104 = -r_{12} + 104$, поэтому $r_{10} = 2$, $[212] = [221] = r_{17} = 50$, $r_{17} = [122] = -r_{12} + 52$, $r_{12} = 2$ и

$$\begin{aligned} [111] &= 1, [112] = [113] = [121] = [131] = 0, [122] = 50, [123] = [132] = 2, [133] = 0; \\ [211] &= 0, [212] = r_{17} = 50, [213] = [231] = 2, [221] = 50, [222] = 2658, [223] = [232] = 102, [233] = 2; \\ [311] &= 0, [312] = [321] = 2, [313] = 0, [322] = 102, [323] = [332] = 2, [331] = [333] = 0. \end{aligned}$$

В случае $r_{11} = 1$ имеем $[233] = r_{12} = r'_{12}$, поэтому $r_{12} = [123] = [132] = [132] = r_{12} + r_{14} - 1$, $r_{14} = 1$, $-r_{17} + 51 = [312] = [321]' = -r'_{17} + r'_{10} + 49$, $r_{17} = r'_{17}$, $r_{10} = 2$, $-r_{17} + 51 = [312] = [132]^* = r_{12}^*$ и

$$\begin{aligned} [111] &= 0, [112] = [121] = 1, [113] = [131] = 0, [122] = -r_{12} + 51, [123] = [132] = r_{12}, [133] = -r_{12} + 2; \\ [211] &= 1, [212] = [221] = r_{17} = 49, [213] = [231] = 2, [222] = r_{12} + 2657, [223] = [232] = 104 - r_{12}, \\ [233] &= r_{12}; \end{aligned}$$

$$[311] = 0, [312] = [321] = 2, [313] = [331] = 0, [322] = 102, [323] = [332] = 2, [333] = 0.$$

Теперь $[212] = [221] = r_{17} = r_{17}^*$, $r_{17} = [122] = -r_{12} + 51$ и $r_{12} = 2$. Лемма доказана.

Доказательство теоремы

Пусть Γ является дистанционно регулярным графом с массивом пересечений $\{55, 54, 2; 1, 1, 54\}$. В этом разделе мы докажем теорему 1.

Зафиксируем вершины u, v, w графа Γ и положим $\{ijh\} = \left\{ \begin{smallmatrix} uvw \\ ijh \end{smallmatrix} \right\}$, $[ijh] = \left[\begin{smallmatrix} uvw \\ ijh \end{smallmatrix} \right]$. Пусть $\Delta = \Gamma_2(u)$ и $\Lambda = \Delta_2$. Тогда Λ — регулярный граф степени $p_{22}^2 = 2811$ на $k_2 = 2970$ вершинах.

ЛЕММА 7. *Выполняются следующие утверждения:*

- (1) если $r_{17} = 49$, то $r_{10} = 2$, $r_{15} + r_{16} = 0$ и $[111] = 0$;
- (2) если $r_{17} = 52$, то $r_{10} = 0$, $r_{15} + r_{16} = 2$, $[111] = -r_{16} + 1$ и $r_{17} = r'_{17} = r_{17}^*$.

Доказательство. Пусть $r_{17} = 49$. По лемме 6 имеем $r_{11} = r'_{14}$, $r'_{10} = [213] = r_{12}^*$, $r_{15} + r_{16} + r'_{10} = 2$ и $-r_{17} + 52 = r_{12}^* + r_{14}^*$. Так как $r_{14}^* \leq 1$, то $r'_{10} = r_{12}^* = 2$.

Пусть $r_{17} = 52$. Тогда равенство $[312] = -r_{17} - r_{11} + 52$ влечет $r_{11} = r'_{14} = 0$. Ввиду леммы 6 имеем $r_{17} = -r_{12}^* - r_{14}^* + 52$, поэтому $r'_{10} = r_{12}^* = r_{14}^* = 0$ и $r_{15} + r_{16} = 2$. Далее, $[122] = -r_{14} + 52 = -r'_{14} + 52$, следовательно, $r_{14} = r'_{14} = 0$. Теперь $[311] = 2 - r_{15} = 2 - r'_{15}$, $r_{15} = [313] = [331] = -r_{16} - r_{10} + 2$, $r_{10} = r'_{10} = 0$. Аналогично, $[212] = [221] = r_{17} = r_{17}^* = [122] = -r_{12} + 52$, $r_{12} = 0$ и

$$\begin{aligned} [111] &= -r_{16} + 1, [112] = [121] = 0, [113] = [131] = r_{16}, [122] = 52, [123] = [132] = 0, [133] = -r_{16} + 2; \\ [211] &= 0, [212] = [221] = 52 = r_{17}, [213] = 0, [222] = r_{16} + 2652, [223] = [232] = 106 - r_{16}, [231] = 0, \\ [233] &= r_{16}; \end{aligned}$$

$$[311] = r_{16}, [312] = [321] = 0, [313] = [331] = 2 - r_{16}, [322] = -r_{16} + 106, [323] = [332] = r_{16}, [333] = 0.$$

ЛЕММА 8. *Пусть $r_{17} = 51$. Тогда выполняются следующие утверждения:*

- (1) если $r_{15} + r_{16} = 2$, то $r_{15} = 2$, $r_{16} = 0$, $[111] = 0$, $r_{11} = r_{14} = 1$, $r_{10} = r_{12} = 0$ и
 - $[111] = 0$, $[112] = 1$, $[113] = [131] = 0$, $[121] = r_{14} = 1$, $[122] = 51$, $[123] = [132] = r_{12} = 0$, $[133] = 2$;
 - $[211] = 1$, $[212] = [221] = r_{17} = 51$, $[213] = [231] = 0$, $[222] = 2653$, $[223] = [232] = 106$, $[233] = 0$;
 - $[311] = [312] = [321] = 0$, $[313] = [331] = 2$, $[322] = 106$, $[323] = [332] = [333] = 0$;
- (2) если $r_{15} + r_{16} = 1$, то $r_{10} = 1$ и
 - либо $r_{15} = 0$, $r_{16} = 1$, $r_{11} = r_{14} = 0$, $r_{12} = 1$ и
 - $[111] = [112] = [121] = 0$, $[113] = 1$, $[122] = 51$, $[123] = [132] = r_{12} = 1$, $[131] = 1$, $[133] = 0$;
 - $[211] = 0$, $[212] = r_{17} = 51$, $[213] = 1$, $[221] = 51$, $[222] = 2656$, $[223] = [232] = 103$, $[231] = r_{10} = 1$, $[233] = 2$;
 - $[311] = [312] = [321] = 1$, $[313] = [331] = 0$, $[322] = 103$, $[323] = [332] = 2$, $[333] = 0$,
 - либо $r_{15} = 1$, $r_{16} = 0$, $r_{11} = r_{14} = 0$, $r_{12} = 1$ и
 - $[111] = 1$, $[112] = [113] = [121] = 0$, $[122] = 51$, $[123] = 1$, $[131] = 0$, $[132] = [133] = 1$;
 - $[211] = 0$, $[212] = [221] = r_{17} = 51$, $[213] = 1$, $[222] = 2655$, $[223] = [232] = 104$, $[231] = r_{10} = 1$, $[233] = 1$;
 - $[311] = 0$, $[312] = [313] = [321] = 1$, $[322] = 104$, $[323] = [331] = [332] = 1$, $[333] = 0$.

Доказательство. Пусть $r_{17} = 51$. Тогда $r_{17} = [212] = [122]^* = -r_{12}^* - r_{14}^* + 52$, поэтому $r_{12}^* + r_{14}^* = 1$. По лемме 6 имеем $r_{11} = r'_{14}$, $r'_{10} = r_{12}^*$ и $r_{15} + r_{16} + r'_{10} = 2$. Далее, $[222] = r_{12} + r_{16} + r_{10} + 2653$.

Ввиду леммы 7 и утверждения (1) получим $r'_{17}, r_{17}^* \in \{50, 51\}$. Имеем $r_{17}^* = [122] = -r_{12} - r_{14} + 52$ и $r'_{17} = [221] = -r_{15} - r_{16} - r_{10} + 53$.

Так как ввиду леммы 6 имеем $r'_{10} \neq 2$, то либо $r_{15} + r_{16} = 1$, $r'_{10} = r_{12}^* = 1$ и $r_{14}^* = 0$, либо $r_{15} + r_{16} = 2$, $r'_{10} = r_{12}^* = 0$ и $r_{14}^* = 1$.

Пусть $r_{15} + r_{16} = 2$. Тогда $[211] = r_{15} + r_{16} - r_{17} + 50 = 1$, $[111] = -r_{16} - r_{11} + 1 = 0$ и $[311] = -r_{15} + r_{11} + 1 = 0$, поэтому $r_{11} = 1 - r_{16} = r_{15} - 1$. Далее, $r'_{17} = [221] = 51 - r_{10}$ и в случае $r_{16} = 1$ имеем $r_{11} = 0$, $r_{15} = 1$. Так как $[133] = -r_{12} + 1$, то $r_{12} = r'_{12}$, $[123] = r_{12} = [132] = r_{12} + r_{14}$ и $r_{14} = 0$. Аналогично, $[322] = -r_{10} + 104$, $r_{10} = r'_{10} = 0$, $[233] = r_{12} + 1$, $r_{12} = r'_{12}$, $[222] = r_{12} + 2653$, $r_{12} = r_{12}^* = 0$. Противоречие с тем, что $[212] = [221] = r_{17} = 51$, но $[122] = r_{17}^* = 52$.

Пусть $r_{16} = 0$, $r_{15} = 2$. Тогда $r_{11} = r'_{14} = 1$, $r_{12} = [123] = [132]' = r'_{12} + r'_{14} - 1 = r'_{12}$. Аналогично, $[122] = -r_{12} - r_{14} + 52 = -r'_{12} - r'_{14} + 52$, поэтому $r_{14} = r'_{14} = 1$. Так как $[322] = 106 - r_{10}$, то $r_{10} = r'_{10} = 0$, $[222] = r_{12} + 2653$, то $r_{12} = r_{12}^* = 0$ и

$$\begin{aligned} [111] &= 0, [112] = 1, [113] = [131] = 0, [121] = r_{14} = 1, [122] = 51, [123] = [132] = r_{12} = 0, [133] = 2; \\ [211] &= 1, [212] = [221] = 51, [213] = [231] = 0, [222] = 2653, [223] = [232] = 106, [233] = 0; \\ [311] &= [312] = [321] = 0, [313] = [331] = 2, [322] = 106, [323] = [332] = [333] = 0. \end{aligned}$$

Пусть $r_{15} + r_{16} = 1$. Тогда $r'_{10} = r_{12}^* = 1$, $r_{14}^* = 0$, $[211] = r_{15} + r_{16} - r_{17} + 50 = 0$, $r'_{17} = [221] = 52 - r_{10}$ и $r_{17}^* = [122] = -r_{12} - r_{14} + 52$, поэтому $1 \leq r_{12} + r_{14}$, $r_{10} \leq 2$.

Если $r_{10} = 2$, то $[232] = -r_{12} - r_{16} + 104 = [223]^* = -r_{12}^* + r_{15}^* + 104$ и $r_{12} + r_{16} = 1 - r_{15}^*$, поэтому $r_{15} + r_{16}^* = r_{15} + r_{16} = 1 - r_{15}^* = 0$, противоречие. Значит, $r_{10} = 1$.

Если $r_{16} = 1$, то $[111] = 0$ и $r_{11} = r_{15} = 0$. Так как $[222] = r_{12} + 2655$, то $r_{12} = r_{12}^* = 1$. Далее, $[122] = -r_{14} + 51$ и $r_{14} = r'_{14} = 0$, поэтому

$$\begin{aligned} [111] &= [112] = [121] = 0, [113] = 1, [122] = 51, [123] = [132] = r_{12} = 1, [131] = 1, [133] = 0; \\ [211] &= 0, [212] = r_{17} = 51, [213] = 1, [221] = 51, [222] = 2656, [223] = [232] = 103, [231] = r_{10} = 1, \\ [233] &= 2; \\ [311] &= [312] = [321] = 1, [313] = [331] = 0, [322] = 103, [323] = [332] = 2, [333] = 0. \end{aligned}$$

Если $r_{16} = 0$, то $r_{15} = 1$, $[111] = -r_{11} + 1$, $[311] = r_{11}$. Так как $[222] = r_{12} + 2654$, то $r_{12} = r_{12}^* = 1$. Далее, $[122] = -r_{14} + 51$ и $r_{14} = r'_{14} = r_{11}$. Имеем $[112] = r_{11} = r_{11}^*$, поэтому $[122] = 51 - r_{11} = [212] = 51$. Итак, $r_{11} = 0$ и

$$\begin{aligned} [111] &= 1, [112] = [113] = [121] = 0, [122] = 51, [123] = 1, [131] = 0, [132] = [133] = 1; \\ [211] &= 0, [212] = [221] = r_{17} = 51, [213] = 1, [222] = 2655, [223] = [232] = 104, [231] = r_{10} = 1, \\ [233] &= 1; \\ [311] &= 0, [312] = [313] = [321] = 1, [322] = 104, [323] = [331] = [332] = 1, [333] = 0. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

По лемме 8 если $r_{17} = 51$, то $r'_{17} = r_{17}^* = 51$.

ЛЕММА 9. Если $r_{17} = 50$, то $r_{15} + r_{16} = 1$, $r_{10} = 1$, $r_{12} = r_{14} = 1$, $r_{16} = 0$, $r_{11} = r_{15} = 1$ и

$$\begin{aligned} [111] &= 0, [112] = 1, [113] = 0, [121] = 1, [122] = 50, [123] = 1, [131] = 0, [132] = [133] = 1; \\ [211] &= 1, [212] = r_{17} = 50, [213] = 1, [221] = 50, [222] = 2656, [223] = [232] = 104, [231] = r_{10} = 1, \\ [233] &= 1; \\ [311] &= 0, [312] = [313] = [321] = 1, [322] = 104, [323] = [331] = [332] = 1, [333] = 0. \end{aligned}$$

Доказательство. Пусть $r_{17} = 50$. По лемме 6 имеем $r_{11} = r'_{14}$, $r'_{10} = [213] = r_{12}^*$, $r_{15} + r_{16} + r'_{10} = 2$ и $-r_{17} + 52 = r_{12}^* + r_{14}^*$, поэтому $r_{12}^* + r_{14}^* = 2$.

Так как $[211] = r_{15} + r_{16} - r_{17} + 50$, то либо $r_{15} + r_{16} = 1$, $r'_{10} = r_{12}^* = 1$ и $r_{14}^* = 1$, либо $r_{15} + r_{16} = 0$, $r'_{10} = r_{12}^* = 2$, противоречие с леммой 6. Итак, $r_{15} + r_{16} = 1$.

Далее, $r'_{17} = [221] = 51 - r_{10}$ и $r_{10} = 1$. Аналогично, $r_{17}^* = [122] = -r_{12} - r_{14} + 52$, поэтому $r_{12} + r_{14} = 2$. Так как $[222] = r_{12} + r_{16} + 2655$, то $r_{12} + r_{16} = r_{12}^* + r_{16}^* = r_{12}^* + r_{16}$ и $r_{12} = r_{12}^* = 1$. Отсюда $r_{14} = 1$. Теперь $[111] = -r_{16} - r_{11} + 1$, $[131] = -1 + r_{16} + r_{11}$, поэтому $r_{16} + r_{11} = 1$. Наконец, $[133] = 1 - r_{16}$, $r_{16} = r'_{16}$, $[113] = r_{16} = [131] = 0$, $r_{11} = 1$ и

$$\begin{aligned} [111] &= 0, [112] = 1, [113] = 0, [121] = 1, [122] = 50, [123] = 1, [131] = 0, [132] = [133] = 1; \\ [211] &= 1, [212] = r_{17} = 50, [213] = 1, [221] = 50, [222] = 2656, [223] = [232] = 104, [231] = r_{10} = 1, \\ [233] &= 1; \\ [311] &= 0, [312] = [313] = [321] = 1, [322] = 104, [323] = [331] = [332] = 1, [333] = 0. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Подсчитаем число f пар смежных вершин (y, z) в графе Λ , где $y \in \left\{ \begin{smallmatrix} uv \\ 22 \end{smallmatrix} \right\}$ и $z \in \left\{ \begin{smallmatrix} uv \\ 21 \end{smallmatrix} \right\}$. С одной стороны, по лемме 3 имеем $[221] = 51$, поэтому $f = 51 \cdot 52 = 2652$. С другой стороны, по лемме 5

имеем $[211] = r_{15} + r_{16} - r_{17} + 50$, $f = \sum_i (r_{15}^i + r_{16}^i - r_{17}^i) + 50 \cdot 2811 = 2652$ и $\sum_i (-r_{15}^i - r_{16}^i + r_{17}^i) = 137898$. Отсюда $\sum_i (r_{15}^i + r_{16}^i) = 110$.

Оценим число x_0 вершин w с $r_{17} = 49$. По лемме 5 для такой вершины w имеем $[211] = 1$. Так как $a_2 = 52$, то Λ содержит 52 вершины из $[v]$. Для вершины y из $\Lambda \cap [v]$ подграф $\Lambda \cap [y]$ содержит v и еще 51 вершину. Поэтому число троек (u, v, w) с $r_{17} = 49$ не больше $51 \cdot 52 = 2652$.

Пусть X_j — множество вершин w_i таких, что $r_{17}^i = 49 + j$, $x_j = |X_j|$. Тогда $x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 2811$ и $x_1 + x_2 + x_3 \geq 2811 - 2652 = 159$. Далее, X_2 содержит m вершин w_i с $r_{15}^i + r_{16}^i = 2$, $x_2 - m$ вершин w_i с $r_{15}^i + r_{16}^i = 1$ и $x_1 + 2m + (x_2 - m) + 2x_3 = 110$. Противоречие с тем, что $x_1 + x_2 + x_3 \geq 159$.

Теорема 1 доказана.

Автор благодарен М.П. Голубятникову за помощь в компьютерных вычислениях.

Список литературы

- [1] *Brouwer A. E., Cohen A. M., Neumaier A.* Distance-Regular Graphs. Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1989.
- [2] *Damerell R.M.* On Moore graphs // Math. Proc. Cambr. Phil. Soc., Vol. 74 (1973). P. 227–236.
- [3] *Ashbacher M.* The nonexistence of rank 3 permutation group of degree 3250 and subdegree 57 // J. Algebra, Vol. 19, no. 3 (1971). P. 538–540.
- [4] *Cameron P.J.* Permutation Groups. London Math. Soc. Student Texts N 45: Cambridge Univ. Press, 1999
- [5] *Makhnev A.A., Paduchikh D.V.* On automorphisms of Aschbacher graph // Algebra i Logika, Vol. 40, no. 2 (2001). P. 125–134.
- [6] *Makhnev A.A., Paduchikh D.V.* On automorphisms group of Aschbacher graph // Doklady RAN, Vol. 426, no. 3 (2009). P. 310–313.
- [7] *Jurishich A., Vidali J.* The Sylvester graph and Moore graphs // Europ. J. Comb., Vol. 80 (2019). P. 184–193.
- [8] *Makhnev A.A., Paduchikh D.V.* The most Moore graph and distance-regular graph with intersection array $\{55, 54, 2; 1, 1, 54\}$ // Algebra i Logika, Vol. 57, no. 3 (2020). P. 214-231?.
- [9] *Jurishich A., Vidali J.* Extremal 1-codes in distance-regular graphs of diameter 3 // Des. Codes Cryptogr., Vol. 65 (2012). P. 29–47.

Сведения об авторах:

МАХНЕВ Александр Алексеевич,

РОССИЯ, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 16, 620990,

Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН,

РОССИЯ, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, 620002,

Уральский федеральный университет,

e-mail: makhnev@imm.uran.ru