

# О произведении $l_{s,r}$ -ядерных и близких к ним операторов

О.И. Рейнов

Аннотация. Цель статьи — исследовать возможности факторизации различного типа ядерных операторов через гильбертовы пространства и применить получаемые результаты к задачам о распределении собственных чисел операторов из соответствующих классов.

## 1. Введение

Пожалуй, впервые задача о распределении собственных чисел ядерных операторов появилась (неявно) в 1909 г. статье И. Шура [15]. Доказанное там неравенство для собственных чисел интегральных операторов в  $L_2(a, b)$  с квадратично суммируемым ядром теперь известно как неравенство Шура (из него следует, что собственные числа этих операторов лежат в  $l_2$ ). Заметим, что в случае, когда ядра непрерывны, эти интегральные операторы являются ядерными в  $C[a, b]$ .

В 1915 г. Т. Лалеско [10], обобщая теорему Шура, рассмотрел интегральные операторы, представляющие собой суперпозиции двух операторов Гильберта-Шмидта (такие операторы являются ядерными в  $L_2(a, b)$ ), установив, что эти операторы имеют абсолютно суммируемую последовательности собственных чисел. В работе [10] Е. Лалеско не указывал явно пространство, в котором действуют его операторы, но если считать, например, что ядра операторов непрерывны и сами операторы заданы в пространстве  $C[a, b]$ , то они представят собой первые примеры произведений двух ядерных операторов. Полученная же им теорема тогда является первой теоремой о том, что произведение двух ядерных операторов имеет абсолютно суммируемую последовательность собственных чисел (что потом, в 1955 г., в абстрактной форме докажет А. Гротендик; см. ниже).

В 1916 г. Т. Карлеман [4] привел первый пример интегрального оператора с непрерывным ядром в  $C[0, 2\pi]$  (это ядерный оператор), собственные числа которого лежат в  $l_2 \setminus \cup_{r < 2} l_r$ . Этим была установлена точность теоремы Шура

---

AMS Subject Classification 2010: 47B10, 46B28.

Key words: ядерный оператор, класс Шаттена, пространство Лоренца, факторизация, гильбертово пространство.

(если рассматривать ее как теорему об интегральном операторе с непрерывным ядром).

Абстрактное понятие ядерного (более того,  $s$ -ядерного) оператора было введено в рассмотрение лишь в 1955 г. А. Гротендиком [5] (после известных работ Шаттена, фон Ноймана и др.). Им были получены основные на то время результаты о распределении собственных чисел  $s$ -ядерных операторов.

После этой фундаментальной работы А. Гротендика над проблемой распределения собственных чисел как ядерных, так и близких к ним операторов работало (и продолжает работать) огромное число математиков. Невозможно перечислить всех основных авторов. В сравнительно близкий к исследованиям А. Гротендика период этим серьезно занимались такие специалисты, как В. Б. Лидский, А. Pietsch, А.С. Маркус и В.И. Мацаев, Н. König, В. Maurey, W.B. Johnson и многие другие. Соответствующие ссылки можно найти, например, в монографиях [12] и [13].

Следует отметить фундаментальную работу [8], в которой, помимо получения большого числа важных результатов, впервые был рассмотрен вопрос о распределении собственных чисел произведений нескольких операторов в банаховых пространствах, принадлежащих различным операторным идеалам (таких как идеалы абсолютно суммирующих операторов).

Эта заметка, как и предыдущие две [1, 2] возникла благодаря следующему вопросу Б.С. Митягина, заданному в 2014 г. на конференции, посвященной памяти А. Пелчинского, в Бедлево (Польша): верно ли, что произведение двух ядерных операторов в банаховых пространствах факторизуется через ядерный оператор в гильбертовом пространстве?

В [1], используя пример Карлемана, мы показали, что ответ отрицателен. Там же были приведены точные результаты о факторизации произведений  $s$ -ядерных операторов в банаховых пространствах через операторы из классов Шаттена [14]. Затем, в работе [2], были получены их конечномерные аналоги и, в частности, приведены доказательства анонсированных ранее утверждений.

Здесь мы исследуем более общие вопросы. Именно, при каких (желательно, *точных*) значениях параметров  $p, q$ ,  $p, q \in (0, +\infty]$ , произведения нескольких так называемых  $(s, r)$ -ядерных (и близких к ним) операторов в банаховых пространствах факторизуется через операторы в гильбертовом пространстве, принадлежащие классам Лоренца-Шаттена  $S_{p,q}$ . Результаты применяются к некоторым задачам о распределении собственных чисел.

## 2. Предварительные сведения

Мы придерживаемся терминологии монографии [13]. Везде далее через  $X, Y, \dots$  обозначаются банаховы пространства,  $L(X, Y)$  — банахово пространство всех линейных непрерывных операторов из  $X$  в  $Y$ . Для банахова сопряженного к пространству  $X$  используется обозначение  $X^*$ . Если  $x \in X$  и  $x' \in X^*$ , то используем обозначение  $\langle x', x \rangle$  для  $x'(x)$ . Элементы пространств  $X, X^*, Y$  и т.д. будут обозначаться через  $x, x', y$  и т.д.. Обозначения  $c_0, l_p, L_p$  ( $0 < p \leq \infty$ ) стандартны.

Пространство Лоренца  $l_{p,q}$  ( $0 < p < \infty, 0 \leq q \leq \infty$ ) состоит из последовательностей  $\alpha := (\alpha_n) \in c_0$ , для которых

$$\|\alpha\|_{p,q} := \left( \sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n^{*q} n^{q/p-1} \right)^{1/q} < +\infty \text{ при } q < \infty \text{ и } \|\alpha\|_{p,\infty} := \sup_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n^* n^{1/p} < +\infty,$$

где  $(\alpha_n^*)$  есть неубывающая перестановка последовательности  $\alpha$ ,  $n$ -й элемент  $\alpha_n^*$  которой определяется так:

$$\alpha_n^* := \inf_{|J| < n} \sup_{j \notin J} |\alpha_j|.$$

С указанными квазинормами пространства  $l_{p,q}$  являются полными квазинормированными пространствами. При  $p = q = \infty$  получаем пространства  $l_p$  (с квазинормой  $\|\cdot\|_p$ ). Естественно считать, что  $l_{\infty\infty} = l_\infty$  (с квазинормой  $\|\cdot\|_\infty$ ). Отметим, что  $l_{p,q_1} \subsetneq l_{p,q_2}$  для  $q_1 < q_2$  и  $l_{p_1,q_1} \subsetneq l_{p_2,q_2}$  для  $p_1 < p_2$  и для всех  $q_1, q_2$ .

Оператор  $T : X \rightarrow Y$  называется  $s$ -ядерным ( $0 < s \leq 1$ , см., например, [13]), если он представим в виде  $Tx = \sum_{k=1}^{\infty} \langle x'_k, x \rangle y_k$  для  $x \in X$ , где

$$(x'_k) \subset X^*, (y_k) \subset Y, \sum_k \|x'_k\|^s \|y_k\|^s < \infty.$$

Мы используем обозначение  $N_s(X, Y)$  для линейного пространства всех таких операторов и  $\nu_s(T)$  для соответствующей квазинормы  $\inf(\sum_k \|x'_k\|^s \|y_k\|^s)^{1/s}$ . В случае, когда  $s = 1$ , эти операторы называют просто *ядерными*. Оператор  $T : X \rightarrow Y$  называется  $(s, r)$ -ядерным ( $0 < s < 1, 0 < r \leq \infty$  или  $s = 1, 0 < r \leq 1$ ; см., например, [6]), если он может быть представлен в виде  $Tx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \langle x'_n, x \rangle y_n$  для  $x \in X$ , где  $(x'_n) \subset X^*, (y_n) \subset Y, \|x'_n\|, \|y_n\| \leq 1, (a_n) \in l_{s,r}$ . Отметим, что мы можем (и будем) предполагать, что  $\|x'_n\| = \|y_n\| = 1$  для всех  $n$  и что последовательность  $(a_n)$  неотрицательная и убывающая.. Мы используем обозначения  $N_{s,r}(X, Y)$  для векторного пространства всех таких операторов и  $\nu_{s,r}(T)$  для соответствующей квазинормы  $\inf \|(a_n)\|_{l_{s,r}}$ . В случае, когда  $s = r = 1$  эти операторы называются *ядерными*.

Ниже мы рассматриваем только  $(s, r)$ -ядерные операторы для показателей, удовлетворяющих неравенствам  $0 < r \leq s \leq 1$ . Каждый  $(s, r)$ -ядерный оператор  $T : X \rightarrow Y$  допускает факторизацию следующего вида:

$$(1) \quad T : X \xrightarrow{W} l_\infty \xrightarrow{\Delta} l_1 \xrightarrow{V} Y,$$

где  $\|V\| = \|W\| = 1$  и  $\Delta$  — диагональный оператор с диагональю  $(d_n) \in l_{s,r}$ . Действительно, достаточно положить  $Wx := (\langle x'_k, x \rangle)$ ,  $V(\alpha_n) := \sum \alpha_n y_n$  и  $\Delta(\beta_n) := (d_n \beta_n)$  (где  $d_n := a_n$ ). Для наших целей, удобно переписать указанную факторизацию следующим образом:

$$(2) \quad T : X \xrightarrow{W} l_\infty \xrightarrow{\Delta_1} l_2 \xrightarrow{\Delta_0} l_2 \xrightarrow{\Delta_2} l_1 \xrightarrow{V} Y,$$

где  $\Delta_1 := (\sqrt{n^{r/s-1} d_n^r})$ ,  $\Delta_2 := (\sqrt{n^{r/s-1} d_n^r})$  и  $\Delta_0 := (n^{1-r/s} d_n^{1-r})$ .

Предположим, что  $\varepsilon > 0$  и в факторизации (1)  $\|V\| = \|W\| = 1$  и  $\|(d_n)\|_{l_{s,r}} \leq (1 + \varepsilon)\nu_{s,r}(T)$ . Тогда

$$(3) \quad \begin{aligned} \|\Delta_2\| &= \|\Delta_1\| \leq \pi_2(\Delta_1) \leq \|\sqrt{n^{r/s-1}d_n^r}\|_{l_2} \\ &= \|n^{r/s-1}d_n^r\|_{l_1}^{1/2} \leq [(1 + \varepsilon)\nu_{s,r}(T)]^{r/2}. \end{aligned}$$

Также  $\Delta_0 \in S_{q,v}(l_2)$ , где  $1/q = 1/s - 1$  и  $1/v = 1/r - 1$ . Более того, так как  $1/q - 1/v = 1/s - 1/r$ ,  $1 - r = r/v$  и  $v/q - 1 + v - vr/s = v(1/s - 1/r + r(1/r - 1/s)) = v(1 - r)(1/s - 1/r) = r(1/s - 1/r)$ , то

$$(4) \quad \begin{aligned} \sigma_{q,v}(\Delta_0) &= \left( \sum n^{v/q-1} [n^{1-r/s} d_n^{1-r}]^v \right)^{1/v} \\ &= \left( \sum [n^{1/s-1/r} d_n]^r \right)^{1/v} \leq [(1 + \varepsilon)\nu_{s,r}(T)]^{r/v}. \end{aligned}$$

Факторизация  $(s, r)$ -ядерного оператора  $T$ , описанна в (2)–(4) будет называться  $\varepsilon$ -допустимой факторизацией для  $T$ .

Для нас очень важным будут классы  $S_{p,q}$  (классы Лоренца-Шаттена) операторов в гильбертовых пространствах, представляющие собой обобщения хорошо известных классов Шаттена  $S_p$ . Класс  $S_{p,q}$ ,  $0 < p, q < \infty$ , рассмотренный впервые Трибелем [16], определяется следующим образом. Пусть  $U$  — компактный оператор в гильбертовом пространстве  $H$  и  $(\mu_n)$  — последовательность его сингулярных чисел (см., например, [12], 2.1.13). Оператор  $U$  принадлежит пространству  $S_{p,q}(H)$ , если  $(\mu_n) \in l_{p,q}$ . (см., например, [12], 2.11.15). Пространство  $S_{p,q}(H)$  имеет естественную квазинорму

$$\sigma_{p,q}(U) = \|(\mu_n)\|_{p,q} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} n^{(q/p)-1} \mu_n^q \right)^{1/q}.$$

При  $p = q$  класс  $S_{p,p}$  совпадает с классом  $S_p$  (с квазинормой  $\sigma_p$ ). Отметим, что для  $p, q \in (0, 1]$  выполняется равенство  $N_{p,q}(H) = S_{p,q}(H)$  (см. например, [6]). Имеют место включения  $S_{p,q} \subset S_{p',q'}$ , если  $0 < p < \infty$  и  $0 < q \leq q' < \infty$  или  $0 < p < p' < \infty$ ,  $0 < q, q' < \infty$  (см. [16], Lemma 2) и

$$S_{p,q} \circ S_{p',q'} \subset S_{s,r}, \quad 1/p + 1/p' = 1/s, \quad 1/q + 1/q' = 1/r.$$

При этом, если  $V \in S_{p,q}$  и  $U \in S_{p',q'}$ , то  $\sigma_{s,r}(UV) \leq 2^{1/s} \sigma_{p',q'}(U) \sigma_{p,q}(V)$  (см. [11], p. 155).

В случае, когда  $p = q, p' = q'$ , вместо  $2^{1/s}$  в последнем неравенстве можно поставить 1 [7], [12], p. 128, [3], p.262.

Примерами  $S_{p,q}$ -операторов могут служить диагональные операторы  $D$  в  $l_2$  с диагоналями  $(d_n)$  из  $l_{p,q}$ ; в этих случаях мы пишем  $D = (d_n)$ .

Ниже мы используем понятие 2-абсолютно суммирующей нормы  $\pi_2$  для операторов в банаховых пространствах (см. [13]). Отметим, что  $\pi_2 = \sigma_2$  для операторов в гильбертовых пространствах (см. [13]).

### 3. Основные результаты

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.** Оператор  $T : X \rightarrow Y$  факторизуется через оператор из  $S_{p,q}(H)$  (через  $S_{p,q}$ -оператор), если существуют такие операторы  $A \in L(X, H)$ ,  $U \in S_{p,q}(H)$  и  $B \in L(H, Y)$ , что  $T = BUA$ . Если  $T$  факторизуется через оператор из  $S_{p,q}(H)$ , то полагаем  $\gamma_{S_{p,q}}(T) = \inf \|A\| \sigma_{p,q}(U) \|B\|$ , где инфимум берется по всем возможным факторизациям оператора  $T$  через оператор из  $S_{p,q}(H)$ .

Ниже нам понадобится следующий факт.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1.** Если оператор  $T : X \rightarrow Y$  факторизуется через  $S_{p,q}$ -оператор, то для любого  $\varepsilon > 0$  факторизацию  $T = BUA$ , где  $A \in L(X, H)$ ,  $U \in S_{p,q}(H)$  и  $B \in L(H, Y)$ , можно выбрать таким образом, что оператор  $B$  инъективен,  $\overline{B(H)} = \overline{T(X)}$  и  $\|A\| \sigma_{p,q}(U) \|B\| \leq (1 + \varepsilon) \gamma_{S_{p,q}}(T)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Это простое упражнение. В любом случае, доказательство соответствующего факта в [2] о факторизации через  $S_p$  оператор переносится и на этот случай.  $\square$

**СЛЕДСТВИЕ 1.** Пусть  $0 < p \leq 1, 0 < t \leq q \leq p$ . В условиях предложения 1, если оператор  $T$  конечномерен, то  $\gamma_{S_{p,t}}(T) \leq (\dim T(X))^{1/t-1/q} \gamma_{S_{p,q}}(T)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Если некоторый оператор  $V : X \rightarrow Y$  факторизуется через  $S_{s,r}$ -оператор, то ассоциированный с ним оператор  $V_0 : X \rightarrow \overline{V(X)}$  факторизуется через  $S_{s,r}$ -оператор с той же  $S_{s,r}$ -факторизационной квазинормой (предложение 1). У нас пространство  $T(X)$  конечномерно. Поэтому, применяя к оператору  $T$  теорему 1 и предложение 1, мы получаем соответствующую факторизацию  $T = BUA$  нашего оператора через  $S_{s,r}$ -оператор в конечномерном гильбертовом пространстве (размерности  $N := \dim T(X)$ ). Если  $t \in (0, q]$ , то наше утверждение следует из соответствующих неравенств для  $S_{p,t}$ -квазинорм в конечномерной ситуации: если  $(\mu_k(U))_{k=1}^N$  — сингулярные числа оператора  $U$ , то, по неравенству Гельдера,

$$\left( \sum_{k=1}^N k^{t/p-1} \mu_k(U)^t \right)^{1/t} \leq N^{1/t-1/p} \left( \sum_{k=1}^N k^{q/p-1} \mu_k(U)^q \right)^{1/q}.$$

$\square$

Имеет место следующая

**ТЕОРЕМА 1.** Пусть  $m \in \mathbb{N}$ . Если  $X_1, X_2, \dots, X_{m+1}$  — банаховы пространства,  $0 < r_k \leq s_k \leq 1$   $T_k \in N_{s_k, r_k}(X_k, X_{k+1})$  для  $k = 1, 2, \dots, m$ , то произведение  $T := T_m T_{m-1} \cdots T_1$  может быть факторизовано через оператор из  $S_{s,r}(H)$ , где  $1/s = 1/s_1 + 1/s_2 + \cdots + 1/s_m - (m+1)/2$  и  $1/r = 1/r_1 + 1/r_2 + \cdots + 1/r_m - (m+1)/2$ . Более того,

$$\gamma_{S_{s,r}}(T) \leq 2^{1/s} \tilde{c} \prod_{k=1}^m \nu_{s_k, r_k}(T_k),$$

где  $\tilde{c}$  — некоторая постоянная  $\tilde{c} := c_{m;s_1,s_2,\dots,s_{m-1}}$ , зависящая только от значений указанных параметров. Если  $s = r$ , то постоянная перед произведением равна единице.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим отдельно два случая.

Случай 1:  $m > 1$ . Для каждого  $T_k$ , пусть

$$T_k := V_k D_2^{(k)} D_0^{(k)} D_1^{(k)} W_k$$

— его  $\varepsilon$ -допустимая факторизация (так что  $1/q_k = 1/s_k - 1$  и  $1/v_k = 1/r_k - 1$ ). Отщепим часть произведения  $T$ , а именно, рассмотрим оператор

$$D_0^{(m)} D_1^{(m)} W_m V_{m-1} D_2^{(m-1)} D_0^{(m-1)} D_1^{(m-1)} W_{m-1} \dots V_1 D_2^{(1)} D_0^{(1)} : l_2 \rightarrow l_2.$$

Каждый кусок вида  $U_{k-1} := D_1^{(k)} W_k V_{k-1} D_2^{(k-1)} D_0^{(k-1)}$  этого произведения ( $k > 1$ ),

$$U_{k-1} : l_2 \xrightarrow{D_0^{(k-1)}} l_2 \xrightarrow{D_2^{(k-1)}} l_1 \xrightarrow{V_{k-1}} X_k \xrightarrow{W_k} l_\infty \xrightarrow{D_1^{(k)}} l_2,$$

есть композиция операторов, для которых

$$\begin{aligned} \sigma_2(D_1^{(k)} W_k V_{k-1} D_2^{(k-1)}) &= \pi_2(D_1^{(k)} W_k V_{k-1} D_2^{(k-1)}) \leq \|n^{r_k/s_k-1} (d_n^{(k)})_{r_k}\|_{l_1}^{1/2} \|D_2^{(k-1)}\| \leq \\ &\leq \|n^{r_k/s_k-1} (d_n^{(k)})_{r_k}\|_{l_1}^{1/2} \|n^{r_{k-1}/s_{k-1}-1} (d_n^{(k-1)})_{r_{k-1}}\|_{l_1}^{1/2} \\ &\leq [(1 + \varepsilon) \nu_{s_k, r_k}(T_k)]^{r_k/2} [(1 + \varepsilon) \nu_{s_{k-1}, r_{k-1}}(T_{k-1})]^{r_{k-1}/2} \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} \sigma_{q_{k-1}, v_{k-1}}(D_0^{(k-1)}) &= \\ \left( \sum [n^{1/s_{k-1}-1/r_{k-1}} d_n^{(k-1)}]_{r_{k-1}} \right)^{1/v_{k-1}} &\leq [(1 + \varepsilon) \nu_{s_{k-1}, r_{k-1}}(T_{k-1})]^{r_{k-1}/v_{k-1}}. \end{aligned}$$

Следовательно,  $U_{k-1} \in S_{u_{k-1}, w_{k-1}}(l_2)$ , где  $1/u_{k-1} = 1/2 + 1/q_{k-1}$ ,  $1/w_{k-1} = 1/2 + 1/v_{k-1}$ , и

$$\sigma_{u_{k-1}, w_{k-1}}(U_{k-1}) \leq 2^{1/u_{k-1}} [(1 + \varepsilon) \nu_{s_k, r_k}(T_k)]^{r_k/2} [(1 + \varepsilon) \nu_{s_{k-1}, r_{k-1}}(T_{k-1})]^{1-r_{k-1}/2}$$

Теперь,  $T = V_m D_2^{(m)} D_0^{(m)} U_{m-1} U_{m-2} \dots U_1 D_1^{(1)} W_1$ . Здесь

$$\|V_m\| = \|W_1\| = 1, \|D_2^{(m)}\| \leq \|n^{r_m/s_m-1} (d_n^{(m)})_m\|_{l_1}^{1/2} \leq [(1 + \varepsilon) \nu_{s_m, r_m}(T_m)]^{r_m/2},$$

$$\sigma_{q_m, v_m}(D_0^{(m)}) = \left( \sum [n^{1/s_m-1/r_m} d_n^{(m)}]_{r_m} \right)^{1/v_m} \leq [(1 + \varepsilon) \nu_{s_m, r_m}(T_m)]^{r_m/v_m},$$

$$\|D_1^{(1)}\| \leq \|n^{r_1/s_1-1} (d_n^{(1)})_1\|_{l_1}^{1/2} \leq [(1 + \varepsilon) \nu_{s_1, r_1}(T_1)]^{r_1/2}.$$

Для произведения  $U_{m-1} U_{m-2} \dots U_1$ , имеем:  $U_{m-1} U_{m-2} \dots U_1 \in S_{u, w}(l_2)$ , где  $1/u = 1/u_{m-1} + \dots + 1/u_1 = 1/s_{m-1} + \dots + 1/s_1 - (m-1)/2$  и  $1/w = 1/w_{m-1} + \dots + 1/w_1 = 1/r_{m-1} + \dots + 1/r_1 - (m-1)/2$ . Более того, для некоторой постоянной  $\tilde{c} := c_{m;s_1,s_2,\dots,s_{m-1}}$ , зависящей только от значений указанных параметров,

$$\begin{aligned} \sigma_{u, w}(U_{m-1} U_{m-2} \dots U_1) &\leq \tilde{c} [(1 + \varepsilon) \nu_{s_m, r_m}(T_m)]^{r_m/2} [(1 + \varepsilon) \nu_{s_{m-1}, r_{m-1}}(T_{m-1})]^{1-r_{m-1}/2} \times \\ &\times [(1 + \varepsilon) \nu_{s_{m-1}, r_{m-1}}(T_{m-1})]^{r_{m-1}/2} [(1 + \varepsilon) \nu_{s_{m-2}, r_{m-2}}(T_{m-2})]^{1-r_{m-2}/2} \dots \\ &[(1 + \varepsilon) \nu_{s_2, r_2}(T_2)]^{1-r_2/2} [(1 + \varepsilon) \nu_{s_2, r_2}(T_2)]^{r_2/2} [(1 + \varepsilon) \nu_{s_1, r_1}(T_1)]^{1-r_1/2}. \end{aligned}$$

Положим

$$A = D_1^{(1)}W_1, B = V_m D_2^m, U = D_0^m U_{m-1} U_{m-2} \dots U_1.$$

Тогда  $T = BUA$  and, by (3)–(4),

$$\|A\| \leq [(1 + \varepsilon)\nu_{s_1, r_1}(T_1)]^{r_1/2}, \|B\| \leq [(1 + \varepsilon)\nu_{s_m, r_m}(T_m)]^{r_m/2},$$

$$\begin{aligned} \sigma_{s,r}(U) &\leq 2^{1/s} \sigma_{q_m, v_m}(D_0^m) \sigma_{u,w}(U_{m-1} U_{m-2} \dots U_1) \leq \\ &\leq 2^{1/s} \tilde{c} [(1 + \varepsilon)\nu_{s_m, r_m}(T_m)]^{1-r_m} [(1 + \varepsilon)\nu_{s_m, r_m}(T_m)]^{r_m/2} [(1 + \varepsilon)\nu_{s_{m-1}, r_{m-1}}(T_{m-1})] \times \\ &\quad [(1 + \varepsilon)\nu_{s_{m-2}, r_{m-2}}(T_{m-2})] \dots [(1 + \varepsilon)\nu_{s_2, r_2}(T_2)] [(1 + \varepsilon)\nu_{s_1, r_1}(T_1)]^{1-r_1/2} \end{aligned}$$

(напомним, что  $r_m/v_m = 1 - r_m$ ,  $1/q_m = 1/s_m - 1$  and  $1/v_m = 1/r_m - 1$ ). Следовательно,

$$\gamma_{S_{s,r}(T)} \leq 2^{1/s} \tilde{c} \prod_{k=1}^m \nu_{s_k, r_k}(T_k).$$

Случай 2:  $m = 1$ . Пусть  $0 < r \leq s < 1$  или  $0 < r < s = 1$  (ситуация, в которой  $s = r = 1$  рассмотрена в [2]). В этом случае  $1/q_1 = 1/s_1 - 1$  и  $1/v_1 = 1/r_1 - 1$  (и, следовательно,  $r_1/v_1 = 1 - r_1$ ). Для  $\varepsilon$ -допустимой факторизации  $T_1 := V_1 D_2^{(1)} D_0^{(1)} D_1^{(1)} W_1$  имеем:

$$\|V_1 D_2^{(1)}\| \|D_1^{(1)} W_1\| \sigma_{q_1, v_1}(D_0^{(1)}) \leq$$

$$[(1 + \varepsilon)\nu_{s_1, r_1}(T_1)]^{r_1} [(1 + \varepsilon)\nu_{s_1, r_1}(T_1)]^{r_1/v_1} = (1 + \varepsilon)\nu_{s_1, r_1}(T_1).$$

Следовательно,

$$\gamma_{S_{s_1, r_1}(T_1)} \leq \nu_{s_1, r_1}(T_1). \quad \square$$

Из доказательства теоремы получаем даже более сильное утверждение.

**СЛЕДСТВИЕ 2.** В условиях теоремы 1, для любого  $\delta > 0$  произведение  $T := T_m T_{m-1} \dots T_1$  может быть факторизовано следующим образом

$$T : X_1 \xrightarrow{\tilde{A}} l_2 \xrightarrow{\tilde{U}} l_2 \xrightarrow{\tilde{B}} X_m,$$

где  $\pi_2(\tilde{A}) \leq 1$ ,  $\pi_2(\tilde{B}^*) \leq 1$  и

$$\sigma_{s,r}(\tilde{U}) \leq (1 + \delta) 2^{1/s} \tilde{c} \prod_{k=1}^m \nu_{s_k, r_k}(T_k).$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Рассмотрим операторы  $A, U, B$  из доказательства теоремы 1 и положим

$$\tilde{A} := [(1 + \varepsilon)\nu_{s_1, r_1}(T_1)]^{-r_1/2} A, \quad \tilde{B} := [(1 + \varepsilon)\nu_{s_m, r_m}(T_m)]^{-r_1/2} B,$$

$$\tilde{U} := (1 + \varepsilon)^{r_1/2 + r_m/2} \nu_{s_1, r_1}(T_1)^{r_1/2} \nu_{s_m, r_m}(T_m)^{r_m/2} U.$$

Выбрав достаточно малое  $\varepsilon = \varepsilon(\delta)$ , получим желаемую факторизацию. □

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Если  $s = r$  (тогда все  $s_j$  и, соответственно, все  $r_j$  равны между собой), постоянная в неравенстве из теоремы 1 (соотв., в Следствии 2) равна единице (соотв.,  $1 + \delta$ .) [2]. Действительно, в этом случае постоянные в неравенствах Гельдера для соотношений типа  $S_r \subset S_p \circ S_q$  равны единице.

СЛЕДСТВИЕ 3. В условиях теоремы 1, пусть  $X_1 = X_m$  и  $\delta > 0$ . Последовательность  $(\lambda_n(T))$  собственных чисел оператора  $T$  лежит в пространстве  $S_{\tilde{s}, \tilde{r}}$ , где  $\tilde{s} = 1/2 + 1/s$ ,  $\tilde{r} = 1/2 + 1/r$ . При этом

$$\|(\lambda_n(T))\|_{\tilde{s}, \tilde{r}} \leq 2^{1/s+1/\tilde{s}} \tilde{c} \prod_{k=1}^m \nu_{s_k, r_k}(T_k).$$

Если  $s = r$ , то постоянная справа в этом неравенстве равна 1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $\delta > 0$ . В обозначениях следствия 2 и теоремы 1, рассмотрим следующую диаграмму:

$$\tilde{A}T : X_1 \xrightarrow{\tilde{A}} l_2 \xrightarrow{\tilde{U}} l_2 \xrightarrow{\tilde{B}} X_1 \xrightarrow{\tilde{A}} l_2.$$

Последовательность собственных чисел  $(\lambda_n(T))$  оператора  $T$  совпадает (с учетом их алгебраических кратностей) с полной последовательностью собственных чисел оператора  $\tilde{A}\tilde{U}\tilde{B}$  (см., например, [13]). Так как

$$\tilde{A}\tilde{U}\tilde{B} \in S_2 \circ S_{s,r} \subset S_{\tilde{s}, \tilde{r}}$$

и  $r \leq s$ , то, по неравенству Вейля (см. [9], 1.с.13),

$$\|(\lambda_n(T))\|_{\tilde{s}, \tilde{r}} \leq \sigma_{\tilde{s}, \tilde{r}}(\tilde{A}\tilde{U}\tilde{B}) \leq 2^{1/\tilde{s}} \pi_2(\tilde{A}) \sigma_{s,r}(\tilde{U}) \leq (1 + \delta) 2^{1/s+1/\tilde{s}} \tilde{c} \prod_{k=1}^m \nu_{s_k, r_k}(T_k).$$

В силу произвольности  $\delta$ , наше утверждение доказано.  $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Имеет место более сильный вариант последнего следствия. Пусть  $\Sigma_{p,q}$  есть пространство всех неупорядоченных комплексных последовательностей  $\alpha = (\alpha_k)$ , для которых конечна величина  $\rho_{p,q}(\alpha, \beta) := \inf \text{dist}_{p,q}(\alpha_k - \beta_k)$ , где  $\text{dist}_{p,q}$  — метрика на пространстве  $l_{p,q}$ , порождающая его естественную топологию (см., например, [[12], 6.1-6.2, а также [5], Chap. 2, pp. 20-21). Здесь infimum берется по всевозможным последовательностям  $(\alpha_k)$  (соответственно,  $(\beta_k)$ ) из  $l_{p,q}$ , которые определяют неупорядоченную последовательность  $\alpha$  (соответственно,  $(\beta_k)$ ). Тогда, в условиях теоремы 1 (и следствия 3), естественное отображение

$$N_{s_m, r_m} \circ N_{s_{m-1}, r_{m-1}} \cdots \circ N_{s_1, r_1} \rightarrow \Sigma_{\tilde{s}, \tilde{r}}$$

непрерывно. Доказательство сводится к случаю гильбертова пространства, в котором непрерывность естественного отображения  $S_{\tilde{s}, \tilde{r}} \rightarrow \Sigma_{\tilde{s}, \tilde{r}}$  получается, например, с помощью рассуждений, аналогичных тем, что приведены в [3], Chap 11, §7. Впрочем, этот фкт для  $s$ -ядерных операторов и операторов из класса  $S_p$  был известен еще А. Гротендику [5], Chap. 2, pp. 20-21.

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Следствие 3 точно для случая, когда  $s = r$  (см. [2]). В общем случае точным оказывается такой результат.



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.** Пусть  $m \in \mathbb{N}$ . Если  $X_1, X_2, \dots, X_{m+1}$  — банаховы пространства,  $0 < r_k \leq s_k \leq 1$ ,  $T_k \in N_{s_k, r_k}(X_k, X_{k+1})$  для  $k = 1, 2, \dots, m$ , то собственные числа произведения  $T := T_m T_{m-1} \cdots T_1$  лежат в пространстве  $l_{p,q}$ , где  $1/p = 1/s_1 + 1/s_2 + \cdots + 1/s_m - m/2$ ,  $1/q = \sum_{k=1}^m 1/r_k$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Мы воспользуемся теми фактами, что идеал операторов Вейля  $\mathfrak{L}_{p,q}^{(x)}$  [12] типа  $l_{p,q}$  имеет спектральный тип  $l_{p,q}$  (т. е. последовательности собственных чисел операторов Вейля лежат в  $l_{p,q}$ ; см. [12], 3.6.2) и идеал  $(p_0, q)$ -ядерных операторов, где  $1/p_0 = 1/2 + 1/p$ , вложен в этот идеал операторов Вейля [6], р. 243. Из этих фактов следует, что оператор  $T$  лежит в соответствующем произведении идеалов операторов Вейля. По теореме о произведениях [12], 2.4.18,

$$\mathfrak{L}_{p_1, q_1}^{(x)} \circ \mathfrak{L}_{p_2, q_2}^{(x)} \subset \mathfrak{L}_{p, q}^{(x)},$$

где  $1/p = 1/p_1 + 1/p_2$ ,  $1/q = 1/q_1 + 1/q_2$ . Поэтому  $(\lambda_n(T)) \in \mathfrak{L}_{s,q}^{(x)}$ , где и  $1/q = \sum_{k=1}^m 1/r_k$ .  $\square$

В работе [2], как видно из доказательства теоремы 3 той работы, мы на самом деле, кроме всего прочего, установили следующий результат, показывающий, что утверждение следствия 3 точно для случая, когда рассматриваются  $p$ -ядерные операторы и классы Шаттена  $S_p$  (т. е. в следствии 3  $s = r$ ). Сформулируем результат в полной общности (используя и заключение теоремы 1 при  $s = r$ ).

**ТЕОРЕМА 2.** В условиях теоремы 1, пусть  $\lambda := (\lambda_k(T))$  есть последовательность всех собственных чисел оператора  $T$ , взятых с учетом кратностей. Если  $s_k = r_k$ ,  $k = 1, 2, \dots, m$ , то  $\lambda \in l_q$ , где  $1/q = 1/r_1 + 1/r_2 + \cdots + 1/r_m - m/2$ , причем  $(\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|^q)^{1/q} \leq \prod_{k=1}^m \nu_{r_k}(T_k)$ . Неравенство неулучшаемо с точностью до абсолютной постоянной (для любого количества операторов и для любого набора чисел  $0 < r_k = s_k \leq 1$ ).

#### 4. Факторизация операторов из $N_{s;2}$

В этом разделе мы рассмотрим задачу о факторизации через операторы из классов Лоренца-Шаттена операторов типа  $N_{s;2}$  (в индексе точка с запятой!). Здесь  $0 < s \leq 2$ . Для банаховых пространств  $X, Y$  пространство  $N_{s;2}(X, Y)$  состоит из ядерных операторов  $T : X \rightarrow Y$ , которые представимы в виде  $Tx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \langle x'_n, x \rangle y_n$ , для  $x \in X$ , где

$$\|x'_n\| \leq 1, (a_n) \in l_s, \|(y_n)\|_2^{\text{weak}} := \sup_{\|y'\| \leq 1} \left( \sum_{n=1}^{\infty} |\langle y', y_n \rangle|^2 \right)^{1/2} < \infty.$$

Такие операторы будем называть  $(s; 2)$ -ядерными. Отметим, что мы можем (и будем) предполагать, что  $\|x'_n\| = 1$ ,  $\|(y_n)\|_2^{\text{weak}} = 1$  для всех  $n$  и что последовательность  $(a_n)$  неотрицательная и убывающая. Мы используем обозначение  $\nu_{(s;2)}(T)$  для естественной квазинормы  $\inf \|(a_n)\|_{l_s}$ . Идеалы  $(s; 2)$ -операторов являются частными случаями идеалов  $(s, r, q)$ -ядерных операторов из [13], 18.1.

Каждый  $(s; 2)$ -ядерный оператор  $T : X \rightarrow Y$  допускает факторизацию следующего вида:

$$(5) \quad T : X \xrightarrow{W} l_\infty \xrightarrow{\Delta} l_2 \xrightarrow{V} Y,$$

где  $\|V\| = \|W\| = 1$  и  $\Delta$  — диагональный оператор с диагональю  $(d_n) \in l_s$ . Действительно, достаточно положить  $Wx := (\langle x'_k, x \rangle)$ ,  $V(\alpha_n) := \sum \alpha_n y_n$  и  $\Delta(\beta_n) := (d_n \beta_n)$  (где  $d_n := a_n$ ). Для наших целей, удобно переписать указанную факторизацию следующим образом (мы следуем идеям из [12], 3.8.6):

$$(6) \quad T : X \xrightarrow{W} l_\infty \xrightarrow{\Delta_1} l_2 \xrightarrow{\Delta_0} l_2 \xrightarrow{V} Y,$$

где  $\Delta_1 := (d_n^{s/2})$  и  $\Delta_0 := (d_n^{s/q})$ , где  $1/q = 1/s - 1/2$ . Предположим, что  $\varepsilon > 0$  и в факторизации (6)  $\|V\| = \|W\| = 1$  и  $\|(d_n)\|_{l_s} \leq (1 + \varepsilon)\nu_{s;2}(T)$ . Тогда

$$(7) \quad \pi_2(\Delta_1) \leq \|(d_n^{s/2})\|_{l_2} = \|(d_n)\|_{l_s}^{s/2} \leq [(1 + \varepsilon)\nu_{s;2}(T)]^{s/2}.$$

Также  $\Delta_0 \in S_q(l_2)$  и  $\sigma_q(\Delta_0) \leq \|(d_n)\|_{l_s}^{s/q} \leq [(1 + \varepsilon)\nu_{s;2}(T)]^{s/q}$ . Поэтому  $T = V\Delta_0\Delta_1W \in S_q \circ \Pi_2$  и  $\|T\|_{S_q \circ \Pi_2} \leq \nu_{s;2}(T)$ .

Теперь нетрудно получить следующий результат.

**ТЕОРЕМА 3.** Пусть  $m \in \mathbb{N}$ . Если  $X_1, X_2, \dots, X_{m+1}$  — банаховы пространства,  $0 < s_k \leq 2$  и  $T_k \in N_{s_k;2}(X_k, X_{k+1})$  для  $k = 1, 2, \dots, m$ , то произведение  $T := T_m T_{m-1} \dots T_1$  может быть факторизовано через оператор из  $S_s(H)$ , где  $1/s = \sum_{k=1}^m 1/s_k - 1/2$ . Более того,

$$\gamma_{S_s}(T) \leq \prod_{k=1}^m \nu_{s_k;2}(T_k),$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Следуя предыдущим рассуждениям, факторизуем каждый из операторов  $T_k$  как произведение  $V^k \Delta_0^k \Delta_1^k W^k$ . Тогда на "стыке" двух операторов появится оператор вида  $\Delta_1^{k+1} W^{k+1} V^k$ , у которого  $\sigma_2$ -норма не превосходит  $\pi_2$ -нормы оператора  $\Delta_1^{k+1}$ , т. е.  $[(1 + \varepsilon)\nu_{s_{k+1};2}]^{s_{k+1}/2}$ . За ним следует оператор  $\Delta_0^{k+1}$ , для которого  $\sigma_{q_{k+1}}(\Delta_0^{k+1}) \leq [(1 + \varepsilon)\nu_{s_{k+1};2}]^{s_{k+1}/q_{k+1}}$ . Поэтому

$$T \in L \circ S_{q_m} \circ S_2 \circ S_{q_{m-1}} \circ S_2 \circ \dots \circ S_{q_2} \circ S_2 \circ S_{q_1} \circ \Pi_2 \circ L.$$

Здесь слева и справа в получаемой факторизации  $T$  появляются операторы  $V^m$  и  $\Delta_1^1 W^1$  соответственно. Между ними находятся произведения вида  $S_{q_k} \circ S_2$  ( $m - 1$  штука). Особняком входит в произведение оператор из  $S_{q_1}$ . Таким образом, используя неравенство Гельдера для произведений операторов из классов Шаттена, получаем:  $T \in L \circ S_s \circ \Pi_2$ ,  $\gamma_{S_s} \leq \prod_{k=1}^m \nu_{s_k;2}(T_k)$ .  $\square$

Важно отметить, что в полученном неравенстве постоянная оценки справа ( $= 1$ ) не зависит от параметров.

**СЛЕДСТВИЕ 4.** В условиях теоремы 3, для любого  $\delta > 0$  оператор  $T$  представим в виде произведения  $BUA \in L \circ S_s \circ \Pi_2$ , где

$$\|B\| = 1, \sigma_s(U) \leq (1 + \delta) \prod_{k=1}^m \nu_{s_k;2}(T_k) \text{ и } \pi_2(A) = 1.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Это вытекает непосредственно из доказательства теоремы 3.  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 5. В условиях теоремы 3, пусть  $X_1 = X_m$  и  $\delta > 0$ . Последовательность  $(\lambda_n(T))$  собственных чисел оператора  $T$  лежит в пространстве  $S_{\tilde{s}}$  где  $\tilde{s} = \sum_{k=1}^m 1/s_k$ . При этом

$$\|(\lambda_n(T))\|_{\tilde{s}} \leq \prod_{k=1}^m \nu_{s_k;2}(T_k).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Применяем предыдущее следствие. Так как наборы собственных чисел операторов  $T = BUA : X_1 \xrightarrow{A} l_2 \xrightarrow{U} l_2 \xrightarrow{B} X_1$  и  $ABU : l_2 \xrightarrow{U} l_2 \xrightarrow{B} X_1 \xrightarrow{A} l_2$  совпадают (вместе с кратностями) и  $\Pi_2(l_2) = S_2(l_2)$  изометрично, то  $(\lambda_n(T)) \in l_{\tilde{s}}$ . Неравенство следует из неравенства Гельдера для произведений  $S_p$ -операторов и из неравенства Вейля между  $l_p$ -квазинормами последовательностей собственных и сингулярных чисел.  $\square$

Приведем конечномерные варианты теоремы 3 и следствия 5.

СЛЕДСТВИЕ 6. Пусть  $m \in \mathbb{N}$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_{m+1}$  — банаховы пространства,  $0 < s_k \leq 2$  и  $T_k \in N_{s_k;2}(X_k, X_{k+1})$  для  $k = 1, 2, \dots, m$ . Пусть, далее,  $1/s = \sum_{k=1}^m 1/s_k - 1/2$  и  $0 < t \leq s$ . Если оператор  $T := T_m T_{m-1} \cdots T_1$  конечномерен, то

$$\gamma_{s_s}(T) \leq (\dim T(X_1))^{1/t-1/s} \prod_{k=1}^m \nu_{s_k;2}(T_k),$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточно применить следствие 1.  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 7. Пусть  $m \in \mathbb{N}$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_{m+1}$  — банаховы пространства,  $0 < s_k \leq 2$  и  $T_k \in N_{s_k;2}(X_k, X_{k+1})$  для  $k = 1, 2, \dots, m$ . Пусть, далее,  $1/s = \sum_{k=1}^m 1/s_k - 1/2$  и  $0 < t \leq s$ . Если оператор  $T := T_m T_{m-1} \cdots T_1$  конечномерен, то

$$\|(\lambda_n(T))\|_{\tilde{s}} \leq (\dim T(X_1))^{1/t-1/\tilde{s}} \prod_{k=1}^m \nu_{s_k;2}(T_k).$$

где  $1/\tilde{s} = \sum_{k=1}^m 1/s_k$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Применяем предыдущее следствие и рассуждения из доказательства следствия 5.  $\square$

Результаты, полученные в последних двух следствиях, не улучшаемы (с точностью до абсолютной постоянной в неравенстве). По-существу, соответствующий пример имеется в работе [2], теорема 2. Удобно сформулировать в виде отдельного утверждения результат, установленный в доказательстве теоремы 2 в той статье (мы изменим здесь обозначения параметров из [2] для согласования с нашими обозначениями).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. Существует постоянна  $G > 0$  такая, что для любого натурального числа  $n$  найдется оператор  $A_n : l_1^n \rightarrow l_1^n$ , обладающий следующим

свойством. Если  $m \in \mathbb{N}$ ,  $p_k \in (0, 1]$  для  $k = 1, 2, \dots, m$ ,  $1/p = 1/p_1 + 1/p_2 + \dots + 1/p_m - (m+1)/2$  и  $u \in (0, p]$ , то

$$\gamma_{S_u}(A_n^m) \geq Gn^{1/u-1/p} \prod_{k=1}^m \nu_{p_k}(A_n) = Gn^{1/u-1/p} \left( \sum_{\lambda(A_n^m)} |\lambda(A_n^m)|^v \right)^{1/v},$$

где  $(\lambda(A_n^m))$  – полный набор собственных чисел оператора  $A_n^m$  и  $1/v = 1/2 + 1/p$ .

Теперь о точности неравенств из следствий 6 и 7.

**ТЕОРЕМА 4.** Существует постоянна  $G > 0$  такая, что для любого натурального числа  $n$  найдется оператор  $A_n : l_1^n \rightarrow l_1^n$ , обладающий следующим свойством. Если  $m \in \mathbb{N}$ ,  $s_k \in (0, 1]$  для  $k = 1, 2, \dots, m$ ,  $1/s = 1/s_1 + 1/s_2 + \dots + 1/s_m - (m+1)/2$  и  $t \in (0, r]$ , то

$$\gamma_{S_t}(A_n^m) \geq Gn^{1/t-1/s} \prod_{k=1}^m \nu_{s_k}(A_n) \quad \text{и} \quad \prod_{k=1}^m \nu_{s_k;2}(A_n) = \left( \sum_{\lambda(A_n^m)} |\lambda(A_n^m)|^{\bar{s}} \right)^{1/\bar{s}}.$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Оператор, о котором говорится в предложении 3, порождается унитарной матрицей

$$\left( n^{-1/2} e^{\frac{2\pi i l}{n} i} \right) \quad (j, l = 1, 2, \dots, n).$$

Рассмотрим несколько новых параметров. Пусть  $1/p_k = 1/s_k + 1/2$ ,  $1/p = 1/s + 1/2$ ,  $1/u = 1/t + 1/2$ ,  $1/q = 1/2 + 1/u = 1/t + 1$ . Для любого  $k$  имеют место соотношения

$$\nu_{s_k;2}(A_n) \leq \nu_{p_k}(A_n) \leq n^{1 \cdot s_k} = \left( \sum_{\lambda(A_n)} |\lambda(A_n)|^{s_k} \right)^{1/s_k} \leq \nu_{s_k;2}(A_n).$$

Поэтому

$$\prod_{k=1}^m \nu_{s_k;2}(A_n) = n^{\sum 1/s_k} = n^{1/\bar{s}}.$$

Кроме того,  $1/u - 1/p = 1/t - 1/s$  и  $\gamma_{S_u}(A_n^m) \leq \gamma_{S_t}(A_n^m) \cdot n^{1/2}$  (неравенство Гельдера). По предложению 3,

$$\gamma_{S_t}(A_n^m) \geq n^{-1/2} Gn^{1/t-1/s} \prod_{k=1}^m \nu_{s_k;2}(A_n) = n^{1/2} Gn^{1/t-1/s} \left( \sum_{\lambda(A_n^m)} |\lambda(A_n^m)|^{\bar{s}} \right)^{1/\bar{s}}.$$

□

В работе [2] мы использовали предложение 3 для построения примера произведения  $N_s$ -операторов в  $l_1$ , для которого утверждения следствий 3 и 4 точны (при  $s = r$ ; см. теорему 3 в [2]). В наших последних утверждениях (следствия 6 и 7) получены оценки факторизационных  $\gamma_{S_p}$ -квазинорм, а также  $l_p$ -квазинорм последовательностей собственных чисел произведений  $N_{s;2}$ -операторов. Предыдущая теорема показывает, что эти оценки точны в конечномерных ситуациях.

С другой стороны, в доказательстве теоремы 4 существенно использовался тот факт, что для рассматриваемого там оператора  $A_n$  его  $\nu_{p_k}$ - и  $\nu_{s_k;2}$ -квазинормы совпадают. Это приводит нас к результату, соответствующему теореме 3 из [2]. Доказательство буквально то же, с заменой обозначений (одной квазинормы на другую). Основное совпадение рассматриваемых сейчас квазинорм (и это существенно в доказательстве той теоремы) — это то, что обе они, как  $\nu_{p_k}$ , так и  $\nu_{s_k;2}$  ( $1/p_k = 1/2 + 1/s_k$ ) являются полными  $p_k$ -нормами. Поэтому доказательство теоремы 3 из [2] почти дословно проходит в нашем случае для произведений операторов из  $N_{s;2}$ , приводя к следующей теореме.

**ТЕОРЕМА 5.** Пусть  $m \in \mathbb{N}$ ,  $s_k \in (0, 2]$  для  $k = 1, 2, \dots, m$  и  $1/s = 1/s_1 + 1/s_2 + \dots + 1/s_m - 1/2$ . Существуют операторы  $T_k \in N_{s_k;2}(X_k, X_{k+1})$  в банаховых пространствах такие, что композиция  $T := T_m T_{m-1} \dots T_1$  факторизуется через оператор из  $S_s(H)$ , но не факторизуется ни через какой оператор из  $S_t(H)$ , если  $t \in (0, r)$ . В качестве всех пространств  $X_k$  можно взять пространство  $l_1$ .

Итак, для произведений  $(s; 2)$ -ядерных и для произведений  $p$ -ядерных операторов, действующих из  $L_1$ -пространств в  $L_1$ -пространства, получены точные ответы на вопросы о факторизации через операторы из классов Шаттена и о распределении их собственных чисел (но оставаясь в шкалах  $S_p$  и  $l_s$ ).

*Как выглядят ответы на соответствующие вопросы для произведений операторов, которые (произведения) действуют в  $L_p$ -пространствах?*

Мы оставим ответы на этот и другие (более тонкие) вопросы до следующей статьи. Между прочим, для случая  $L_2$ -пространств ответы почти очевидны. Для того, чтобы сформулировать некоторые результаты об операторах в  $L_p$ -пространствах, надо "интерполировать" полученные выше утверждения между  $L_1$ - и  $L_2$ -случаями.

### Список литературы

- [1] Рейнов О. И., О произведении ядерных операторов, Функц. анализ и его прил., том 51, выпуск 4, 2017, 90–91
- [2] Рейнов О. И., О произведении  $s$ -ядерных операторов, Матем. заметки, том 107, выпуск 2, 2020, 311–316.
- [3] Michael Sh. Birman, M.Z. Solomjak, Spectral Theory of Self-Adjoint Operators in Hilbert Space, D. Reidel Pub. Co., 1987
- [4] T. Carleman, Uber die Fourierkoeffizienten einer stetigen Funktion: Aus einem Brief an Herrn A. Wiman. Acta Math. 41 (1916), 377–384. [Ca16]
- [5] A. Grothendieck, Produits tensoriels topologiques et espaces nucléaires, Mem. Amer. Math. Soc., Volume 16, 1955, 196 + 140. [Groth]
- [6] A. Hinrichs, A. Pietsch,  $p$ -nuclear operators in the sense of Grothendieck, Math. Nachr. 283, No. 2, 232–261 (2010).
- [7] Horn, A. (1950) On the singular values of a product of completely continuous operators. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 36, 374–375.
- [8] W.B. Johnson, H. König, B. Maurey, J.R. Retherford ? [1979] Eigenvalues of  $p$ -summing and  $l_p$ -type operators in Banach spaces, J. Funct. Anal. 32, 353–380.
- [9] Hermann König, Eigenvalue Distribution of Compact Operators, Springer Basel AG, 1986.

- [10] T. Lalesco, Un théorème sur les noyaux composés, Bull. Sect. Sci. Acad. Roumaine 3, 1915, 271–272
- [11] A. Pietsch, Weyl numbers and eigenvalues of operators in Banach spaces, Math. Ann. 247, 1980, 149–168.
- [12] A. Pietsch, Eigenvalues and s-numbers (Cambridge University Press, Cambridge, 1987).
- [13] A. Pietsch, History of Banach Spaces and Linear Operators (Birkhauser, Boston, 2007).
- [14] Schatten, R. , A theory of cross-spaces. Annals of Math. Studies 26, Princeton Univ. Press 1950.
- [15] I. Schur, Über die charakteristischen Wurzeln einer linearen Substitution mit einer Anwendung auf die Theorie der Integralgleichungen, Math. Ann. 66, 1909, 488–510.
- [16] H. Triebel, Über die Verteilung der Approximationszahlen kompakter Operatoren in Sobolev-Besov-Räumen, Invent. Math. 4, 1967, 275–293.

САНК-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
*Email address:* orein51@mail.ru