

УДК: 519.21:519.65:517.518.8

О частных производных модифицированных полиномов Бернштейна - Станку для функций нескольких переменных *

А.Ю.Веретенников[†], Н.М.Мазутский[‡]

2 июля 2024 г.

Аннотация

Целью работы является доказательство аппроксимации смешанных производных второго порядка для функции нескольких переменных в норме L_1 такими же производными модифицированных полиномов Бернштейна при минимальной возможной гладкости.

Ключевые слова: модифицированные полиномы Бернштейна; аппроксимации смешанных производных

MSC: 60F05; 41A10

1. Введение

Для нового (на тот момент) доказательства аппроксимационной полиномиальной теоремы Вейерштрасса на основе закона больших чисел (ЗБЧ) в схеме Бернулли С.Н.Бернштейн [1] предложил полиномы, названные затем его именем:

$$B_n(f, x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Кажущаяся на первый взгляд искусственной интерпретация здесь переменной x как вероятности и применение ЗБЧ приводит к теореме о сходимости для любой функции $f \in C[0, 1]$:

$$\sup_{|x| \leq 1} |B_n(f, x) - f(x)| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Дальнейшее развитие этой идеи шло по разным направлениям: как оценить скорость сходимости при той, или иной гладкости приближаемой функции;

* Для обоих авторов данная работа была поддержана грантом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС».

[†] Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича, email: ayv@iitp.ru

[‡] МГУ им. М.В.Ломоносова, email: nikolaymazutsky@gmail.com

можно ли производными полиномов B_n приблизить соответствующие производные функции f ; что можно сказать в отсутствие предположения о непрерывности f ; наконец, существуют ли аналоги полиномов $B_n(x)$ для приближения функций нескольких переменных на кубе, или на симплексе, и как обстоит дело с приближением частных производных f в этом случае. Различными авторами были предложены разнообразные модификации полиномов Бернштейна, см., в частности, [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. В работе [11] было установлено, что естественные аналоги полиномов Бернштейна приближают функции нескольких переменных на кубе и на симплексе вместе с их производными определенного порядка, или индекса, в предположении о непрерывности производных этого порядка, или индекса (то есть, не обязательно *всех* производных, скажем, второго порядка, а лишь тех, которые определены и непрерывны). В настоящей работе на основе некоторой модификации полиномов Бернштейна - Станку (см. [3]) исследован многомерный (формально двумерный) случай и для него – вопрос о приближении смешанной частной производной второго порядка в интегральной норме и без предположения о ее непрерывности. Для полноты изложения сформулирован и доказан также предварительный результат о приближении в той же норме частных производных первого порядка. Работа состоит из шести разделов: Введение, О более ранних результатах, Основной результат (теорема 5), Вспомогательный результат, Доказательство теоремы 5 и Замечания о (равенстве) смешанных производных. Все результаты, леммы и т.п. имеют сквозную нумерацию ради удобства их быстрого нахождения при чтении.

2. О более ранних результатах

Перед презентацией основного результата статьи напомним основополагающую теорему Бернштейна [1], а также результаты Хлодовского [12] и Канторовича [10], а также еще одно, не столь давнее, предложение 4. Все они, кроме последнего, относятся к приближению функций одной переменной на $[0, 1]$, тогда как теорема 5 (см. ниже) – к приближению функции (и ее производных) двух переменных; однако, это может помочь читателю быстро войти в курс дела. Все “чужие” (то есть, взятые из других статей) теоремы будем называть предложениями. Поскольку работы [12] и [10] нельзя назвать легко доступными, см. формулировки их результатов в [13, Теорема 1] и [2, Теорема 2.1.1], соответственно.

Предложение 1 (Бернштейн [1]). *Для любой функции f , непрерывной на $[0, 1]$, последовательность полиномов $B_n(f, x)$ при $n \rightarrow \infty$ сходится к $f(x)$ равномерно на $[0, 1]$.*

Предложение 2 (Хлодовский [12], Лоренц [13, Теорема 1]). *Если для ограниченной функции $f(x)$ в точке x_0 существует r -тая производная $f^{(r)}(x_0)$, то*

$$B_n^{(r)}(f, x_0) \rightarrow f^{(r)}(x_0), \quad n \rightarrow \infty.$$

Ссылка [12] дает лишь название устной презентации автора на Всесоюзном съезде математиков; тексты большей части докладов не публиковались. Тем не менее, в результате этого выступления данный результат (предложение 2) затем получил известность в литературе под именем своего автора.

В работе [10] (см. также изложение в [2, глава 2]) в качестве видоизменения полиномов для исследования аппроксимационных свойств нерегулярных функций было предложено заменить интегрируемую на $[0, 1]$ функцию $f(x)$ на $F(x) = \int_0^x f(t)dt$. Таким образом, *производная* полинома для функции $F(x)$ примет следующий вид:

$$P_n(f, x) := \frac{d}{dx} B_{n+1}(F, x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} (n+1) \int_{\frac{k}{n+1}}^{\frac{k+1}{n+1}} f(t)dt.$$

Предложение 3 (Канторович [10]). *В любой точке $x \in (0, 1)$, где $f(x)$ – производная от интеграла $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, то есть почти всюду, имеет место сходимость*

$$P_n(f, x) \rightarrow f(x), \quad n \rightarrow \infty$$

Изложение этого результата можно также найти в [2, Теорема 2.1.1], со ссылкой на Канторовича.

Одномерные аналоги введенных далее в (1) модифицированных полиномов \tilde{B}_n идеологически были бы близки данной модификации Канторовича; однако, тип сходимости, утверждаемой в теореме 5 ниже, несколько иной. Кроме того, вспомним, что в многомерном случае нет полного аналога одномерной теоремы Лебега о дифференцировании, так что, на самом деле, автоматически результат из [10] на многомерный случай не переносится. Также подчеркнем, что целью данной работы является иная задача, а именно – приближение смешанной производной второго порядка.

Один из двух классических вариантов полиномов Бернштейна в случае функции двух переменных имеет следующий вид:

$$B_n(f, x_1, x_2) = \sum_{k_1, k_2=0}^n f\left(\frac{k_1}{n}, \frac{k_2}{n}\right) \binom{n}{k_1} \binom{n}{k_2} x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2},$$

где $0 \leq x_1, x_2 \leq 1$, и аналогично он может быть задан на d -мерном кубе $0 \leq x_1, \dots, x_d \leq 1$. Именно этот вид будет исследован далее в работе. (Второй известный вариант задает полином и приближает функцию не на квадрате/кубе, а на симплексе; в одномерном случае обе версии, естественно, совпадают.) В работе [11] был установлен (см. [11, Теорема 4]) факт равномерной сходимости на d -мерном кубе m -й производной полинома Бернштейна многих переменных к m -й производной функции $f \in C^m(\mathbb{R}^d)$: $B_n^{(m)}(f, x) \rightrightarrows f^{(m)}(x)$, $n \rightarrow \infty$, а также аналогичное утверждение доказано и для мультииндекса $k = (k_1, \dots, k_d)$: $B_n^{(k)}(f, x) \rightrightarrows f^{(k)}(x)$, $n \rightarrow \infty$, в предположении существования лишь непрерывной производной, соответствующей этому мультииндексу, но не обязательно всех производных данного порядка. То, что данный факт может представлять самостоятельный интерес, демонстрируется теоремой Г.П.Толстова (см. ниже теорему 16), где утверждается не сходимость, а лишь равенство смешанных производных взятых в различных порядках, однако в условия входит требование существования **всех** производных порядка 2; такое предположение характерно и для других версий этого результата; ни в предложении 4, ни в теореме 5 ниже оно не накладывается.

Предложение 4 ([11, Теорема 4]). 1) Если $m > 0$, $f \in C^m(\mathbb{R}^d)$, то

$$B_n^{(m)}(f, x) \xrightarrow{\rightarrow} f^{(m)}(x), n \rightarrow \infty, x \in K^d, \text{ где } K^d - d\text{-мерный куб.}$$

2) Если $\mathbf{k} = (k_1, \dots, k_d)$ – мультииндекс и $f \in C^{\mathbf{k}}(\mathbb{R}^d)$, то

$$B_n^{(\mathbf{k})}(f, x) \xrightarrow{\rightarrow} f^{(\mathbf{k})}(x), n \rightarrow \infty, x \in K^d, \text{ где } K^d - d\text{-мерный куб.}$$

По сравнению с последним указанным результатом, в теореме 5 ниже удалось отказаться от условия непрерывности смешанной производной второго порядка функции f на $[0, 1]^2 := K$, и при условии $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \in L_1(K)$ и некоторых других установлен факт сходимости смешанной частной производной второго порядка по переменным x_1, x_2 модифицированного полинома Бернштейна – Станку к смешанной частной производной второго порядка функции f в норме L_1 по $(x_1, x_2) \times \omega$ относительно прямого произведения двумерной меры Лебега на K и вероятностной меры \mathbb{P} на измеримом пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ (см. точные определения в следующем разделе). Здесь $(x_1, x_2) \in K$, $\omega \in \Omega$. Отметим, что это иной тип сходимости и по сравнению с вариантом сходимости в указанном выше результате из [11]. Предложение 4 будет использовано далее в ходе доказательства теоремы 5 в разделе 5; по этой причине и ради удобства читателя этот результат и сформулирован выше ради удобства ссылок. Далее в работе рассматриваются лишь функции двух переменных, поскольку предметом изучения являются смешанные производные второго порядка, для которых большее число переменных не актуально.

3. Основной результат

Для формулировки основного результата введем две независимые случайные величины¹ $\alpha_i \in U[0, 1]$, $i = 1, 2$, на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, равномерно распределенные на $[0, 1]$, и положим $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$. Полиномы типа Бернштейна – Станку, исследуемые в настоящей работе, будут иметь следующий вид:

$$\begin{aligned} \tilde{B}_{\alpha, n}(f, x_1, x_2) &= \sum_{k_1, k_2=0}^n f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n}\right) \binom{n}{k_1} \binom{n}{k_2} \\ &\times x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2}. \end{aligned} \tag{1}$$

Полезно доопределить $f(x_1, x_2) = 0$ вне $K = [0, 1]^2$, что и сделаем. Мы определили полиномы на квадрате, так как нас будет интересовать именно двумерный вариант этих полиномов; аналогичным образом они могут быть определены и на d -мерном кубе. Как уже отмечалось выше, похожие полиномы с неслучайными α_i были впервые предложены Д.Д.Станку в [3].

¹Напомним, что $U[0, 1]$ является стандартным обозначением равномерно распределенных на $[0, 1]$ случайных величин; знак \mathbb{E} означает математическое ожидание по мере \mathbb{P} .

Теорема 5. Пусть $f(x_1, x_2)$ — ограниченная, борелевская на $[0, 1]^2 := K$. Пусть существуют (классические) производные $\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \in L_1(K)$ и $\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \in L_1(K)$, и также что существует смешанная производная второго порядка $f_{x_1x_2}(x_1, x_2) = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \equiv \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \right) \in L_1(K)$. Тогда

$$\mathbb{E} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \frac{\partial^2 \tilde{B}_{\alpha, n}(f, x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} - \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (2)$$

Следствие 6. Если в дополнение к условиям части 2 теоремы 5 предположить, что существует также частная смешанная производная $f_{x_2x_1} \in L_1(K)$, то аналогичная (2) сходимость имеет место и для нее и имеем место равенство п.в. (x_1, x_2) :

$$f_{x_2x_1}(x_1, x_2) = f_{x_1x_2}(x_1, x_2).$$

4. Вспомогательные результаты

По мнению авторов, следующая лемма хорошо известна в теории интегрирования. Однако, найти точную ссылку нам не удалось, и потому, по настоянию рецензента, приводим ее с доказательством, естественно, не претендуя на авторство².

Лемма 7. 1. Пусть $g \in L_1([0, 1])$; вне отрезка $[0, 1]$ доопределим функцию g нулем. Тогда

$$\int_0^1 |g(x+t) - g(x)| dx \rightarrow 0, \quad t \rightarrow 0.$$

2. Пусть $g \in L_1([0, 1]^2)$; вне квадрата $K = [0, 1]^2$ доопределим функцию g нулем. Тогда

$$\iint_K |g(x_1 + t_1, x_2 + t_2) - g(x_1, x_2)| dx_1 dx_2 \rightarrow 0, \quad t_1, t_2 \rightarrow 0.$$

Доказательство. 1. Пусть $\delta > 0$, и выберем любую функцию $h \in C([0, 1])$ такую, что

$$\|g - h\|_{L_1([0,1])} \leq \delta.$$

²С благодарностью примем совет, содержащий нужную ссылку, и тогда доказательство можно будет убрать.

Тогда оцениваем,

$$\begin{aligned} \int_0^1 |g(x+t) - g(x)| dx &\leq \int_0^1 |g(x+t) - h(x+t)| dx \\ &+ \int_0^1 |g(x) - h(x)| dx + \int_0^1 |h(x+t) - h(x)| dx \\ &\leq 2\delta + \int_0^1 |h(x+t) - h(x)| dx. \end{aligned}$$

Здесь последний интеграл стремится к нулю при $t \rightarrow 0$ в силу поточечной сходимости $h(x+t)$ к $h(x)$ и поскольку функция h ограничена, по теореме Лебега об ограниченной сходимости.

2. Пусть вновь $\delta > 0$, и выберем любую функцию $h \in C(K)$ такую, что

$$\|g - h\|_{L_1(K)} \leq \delta.$$

Подчеркнем, что на этот раз обе функции g и h заданы на K . Тогда оцениваем,

$$\begin{aligned} &\iint_K |g(x_1 + t_1, x_2 + t_2) - g(x_1, x_2)| dx_1 dx_2 \\ &\leq \iint_K |g(x_1 + t_1, x_2 + t_2) - h(x_1 + t_1, x_2 + t_2)| dx_1 dx_2 \\ &+ \iint_K |g(x_1, x_2) - h(x_1, x_2)| dx_1 dx_2 + \iint_K |h(x_1 + t_1, x_2 + t_2) - h(x_1, x_2)| dx_1 dx_2 \\ &\leq 2\delta + \iint_K |h(x_1 + t_1, x_2 + t_2) - h(x_1, x_2)| dx_1 dx_2. \end{aligned}$$

Как и в одномерном случае, в силу (даже равномерной) непрерывности и ограниченности h на K , последний интеграл стремится к нулю при $t_1, t_2 \rightarrow 0$, по теореме Лебега об ограниченной сходимости. Лемма 7 доказана. \square

Так как в дальнейшем пойдет речь о производных функций, уже заданных достаточно громоздкими выражениями, а формулы для производных будут, естественно, еще более громоздки, то полезно ввести следующие обозначения, существенно сокращающие размеры выкладок, хоть они все равно остаются не маленькими:

$$\Delta_{(x_1)} f(x_1, x_2) = \Delta_{\frac{1}{n}, x_1} f(x_1, x_2) := f(x_1 + \frac{1}{n}, x_2) - f(x_1, x_2).$$

$$\Delta_{(x_2)}f(x_1, x_2) = \Delta_{\frac{1}{n}, x_2}f(x_1, x_2) := f(x_1, x_2 + \frac{1}{n}) - f(x_1, x_2).$$

$$f_{x_i} := \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_i}, \quad f_{x_i, x_j} := \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_j} \right), \quad i, j = 1, 2.$$

Лемма 8. 1. Пусть функция f ограниченная и борелевская на K , и при всех x_1, x_2 существует классическая производная первого порядка $\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \in L_1(K)$. Тогда

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f \left(x_1, x_2 \right) \right) - \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (3)$$

Аналогичное утверждение справедливо и для производной по другой переменной f_{x_2} при условии ее существования и интегрируемости $\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \in L_1(K)$:

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f \left(x_1, x_2 + \frac{1}{n} \right) - f \left(x_1, x_2 \right) \right) - \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (4)$$

2. Пусть при всех x_1, x_2 определена классическая смешанная производная $\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \in L_1(K)$ (в частности, функция $f_{x_2}(x_1, x_2)$ ограничена при всяком x_2). Тогда

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f_{x_2} \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f_{x_2} \left(x_1, x_2 \right) \right) - \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Другими словами,

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \Delta_{(x_1)} f_{x_2}(x_1, x_2) - f_{x_1 x_2}(x_1, x_2) \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Также

$$\Delta_{(x_1)} f_{x_2}(x_1, x_2) = \frac{\partial}{\partial x_2} \Delta_{(x_1)} f(x_1, x_2), \quad (6)$$

и

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n^2 \Delta_{(x_2)} \Delta_{(x_1)} f(x_1, x_2) - n \Delta_{(x_1)} f_{x_2}(x_1, x_2) \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (7)$$

Аналогично, если при всех x_1, x_2 определена классическая смешанная производная $\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2 \partial x_1} \in L_1(K)$ (и, в частности, функция $f_{x_1}(x_1, x_2)$ ограничена при всяком x_1), то при $n \rightarrow \infty$ имеет место сходимость

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f_{x_1} \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 + \frac{1}{n} \right) - f_{x_1} \left(x_1, x_2 \right) \right) - \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2 \partial x_1} \right| \rightarrow 0, \quad (8)$$

и также

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n^2 \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f(x_1, x_2) - n \Delta_{(x_2)} f_{x_1}(x_1, x_2) \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (9)$$

Доказательство. В доказательстве неоднократно будут использованы вспомогательные функции $g \in C(K)$ для приближения функции f и ее производных, а также F^ε для некоторых интегральных разностей. Для различных $f, f_{x_1}, f_{x_2}, f_{x_1 x_2}$ и для различных разностей эти функции будут, вообще говоря, всякий раз различными.

1. Установим справедливость утверждения (3). С этой целью рассмотрим приближения функции f гладкими $f^\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$. Будем для определенности считать, что f^ε является функцией, приближающей функцию f посредством свертки с помощью одного и того же неотрицательного ядра $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ (где 0 означает компактность носителя) по каждой из двух переменных, где $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = 1$, и $\varphi^\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \varphi(\frac{x}{\varepsilon})$. Тогда, как известно,

$$f^\varepsilon(x_1, x_2) = \int dy_1 \int dy_2 [f(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2)] \in C^\infty.$$

В дальнейшем, при появлении произведения $\varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2)$ будем иногда использовать для краткости выражения

$$\varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2) =: \bar{\varphi}^\varepsilon(y_1, y_2) \quad \text{и} \quad f^\varepsilon = f * \bar{\varphi}^\varepsilon.$$

Покажем, что в условиях данного пункта леммы оператор производной по x_1 перестановочен с интегрированием, то есть, что

$$\partial_{x_1} f^\varepsilon(x_1, x_2) \equiv f_{x_1}^\varepsilon(x_1, x_2) = \int dy_1 \int dy_2 [f_{x_1}(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2)]. \quad (10)$$

Для этого достаточно установить, что при всех $0 \leq x_1 \leq x'_1 \leq 1$ и при любом x_2 справедливо равенство

$$f^\varepsilon(x'_1, x_2) - f^\varepsilon(x_1, x_2) = \int_{x_1}^{x'_1} dz \int dy_1 \int dy_2 [f_z(z - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2)].$$

Имеем, при условии, что все интегралы абсолютно сходятся (а так оно и есть в силу условий леммы),

$$\begin{aligned} & f^\varepsilon(x_1, x_2) + \int_{x_1}^{x'_1} dz \int dy_1 \int dy_2 [f_z(z - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2)] \\ &= \int dy_1 \int dy_2 [f(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2)] \\ &+ \int dy_1 \int dy_2 \int_{x_1}^{x'_1} dz [f_z(z - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2)] \\ &= \iint \left[f(x_1 - y_1, x_2 - y_2) + \int_{x_1}^{x'_1} dz f_z(z - y_1, x_2 - y_2) \right] \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2) dy_1 dy_2 \\ &= \iint f(x'_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2) dy_1 dy_2 = f^\varepsilon(x'_1, x_2), \end{aligned}$$

по теореме Фубини и в силу формулы Ньютона - Лейбница, что и требовалось.

Далее, оценим верхний предел при $n \rightarrow \infty$ (неотрицательного) интеграла в левой части (3), зависящего от n , но не от ε , с помощью вспомогательной функции f^ε . Покажем, что этот верхний предел не превосходит некоторого (также неотрицательного) выражения от ε , которое, в свою очередь, стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow 0$. Другими словами, при оценках вспомогательных выражений, зависящих от n и ε , нас будут интересовать повторные пределы вида $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty}$. (Если бы выражения под интегралом не были неотрицательны, то, конечно, надо было бы исследовать также пределы вида $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \liminf_{n \rightarrow \infty}$, однако, в данном случае это лишнее.) Имеем,

$$\begin{aligned} & \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f \left(x_1, x_2 \right) \right) - f_{x_1} \left(x_1, x_2 \right) \right| \\ & \leq \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| f_{x_1}^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) - f_{x_1} \left(x_1, x_2 \right) \right| \\ & + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f^\varepsilon \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) \right) - f_{x_1}^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) \right| \\ & + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f \left(x_1, x_2 \right) \right) \right. \\ & \left. - n \left(f^\varepsilon \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) \right) \right| =: J_1^\varepsilon + J_2^{n,\varepsilon} + J_3^{n,\varepsilon}. \end{aligned}$$

Покажем, что

$$J_1^\varepsilon = \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| f_{x_1}^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) - f_{x_1} \left(x_1, x_2 \right) \right| \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0. \quad (11)$$

В самом деле, поскольку, как известно, пространство $C(K)$ всюду плотно в $L_1(K)$, то для любого $\delta > 0$ найдется такая функция $g \in C(K)$, что

$$\|f_{x_1} - g\|_{L_1(K)} \leq \delta.$$

В силу доказанного выше имеем также

$$\|f_{x_1}^\varepsilon - g^\varepsilon\|_{L_1(K)} \leq \delta,$$

где $g^\varepsilon = g * \bar{\varphi}^\varepsilon$. Тогда находим,

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 |f_{x_1}^\varepsilon(x_1, x_2) - f_{x_1}(x_1, x_2)| \\
& \leq \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 |f_{x_1}^\varepsilon(x_1, x_2) - g^\varepsilon(x_1, x_2)| + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 |f_{x_1}(x_1, x_2) - g(x_1, x_2)| \\
& + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 |g^\varepsilon(x_1, x_2) - g(x_1, x_2)| \\
& \leq \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 |g^\varepsilon(x_1, x_2) - g(x_1, x_2)| + 2\delta.
\end{aligned}$$

Здесь в интеграле в правой части в силу равномерной непрерывности g и компактности носителя функции φ подынтегральное выражение $g^\varepsilon(x_1, x_2) - g(x_1, x_2)$ стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow 0$ при всех $(x_1, x_2) \in K$. Поскольку $\delta > 0$ может быть выбрано произвольным, а интеграл J_1^ε от δ не зависит, то получаем искомую сходимость (11).

Рассмотрим второй интеграл. При фиксированном ε имеем при $n \rightarrow \infty$,

$$J_2^{n,\varepsilon} = \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f^\varepsilon \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) \right) - f_{x_1}^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) \right| \rightarrow 0, \quad (12)$$

по определению производной непрерывной функции f^ε и в силу теоремы Лебега об ограниченной сходимости под знаком интеграла; здесь ограниченность конечных разностей $n \left(f^\varepsilon \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) \right)$ следует из теоремы о среднем, или из формулы Ньютона - Лейбница.

Рассмотрим $J_3^{n,\varepsilon}$. Для сокращения выкладок сперва преобразуем подынтегральное выражение в $J_3^{n,\varepsilon}$:

$$\begin{aligned}
& n \left| (f^\varepsilon - f) \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) + (f - f^\varepsilon) \left(x_1, x_2 \right) \right| \\
& = n \left| (f * \varphi^\varepsilon - f) \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) + (f - f * \varphi^\varepsilon) \left(x_1, x_2 \right) \right| \\
& = \left| \int_0^1 dz (f_{x_1} * \varphi^\varepsilon) \left(x_1 + \frac{z}{n}, x_2 \right) - \int_0^1 dz f_{x_1} \left(x_1 + \frac{z}{n}, x_2 \right) \right|.
\end{aligned}$$

Используя теорему Фубини и формулу Ньютона - Лейбница, сам интеграл

$J_3^{n,\varepsilon}$ можно представить в виде

$$\begin{aligned} J_3^{n,\varepsilon} &= \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} dy_1 \int_{-\infty}^{\infty} dy_2 \left(f\left(x_1 + \frac{1}{n} - y_1, x_2 - y_2\right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - f\left(x_1 - y_1, x_2 - y_2\right) \right) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2) \right] - \left[f\left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2\right) - f\left(x_1, x_2\right) \right] \\ &= \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} dy_1 \int_{-\infty}^{\infty} dy_2 \left(f\left(x_1 + \frac{1}{n} - y_1, x_2 - y_2\right) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - f\left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2\right) \right) - \left(f\left(x_1 - y_1, x_2 - y_2\right) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2) - f\left(x_1, x_2\right) \right) \right|. \end{aligned}$$

Покажем, что это выражение стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$ при любом фиксированном $\varepsilon > 0$. Действительно, обозначим

$$F^\varepsilon(x_1, x_2) := \int_{-\infty}^{\infty} dy_1 \int_{-\infty}^{\infty} dy_2 f(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2) - f(x_1, x_2).$$

Эта функция ограничена и, стало быть, также из $L_1(K)$, и справедливо представление

$$J_3^{n,\varepsilon} = \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 (F^\varepsilon(x_1 + \frac{1}{n}, x_2) - F^\varepsilon(x_1, x_2)).$$

При $n \rightarrow \infty$ последнее выражение стремится к нулю по лемме 7. Стало быть,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} J_3^{n,\varepsilon} = 0,$$

что и требовалось. Отсюда и из (11) и (12) утверждение (3) следует. Соотношение (4) совершенно аналогично и может быть получено транспозицией x_1 и x_2 .

2. Докажем утверждение (5). Прежде всего, установим, аналогично такому же свойству для первых производных, что в условиях данного пункта леммы вторая смешанная производная f также перестановочна с операцией конволюции с функцией φ^ε :

$$(f^\varepsilon)_{x_1 x_2}(x_1, x_2) = (f_{x_1 x_2} * \varphi^\varepsilon)(x_1, x_2). \quad (13)$$

Далее используем тот факт, что и оператор смешанной производной второго порядка можно переставить с двойным интегралом, определяющим конволюцию, при условии абсолютной сходимости всех нужных интегралов. В самом деле, по доказанному выше в (10) имеем, ((при условии, что все интегралы абсолютно сходятся (а так оно и есть в силу условий леммы))),

$$\begin{aligned} (f^\varepsilon)_{x_1 x_2}(x_1, x_2) &= \frac{\partial}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial x_1} \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_2) dy_2 \right) \varphi^\varepsilon(y_1) dy_1 \\ &= \frac{\partial}{\partial x_2} \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\int_0^1 f(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_2) dy_2 \right) \varphi^\varepsilon(y_1) dy_1. \end{aligned}$$

Здесь для внутреннего интеграла переменная x_1 является параметром, поэтому в силу абсолютной сходимости правой части верно равенство

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x_2} \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\int_0^1 f(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_2) dy_2 \right) \varphi^\varepsilon(y_1) dy_1 \\ &= \frac{\partial}{\partial x_2} \int_0^1 \left(\int_0^1 f_{x_1}(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_2) dy_2 \right) \varphi^\varepsilon(y_1) dy_1. \end{aligned}$$

Теперь по теореме Фубини перепишем,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x_2} \int_0^1 \left(\int_0^1 f_{x_1}(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_2) dy_2 \right) \varphi^\varepsilon(y_1) dy_1 \\ &= \frac{\partial}{\partial x_2} \int_0^1 \left(\int_0^1 f_{x_1}(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) dy_1 \right) \varphi^\varepsilon(y_2) dy_2, \end{aligned}$$

и далее, вновь используя доказанное ранее в (10) и возможность дифференцировать по параметру, – только теперь в этой роли выступит x_2 , – внутри интеграла, имеем,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x_2} \int_0^1 \left(\int_0^1 f_{x_1}(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) dy_1 \right) \varphi^\varepsilon(y_2) dy_2 \\ &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\int_0^1 f_{x_1}(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) dy_1 \right) \varphi^\varepsilon(y_2) dy_2 \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 f_{x_1 x_2}(x_1 - y_1, x_2 - y_2) \varphi^\varepsilon(y_1) dy_1 \right) \varphi^\varepsilon(y_2) dy_2, \end{aligned}$$

что и требовалось для (13). Итак,

$$(f_{x_1 x_2})^\varepsilon(x_1, x_2) \equiv (f_{x_1 x_2} * \bar{\varphi}^\varepsilon)(x_1, x_2);$$

будем использовать для обоих этих двух эквивалентных выражений краткое обозначение $f_{x_1 x_2}^\varepsilon(x_1, x_2)$.

Теперь оцениваем,

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f_{x_2} \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f_{x_2} \left(x_1, x_2 \right) \right) - f_{x_1 x_2} \left(x_1, x_2 \right) \right| \\
& \leq \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| f_{x_1 x_2}^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) - f_{x_1 x_2} \left(x_1, x_2 \right) \right| \\
& + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f_{x_2}^\varepsilon \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f_{x_2}^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) \right) - f_{x_1 x_2}^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) \right| \\
& + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f_{x_2} \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f_{x_2} \left(x_1, x_2 \right) \right) \right. \\
& \left. - n \left(f_{x_2}^\varepsilon \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f_{x_2}^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) \right) \right| = J_4^\varepsilon + J_5^{n,\varepsilon} + J_6^{n,\varepsilon}
\end{aligned}$$

Проверим сходимость к нулю каждого из интегралов в отдельности по базе $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} (\dots)$. Прежде всего, покажем, что

$$J_4^\varepsilon = \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| f_{x_1 x_2}^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) - f_{x_1 x_2} \left(x_1, x_2 \right) \right| \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0. \quad (14)$$

В самом деле, пусть при некотором $\delta > 0$ функция $g \in C(K)$ такова, что

$$\|f_{x_1 x_2} - g\|_{L_1(K)} \leq \delta.$$

Тогда в силу элементарных неравенств и доказанного выше свойства (13), а также теоремы Фубини имеем,

$$\|f_{x_1 x_2}^\varepsilon - g^\varepsilon\|_{L_1(K)} \leq \delta,$$

где $g^\varepsilon = g * \varphi^\varepsilon$. В самом деле,

$$\begin{aligned}
\|f_{x_1 x_2}^\varepsilon - g^\varepsilon\|_{L_1(K)} &= \iint_K |f_{x_1 x_2}^\varepsilon(x_1, x_2) - g^\varepsilon(x_1, x_2)| dx_1 dx_2 \\
&= \iint_K \left| \iint_K (f_{x_1 x_2}(x_1 - y_1, x_2 - y_2) - g(x_1 - y_1, x_2 - y_2)) \bar{\varphi}^\varepsilon(y_1, y_2) dy_1 dy_2 \right| dx_1 dx_2 \\
&\leq \iint_K \left(\iint_K |f_{x_1 x_2}(x_1 - y_1, x_2 - y_2) - g(x_1 - y_1, x_2 - y_2)| \bar{\varphi}^\varepsilon(y_1, y_2) dx_1 dx_2 \right) dy_1 dy_2 \\
&\leq \iint_K (\|f_{x_1 x_2} - g\|_{L_1(K)}) \bar{\varphi}^\varepsilon(y_1, y_2) dy_1 dy_2 \leq \delta \iint_K \bar{\varphi}^\varepsilon(y_1, y_2) = \delta.
\end{aligned}$$

Теперь оцениваем, при любом $\delta > 0$,

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| f_{x_1 x_2}^\varepsilon(x_1, x_2) - f_{x_1 x_2}(x_1, x_2) \right| \\
& \leq \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| f_{x_1 x_2}^\varepsilon(x_1, x_2) - g^\varepsilon(x_1, x_2) \right| \\
& \quad + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| f_{x_1 x_2}(x_1, x_2) - g(x_1, x_2) \right| \\
& \quad + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| g^\varepsilon(x_1, x_2) - g(x_1, x_2) \right| \\
& \leq \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| g^\varepsilon(x_1, x_2) - g(x_1, x_2) \right| + 2\delta.
\end{aligned}$$

Здесь интеграл в правой части последнего неравенства стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow 0$, в силу равномерной непрерывности функции g . Поскольку же интеграл J_4^ε не зависит от δ , то получаем искомое стремление к нулю в (14).

Рассмотрим член $J_5^{n,\varepsilon}$. При $n \rightarrow \infty$ имеем,

$$J_5^{n,\varepsilon} = \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \left(f_{x_2}^\varepsilon \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f_{x_2}^\varepsilon(x_1, x_2) \right) - f_{x_1 x_2}^\varepsilon(x_1, x_2) \right| \rightarrow 0,$$

согласно определению производной для гладкой ограниченной функции f^ε и в силу теоремы Лебега об ограниченной сходимости под знаком интеграла; здесь ограниченность конечных разностей $n \left(f_{x_2}^\varepsilon \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f_{x_2}^\varepsilon(x_1, x_2) \right)$ следует из теоремы о среднем, или из формулы Ньютона - Лейбница, аналогично тому, как это имело место для $J_2^{n,\varepsilon}$. Стало быть, получаем

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} J_5^{n,\varepsilon} = 0.$$

Рассмотрим интеграл $J_6^{n,\varepsilon}$. Преобразуем подынтегральное выражение в $J_6^{n,\varepsilon}$, пользуясь формулой Ньютона-Лейбница и перестановочностью операторов производной (по x_1) и конволюции:

$$\begin{aligned}
& n \left| \left(f_{x_2}^\varepsilon - f_{x_2} \right) \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - \left(f_{x_2}^\varepsilon - f_{x_2} \right) \left(x_1, x_2 \right) \right| \\
& = n \left| \left(f_{x_2} * \varphi^\varepsilon - f_{x_2} \right) \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) + \left(f_{x_2} - f_{x_2} * \varphi^\varepsilon \right) \left(x_1, x_2 \right) \right| \\
& = \left| \int_0^1 dz \left(f_{x_2 x_1} * \varphi^\varepsilon \right) \left(x_1 + \frac{z}{n}, x_2 \right) - \int_0^1 dz f_{x_2 x_1} \left(x_1 + \frac{z}{n}, x_2 \right) \right|.
\end{aligned}$$

В результате получаем представление

$$\begin{aligned}
J_6^{n,\varepsilon} &= \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} dy_1 \int_{-\infty}^{\infty} dy_2 \left(f_{x_2} \left(x_1 + \frac{1}{n} - y_1, x_2 - y_2 \right) \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - f_{x_2} \left(x_1 - y_1, x_2 - y_2 \right) \right) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2) - \left(f_{x_2} \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f_{x_2} \left(x_1, x_2 \right) \right) \right| \\
&= \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} dy_1 \int_{-\infty}^{\infty} dy_2 \left(f_{x_2} \left(x_1 + \frac{1}{n} - y_1, x_2 - y_2 \right) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2) \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - f_{x_2} \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) \right) - \left(f_{x_2} \left(x_1 - y_1, x_2 - y_2 \right) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2) - f_{x_2} \left(x_1, x_2 \right) \right) \right|.
\end{aligned}$$

Обозначая

$$F^\varepsilon(x_1, x_2) := \int_{-\infty}^{\infty} dy_1 \int_{-\infty}^{\infty} dy_2 \left(f_{x_2} \left(x_1 - y_1, x_2 - y_2 \right) \varphi^\varepsilon(y_1) \varphi^\varepsilon(y_2) - f_{x_2} \left(x_1, x_2 \right) \right),$$

интеграл $J_6^{n,\varepsilon}$ можно переписать как

$$J_6^{n,\varepsilon} = \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| F^\varepsilon \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - F^\varepsilon \left(x_1, x_2 \right) \right|.$$

Поскольку функция F^ε ограничена, находим, что $\lim_{n \rightarrow \infty} J_6^{n,\varepsilon} = 0$. Стало быть, и

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} J_6^{n,\varepsilon} = 0,$$

что и требовалось.

3. Докажем утверждение (7):

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n^2 \Delta_{(x_2)} \Delta_{(x_1)} f(x_1, x_2) - n \Delta_{(x_1)} f_{x_2}(x_1, x_2) \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Применяя формулу Ньютона-Лейбница в версии

$$g(x+a) - g(x) = \int_0^1 g'(x+sa) ds$$

с $a = 1/n$, имеем,

$$n \Delta_{(x_1)} f_{x_2}(x_1, x_2) = n \left(f_{x_2} \left(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 \right) - f_{x_2} \left(x_1, x_2 \right) \right) = \int_0^1 f_{x_2 x_1} \left(x_1 + \frac{t}{n}, x_2 \right) dt,$$

и

$$\begin{aligned}
& n^2 \Delta_{(x_2)} \Delta_{(x_1)} f(x_1, x_2) \\
&= n^2 [f(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 + \frac{1}{n}) - f(x_1 + \frac{1}{n}, x_2) - f(x_1, x_2 + \frac{1}{n}) + f(x_1, x_2)] \\
&= n \int_0^1 f_{x_2}(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 + \frac{t}{n}) ds - n \int_0^1 f_{x_2}(x_1, x_2 + \frac{t}{n}) dt \\
&= n \int_0^1 [f_{x_2}(x_1 + \frac{1}{n}, x_2 + \frac{t}{n}) - f_{x_2}(x_1, x_2 + \frac{t}{n})] dt \\
&= \iint_K f_{x_2 x_1}(x_1 + \frac{s_1}{n}, x_2 + \frac{s_2}{n}) ds_1 ds_2.
\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \Delta_{(x_1)} f_{x_2}(x_1, x_2) - n^2 \Delta_{(x_2)} \Delta_{(x_1)} f(x_1, x_2) \right| \\
&= \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \int_0^1 f_{x_1 x_2}(x_1 + \frac{t_1}{n}, x_2) dt_1 - \int_0^1 dt_1 \int_0^1 f_{x_1 x_2}(x_1 + \frac{t_1}{n}, x_2 + \frac{t_2}{n}) dt_2 \right| \\
&\leq \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \int_0^1 dt_1 \int_0^1 dt_2 \left| f_{x_1 x_2}(x_1 + \frac{t_1}{n}, x_2) - f_{x_1 x_2}(x_1 + \frac{t_1}{n}, x_2 + \frac{t_2}{n}) \right| \\
&\leq \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \int_0^1 dt_1 \int_0^1 dt_2 \left| f_{x_1 x_2}(x_1 + \frac{t_1}{n}, x_2 + \frac{t_2}{n}) - f_{x_1 x_2}(x_1, x_2) \right| \\
&+ \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \int_0^1 dt_1 \int_0^1 dt_2 \left| f_{x_1 x_2}(x_1, x_2) - f_{x_1 x_2}(x_1 + \frac{t_1}{n}, x_2) \right|.
\end{aligned}$$

В силу леммы 7 заключаем, что оба слагаемых в правой части последнего неравенства стремятся к нулю при $n \rightarrow \infty$. Стало быть,

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n^2 \Delta_{(x_2)} \Delta_{(x_1)} f(x_1, x_2) - n \Delta_{(x_1)} f_{x_2}(x_1, x_2) \right| \rightarrow 0.$$

Наконец, соотношение (8) эквивалентно (5), а (9) эквивалентно (7). Лемма 8 доказана. \square

5. Доказательство теоремы 5

Ради облегчения выкладок введем обозначение:

$$\Pi_{k_1, k_2}(x_1, x_2) := \binom{n-1}{k_1} \binom{n-1}{k_2} x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2-1}.$$

Выражение в правой части естественным образом появляется при повторном дифференцировании полиномов $\tilde{B}_{\alpha, n}$. Отметим, что в силу формулы биному Ньютона, при всех x_1, x_2

$$\sum_{0 \leq k_1, k_2 \leq n-1} \Pi_{k_1, k_2}(x_1, x_2) = 1. \quad (15)$$

Покажем, что в силу соотношений (5) и (7) из леммы 8 следует равенство

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \frac{\partial^2 \tilde{B}_{\alpha, n}(f, x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} - \frac{\partial^2 (f, x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right| \\ &= \mathbb{E} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} n^2 \left[\Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right. \right. \\ & \quad \left. \left. - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f(x_1, x_2) \right] \Pi_{k_1, k_2}(x_1, x_2) \right| + o(1) =: I^n + o(1), \quad n \rightarrow \infty. \quad (16) \end{aligned}$$

В самом деле, продифференцируем $\tilde{B}_{\alpha, n}$ по x_1 . Имеем,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \tilde{B}_{\alpha,n}(f, x_1, x_2)}{\partial x_1} &= \frac{\partial}{\partial x_1} \sum_{k_1, k_2=0}^n f\left(\frac{k_1}{n} + \frac{\alpha_1}{n}, \frac{k_2}{n} + \frac{\alpha_2}{n}\right) \binom{n}{k_1} \binom{n}{k_2} \\
&\times x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2} = \sum_{\substack{0 \leq k_1 \leq n \\ 0 \leq k_2 \leq n}} f\left(\frac{k_1}{n} + \frac{\alpha_1}{n}, \frac{k_2}{n} + \frac{\alpha_2}{n}\right) \binom{n}{k_1} \binom{n}{k_2} \\
&\times k_1 x_1^{k_1-1} (1-x_1)^{n-k_1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2} - \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 \leq n}} f\left(\frac{k_1}{n} + \frac{\alpha_1}{n}, \frac{k_2}{n} + \frac{\alpha_2}{n}\right) \binom{n}{k_1} \binom{n}{k_2} \\
&\times x_1^{k_1} (n-k_1) (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2} = \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 \leq n}} f\left(\frac{k_1 + \alpha_1 + 1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n}\right) \\
&\times \binom{n}{k_1 + 1} \binom{n}{k_2} (k_1 + 1) x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2} \\
&- \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 \leq n}} f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n}\right) \binom{n}{k_1} \binom{n}{k_2} x_1^{k_1} (n-k_1) (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2} \\
&= \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 \leq n}} n \Delta_{(x_1)} f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n}\right) \binom{n-1}{k_1} \binom{n}{k_2} x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2}.
\end{aligned}$$

Продифференцируем теперь полученное выражение по x_2 :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 \tilde{B}_{\alpha,n}(f, x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} &= \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} \sum_{k_1, k_2=0}^n f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n}\right) \binom{n}{k_1} \binom{n}{k_2} \\
&\times x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2} = \frac{\partial}{\partial x_2} \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 \leq n}} n \Delta_{(x_1)} f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n}\right) \\
&\times \binom{n-1}{k_1} \binom{n}{k_2} \times x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2} \\
&= \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} n \Delta_{(x_1)} f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n}\right) \binom{n-1}{k_1} \binom{n}{k_2} x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2} \\
&- \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 < k_2 \leq n}} n \Delta_{(x_1)} f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n}\right) \binom{n-1}{k_1} \binom{n}{k_2} \\
&\times x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (n-k_2) (1-x_2)^{n-k_2-1} = \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2 + 1}{n}\right) \\
&\times \binom{n-1}{k_1} \binom{n}{k_2 + 1} x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2-1} \\
&- \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 < k_2 \leq n}} n \Delta_{(x_1)} f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n}\right) \binom{n-1}{k_1} \binom{n}{k_2} x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (n-k_2) (1-x_2)^{n-k_2-1} \\
&= \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} n^2 \left(\Delta_{(x_1)} f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2 + 1}{n}\right) - \Delta_{(x_1)} f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n}\right) \right) \\
&\times \binom{n-1}{k_1} \binom{n-1}{k_2} x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2-1} \\
&= \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} n^2 \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f\left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n}\right) \binom{n-1}{k_1} \binom{n-1}{k_2} \\
&\times x_1^{k_1} (1-x_1)^{n-k_1-1} x_2^{k_2} (1-x_2)^{n-k_2-1}.
\end{aligned}$$

Теперь формула (16) следует из найденного представления для смешанной производной $\frac{\partial^2 \tilde{B}_{\alpha,n}(f,x_1,x_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$ и из леммы 8.

Оценим сверху (неотрицательный) интеграл I^n в правой части (16), используя сглаженную функцию $f^\varepsilon = f * \tilde{\varphi}^\varepsilon$, ранее введенную в доказательстве леммы 8. Имеем,

$$\begin{aligned}
I^n &\leq n^2 \mathbb{E} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} \left(\Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon(x_1, x_2) \right) \Pi_{k_1, k_2}(x_1, x_2) \right| \\
&+ n^2 \mathbb{E} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} \left(\Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon(x_1, x_2) - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f(x_1, x_2) \right) \right. \\
&\quad \left. \times \Pi_{k_1, k_2}(x_1, x_2) \right| \\
&+ n^2 \mathbb{E} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} \left(\Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right) \Pi_{k_1, k_2}(x_1, x_2) \right| \\
&=: I_1^{n,\varepsilon} + I_2^{n,\varepsilon} + I_3^{n,\varepsilon}.
\end{aligned}$$

Все три выражения $I_k^{n,\varepsilon}$, $1 \leq k \leq 3$, неотрицательны. Покажем, что

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} I_k^{n,\varepsilon} = 0, \quad k = 1, 2, 3.$$

Здесь удобно $I_2^{n,\varepsilon}$ рассмотреть в последнюю очередь, см. конец доказательства.

Рассмотрим интеграл $I_2^{n,\varepsilon}$. Оценим его сверху, разложив, в свою очередь,

оценку в сумму трех интегралов: в силу (15) имеем,

$$\begin{aligned}
I_2^{n,\varepsilon} &= \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n^2 \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon(x_1, x_2) - n^2 \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f(x_1, x_2) \right| \\
&\leq \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n^2 \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon(x_1, x_2) - f_{x_1 x_2}^\varepsilon(x_1, x_2) \right| \\
&\quad + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| f_{x_1 x_2}^\varepsilon(x_1, x_2) - f_{x_1 x_2}(x_1, x_2) \right| \\
&\quad + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| f_{x_1 x_2}(x_1, x_2) - n^2 \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f(x_1, x_2) \right| \\
&=: I_{21}^{n,\varepsilon} + I_{22}^\varepsilon + I_{23}^n.
\end{aligned}$$

Рассмотрим интеграл I_{22}^ε . Поскольку $f_{x_1 x_2} \in L_1(K)$, то он сходится к нулю при $\varepsilon \rightarrow 0$, в силу леммы 7.

Рассмотрим интеграл $I_{21}^{n,\varepsilon}$. Оценим его таким образом:

$$\begin{aligned}
0 \leq I_{21}^{n,\varepsilon} &\leq \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n^2 \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon(x_1, x_2) - n \Delta_{(x_1)} f_{x_2}^\varepsilon(x_1, x_2) \right| \\
&\quad + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \Delta_{(x_1)} f_{x_2}^\varepsilon(x_1, x_2) - f_{x_1 x_2}^\varepsilon(x_1, x_2) \right| =: I_{21a}^{n,\varepsilon} + I_{21b}^{n,\varepsilon}.
\end{aligned}$$

При $n \rightarrow \infty$ имеем сходимость $I_{21b}^{n,\varepsilon} \rightarrow 0$ в силу формулы (5) леммы 8. Аналогично, имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} I_{21a}^{n,\varepsilon} = 0$ в силу формулы (9) леммы 8.

Рассмотрим интеграл I_{23}^n . Оценим его сверху суммой двух интегралов. Поскольку $\Delta_{(x_2)} \Delta_{(x_1)} f(x_1, x_2) = \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f(x_1, x_2)$, то оценим,

$$\begin{aligned}
&\int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| f_{x_1 x_2}(x_1, x_2) - n^2 \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f(x_1, x_2) \right| \leq \\
&\leq \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| n \Delta_{(x_1)} f_{x_2}(x_1, x_2) - n^2 \Delta_{(x_2)} \Delta_{(x_1)} f(x_1, x_2) \right| \\
&\quad + \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| f_{x_1 x_2}(x_1, x_2) - n \Delta_{(x_1)} f_{x_2}(x_1, x_2) \right| = I_{23a}^n + I_{23b}^n.
\end{aligned}$$

Для I_{23a}^n имеем, $I_{23a}^n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ в силу соотношения (7) леммы 8.

Для I_{23b}^n имеем $I_{23b}^n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ в силу соотношения (5) леммы 8.

Таким образом, для интеграла $I_2^{n,\varepsilon}$ получаем

$$0 \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} I_2^{n,\varepsilon} \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} (I_{21}^{n,\varepsilon} + I_{22}^\varepsilon + I_{23}^n) = 0.$$

Рассмотрим теперь интеграл $I_3^{n,\varepsilon}$. Напомним определение и свойство бэта-функции, которое будет полезно в дальнейшем:

$$\mathcal{B}(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}.$$

Рассмотрим каждый из членов двойной суммы в этом интеграле отдельно без множителя $\Pi_{k_1, k_2}(x_1, x_2)$, причем внесем модуль внутрь суммы, отчего неравенство только усилится. При любом $0 \leq k_1, k_2 < n$ имеют место равенства

$$\begin{aligned} & \int_0^1 d\alpha_1 \int_0^1 d\alpha_2 \left| \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon \left(\frac{\alpha_1 + k_1}{n}, \frac{\alpha_2 + k_2}{n} \right) - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f \left(\frac{\alpha_1 + k_1}{n}, \frac{\alpha_2 + k_2}{n} \right) \right| \\ &= n^2 \int_{k_1/n}^{(k_1+1)/n} da_1 \int_{k_2/n}^{(k_2+1)/n} da_2 \left| \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon(a_1, a_2) - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f(a_1, a_2) \right|. \end{aligned}$$

Складывая по всем $0 \leq k_1, k_2 < n$, в итоге получаем,

$$\begin{aligned} & \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} \int_0^1 d\alpha_1 \int_0^1 d\alpha_2 \left| \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right. \\ & \quad \left. - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right| d\alpha_2 \quad (17) \\ &= n^2 \int_0^{\frac{n-1}{n}} d\alpha_1' \int_0^{\frac{n-1}{n}} da_2 \left| \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon(a_1, a_2) - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f(a_1, a_2) \right|. \end{aligned}$$

Данное тождество будет использовано в конце выкладок.

Теперь приступим к преобразованию интеграла $I_3^{n,\varepsilon}$, используя известные комбинаторные выражения для гамма-функции от целочисленного аргумента через факториалы. Как вскоре выяснится, с их помощью для $I_3^{n,\varepsilon}$ получается представление, почти в точности эквивалентное интегралу $I_2^{n,\varepsilon}$. Имеем,

$$\begin{aligned} I_3^{n,\varepsilon} &= n^2 \mathbb{E} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 \left[\sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right. \\ & \quad \left. - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times x^{k_1}(1-x)^{n-k_1-1}x^{k_2}(1-x)^{n-k_2-1} \binom{n-1}{k_1} \binom{n-1}{k_2} \Big| dx_2 \\
& \leq n^2 \mathbb{E} \left[\sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 \left| \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right. \right. \\
& \quad \left. \left. - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right] \right. \\
& \quad \left. \times x^{k_1}(1-x)^{n-k_1-1}x^{k_2}(1-x)^{n-k_2-1} \binom{n-1}{k_1} \binom{n-1}{k_2} dx_2 \right| \\
& = n^2 \mathbb{E} \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} \left| \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right| \times \\
& \quad \times \int_0^1 dx_1 \int_0^1 \left[x^{k_1}(1-x)^{n-k_1-1}x^{k_2}(1-x)^{n-k_2-1} \binom{n-1}{k_1} \binom{n-1}{k_2} dx_2 \right] \\
& = \mathbb{E} \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} \left| \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right| \\
& \quad \times n^2 \binom{n-1}{k_1} \binom{n-1}{k_2} \mathcal{B}(k_1 + 1, n - k_1) \mathcal{B}(k_2 + 1, n - k_2) \\
& = \mathbb{E} \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} \left| \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right| \\
& \quad \times n^2 \binom{n-1}{k_1} \binom{n-1}{k_2} \frac{\Gamma(k_1 + 1)\Gamma(n - k_1)}{\Gamma(n + 1)} \frac{\Gamma(k_2 + 1)\Gamma(n - k_2)}{\Gamma(n + 1)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \mathbb{E} \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} \left| \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right| \\
&\times \binom{n-1}{k_1} \binom{n-1}{k_2} \frac{k_1!(n-k_1-1)! k_2!(n-k_2-1)!}{n! (n)!} \\
&= \mathbb{E} \sum_{\substack{0 \leq k_1 < n \\ 0 \leq k_2 < n}} \left| \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f \left(\frac{k_1 + \alpha_1}{n}, \frac{k_2 + \alpha_2}{n} \right) \right| \\
&\stackrel{(17)}{=} n^2 \int_0^{1-\frac{1}{n}} da_1 \int_0^{1-\frac{1}{n}} da_2 \left| \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f^\varepsilon(a_1, a_2) - \Delta_{(x_1)} \Delta_{(x_2)} f(a_1, a_2) \right|.
\end{aligned}$$

Из вида последнего выражения ясно видно, что сходимость интеграла

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} I_3^{n,\varepsilon} = 0$$

следует буквально из тех же выкладок, что и для $I_2^{n,\varepsilon}$, с заменой x_i на a_i , $i = 1, 2$.

Наконец, сходимость $\lim_{n \rightarrow \infty} I_1^{n,\varepsilon} = 0$ при выбранном ранее для интегралов $I_2^{n,\varepsilon}$ и $I_3^{n,\varepsilon}$ сколь угодно малом $\varepsilon > 0$ вытекает из предложения 4 при $d = 2$ и для мультииндекса $k = (1, 1)$, в силу гладкости f^ε .

Таким образом,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} (I_1^{n,\varepsilon} + I_2^{n,\varepsilon} + I_3^{n,\varepsilon}) = 0.$$

Стало быть,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I^n = 0,$$

что и доказывает искомую сходимость

$$\mathbb{E} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \left| \frac{\partial^2 \tilde{B}_{\alpha,n}(f, x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} - \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Теорема 5 доказана. \square

6. Замечания о смешанных производных

Приведем несколько теорем о смешанных производных, формально отличных, но близких по духу к теореме 5, а также имеющий к ним отношение один результат о первой производной В.В. Степанова.

Предложение 9 (Schwarz, цит. по [14, теорема 8.2.3]). *Если функция $f : G \mapsto \mathbb{R}$ имеет в области G частные производные f_{xy} и f_{yx} , то в любой точке $(x_0, y_0) \in G$, в которой обе они непрерывны, они равны:*

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

Полезное обобщение см. в предложении 14, взятом из упражнения 8.4.2b там же. В нем не предполагается заранее существование обеих частных производных в точке, а лишь одной из них; существование второй следует из утверждения. В следующей также классической теореме предполагается существование второго дифференциала в точке.

Предложение 10 (Young [15]). *Рассмотрим функцию $f : D \subset \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ и некоторую точку $(x_1^0, x_2^0) \in D$. Если частные производные функции первого порядка $\partial f / \partial x_1$ и $\partial f / \partial x_2$ существуют в некоторой окрестности точки (x_1^0, x_2^0) и дифференцируемы в точке (x_1^0, x_2^0) , то значения обеих смешанных частных производных второго порядка функции f в точке (x_1^0, x_2^0) равны:*

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \right)_{(x_1^0, x_2^0)} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} \right)_{(x_1^0, x_2^0)}.$$

В оригинальной статье Янга 1908 года многостраничное доказательство читаемо поистине с трудом, как порой случается с первыми доказательствами. Современное изящное и короткое обоснование можно найти в [16, (8.12.3)], а в интернете одностраничная версия Дьёдонне доступна еще по ссылке [17]. В учебных целях процитируем обе формулировки, сохраняя язык оригиналов.

Предложение 11 (Young – Dieudonne). (A) [16, (8.12.3)] *Let G be an open set in \mathbf{R}^n ; if a mapping f of G into a Banach space F is twice differentiable at x_0 , then the partial derivatives $D_i f$ are differentiable at x_0 and*

$$D_i D_j f(x_0) = D_j D_i f(x_0).$$

(B)[17] *Suppose $f(x, y)$ is defined in a neighborhood of a point (a, b) . Suppose the partial derivatives f_x, f_y are defined in a neighborhood of (a, b) and are differentiable at (a, b) . (In particular this implies that f_x, f_y are continuous at (a, b) , but it is not assumed that their derivatives exist anywhere other than at (a, b) .) A short statement of the assumption is that $Df = [f_x, f_y]$ is differentiable at (a, b) . This is sometimes stated as f is twice differentiable at (a, b) . Then*

$$(f_x)_y(a, b) = (f_y)_x(a, b),$$

sometimes stated as

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

Предложение 12 (Aksoy, Martelli [18]). *Следующие утверждения эквивалентны.*

(1) *Пусть $g \in C(U, \mathbf{R}^2)$ и $[a, b] * [c, d] \subset U$. Тогда*

$$\int_a^b \int_c^d g(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b g(x, y) dx dy.$$

(2) *Пусть $f \in C^1(U, \mathbf{R}^2)$ и существует смешанная производная $f_{xy} \in C(U, \mathbf{R}^2)$. Тогда производная f_{yx} также существует и*

$$f_{yx}(x, y) = f_{xy}(x, y) \quad \text{при всех } (x, y) \in U.$$

Предложение 13 (Stepanoff [19], [20, Теорема 3.1.9]). *Если E – измеримое множество, $E \subset G \subset \mathbf{R}^m$, где множество G открыто, и $f : G \rightarrow \mathbf{R}^n$ локально ограничена, измерима, и $\limsup_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - f(a)|}{|x - a|} < \infty$ для почти всех точек $a \in E$, то функция f дифференцируема в L_m – почти всех точках множества E , где L_m – m -мерная мера Лебега.*

Конечно, эта последняя теорема применима и ко вторым производным. Правда, вопроса о равенстве двух смешанных производных она не касается.

Предложение 14 ([14, упражнение 8.4.2b]). *Пусть функция f имеет частные производные f_x, f_y в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) . Тогда, если смешанная производная f_{xy} (или f_{yx}) существует в U и непрерывна в (x_0, y_0) , то смешанная производная f_{yx} (соответственно, f_{xy}) также существует в этой точке и имеет место равенство*

$$f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0).$$

Предложение 15 (Толстов [21, Теорема 7]). *Если $f(x_1, x_2)$ линейно непрерывна (то есть, непрерывна по каждому аргументу), измерима в области G и в точках множества E плоской положительной меры для каждой из ее частных производных $\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1}$ и $\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2}$ все производные числа по каждому из переменных конечны, то почти всюду на E существуют и совпадают между собой смешанные производные $\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$ и $\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2 \partial x_1}$.*

Предложение 16 (Толстов [21, Теорема 8]). *Если функция $f(x_1, x_2)$ линейно непрерывна, всюду в области G допускает производные, $\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2}$, $\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$, $\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2 \partial x_1}$, $\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2}$, то почти всюду в G :*

$$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2 \partial x_1}.$$

Наконец, совсем просто (по модулю теорем Шварца, или Янга – см. предложения 9 и 10) вопрос о равенстве двух смешанных производных решается в случае соболевских производных. Для удобства читателя напомним, что функция g является смешанной соболевской производной второго порядка по переменным x и y в $L_p(G)$, если найдется последовательность гладких функций $f^n \in C^\infty(G)$ таких, что

$$\|f^n - f\|_{L_p(G)} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

и при этом

$$\|f_{xy}^n - g\|_{L_p(G)} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Следующий элементарный результат вытекает из того факта, что для гладких функций $f_{xy}^n = f_{yx}^n$ во всех точках.

Предложение 17 (О соболевских производных). *Если функция f из класса $L_p(G)$ с $p > 0$ обладает смешанной соболевской производной $f_{xy} \in L_p(G)$, то также существует соболевская производная $f_{yx} \in L_p(G)$, и функции f_{yx} и f_{xy} почти всюду в G равны: $\|f_{yx} - f_{xy}\|_{L_p(G)} = 0$.*

Список литературы

- [1] S. Bernstein, Démonstration du théorème de Weierstrass fondée sur la calcul des probabilités, Сообщения Харьков. мат. о-ва. Вторая серия., 13:1 (1912), 1–2.
- [2] G. Lorentz, Bernstein polynomials, AMS Chelsea Publ., 1997.
- [3] Д.Д. Станку, О некоторых многочленах двух переменных типа Бернштейна и некоторых их применениях, ДАН СССР, 134:1 (1960), 48–51.
- [4] Е. В. Вороновская, Определение асимптотического вида приближения функций многочленами С.Н. Бернштейна. ДАН СССР, А. 4 (1932), 79–85.
- [5] В. С. Виденский, Многочлены Бернштейна. Л., ЛГПИ, 1990.
- [6] Т.П. Пендина, О приближении дифференцируемых функций бернштейновскими модификациями некоторых положительных операторов. Применение функционального анализа в теории приближений: сб. науч. тр. Калинин, 1987. 72–80.
- [7] Ю.С. Половинкина, Обобщенные многочлены Бернштейна. Современные достижения в науке и образовании: математика и информатика: материалы междунар. науч.-практ. конф. Архангельск, 2010. 160–161.
- [8] G.H. Kirov, A Generalization of the Bernstein Polynomials. Mathematica Balkanica. 6:2 (1992), 147–153.
- [9] Y.C. Kwun, A-M. Acu, A. Rafiq, et al., Bernstein-Stancu type operators which preserve polynomials, Computational analysis and applications, 23:4 (2017), 758-770.
- [10] Л.В.Канторович, О некоторых разложениях по полиномам в форме С.Н.Бернштейна. ДАН(А), 1930, 20, 563–566; 21, 595–600.
- [11] А.Ю. Веретенников, Е.В. Веретенникова, О частных производных многомерных полиномов Бернштейна, Матем. труды, 18:2 (2015), 22-38.
- [12] И.Н. Хлодовский, О некоторых свойствах полиномов С. Н. Бернштейна. Тр. первого Всесоюз. съезда математиков (Харьков, 1930 г.) М.-Л.: ОНТИ НКТП СССР, 1936. С. 22.
- [13] G. Lorentz, Zur Theorie der Polynome von S. Bernstein, Матем. сб. 2(44):3 (1937), 543–556.
- [14] В.А.Зорич, Математический анализ, часть I, М., Наука, 1981.
- [15] W.H. Young, On the Conditions for the Reversibility of the Order of Partial Differentiation, Proc. Royal Soc. of Edinburgh, 29 (1908-09), 136-164.
- [16] Ж. Дьедонне, Основы современного анализа, М., Мир, 1964.
- [17] J. Morrow, Mixed Partial – Young’s Theorem, https://sites.math.washington.edu/~morrow/334_15/mixed%20partials%20young.pdf

- [18] A. Aksoy, M. Martelli, Mixed Partial Derivatives and Fubini's Theorem, College Mathematics Journal of MAA, 33 (2002), 126-130.
- [19] W. Stepanoff, Sur les conditions de l'existence de la différentielle totale, Mat. Sb., 32:3 (1925), 511-527.
- [20] Г. Федерер, Геометрическая теория меры, М., Наука, 1987.
- [21] Г. П. Толстов, О частных производных, Изв. АН СССР. Сер. матем., 13:5 (1949), 425-446.