



UNIVERSITÉ IBN TOFAIL
FACULTÉ DES SCIENCES DE KÉNITRA

Sciences Mathématiques appliquées
(SMA)

Mémoire de Projet de Fin d'Études

Understanding the Hausdorff Measure and Dimension : Fundamentals and Examples

préparer par :
Ouyaz Mustapha
Nechba Mohammed

Encadré par :
MR ELARROUCHI MOHAMMED

Année Universitaire :2020-2021

Table des matières

Abstract	2
Introduction	3
1 Mesure De Hausdorff	4
1.1 Mesure exterieure	4
1.2 Mesure métrique exterieure	5
1.3 Théorème de Carathéodory	5
1.4 Construction de mesure	10
1.5 Définition de Mesure de Hausdorff	11
1.6 Quelques propriétés de la mesure de Hausdorff	13
2 Dimension de Hausdorff	16
2.1 Définition de la dimension de Hausdorff	16
2.2 Propriétés de la dimension de Hausdrooff	18
3 Application	20
3.1 Esemble Triadique de Cantor	20

Abstract

The objective of this paper is to study the Hausdorff measure, a fundamental concept in fractal geometry. We begin by defining the Hausdorff outer measure, which allows us to assign a measure to any subset of a metric space. We then present Carathéodory's theorem, which characterizes the outer measure in terms of coverings by open sets. We also study the construction of the Hausdorff measure from the outer measure.

Next, we introduce the Hausdorff measure proper, which is an extension of the outer measure. We give a formal definition and discuss its properties, such as monotonicity and translation invariance. We also address the notion of Hausdorff dimension, which is a generalization of Euclidean dimension to non-regular sets.

Finally, we present an application of the Hausdorff measure to the Cantor ternary set, which is a classic example of a fractal set. We calculate the Hausdorff dimension of this set and show how the Hausdorff measure can be used to quantify the geometric complexity of this object.

Overall, this paper provides a comprehensive introduction to the Hausdorff measure, which is an essential concept for understanding fractal geometry and its applications in many scientific fields.

Introduction

La géométrie fractale est une branche des mathématiques qui étudie les objets géométriques complexes et irréguliers, tels que les nuages, les fractales naturelles ou les graphes de réseaux. La mesure de Hausdorff est une notion fondamentale de la géométrie fractale, qui permet d'attribuer une mesure à des ensembles qui ne sont pas nécessairement réguliers.

Cette mémoire a pour objectif d'introduire la mesure de Hausdorff et de décrire ses principales propriétés et applications. Nous commençons par donner une définition de la mesure extérieure de Hausdorff, qui permet de mesurer la taille d'un sous-ensemble d'un espace métrique. Nous présentons également le théorème de Carathéodory, qui permet de construire une mesure à partir de la mesure extérieure.

Nous introduisons ensuite la mesure de Hausdorff, qui est une généralisation de la mesure extérieure et qui permet de mesurer la complexité géométrique d'un ensemble. Nous décrivons les propriétés de la mesure de Hausdorff, telles que la monotonie et l'invariance par translation, ainsi que la notion de dimension de Hausdorff.

Enfin, nous présentons une application de la mesure de Hausdorff à l'ensemble triadique de Cantor, qui est un exemple classique d'un ensemble fractal. Nous calculons la dimension de Hausdorff de cet ensemble et montrons comment la mesure de Hausdorff peut être utilisée pour quantifier la complexité géométrique de cet objet.

Cette mémoire fournira une introduction complète et rigoureuse à la mesure de Hausdorff, qui est une notion essentielle pour comprendre la géométrie fractale et ses applications dans de nombreux domaines scientifiques.

Chapitre 1

Mesure De Hausdorff

1.1 Mesure extérieure

Définition 1

Soit X un ensemble quelconque. On appelle **mesure extérieure** sur X une application $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ telle que :

- i) $\mu^*(\emptyset) = 0$
- ii) μ^* est croissante : si $A \subset B$ alors

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$$

- iii) μ^* est sous-additive : si $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille de parties de X , alors

$$\mu^*\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(A_n)$$

Remarque 1

une mesure extérieure n'est pas une mesure positive sauf s'elle est additive. Par contre une mesure positive définie sur $\mathcal{P}(X)$ est une mesure extérieure .

Exemple 1

Soit X un ensemble et $\varphi : \mathcal{P}(X) \rightarrow \{0, 1\}$ définie par :

$$\varphi(A) = \begin{cases} 0 & \text{si } A = \emptyset \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

φ est bien une mesure extérieure mais pas une mesure positive.

1.2 Mesure métrique extérieure

Définition 2

soit (X,d) un espace métrique. Une mesure extérieure μ^* est appelée **mesure métrique** si :

$$\forall E, F \subset X, d(E, F) > 0 \implies \mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F)$$

où

$$d(E, F) = \inf\{d(x, y), x \in E, y \in F\}.$$

Définition 3

Soit X un ensemble muni d'une mesure extérieure μ^* . On dit qu'une partie $B \subset X$ est μ^* -**mésurable** si, pour toute partie A de X , on a

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \cap B^c)$$

On note $M(\mu^*)$ l'ensemble des parties μ^* -mésurable de X

1.3 Théorème de Carathéodory

Théorème 1

Soit μ^* une mesure extérieure sur X .

l'ensemble $M(\mu^*)$ des parties μ^* -mésurable de X est une tribu sur X , et la restriction de μ^* à $M(\mu^*)$ est une mesure.

Démonstration.

On notera $M = M(\mu^*)$ pour simplifier.

• Montrons pour commencer que M est une algèbre, c-à-d. que M est stable par unions finies et passage au complémentaire et qu'elle contient l'ensemble vide .

En effet,

– soit $A \subset X$. Comme μ^* est une mesure extérieure alors

$$\mu^*(A \cap \emptyset) = \mu^*(\emptyset) = 0 \text{ et } \mu^*(A \cap \emptyset^c) = \mu^*(A \cap X) = \mu^*(A). \text{ donc}$$

$$\mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \cap \emptyset^c) = \mu^*(A)$$

par conséquent, $\emptyset \in M$.

– soit $B \in M$ et $A \subset X$

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \cap B^c) \\ &= \mu^*(A \cap B^c) + \mu^*(A \cap (B^c)^c). \end{aligned}$$

Donc $B^c \in M$.

Soient $A_1, A_2 \in M$ et $B \subset X$ quelconque.

Comme $A_1 \in M$,

$$\begin{aligned}\mu^*(B \cap (A_1 \cup A_2)) &= \mu^*(B \cap (A_1 \cup A_2) \cap A_1) + \mu^*(B \cap (A_1 \cup A_2) \cap A_1^c) \\ &= \mu^*(B \cap A_1) + \mu^*(B \cap A_2 \cap A_1^c).\end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned}\mu^*(B \cap (A_1 \cup A_2)) + \mu^*(B \cap (A_1 \cup A_2)^c) &= \mu^*(B \cap A_1) + \mu^*(B \cap A_1^c \cap A_2) + \mu^*(B \cap A_1^c \cap A_2^c) \\ &= \mu^*(B \cap A_1) + \mu^*(B \cap A_1^c) \quad \text{car } A_2 \in M \\ &= \mu^*(B) \quad \text{car } A_1 \in M.\end{aligned}$$

D'où $A_1 \cup A_2 \in M$.

Il s'en suit que M est une algèbre.

• Montrons que M est une σ -algèbre. Comme on a déjà montré que M est une algèbre, il suffit de prouver que M est stable par union dénombrable.

soit $(B_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de M deux à deux disjoints. On va montrer par récurrence que : pour tout $A \subset X$ et tout $n \geq 1$

$$\mu^*(A) = \sum_{k=1}^n \mu^*(A \cap B_k) + \mu^*(A \setminus \bigcup_{k=1}^n B_k)$$

En effet,

pour $n = 1$, on a $B_1 \in M$ et donc pour tout $A \subset X$ on a

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap B_1) + \mu^*(A \setminus B_1).$$

Donc la relation est vérifiée pour $n=1$.

Supposons que la relation est vérifiée pour $n \geq 1$ fixé.

On a $B_{n+1} \in M$ et donc :

$$\begin{aligned}\mu^*(A \setminus \bigcup_{k=1}^n B_k) &= \mu^*((A \setminus \bigcup_{k=1}^n B_k) \cap B_{n+1}) + \mu^*((A \setminus \bigcup_{k=1}^n B_k) \setminus B_{n+1}) \\ &= \mu^*(A \cap B_{n+1}) + \mu^*(A \setminus \bigcup_{k=1}^{n+1} B_k)\end{aligned}$$

D'après hypothèse de récurrence on a :

$$\begin{aligned}\mu^*(A) &= \sum_{k=1}^n \mu^*(A \cap B_k) + \mu^*(A \setminus \bigcup_{k=1}^n B_k) \\ &= \sum_{k=1}^n \mu^*(A \cap B_k) + \mu^*(A \cap B_{n+1}) + \mu^*(A \setminus \bigcup_{k=1}^{n+1} B_k) \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \mu^*(A \cap B_k) + \mu^*(A \setminus \bigcup_{k=1}^{n+1} B_k).\end{aligned}$$

Ce qui conclut la récurrence.

On pose $B = \bigcup_{n \geq 1} B_n$

D'une part,

On a $A \setminus B \subset A \setminus \bigcup_{k=1}^n B_k$

Par croissance de μ^* , on a

$$\mu^*(A \setminus B) \leq \mu^*(A \setminus \bigcup_{k=1}^n B_k).$$

Il s'en suit que :

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \sum_{k=1}^n \mu^*(A \cap B_k) + \mu^*(A \setminus \bigcup_{k=1}^n B_k) \\ &\geq \sum_{k=1}^n \mu^*(A \cap B_k) + \mu^*(A \setminus B) \end{aligned}$$

En passant à la limite sur n , on a

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n \geq 1} \mu^*(A \cap B_n) + \mu^*(A \setminus B) \quad (1.1)$$

Par sous-additivité de μ^* , on a

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\geq \mu^*(\bigcup_{n \geq 1} A \cap B_n) + \mu^*(A \setminus B) \\ &= \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \setminus B). \end{aligned}$$

Il s'en suit que $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \setminus B)$.

D'autre part,

Comme $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$, alors par croissance de μ^* , on a

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \setminus B).$$

Il en résulte que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \setminus B).$$

D'où $B = \bigcup_{n \geq 1} B_n \in M$. Si $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite quelconque de M , on définit la suite $(B_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de M deux à deux disjoints, on posant

$B_1 := A_1, \dots, B_n := A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$. comme M est une algèbre alors

$B_n \in M, \forall n \geq 1$ et remarquons que $\bigcup_{n \geq 1} A_n = \bigcup_{n \geq 1} B_n \in M$, ce qui affirme que M est bien une tribu de X .

• Enfin, montrons que μ^* est une mesure sur M .

En effet,

– Comme μ^* est une mesure extérieure alors $\mu^*(\emptyset) = 0$.

– soit $(B_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de M deux à deux disjoints.

En prenant $A = \bigcup_{n \geq 1} B_n$ dans (1.1) et en utilisant la notation $B = \bigcup_{n \geq 1} B_n$, On trouve

$$\begin{aligned} \mu^*(\bigcup_{n \geq 1} B_n) &\geq \sum_{n \geq 1} \mu^*(\bigcup_{j \geq 1} B_j \cap B_n) + \mu^*(B \setminus B) \\ &= \sum_{n \geq 1} \mu^*(B_n) \end{aligned}$$

Par hypothèse de sous-additivité de μ^* , cette inégalité est en fait une égalité.
D'où μ^* est mesure sur M .

□

Proposition 1

Soient (X, d) un espace métrique, et μ^* une mesure extérieure sur X .
si μ^* est métrique alors $\mathcal{B}(X) \subset M(\mu^*)$, où $\mathcal{B}(X)$ est la tribu de Borel .

La preuve de cette proposition est basée sur le Lemme suivant :

Lemme 1

Soient μ^* une mesure métrique extérieure, et $\{A_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ une famille croissante de parties de X . On pose $A = \bigcup_{n \in \mathbf{N}} A_n$. Si $d(A_n, A \setminus A_{i+1}) > 0$ pour tout $n \in \mathbf{N}$, alors on a

$$\mu^*(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu^*(A_n)$$

Démonstration de lemme 1.

Soient μ^* une mesure métrique extérieure, et $\{A_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ une famille croissante de parties de X .
On pose $A = \bigcup_{n \in \mathbf{N}} A_n$.
Supposons que $d(A_n, A \setminus A_{n+1}) > 0$ pour tout $n \in \mathbf{N}$.
pour $\mu^*(A) < +\infty$.

Posons $B_0 = A_0$ et, pour tout $n \geq 1, B_n = A_n \setminus A_{n-1}$. Comme la famille $\{A_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ était croissante, $\{B_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ est une famille de parties de X deux à deux disjointes et telle que

$$\bigcup_{n \in \mathbf{N}} B_n = \bigcup_{n \in \mathbf{N}} A_n = A$$

Pour tout $n \in \mathbf{N}$, on a

$$A_n \subset A \subset A_n \cup \bigcup_{k \geq n+1} B_k$$

Donc, Par croissance et sous-aditivité de μ^* on a :

$$\mu^*(A_n) \leq \mu^*(A) \leq \mu^*(A_n) + \sum_{k \geq n+1} \mu^*(B_k) \tag{1.2}$$

Ainsi, pour montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu^*(A_n) = \mu^*(A)$ il suffit maintenant de montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k \geq n+1} \mu^*(B_k) = 0$. Pour cela, il suffit de montrer que la série de terme général $\mu^*(B_k)$ converge.

En effet,

Supposons qu'il existe n et m deux entiers de même parité tels que $n < m$ et $d(B_n, B_m) = 0$.

Alors,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists (x, y) \in B_n \times B_m : d(x, y) < \varepsilon$$

Prenons $\varepsilon = d(A_n, A \setminus A_{n+1}) > 0$ par hypothèse. Il existe donc $(x_0, y_0) \in B_n \times B_m$ tel que $d(x_0, y_0) < \varepsilon$.

Or, $x_0 \in B_n \subset A_n$ et $y_0 \in B_m = A_m \setminus A_{m-1}$.

Comme $n+1 \leq m-1$ (car de même parité et $n < m$) et que la famille $\{A_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ est croissante, alors $y_0 \in A_m \setminus A_{m-1} \subset A_m \setminus A_{n+1} \subset A \setminus A_{n+1}$, donc $y_0 \in A \setminus A_{n+1}$.

Et donc $d(x_0, y_0) \geq d(A_n, A \setminus A_{n+1}) = \varepsilon$. On obtient une absurdité.

Ainsi, par hypothèse, pour tout $N \in \mathbf{N}$ on a :

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^N B_{2k}\right) = \sum_{k=0}^N \mu^*(B_{2k}), \mu^*\left(\bigcup_{k=0}^N B_{2k+1}\right) = \sum_{k=0}^N \mu^*(B_{2k+1})$$

Par croissance de μ^* on a :

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^N B_{2k}\right) \leq \mu^*(A) < \infty$$

Et

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^N B_{2k+1}\right) \leq \mu^*(A) < \infty$$

Ainsi, pour tout $N \in \mathbf{N}$ on a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{2N+1} \mu^*(B_k) &= \sum_{k=0}^N \mu^*(B_{2k}) + \sum_{k=0}^N \mu^*(B_{2k+1}) \\ &= \mu^*\left(\bigcup_{k=0}^N B_{2k}\right) + \mu^*\left(\bigcup_{k=0}^N B_{2k+1}\right) \\ &\leq 2\mu^*(A). \end{aligned}$$

Par passage à la limite sur N , On trouve que

$$\sum_{k \geq 0} \mu^*(B_k) \leq 2\mu^*(A) < \infty$$

Finalement, en passant à la limite dans 1.2, on a

$$\mu^*(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu^*(A_n)$$

□

Démonstration de proposition 1.

Soient (X, d) un espace métrique, et μ^* une mesure extérieure sur X .

Supposons que μ^* est métrique, c-à-d. $\forall E, F \subset X$, avec $d(E, F) > 0$ on a $\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F)$

Soit F un ensemble fermé de X . Montrons que F est μ^* -mesurable. Pour cela, soit A une partie de X . On veut montrer que $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap F^c)$ l'autre inégalité provenant immédiatement de la sous-additivité de μ^* . On peut supposer que $\mu^*(A) < \infty$, sans quoi il n'y a rien à montrer.

Pour tout $n \geq 1$, posons

$$F_n = \left\{x \in X \mid d(x, F) > \frac{1}{n}\right\}$$

Comme $d(A \cap F, A \cap F_n) > 0$, on a

$$\mu^*((A \cap F_n) \cup (A \cap F)) = \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F).$$

Par croissance de μ^* on a alors

$$\begin{aligned}\mu^*(A) &\geq \mu^*((A \cap F_n) \cup (A \cap F)) \\ &= \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F).\end{aligned}$$

En passant à la limite, comme $\bigcup_{n \geq 1} F_n = F^c$, et comme $\{A \cap F_n\}_{n \geq 1}$ vérifie les hypothèses du lemme précédent, on obtient l'inégalité voulue.

Finalement, tout fermé est μ^* -mesurable, et comme les fermés engendrent la tribu borélienne, on a la conclusion voulue. \square

1.4 Construction de mesure

Dans cette section, nous nous intéressons à la construction de mesures extérieures. Pour ce faire, nous nous donnons E un ensemble, $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}(E)$ un recouvrement de E et $\delta : \mathcal{U} \rightarrow [0, +\infty]$ une fonction avec $\delta(\emptyset) = 0$. On définit alors :

$$\mu(A) = \inf_{D \in \mathcal{R}(A)} \sum_{X \in D} \delta(X), \forall A \subset E$$

où $\mathcal{R}(A)$ désigne l'ensemble des recouvrements dénombrables de A par des éléments de \mathcal{U} .

Théorème 2

l'application μ est une mesure extérieure sur E .

Démonstration.

— Soit $A \subset E$, par construction de μ on a :

$$\mu(A) = \inf_{D \in \mathcal{R}(A)} \sum_{X \in D} \delta(X)$$

Or pour tout $D \in \mathcal{R}(A)$ et tout $X \in D$ on a $\delta(X) \geq 0$

Alors : $\forall D \in \mathcal{R}(A)$, $\sum_{X \in D} \delta(X) \geq 0$

Par conséquent :

$$\mu(A) = \inf_{D \in \mathcal{R}(A)} \sum_{X \in D} \delta(X) \geq 0$$

D'où μ est bien défini.

— Vérifions que $\mu(\emptyset) = 0$:

En effet, on a :

$$\mu(\emptyset) = \inf_{D \in \mathcal{R}(\emptyset)} \sum_{X \in D} \delta(X) \geq 0$$

Comme $\{\emptyset\}$ est un recouvrement de \emptyset , alors $\{\emptyset\} \in \mathcal{R}(\emptyset)$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\mu(\emptyset) &= \inf_{D \in \mathcal{R}(\emptyset)} \sum_{X \in D} \delta(X) \\ &\leq \sum_{X \in \{\emptyset\}} \delta(X) \\ &= \delta(\emptyset) \\ &= 0\end{aligned}$$

D'où $\mu(\emptyset) = 0$.

— Soient $A, B \subset E$ avec $A \subset B$ et $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{R}(B)$

Alors, $B \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$

Or $A \subset B$, alors $A \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$

Donc :

$$\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{R}(A)$$

Par conséquent,

$$\mathcal{R}(B) \subset \mathcal{R}(A)$$

Ou encore

$$\inf_{D \in \mathcal{R}(A)} \sum_{X \in D} \delta(X) \leq \inf_{D \in \mathcal{R}(B)} \sum_{X \in D} \delta(X)$$

Il s'en suit que $\mu(A) \leq \mu(B)$.

— Soient $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de partie de E et $\epsilon > 0$.

pour chaque n , on pose $D_n \in \mathcal{R}(A_n)$, telle que $\sum_{X \in D_n} \delta(X) \leq \mu(A_n) + \frac{\epsilon}{2^{n+1}}$.

L'existence d'un tel ensemble est garanti par la construction de μ .

On a de plus $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n \in \mathcal{R}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n)$, et donc :

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) &\leq \sum_{X \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n} \delta(X) \\ &\leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{X \in D_n} \delta(X) \\ &\leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\mu(A_n) + \frac{\epsilon}{2^{n+1}}\right) \\ &= \epsilon + \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) \end{aligned}$$

On fait tendre ϵ vers 0 et on obtient bien la sous-additivité de μ . Finalement μ est une mesure extérieure. \square

1.5 Définition de Mesure de Hausdorff

On réalise ici la même construction de la mesure que précédemment, en se plaçant sur un espace métrique (E, d) , qu'on recouvre avec la classe $\mathcal{U} = \{X \subset E, \text{diam}(X) \leq \epsilon\}$, où ϵ est fixé positif strictement.

On se donne un réel $s > 0$ et on pose l'application $\delta : X \rightarrow \text{diam}(X)^s$.

Enfin, on pose $\mathcal{R}_\epsilon(A)$, l'ensemble des recouvrements d'énombrables de A par des parties $X \subset E$ telles que $\text{diam}(X) \leq \epsilon$

On obtient alors la quantité : $\forall A \subset E, \mathcal{H}_\epsilon^s(A) := \inf_{D \in \mathcal{R}_\epsilon(A)} \sum_{X \in D} (\text{diam}(X))^s$

Définition 4

On définit la mesure de Hausdorff comme il suit :

$$\mathcal{H}^s(A) := \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathcal{H}_\epsilon^s(A), \forall A \subset E$$

Remarque 2

— Pourquoi la limite existe-elle ?

L'application $\eta > 0 \rightarrow \mathcal{H}_\eta^s(A)$, pour tout $A \subset X$, est décroissante (puisque l'infimum est pris sur les recouvrements de diamètre de plus en plus petites) et admet donc une limite en 0.

— On note que si $\eta < \epsilon$, alors $\mathcal{R}_\eta(A) \subset \mathcal{R}_\epsilon(A)$, donc $\mathcal{H}_\eta^s(A) \geq \mathcal{H}_\epsilon^s(A)$.

En conséquence, $\mathcal{H}^s(A) = \sup_{\epsilon > 0} \mathcal{H}_\epsilon^s(A)$ est bien définie.

Proposition 2

La mesure de Hausdorff est :

- i) une mesure extérieure.
- ii) une mesure métrique.
- iii) une mesure borélienne.

Démonstration.

i) Par construction de \mathcal{H}^s est une mesure extérieure.

ii) Soient $s \geq 0, A, B \subset E$ avec $d(A, B) > 0$, et $\epsilon > 0$ avec $d(A, B) > \epsilon$.

considérons un recouvrement $D \in \mathcal{R}_\epsilon(A \cup B)$. Si $X \in D$, l'ensemble X ne peut pas intersecter à la fois A et B . Par conséquent, $D = D_1 \cup D_2, D_1 \cap D_2 = \emptyset$ et $D_1 \in \mathcal{R}_\epsilon(A), D_2 \in \mathcal{R}_\epsilon(B)$. On en déduit que

$$\mathcal{H}^s(A) + \mathcal{H}^s(B) \leq \sum_{X \in D_1} (\text{diam}(X))^s + \sum_{X \in D_2} (\text{diam}(X))^s = \sum_{X \in D} (\text{diam}(X))^s$$

En passant à l'infimum sur $D \in \mathcal{R}_\epsilon(A \cup B)$ et en faisant tendre ϵ vers 0, on obtient bien :

$$\mathcal{H}^s(A) + \mathcal{H}^s(B) \leq \mathcal{H}^s(A \cup B)$$

Par sous additivité de \mathcal{H}^s on a :

$$\mathcal{H}^s(A \cup B) \leq \mathcal{H}^s(A) + \mathcal{H}^s(B)$$

Par conséquent ,

$$\mathcal{H}^s(A \cup B) = \mathcal{H}^s(A) + \mathcal{H}^s(B)$$

Il s'en suit que \mathcal{H}^s est bien est une mesure métrique.

iii) D'après Théorème de Carathéodory on a \mathcal{H}^s est une mesure sur la tribu $M(\mathcal{H}^s)$, et comme on a $\mathcal{B}(E) \subset M(\mathcal{H}^s)$ (proposition 1)

Alors \mathcal{H}^s est une mesure borélienne. □

1.6 Quelques propriétés de la mesure de Hausdorff

Proposition 3

- i) La mesure de Hausdorff est invariante par translation.
- ii) La mesure de Hausdorff vérifie la propriété de dilatation suivante :

$$\mathcal{H}^s(\lambda A) = \lambda^s \mathcal{H}^s, \quad \forall s \in [0, +\infty], \forall A \subset E, \forall \lambda > 0$$

Démonstration.

Soient $s \geq 0$, $\epsilon > 0$ et $A \subset E$.

i) soit $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{R}_\epsilon(A)$ alors pour tout $x \in E$, $\{A_n + x\}_{n \in \mathbb{N}}$ est un recouvrement de $A + x$ où $A + x = \{a + x, a \in A\}$, de plus pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$\begin{aligned} \text{diam}(A_n + x) = \text{diam}(A_n) &\Rightarrow \text{diam}(A_n + x)^s = \text{diam}(A_n)^s \\ &\Rightarrow \sum_{n \in \mathbb{N}} \text{diam}(A_n + x)^s = \sum_{n \in \mathbb{N}} \text{diam}(A_n)^s \\ &\Rightarrow \inf_{\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{R}_\epsilon(A)} \sum_{n \in \mathbb{N}} \text{diam}(A_n + x)^s = \inf_{\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{R}_\epsilon(A)} \sum_{n \in \mathbb{N}} \text{diam}(A_n)^s \\ &\Rightarrow \mathcal{H}_\epsilon^s(A + x) = \mathcal{H}_\epsilon^s(A) \end{aligned}$$

En passant à la limite lorsque ϵ tend vers zéro on obtient $\mathcal{H}^s(A + x) = \mathcal{H}^s(A)$.

ii) Soit $\lambda > 0$.

Pour tout recouvrement $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de A où $\text{diam}(A_n) \leq \epsilon$ correspond un recouvrement $\{\lambda A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de λA , où $\lambda A = \{\lambda a, a \in A\}$ et $\text{diam}(\lambda A_n) \leq \lambda \epsilon$.

$$\begin{aligned} \text{On a} \quad \text{diam}(\lambda A_n) = \lambda \text{diam}(A_n) &\Rightarrow \text{diam}(\lambda A_n)^s = \lambda^s \text{diam}(A_n)^s \\ &\Rightarrow \sum_{n \in \mathbb{N}} \text{diam}(\lambda A_n)^s = \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda^s \text{diam}(A_n)^s \end{aligned}$$

En prenant l'infimum sur tous les recouvrements $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ on obtient $\mathcal{H}_{\lambda \epsilon}^s(\lambda A) = \lambda^s \mathcal{H}_\epsilon^s(A)$, et en faisant tendre ϵ vers zéro on trouve $\mathcal{H}^s(\lambda A) = \lambda^s \mathcal{H}^s(A)$ \square

Proposition 4

- i) La mesure \mathcal{H}^0 est la mesure de comptage.
- ii) Sur \mathbb{R} , la mesure \mathcal{H}^1 est la mesure de Lebesgue.

Démonstration.

i) Soient A une partie finie de E et notons $\delta_0 = \min\{d(x, y) \mid x, y \in A, x \neq y\}$. On veut montrer que pour tout $\delta \in]0, \delta_0[$, $\mathcal{H}_\delta^0(A) = \text{card}(A)$.

En effet, comme $A \subset \bigcup_{x \in A} \{x\}$, alors :

$$\mathcal{H}_\delta^0(A) \leq \sum_{x \in A} 1 = \text{card}(A)$$

Inversement, pour tout $\delta < \delta_0$, si $F \in \mathcal{R}_\delta(A)$, tout ensemble de F contient ou plus un élément de A , donc F est constitué où mois n partie de E avec $n = \text{card}(A)$ et donc $\mathcal{H}_\delta^0(A) \geq \text{card}(A)$. ceci montre que pour tout δ suffisamment petit $\mathcal{H}_\delta^0(A) = \text{card}(A)$ et donc $\mathcal{H}^0(A) = \text{card}(A)$.

Si A est une partie infini de E , il contient des ensembles finis avec un nombre arbitrairement grand d'éléments. Par croissance de \mathcal{H}^0 , on a $\mathcal{H}^0(A) \geq n$ pur tout $n \in \mathbb{N}$ et donc $\mathcal{H}^0(A) = +\infty$ C'est bien la mesure de comptage sur E .

ii) La mesure de Hausdorff étant invariante par translation, il suffit de montrer que $\mathcal{H}^1([0, 1]) = 1$

Dans un premier de temps, on montre que $\mathcal{H}^1([0, 1]) \leq 1$

On pose $U_i = [\frac{i-1}{k}; \frac{i}{k}]$; $i = 1, \dots, k$.

Ainsi on a, $[0, 1] = \bigcup_{i=1}^k U_i$ et $\text{diam}(U_i) = \frac{1}{k}$; $i = 1, \dots, k$ donc :

$$\mathcal{H}_{\frac{1}{k}}^1([0, 1]) \leq \sum_{i=1}^k \text{diam}(U_i) = 1$$

On fait tendre k vers l'infini et on obtient $\mathcal{H}^1([0, 1]) \leq 1$

Pour montrer l'autre sens, on considère $\epsilon > 0, \delta > 0$ et $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{R}_\delta([0, 1])$ et tel que :

$$|\mathcal{H}_\delta([0, 1]) - \sum_{n \in \mathbb{N}} \text{diam}(A_n)| \leq \epsilon$$

Sans porte de gèneralitiè, on peut supposer que les A_n sont des intervalles ouverts. Il existe une famille $\{a_k\}_{0 \leq k \leq n}$ avec $0 = a_0 < a_1 < \dots < a_n = 1$ telle que $[a_k, a_{k+1}]$ n'appartient qu'à un seul A_k pour tout $k=0, \dots, n-1$. Par consèquent

$$\mathcal{H}_\delta^1([0, 1]) + \epsilon \geq \sum_{k=0}^{n-1} \text{diam}([a_k, a_{k+1}]) = 1$$

En faisant tendre ϵ plus δ vers 0, on obtient $\mathcal{H}^1([0, 1]) \geq 1$

Il s'en suit que $\mathcal{H}^1([0, 1]) = 1$. □

Proposition 5

Soit f une similitude de rapport $r > 0$, c'est à dire :

$\forall x, y \in E, d(f(x), f(y)) = rd(x, y)$. Alors :

$$\forall s \geq 0, \forall A \subset E, \mathcal{H}^s(f(A)) = r^s \mathcal{H}^s(A)$$

Démonstration.

Soient $A \subset E, \epsilon > 0$. On remarque que $f(\mathcal{R}_\epsilon(A)) = \mathcal{R}_{r\epsilon}(f(A))$

On en dèduit donc :

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{r\epsilon}^s(f(A)) &= \inf_{D \in \mathcal{R}_\epsilon(A)} \sum_{X \in D} (\text{diam}(X))^s \\ &= \inf_{D' \in \mathcal{R}_{r\epsilon}(f(A))} \sum_{X \in D'} (\text{diam}(f(X)))^s \\ &= r^s \inf_{D' \in \mathcal{R}_\epsilon(A)} \sum_{X \in D'} (\text{diam}(X))^s \\ &= r^s \mathcal{H}_\epsilon^s(A) \end{aligned}$$

En faisant tendre ϵ vers 0 , on obtient que $\mathcal{H}^s(f(A)) = r^s \mathcal{H}^s(A)$. □

Proposition 6

Soient (X, d_x) et (Y, d_y) deux espaces métriques, $k > 0$

et $f : (X, d_x) \rightarrow (Y, d_y)$ une application k -lipschitzienne.

Alors :

$$\forall s \geq 0, \forall A \subset E, \mathcal{H}^s(f(A)) \leq k^s \mathcal{H}^s(A)$$

Démonstration.

Par le même système de preuve que ci-dessus, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{\epsilon r}^s(f(A)) &= \inf_{D \in \mathcal{R}_{\epsilon}(A)} \sum_{X \in D} (\text{diam}(X))^s \\ &= \inf_{D' \in \mathcal{R}_{\epsilon}(A)} \sum_{X \in D'} (\text{diam}(f(X)))^s \\ &\leq k^s \inf_{D' \in \mathcal{R}_{\epsilon}(A)} \sum_{X \in D'} (\text{diam}(X))^s \\ &\leq k^s \mathcal{H}_{\epsilon}^s(A) \end{aligned}$$

En faisant tendre ϵ vers 0 , on obtient que $\mathcal{H}^s(f(A)) \leq k^s \mathcal{H}^s(A)$. □

Chapitre 2

Dimension de Hausdorff

2.1 Définition de la dimension de Hausdorff

Proposition 7

- i) Soit $A \subset \mathbb{R}^n$. S'il existe $d \geq 0$ tel que $\mathcal{H}^d(A) < \infty$, alors :

$$\mathcal{H}^s(A) = 0, \quad s > d$$

.

- ii) Pour toute partie $A \subset \mathbb{R}^n$, il existe une unique valeur $d \in \mathbb{R}^+ \cup \{\infty\}$ tel que :

$$\mathcal{H}^s(A) = +\infty, \quad \forall s < d$$

Et

$$\mathcal{H}^s(A) = 0, \quad \forall s > d$$

Démonstration.

- i) Soient $A \subset \mathbb{R}^n$, $\epsilon > 0$ et $s > d \geq 0$:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_\epsilon^s(A) &= \inf_{D \in \mathcal{R}_\epsilon(A)} \sum_{X \in D} (\text{diam}(X))^s \\ &= \inf_{D \in \mathcal{R}_\epsilon(A)} \sum_{X \in D} (\text{diam}(X))^d (\text{diam}(X))^{s-d} \\ &\leq \inf_{D \in \mathcal{R}_\epsilon(A)} \sum_{X \in D} (\text{diam}(X))^d \epsilon^{s-d} \\ &= \epsilon^{s-d} \mathcal{H}_\epsilon^d(A). \end{aligned}$$

Comme $\mathcal{H}^d(A) < \infty$, on obtient bien que $\mathcal{H}_\epsilon^s(A) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$, et donc que $\mathcal{H}^s(A) = 0 \quad \forall A \subset E$ dès que $s > d$.

- ii) Existence :

Si $\{\mathcal{H}^s(A) < +\infty\} = \emptyset$, alors on pose $d = +\infty$, qui vérifie bien les conditions du théorème.

Si non, on pose $d = \inf \{s \geq 0, \mathcal{H}^s(A) < +\infty\}$.

Si $s < d$ alors $\mathcal{H}^s(A) = +\infty$.

Si $s > d$, alors il existe $s_0 \in]d, s[$ tel que $\mathcal{H}^{s_0}(A) < +\infty$. D'après **i)**, on en déduit que

$\mathcal{H}^s(A) = 0$, ce qui conclut l'existence.


Unicité :

Par l'absurde, s'il existait $s_1 > s_2$ vérifiant les deux hypothèses, alors pour $t \in]s_1, s_2[$, la mesure t -dimensionnelle de \mathbb{R}^n vaudrait à la fois 0 et ∞ . \square

Définition 5

Pour tout $A \subset \mathbb{R}^n$, le dimension de Hausdorff de A est la valeur :

$$\begin{aligned} \dim_{\mathcal{H}}(A) &= \sup \{s \geq 0, \mathcal{H}^s(A) = +\infty\} \\ &= \inf \{s \geq 0, \mathcal{H}^s(A) = 0\} \end{aligned}$$



Graphe de la fonction $d \rightarrow \mathcal{H}^d(A)$

2.2 Propriétés de la dimension de Hausdorff

Proposition 8

- i) Soient $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Si $A \subset B$ alors $\dim_{\mathcal{H}}(A) \leq \dim_{\mathcal{H}}(B)$
- ii) Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ une similitude, $\dim_{\mathcal{H}}(f(A)) = \dim_{\mathcal{H}}(A)$

Démonstration.

i) Soient A, B deux parties de \mathbb{R}^n tel que $A \subset B$ et $d \geq 0$ tel que $\mathcal{H}^d(B) = 0$.

Puisque \mathcal{H}^s est une mesure exterieur sur \mathbb{R}^n , alors $\mathcal{H}^s(A) \leq \mathcal{H}^s(B)$, $\forall s \geq 0$

En particulier $\mathcal{H}^d(A) \leq \mathcal{H}^d(B) = 0$, donc $\mathcal{H}^d(A) = 0$

On dèduit donc que si $d \in \{s \geq 0 / \mathcal{H}^s(B) = 0\}$ alors $d \in \{s \geq 0 / \mathcal{H}^s(A) = 0\}$

Ainsi,

$$\{s \geq 0 / \mathcal{H}^s(B) = 0\} \subset \{s \geq 0 / \mathcal{H}^s(A) = 0\}$$

Il s'en suit que :

$$\inf\{s \geq 0 / \mathcal{H}^s(A) = 0\} \leq \inf\{s \geq 0 / \mathcal{H}^s(B) = 0\}$$

Par défintion de la dimension de Hausdorff on conclut que $\dim_{\mathcal{H}}(A) \leq \dim_{\mathcal{H}}(B)$

ii)

$$\begin{aligned} \dim_{\mathcal{H}}(f(A)) &= \inf\{s \geq 0 / \mathcal{H}^s(f(A)) = 0\} && \text{par defintion} \\ &= \inf\{s \geq 0 / r^s \mathcal{H}^s(A) = 0\} && (\text{proposition 5}) \\ &= \inf\{s \geq 0 / s \mathcal{H}^s(A) = 0\} \\ &= \dim_{\mathcal{H}}(A). \end{aligned}$$

□

Théorème 3

Toute partie au plus dénombrable A de \mathbb{R}^n est de dimension de Hausdorff nulle.

Démonstration.

Il suffit de démontrer le théorème pour les parties dénombrables de \mathbb{R}^n .

pour se faire on note $A = \{x_k \in \mathbb{R}^n / k \in \mathbb{N}\}$

on a bien $A \subset \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{x_k\}$ et $\text{diam}(\{x_k\}) = 0 \leq \varepsilon, \forall k \in \mathbb{N}, \forall \varepsilon > 0$

Ceci affirme $(\{x_k\})_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$

Par consèquent, $\forall s > 0, \forall \varepsilon > 0$, on a

$$\mathcal{H}_\varepsilon^s(A) \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} (\text{diam}(\{x_k\}))^s = 0$$

Par passage a la limite sur ε , on trouve que

$$\mathcal{H}^s(A) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{H}_\varepsilon^s(A) = 0 \quad \forall s > 0$$

Il en rèsult que $\dim_{\mathcal{H}}(A) = 0$ (par defintion de mesure de hausdorff) □

Proposition 9

soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de sous -ensemble de \mathbb{R}^n . Alors :

$$\dim_{\mathcal{H}}\left(\bigcup_k A_k\right) = \sup\{\dim_{\mathcal{H}}(A_k) : k \in \mathbb{N}\}$$

Démonstration.

On note $s = \sup\{\dim_{\mathcal{H}}(A_n) : n \in \mathbb{N}\}$, on distague deux cas :

— 1^{er} cas : si $t > s$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t > \dim_{\mathcal{H}}(A_n)$

Ceci implique que $\mathcal{H}^t(A_n) = 0$, par sous additivè de \mathcal{H}^t on a :

$$\mathcal{H}^t\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{H}^t(A_n) = 0$$

$$\implies \mathcal{H}^t\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = 0$$

— 2^{me} cas : si $t < s$, alors par dèfinition de la borne suprieur $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tq $\dim_{\mathcal{H}}(A_{n_0}) > t$ donc $\mathcal{H}^t(A_{n_0}) = +\infty$

Par croisent de \mathcal{H}^t , $A_{n_0} \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$

$$+\infty = \mathcal{H}^t(A_{n_0}) \leq \mathcal{H}^t\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right)$$

Par consequent $\mathcal{H}^t\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = +\infty$

Le nombre s vèrifie la propriètè de la dimation de Hausdorff, d'où

$$\dim_{\mathcal{H}}\left(\bigcup_k A_k\right) = \sup\{\dim_{\mathcal{H}}(A_k) : k \in \mathbb{N}\}$$

□

Chapitre 3

Application

3.1 Ensemble Triadique de Cantor

On considère l'intervalle $K_0 = [0, 1]$ privé de son tiers central, sans les extrémités $]\frac{1}{3}, \frac{2}{3}[$. On obtient l'ensemble réunion disjointe de deux intervalles fermes $K_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$. On prive chacun de ces deux intervalles de son tiers central, pour obtenir

$K_2 = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$, réunion disjointe de quatre intervalles fermes (figure 1).

On refait la même procédure n fois on obtient K_n un réunion de 2^n intervalles fermes et disjointes, qu'on note $J_{n,k}$. On construit K_{n+1} en privant chacun de ces intervalles de son tiers central. On obtient donc une suite $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissante des compacts.

L'ensemble intersection $K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ est appelé l'ensemble triadique de Cantor.




Figure 1 : Les cinq premières étapes de construction de l'ensemble de Cantor.

Propriétés de K :

i) K est un compact non vide.

Car K est un intersection d'une suite décroissante des compacts non vide.

ii) K est non dénombrable.

En effet, On raisonne par l'absurde, on suppose qu'il existe une bijection $f : \mathbb{N}^* \rightarrow K$.

Soient I_1 le composante connexe de K_1 qui ne contient pas $f(1)$, I_2 le composante connexe de K_2 tels que $I_2 \subset I_1$ et ne contient pas $f(2)$, en générale si I_n est obtenu, I_{n+1} serait le composante connexe de K_{n+1} tels que $I_{n+1} \subset I_n$ et ne contient pas $f(n+1)$.

On obtient $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'intervalle ferme emboites vérifiant :

$$\bigcap_{n \geq 1} I_n \subset \bigcap_{n \geq 1} K_n = K$$

et

$$\left(\bigcap_{n \geq 1} I_n\right) \cap K = \left(\bigcap_{n \geq 1} I_n\right) \cap f(\mathbb{N}^*) = \emptyset$$

Il s'en suite que $\bigcap_{n \geq 1} I_n = \emptyset$ ce qui est contradict avec le théoreme de Cantor des intervalles fermes emboites.

iii) L'ensemble K est de mesure de lebesgue nulle.

En effet,

Comme K étant intersection des ensemble K_n qui sont des compacte emboites, d'après une propriétés bien connue des mesures on a $\lambda(K) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda(K_n)$, où λ désigne la mesure de lebesgue

Maintenant puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$ K_n est un réunion disjointe de 2^n intervalle de longueur $\frac{1}{3^n}$ chacun, alors $\lambda(K_n) = \frac{2^n}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n$

Par passage à la limite :

$$\lambda(K) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

D'où le resultat.

Théorème 4

Soit K l'ensemble triadique de Cantor. Si $s = \frac{\ln 2}{\ln 3}$ alors :

$$\frac{1}{2} \leq \mathcal{H}^s(K) \leq 1 \text{ et } \dim_{\mathcal{H}}(K) = s.$$

Démonstration.

Soient K l'ensemble triadique de Cantor, et $s = \frac{\ln 2}{\ln 3}$.

(a) $\mathcal{H}^s(K) \leq 1$?

Soit $n \in \mathbb{N}$

On sait que $K_n = \bigcup_{k=1}^{2^n} J_{n,k}$

Comme $K \subset \bigcup_{k=1}^{2^n} J_{n,k}$ et $diam(J_{n,i}) = \frac{1}{3^n}$, $\forall 1 \leq i \leq 2^n$

Alors $\{J_{n,i}\}_{1 \leq i \leq 2^n} \in \mathcal{R}_{\frac{1}{3^n}}(K)$

Il s'en suit que,

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^s(K) &\leq \sum_{i=1}^{2^n} (diam(J_{n,i}))^s \\ &= \sum_{i=1}^{2^n} \left(\frac{1}{3^n}\right)^s \\ &= \sum_{i=1}^{2^n} \exp(-n \ln(3) \frac{\ln(2)}{\ln(3)}) \\ &= \sum_{i=1}^{2^n} \exp(-n \ln(2)) \\ &= \sum_{i=1}^{2^n} 2^{-n} \\ &= 1 \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{H}^s(K) \leq 1$.

(b) $\mathcal{H}^s(K) \geq \frac{1}{2}$?

Avant de démontrer le résultat souhaité on donne un raisonnement préliminaire.

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle tel que $0 < diam(I) < \frac{1}{3}$. Alors, il existe un unique $k \geq 2$ tel que :

$$3^{-k} \leq diam(I) \leq 3^{-(k-1)} \quad (3.1)$$

En effet, un tel k doit exister car les intervalles $[\frac{1}{3^n}, \frac{1}{3^{n-1}}[$ forment une partition de $]0, \frac{1}{3}[$ pour $n \geq 2$. La valeur $diam(I)$ doit donc se trouver dans l'un de ces intervalles. On sait que K_{k-1} est formé de 2^{k-1} intervalles fermés de longueur $3^{-(k-1)}$ et que la distance qui sépare ces intervalles est supérieure ou égale à $3^{-(k-1)}$ par construction de K . Alors, de l'expression (3.1), l'intervalle I ne peut intersecter qu'au plus un de ces 2^{k-1} intervalles.

Soit $m \in \mathbb{N}$ tel que $m > k$. Alors, $-m < -k \implies 3^{-m} < 3^{-k} \leq diam(I)$. On sait que K_m est constitué de 2^m intervalles fermés de longueur 3^{-m} . Par construction de K , chaque intervalle de K_{k-1} contient un certain nombre de ces intervalles de K_m . En fait, il en contient $\frac{2^m}{2^{k-1}} = 2^{m-(k-1)} = 2^{m-k+1}$.

Ainsi, I intersecte au plus 2^{m-k+1} des intervalles de K_m puisqu'il intersecte au maximum un intervalle de K_{k-1} . Or,

$$\begin{aligned} 2^{m-k+1} &= 2^{m+1} \cdot 2^{-k} \\ &= 2^{m+1} \cdot 3^{-k \frac{\ln 2}{\ln 3}} \\ &= 2^{m+1} \cdot (3^{-k})^s \\ &\leq 2^{m+1} \cdot (diam(I))^s \end{aligned}$$

En conséquence, I intersecte au plus $2^{m+1} \cdot (diam(I))^s$ des intervalles de K_m .

Montrons maintenant que $\mathcal{H}^s(K) \geq \frac{1}{2}$. Soit $a \geq 1, 0 < \delta < \frac{1}{3a} < \frac{1}{3}$ et $U_i \in \mathcal{R}_\delta(K)$. Pour chaque $i \in \{1, 2, \dots\}$, soit T_i un intervalle ouvert tel que $U_i \subset T_i$ et $\text{diam}(T_i) = a \cdot \text{diam}(U_i)$. Puisque $K \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$ par hypothèse, alors $K \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} T_i$. Comme l'ensemble triadique de Cantor est compact, alors on peut extraire de ce recouvrement un sous-recouvrement fini. Notons les ensembles de ce sous-recouvrement T_1, T_2, \dots, T_n pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Soit $m \in \mathbb{N}$ tel que :

$$3^{-(m-1)} < \text{diam}(T_i) \quad \text{pour tout } i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.2)$$

Alors du raisonnement préliminaire et car $3^{-m} < 3^{-(m-1)}$, chacun des intervalles T_i contient au plus $2^{m+1} \cdot (\text{diam}(T_i))^s$ des intervalles de K_m pour $i = 1, 2, \dots, n$.

Donc, le recouvrement $\{T_i\}_{i=1}^n$ contient au plus $\sum_{i=1}^n 2^{m+1} \cdot (\text{diam}(T_i))^s$ des intervalles de E_m . Mais de l'expression (3.2), le recouvrement $\{T_i\}_{i=1}^n$ doit contenir tous les intervalles de E_m , soit 2^m intervalles. Ainsi,

$$2^m \leq \sum_{i=1}^n 2^{m+1} \cdot (\text{diam}(T_i))^s$$

. Par hypothèse,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n 2^{m+1} \cdot (\text{diam}(T_i))^s &= \sum_{i=1}^n 2^{m+1} \cdot (a \cdot \text{diam}(U_i))^s \\ &= a^s \cdot 2^{m+1} \sum_{i=1}^n (\text{diam}(U_i))^s \end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned} 2^m &\leq a^s \cdot 2^{m+1} \sum_{i=1}^n (\text{diam}(U_i))^s \\ \implies \frac{2^m}{a^s 2^{m+1}} &\leq \sum_{i=1}^n (\text{diam}(U_i))^s \leq \sum_{i=1}^{\infty} (\text{diam}(U_i))^s \\ \implies \frac{1}{2a^s} &\leq \sum_{i=1}^{\infty} (\text{diam}(U_i))^s \end{aligned}$$

Cette expression est vraie pour tout $a \geq 1$ et pour tout δ -recouvrement de K avec $\delta < \frac{1}{3}$. En conséquence,

$$\mathcal{H}_\delta^s(K) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} (\text{diam}(U_i))^s / U_i \in \mathcal{R}_\delta(K) \right\} \geq \frac{1}{2a^s}$$

et en prenant la limite lorsque a tend vers 1, on obtient $\mathcal{H}_\delta^s(K) \geq \frac{1}{2}$

Ainsi, $\mathcal{H}^s(K) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^s(K) \geq \frac{1}{2}$

En conclut, si $s = \frac{\ln(2)}{\ln(3)}$, alors $\frac{1}{2} \leq \mathcal{H}^s(K) \leq 1$ et on déduit que $\dim_{\mathcal{H}}(K) = s$. □

BIBLIOGRAPHIE

- [1] C.Evans,F.Gariepy,Measure Theory and Fine Properties of Functions,1992.
- [2] A. Bibi, Cours de mesure et intégration, Université de Constantine, 1998.
- [3] C. Rogers, Hausdorff measures, Cambridge University Press, 1970.
- [4] T.Gallay, Théorie de mesure et l'intégration, 2009.