

SURVEY ON GENERALIZATIONS OF HOPFICITY OF MODULES

ABDERRAHIM EL MOUSSAOUY

ABSTRACT. The main aim of this paper is the Hopficity of module classes, the study of modules (rings) by properties of their endomorphisms is a classical research subject. In 1986, Hiremath [26] introduced the concepts of Hopfian modules and rings, the notion of Hopfian modules are defined as a generalization of modules of finite length as the modules whose surjective endomorphisms are isomorphisms. Later, the dual concepts co-Hopfian modules and rings were given. Hopfian and co-Hopfian modules (rings) have been investigated by several authors. For example, Hiremath [26], Varadarajan [48], [49], Xue [55], Haghany [25], Liu [34], and Yang and Liu [56]. In 2001, Haghany and Vedadi [24], and in 2002, Ghorbani and Haghany [21], respectively, introduced and investigated the weakly co-Hopfian and generalized Hopfian modules. These modules and several generalizations of them are extensively studied also by several authors.

2010 *Mathematics Subject Classification*. Primary 16D10; Secondary 16D40; 16D90.

Key words and phrases. Hopfian modules; co-Hopfian modules; generalized Hopfian modules; weakly co-Hopfian modules; generalized co-Hopfian modules; weakly Hopfian modules; semi Hopfian modules; semi co-Hopfian modules; μ -Hopfian modules; δ -weakly Hopfian modules; γ -Hopfian modules; jacobson Hopfian modules.

RÉSUMÉ

L'objectif principal de cet article est d'étudier les classes de Hopficité de modules. L'étude des modules (anneaux) par les propriétés de leurs endomorphismes est un sujet de recherche classique. En 1986, Hiremath [26] a introduit les concepts de modules Hopfiens et d'anneaux Hopfiens, la notion de modules Hopfiens est définie comme une généralisation de modules de longueur finie comme les modules dont les endomorphismes surjectifs sont des isomorphismes. Plus tard, les deux concepts de modules co-Hopfiens et d'anneaux co-Hopfiens ont été donnés. Les modules (anneaux) Hopfiens et co-Hopfiens ont été étudiés par plusieurs auteurs. Par exemple, Hiremath [26], Varadarajan [48], [49], Xue [55], Haghany [25], Liu [34] et Yang et Liu [56]. En 2001, Haghany et Vedadi, [24], et en 2002, Ghorbani et Haghany [21], respectivement, ont introduit et étudié les modules faiblement co-Hopfiens et Hopfiens généralisés. Ces modules et plusieurs généralisations ont été étudiés également par plusieurs auteurs.

NOTATIONS

Nous fixons les notations suivantes. Soient A un anneau associatif unitaire, M un A -module à droite et N un sous-module de M .

- $\text{End}(M)$ l'anneau des endomorphismes de M .
- $N \leq M$: N est un sous-module de M ,
- $N \trianglelefteq M$: N est un sous-module totalement invariant de M ($f(N) \leq N$ pour tout $f \in \text{End}(M)$),
- $N \leq^\oplus M$: N est un facteur direct de M ,
- $N \leq^e M$: N est un sous-module essentiel de M ,
- $N \ll M$: N est un sous-module superflu dans M ,
- $N \ll_\mu M$: N est un sous-module μ -superflu dans M ,
- $N \ll_\delta M$: N est un sous-module δ -superflu dans M ,
- $N \ll_\gamma M$: N est un sous-module γ -superflu dans M ,
- $N \ll_J M$: N est un sous-module Jacobson-superflu dans M ,
- $Z(M)$: le sous-module singulier de M ,
- $Z^*(M)$: le sous-module cosingulier de M ,
- $\text{Rad}(M)$ le radical de Jacobson de M .
- $J(A)$ le radical de Jacobson de A .
- $\delta(A)$ l'intersection de tous les idéaux essentiels maximaux de A .
- $E(M)$ l'enveloppe injective de M .
- CCA la condition de chaîne ascendante.
- CCD la condition de chaîne descendante.
- $A_p = \left\{ \frac{a}{p^n}; a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N} \right\}$, où p est un nombre premier.
- $\mathbb{Z}_{p^\infty} = A_p / \mathbb{Z}$.
- $M_n(A)$: l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans A .

Dans cet article, tous les anneaux sont considérés associatifs unitaires et les modules sont considérés des modules à droite sauf mention du contraire.

1. INTRODUCTION

Au début des années quatre-vingt, A. Kaidi et M. Sangharé ont introduit , la notion des modules vérifiant les propriétés (I), (S) et (F), [29]. On dit qu'un A -module à droite M vérifie la propriété (I) (resp. (S)) si tout endomorphisme injectif (resp. surjectif) de M est un automorphisme de M , on dit que M vérifie la propriété (F) si pour tout endomorphisme f de M , il existe un entier $n \geq 1$ tel que $M = Ker f^n \oplus Im f^n$.

En 1986, la notion du module vérifiant la condition (S) a été nommée par Hiremath "module Hopfien", [26]. Un peu plus tard la notion du module vérifiant la condition (I) a été nommée par Varadarajan "module co-Hopfien",[49].

On dit qu'un sous-module N d'un A -module M est essentiel de M ($N \leq^e M$) si $N \cap L = 0$ implique $L = 0$, pour tout sous-module L de M . En 2001, [24], A. Haghany et M. R. Vedadi ont introduit la notion du module faiblement co-Hopfien. Un A -module M est appelé faiblement co-Hopfien, si pour tout endomorphisme injectif f de M , l'image de f est essentiel de M ($Im f \leq^e M$).

On dit qu'un sous-module N d'un A -module M est superflu dans M ($N \ll M$) si $N + L = M$ implique $L = M$, pour tout sous-module L de M . En 2002, [21], A. Ghorbani et A. Haghany ont introduit la notion du module Hopfien généralisé. On dit qu'un A -module M est Hopfien généralisé, si pour tout endomorphisme surjectif f de M , le noyau de f est superflu dans M ($Ker f \ll M$).

En 2005, [52], Y. Wang a introduit la notion du module co-Hopfien généralisé et la notion du module faiblement Hopfien. On dit qu'un A -module M est faiblement Hopfien, si tout endomorphisme surjectif superflu f de M est un automorphisme. Et on dit qu'un A -module M est co-Hopfien généralisé, si tout endomorphisme injectif essentiel f de M est un automorphisme.

En 2007, [27], A. Hmaimou, A. kaidi et E. Sanchez Campos ont introduit la notion du module fortement Hopfien et la notion du module fortement co-Hopfien. On dit qu'un A -module M est fortement Hopfien, si pour tout endomorphisme f de M la suite croissante: $Ker f \subseteq Ker f^2 \subseteq \dots \subseteq Ker f^n \subseteq \dots$ est stationnaire. Et on dit qu'un A -module M est fortement co-Hopfien, si pour tout endomorphisme f de M la suite décroissante: $Im f \supseteq Im f^2 \supseteq \dots \supseteq Im f^n \supseteq \dots$ est stationnaire.

En 2008, [3], P. Aydogdu et A.C. Ozcan ont introduit la notion du module semi Hopfien et la notion du module semi co-Hopfien. On dit qu'un A -module M est semi Hopfien, si pour tout endomorphisme surjectif f de M , le noyau de f est un facteur direct de M . Et on dit qu'un A -module M est semi co-Hopfien, si pour tout endomorphisme injectif f de M , l'image de f est un facteur direct de M .

De tels modules et d'autres généralisations ont été introduits et étudiés par plusieurs auteurs ([3], [17], [18], [19], [20], [22], [24], [26],[27], [49], [12], [13], [10], [9], [14],[15],[16], [52]).

2. MODULES HOPFIEN ET CO-HOPFIEN

Définition 2.1. [26]. *Un A -module M est dit Hopfien si tout endomorphisme surjectif de M est bijectif.*

Définition 2.2. [49]. *Un A -module M est dit co-Hopfien si tout endomorphisme injectif de M est bijectif.*

Proposition 2.3. [51]. *Si A est un anneau commutatif, alors tout A -module de type fini est Hopfien.*

Remarque 2.4. [43]. *Tout module noethérien (resp, artinien) est Hopfien (resp, co-Hopfien).*

Un module Hopfien (resp, co-Hopfien) n'est pas en général noethérien (resp, artinien) comme le montre l'exemple suivant:

Exemple 2.5. [27]. *Le groupe additif \mathbb{Q} des nombres rationnels est Hopfien et co-Hopfien mais n'est ni noethérien ni artinien.*

Définition 2.6. [6, 36]. *L'anneau A est dit Dedekind Fini si pour tout $a, b \in A$, $ab = 1 \Rightarrow ba = 1$. Le module M est dit Dedekind Fini si l'anneau $\text{End}(M)$ est Dedekind Fini. On peut vérifier que M est Dedekind Fini si et seulement si M n'est pas isomorphe à un facteur direct propre de lui-même.*

Proposition 2.7. [6]. *Soit M un A -module Hopfien ou co-Hopfien, alors M est Dedekind Fini.*

La réciproque n'est pas en général vraie comme le montre l'exemple suivant:

Exemple 2.8. *Le groupe abélien \mathbb{Z} est Dedekind Fini mais n'est pas co-Hopfien et le groupe \mathbb{Z}_p^∞ est Dedekind Fini mais n'est pas Hopfien.*

Définition 2.9. *Un A -module E est dit injectif si pour tout homomorphisme injectif g de M vers N et pour tout homomorphisme, γ de M vers E , il existe un homomorphisme h de N vers E tel que $\gamma = hg$ (i.e., il existe $h : N \rightarrow E$ tel que le diagramme*

$$\begin{array}{ccccc}
 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{g} & N \\
 & & \downarrow \gamma & & \nearrow h \\
 & & E & &
 \end{array}$$

est commutatif).

Définition 2.10. *Un A -module P est dit projectif si pour tout homomorphisme surjectif g de M vers N et pour tout homomorphisme, γ de P vers N , il existe un homomorphisme h de P vers M tel que $\gamma = gh$ (i.e., il existe $h : P \rightarrow M$ tel que le diagramme*

$$\begin{array}{ccccc}
 & & P & & \\
 & & \downarrow \gamma & & \\
 & \nearrow h & & & \\
 M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

est commutatif).

Définition 2.11. [31]. Un A -module M est dit quasi-projectif (resp, quasi-injectif) si pour tout homomorphisme surjectif (resp, injectif) g de M vers N (resp, de N vers M) et pour tout homomorphisme, γ de M (resp, N) vers N (resp, vers M), il existe un endomorphisme h de M tel que : $\gamma = gh$ (resp, $\gamma = hg$) (i.e., il existe $h : M \rightarrow M$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
 & & M & & \\
 & & \downarrow \gamma & & \\
 & \nearrow h & & & \\
 M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

resp,

$$\begin{array}{ccccc}
 0 & \longrightarrow & N & \xrightarrow{g} & M \\
 & & \downarrow \gamma & & \nearrow h \\
 & & M & &
 \end{array}$$

est commutatif).

Proposition 2.12. [44]. Soit M un A -module injectif, si M est Hopfien alors il est co-Hopfien.

Proposition 2.13. [44]. Soit M un A -module projectif, si M est co-Hopfien alors il est Hopfien.

Proposition 2.14. [37]. Soit M un A -module quasi-injectif, alors M est Dedekind Fini si et seulement si M est co-Hopfien.

Proposition 2.15. [21]. Soit M un A -module quasi-projectif, alors M est Dedekind Fini si et seulement si M est Hopfien.

3. QUELQUES GÉNÉRALISATIONS DES MODULES SUPERFLUS

Définition 3.1. [33]. *Soit M un A -module et soit N un sous-module de M , on dit que N est superflu dans M ($N \ll M$) si $N + L = M \Rightarrow L = M$, pour tout sous-module L de M .*

Un module M est dit creux si tout sous-module propre de M est superflu.

Définition 3.2. [45]. *L'enveloppe injective $E(M)$ d'un module M est l'extension essentielle maximale de M .*

Proposition 3.3. [33]. *Soit M un A -module, alors M est un module superflu si et seulement si M est superflu dans son enveloppe injective $E(M)$.*

Lemme 3.4. [54] *Soient M , N et L des modules. Alors les deux épimorphismes $f : M \rightarrow N$ et $g : N \rightarrow L$ sont superflus si et seulement si gf est superflu.*

Définition 3.5. [23]. *Soit M un A -module, on appelle sous-module singulier de M , l'ensemble $Z(M)$ des éléments x de M tel que $\text{Ann}(x)$ soit un idéal essentiel dans A . Un A -module M est dit singulier (resp, non singulier) si $Z(M) = M$ (resp., $Z(M) = 0$).*

Si N est un sous-module essentiel de M alors M/N est singulier, mais la réciproque n'est pas en général vraie comme le montre l'exemple suivant, soit $M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $N = 0$. M/N est singulier mais N n'est pas essentiel dans M .

Proposition 3.6. [22]. *Soit M un A -module injectif non singulier, alors M est Hopfien si et seulement si M est co-Hopfien.*

Définition 3.7. [57]. *Soit M un A -module et soit N un sous-module de M , on dit que N est δ -superflu dans M ($N \ll_{\delta} M$) si $N + L = M$ tel que M/L est singulier implique $L = M$, pour tout sous-module L de M .*

Lemme 3.8. [57]. *Soit M un A -module.*

- (1) *Soient $K \leq B \leq M$. Alors $B \ll_{\delta} M$ si et seulement si $K \ll_{\delta} M$ et $B/K \ll_{\delta} M/K$.*
- (2) *Soient K et B deux sous-modules de M , alors $K+B \ll_{\delta} M$ si et seulement si $K \ll_{\delta} M$ et $B \ll_{\delta} M$.*
- (3) *Soient K et B deux sous-modules de M avec $K \leq B$, si $K \ll_{\delta} B$, alors $K \ll_{\delta} M$.*
- (4) *Soit $f : M \rightarrow N$ un homomorphisme tel que $K \ll_{\delta} M$, alors $f(K) \ll_{\delta} N$.*
- (5) *Soit $M = M_1 \oplus M_2$ un A -module et soient $A_1 \leq M_1$ et $A_2 \leq M_2$, alors $A_1 \oplus A_2 \ll_{\delta} M_1 \oplus M_2$ si et seulement si $A_1 \ll_{\delta} M_1$ et $A_2 \ll_{\delta} M_2$.*

Définition 3.9. [40]. *Soit M un A -module, on appelle sous-module cosingulier de M , l'ensemble $Z^*(M)$ des éléments m de M tel que mA soit un module superflu. Un A -module M est dit cosingulier (resp, non cosingulier) si $Z^*(M) = M$ (resp., $Z^*(M) = 0$).*

Lemme 3.10. [39]. *Soit M un A -module.*

- (1) *Si M est superflu alors $Z^*(M) = M$.*
- (2) *Si M est semi simple injectif alors $Z^*(M) = 0$*

Lemme 3.11. [53]. *Soit $f : M \rightarrow N$ un homomorphisme et soit A un sous-module de M tel que M/A est cosingulier, alors $f(M)/f(A)$ est cosingulier.*

Définition 3.12. [53]. *Soit M un A -module et soit N un sous-module de M , on dit que N est μ -superflu dans M ($N \ll_{\mu} M$) si $N + L = M$ tel que M/L est cosingulier implique $L = M$, pour tout sous-module L de M .*

Lemme 3.13. [53]. *Soit M un A -module.*

- (1) *Soient $K \leq B \leq M$. Alors $B \ll_{\mu} M$ si et seulement si $K \ll_{\mu} M$ et $B/K \ll_{\mu} M/K$.*
- (2) *Soient K et B deux sous-modules de M , alors $K+B \ll_{\mu} M$ si et seulement si $K \ll_{\mu} M$ et $B \ll_{\mu} M$.*
- (3) *Soient K et B deux sous-modules de M avec $K \leq B$, si $K \ll_{\mu} B$, alors $K \ll_{\mu} M$.*
- (4) *Soit $f : M \rightarrow N$ un homomorphisme tel que $K \ll_{\mu} M$, alors $f(K) \ll_{\mu} N$.*
- (5) *Soit $M = M_1 \oplus M_2$ un A -module et soient $A_1 \leq M_1$ et $A_2 \leq M_2$, alors $A_1 \oplus A_2 \ll_{\mu} M_1 \oplus M_2$ si et seulement si $A_1 \ll_{\mu} M_1$ et $A_2 \ll_{\mu} M_2$.*

Lemme 3.14. [53]. *Soient M un A -module et $K \leq N$ deux sous-modules de M , si N est un facteur direct de M et $K \ll_{\mu} M$, alors $K \ll_{\mu} N$.*

Définition 3.15. [35]. *Soit M un A -module et soit N un sous-module de M , on dit que N est γ -superflu dans M ($N \ll_{\gamma} M$) si $N + L = M$ tel que M/L est non cosingulier implique $L = M$, pour tout sous-module L de M .*

Lemme 3.16. [35]. *Soit M un A -module.*

- (1) *Soient $K \leq B \leq M$. Alors $B \ll_{\gamma} M$ si et seulement si $K \ll_{\gamma} M$ et $B/K \ll_{\gamma} M/K$.*
- (2) *Soient K et B deux sous-modules de M avec $K \leq B$, si $K \ll_{\gamma} B$, alors $K \ll_{\gamma} M$.*
- (3) *Soit $f : M \rightarrow N$ un épimorphisme tel que $K \ll_{\gamma} M$, alors $f(K) \ll_{\gamma} N$.*
- (4) *Soit $M = M_1 \oplus M_2$ un A -module et soient $A_1 \leq M_1$ et $A_2 \leq M_2$, alors $A_1 \oplus A_2 \ll_{\gamma} M_1 \oplus M_2$ si et seulement si $A_1 \ll_{\gamma} M_1$ et $A_2 \ll_{\gamma} M_2$.*

Définition 3.17. [1]. *Soit M un A -module.*

$\text{Rad}(M) = \bigcap \{K \leq M/K \text{ est maximal dans } M\} = \sum \{K \leq M/K \text{ est superflu dans } M\}$

Définition 3.18. [28]. *Soit M un A -module et soit N un sous-module de M , on dit que N est Jacobson-superflu dans M ($N \ll_J M$) si $N + L = M$ tel que $\text{Rad}(M/L) = M/L$ implique $L = M$, pour tout sous-module L de M .*

Lemme 3.19. [28]. *Soit M un A -module.*

- (1) Soient $K \leq B \leq M$. Alors $B \ll_J M$ si et seulement si $K \ll_J M$ et $B/K \ll_J M/K$.
- (2) Soient K et B deux sous-modules de M , alors $K+B \ll_J M$ si et seulement si $K \ll_J M$ et $B \ll_J M$.
- (3) Soient K et B deux sous-modules de M avec $K \leq B$, si $K \ll_J B$, alors $K \ll_J M$.
- (4) Soit $f : M \rightarrow N$ un homomorphisme tel que $K \ll_J M$, alors $f(K) \ll_J N$.
- (5) Soit $M = M_1 \oplus M_2$ un A -module et soient $A_1 \leq M_1$ et $A_2 \leq M_2$, alors $A_1 \oplus A_2 \ll_J M_1 \oplus M_2$ si et seulement si $A_1 \ll_J M_1$ et $A_2 \ll_J M_2$.

4. MODULES HOPFIEN GÉNÉRALISÉ ET FAIBLEMENT CO-HOPFIEN

Définition 4.1. [21]. Un A -module M est appelé Hopfien généralisé, si pour tout endomorphisme surjectif f de M , le noyau de f est superflu dans M ($\text{Ker } f \ll M$).

Corollaire 4.2. [21]. Soit M un A -module quasi-projectif, alors les assertions suivantes sont équivalentes:

- (1) M est Hopfien.
- (2) M est Hopfien généralisé.
- (3) M est Dedekind Fini.

Définition 4.3. [54]. Soient M un A -module et N un sous-module de M , on dit que N est essentiel de M ($N \leq^e M$) si $N \cap L = 0 \Rightarrow L = 0$, pour tout sous-module L de M .

Un module M est dit uniforme si tout sous-module non nul de M est essentiel.

Définition 4.4. [24]. Un A -module M est appelé faiblement co-Hopfien, si pour tout endomorphisme injectif f de M , l'image de f est essentiel de M ($\text{Im } f \leq^e M$).

Corollaire 4.5. [24]. Soit M un A -module quasi-injectif, alors les assertions suivantes sont équivalentes:

- (1) M est co-Hopfien.
- (2) M est faiblement co-Hopfien.
- (3) M est Dedekind Fini

Remarques 4.6. [21][24]. Soit M un A -module.

- (1) Si M vérifie la CCD sur les sous-modules non essentiels, alors M est faiblement co-Hopfien.
- (2) Si M vérifie la CCA sur les sous-modules non superflus, alors M est Hopfien généralisé.

5. MODULES FAIBLEMENT HOPFIEN ET CO-HOPFIEN GÉNÉRALISÉ

Définition 5.1. [52]. Un A -module M est dit faiblement Hopfien si tout endomorphisme surjectif superflu f ($\text{Ker } f \ll M$) de M est bijectif.

Définition 5.2. [52]. *Un A -module M est dit co-Hopfien généralisé si tout endomorphisme injectif essentiel f ($\text{Im} f \leq^e M$) de M est bijectif.*

Remarques 5.3. [52]. *Soit M un A -module.*

- (1) *M est co-Hopfien si et seulement si M est faiblement co-Hopfien et co-Hopfien généralisé.*
- (2) *M est Hopfien si et seulement si M est faiblement Hopfien et Hopfien généralisé.*
- (3) *Si M vérifie la CCD sur les sous-modules essentiels alors M est co-Hopfien généralisé.*
- (4) *Si M vérifie la CCA sur les sous-modules superflus alors M est faiblement Hopfien.*

Théorème 5.4. [11] *Soit M un module quasi-projectif et soit N un sous-module totalement invariant superflu dans M , si M est faiblement Hopfien alors M/N est faiblement Hopfien.*

Corollaire 5.5. [11] *Soit M un module quasi-projectif de type fini, si M est faiblement Hopfien alors $M/\text{Rad}(M)$ est faiblement Hopfien.*

Proposition 5.6. [11] *Soit M un module quasi-projectif, si M est co-Hopfien alors il est faiblement Hopfien.*

Proposition 5.7. [11] *Soit M un module quasi-injectif, si M est Hopfien alors il est co-Hopfien généralisé.*

6. MODULES FORTEMENT HOPFIEN ET FORTEMENT CO-HOPFIEN

Définition 6.1. [27]. *Un A -module M est appelé fortement Hopfien, si pour tout endomorphisme f de M la suite croissante: $\text{Ker} f \subseteq \text{Ker} f^2 \subseteq \dots \subseteq \text{Ker} f^n \subseteq \dots$ est stationnaire.*

Proposition 6.2. [27]. *Soit M un A -module, alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) *M est fortement Hopfien.*
- (2) *Pour tout endomorphisme f de M , il existe $n \geq 1$ tel que $\text{Ker} f^n = \text{Ker} f^{n+1}$.*
- (3) *Pour tout endomorphisme f de M , il existe $n \geq 1$ tel que $\text{Ker} f^n \cap \text{Im} f^n = (0)$.*

Définition 6.3. [27]. *Un A -module M est appelé fortement co-Hopfien, si pour tout endomorphisme f de M la suite décroissante: $\text{Im} f \supseteq \text{Im} f^2 \supseteq \dots \supseteq \text{Im} f^n \supseteq \dots$ est stationnaire.*

Proposition 6.4. [27]. *Soit M un A -module, alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) *M est fortement co-Hopfien.*

- (2) Pour tout endomorphisme f de M , il existe $n \geq 1$ tel que $Im f^n = Im f^{n+1}$.
- (3) Pour tout endomorphisme f de M , il existe $n \geq 1$ tel que $M = Ker f^n + Im f^n$.

Définition 6.5. [2]. Un A -module M est dit un module de Fitting si pour tout endomorphisme f de M , il existe un entier $n \geq 1$ tel que $M = Ker f^n \oplus Im f^n$.

Remarques 6.6. [27]. Soit M un A -module:

- (1) Tout module noethérien (resp, artinien) est fortement Hopfien (resp, fortement co-Hopfien).
- (2) Tout module fortement Hopfien (resp, fortement co-Hopfien) est Hopfien (resp, co-Hopfien).
- (3) Tout module fortement Hopfien (resp, fortement co-Hopfien) est Dedekind Fini.
- (4) M est fortement Hopfien et fortement co-Hopfien si et seulement si M est un module de Fitting.
- (5) Tout module de longueur finie est de Fitting.
- (6) Tout module de Fitting est Hopfien et co-Hopfien.

Exemple 6.7. [27][56]. Il existe un \mathbb{Z} -module Hopfien et co-Hopfien et qui n'est ni fortement Hopfien ni fortement co-Hopfien. En effet: Soit $(p_n)_{n \geq 1}$ une suite de nombres premiers tels que $p_1 < p_2 < \dots < p_n < \dots$. Posons $M_n = \mathbb{Z}/p_n^n \mathbb{Z}$ et considérons $M = \bigoplus_{n \geq 1} M_n$. M est co-Hopfien (resp, Hopfien), par contre M n'est ni fortement Hopfien ni fortement co-Hopfien. D'autre part, soit P l'ensemble des nombres premiers. Le \mathbb{Z} -module $M = \bigoplus_{p \in P} \mathbb{Z}_p$ est fortement Hopfien et fortement co-Hopfien mais n'est ni artinien ni noethérien.

Théorème 6.8. [27]. Soit M un A -module:

- (1) Si M est quasi-projectif et fortement co-Hopfien alors M est fortement Hopfien.
- (2) Si M est quasi-injectif et fortement Hopfien alors M est fortement co-Hopfien.

7. MODULES SEMI HOPFIEN ET SEMI CO-HOPFIEN

Définition 7.1. [3]. Un A -module M est appelé semi Hopfien, si pour tout endomorphisme surjectif f de M , le noyau de f est un facteur direct de M .

Exemples 7.2. [3].

- (1) Tout module semi simple est semi Hopfien.
- (2) D'après [26, Théorème 16(ii)], un espace vectoriel V sur un corps F est Hopfien si et seulement s'il est de dimension finie. Donc un espace vectoriel de dimension infinie est semi Hopfien, mais il n'est pas Hopfien.
- (3) Tout module vérifiant $D2$ est semi Hopfien. (On dit qu'un module M vérifie $D2$ si tout sous-module N tel que M/N est isomorphe à un facteur direct de M est un facteur direct de M).

(4) *Tout module quasi-projectif est semi Hopfien.*

Proposition 7.3. [3]. *Soit M un A -module semi-Hopfien, si M est Dedekind Fini alors il est Hopfien.*

Définition 7.4. [3]. *Un A -module M est appelé semi co-Hopfien, si pour tout endomorphisme injectif f de M , l'image de f est un facteur direct de M .*

Proposition 7.5. [3]. *Soit M un A -module semi-co-Hopfien, si M est Dedekind Fini alors il est co-Hopfien.*

Remarque 7.6. *Les anneaux fortement π -réguliers à gauche et à droite ont été introduits par Kaplansky [30], Azumaya a montré en 1954 qu'un anneau A est fortement π -régulier si pour tout $a \in A$ il existe $m \in \mathbb{N}$ et $c \in A$ tel que $ac = ca$ et $a^m = ca^{m+1}$ [4]. Dischinger a montré en 1976 que la propriété fortement π -régularité est symétrique [8].*

Exemple 7.7. *D'après [27, Remarque 2.16(3)], l'anneau $A = \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ est Hopfien (tout anneau commutatif est Hopfien) mais n'est pas fortement Hopfien. Puisque tout anneau Hopfien est semi Hopfien, alors l'anneau $\prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ est semi Hopfien mais n'est pas fortement Hopfien.*

Théorème 7.8. [14]. *Soit M un A -module, alors:*

- (1) *Si M est semi Hopfien et fortement co-Hopfien, alors $\text{End}_A(M)$ est fortement π -régulier.*
- (2) *Si M est semi co-Hopfien et fortement Hopfien, alors $\text{End}_A(M)$ est fortement π -régulier.*

Corollaire 7.9. [14] *Tout module semi Hopfien et fortement co-Hopfien ou semi co-Hopfien et fortement Hopfien est un module de Fitting.*

Le résultat suivant présente un analogue du théorème de Hopkins-Levitzki.

Corollaire 7.10. [14] *Soit M un A -module, alors:*

- (1) *Si M est semi Hopfien et fortement co-Hopfien, alors M est fortement Hopfien.*
- (2) *Si M est semi co-Hopfien et fortement Hopfien, alors M est fortement co-Hopfien.*

Il est facile de voir que tout module Hopfien est semi Hopfien, mais la réciproque n'est pas vraie en général comme le montre l'exemple suivant:


Exemple 7.11. [14] *D'après [26, Théorème 16(ii)], un espace vectoriel V sur un corps F est Hopfien si et seulement s'il est de dimension finie. Alors un espace vectoriel de dimension infinie sur un corps est semi Hopfien mais n'est pas Hopfien.*

Proposition 7.12. [14] *Soit M un module semi Hopfien, si M est indécomposable alors il est Hopfien.*

Théorème 7.13. [14] *Soit M un A -module, alors:*

- (1) *Si M est semi Hopfien et co-Hopfien, alors M est Hopfien.*
- (2) *Si M est semi co-Hopfien et Hopfien, alors M est co-Hopfien.*


Définition 7.14. [7]. *Un A -module M est dit quasi-principalement projectif si pour tout endomorphisme f de M et pour tout homomorphisme g de M vers $f(M)$, il existe un endomorphisme h de M tel que : $g = fh$*



Puisque tout A -module quasi-principalement projectif est semi Hopfien d'après [32, Proposition 3.2], alors il est facile de voir le corollaire suivant.

Corollaire 7.15. [14] *Soit M un module quasi-principalement projectif, si M est co-Hopfien alors il est Hopfien.*

Définition 7.16. [38]. *Un A -module M est dit quasi-principalement injectif si pour tout endomorphisme non nul f de M et pour tout homomorphisme g de $f(M)$ vers M , il existe un endomorphisme h de M tel que : $g = hf$*



Puisque tout A -module quasi-principalement injectif est semi co-Hopfien d'après [32, Proposition 3.1], alors il est facile de voir le corollaire suivant.

Corollaire 7.17. [14]

Soit M un module quasi-principalement injectif, si M est Hopfien alors il est co-Hopfien.

Il est facile de voir que tout module Hopfien est Hopfien généralisé, mais la réciproque n'est pas toujours vraie comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 7.18. [21, exemple 1.7]. *Soit $G = \mathbb{Z}_{p^\infty}$. Puisque dans G tout sous-groupe propre est superflu, donc G est un groupe abélien Hopfien généralisé. Mais G n'est pas Hopfien puisque la multiplication par p induit un épimorphisme de G qui n'est pas un isomorphisme.*

Proposition 7.19. [14] *Soit M un module semi Hopfien. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) M est Hopfien.
- (2) M est Hopfien généralisé.

Proposition 7.20. [14] *Soit M un module semi co-Hopfien. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) M est co-Hopfien.
- (2) M est faiblement co-Hopfien

8. MODULES μ -HOPFIENS

Définition 8.1. [12]

Un A -module M est appelé μ -Hopfien, si pour tout endomorphisme surjectif f de M , le noyau de f est μ -superflu dans M ($\text{Ker } f \ll_{\mu} M$).

Lemme 8.2. [12] *Soit M un A -module et soit N un sous-module de M , alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) $N \ll_{\mu} M$.
- (2) Si $X + N = M$, alors X est un facteur direct de M avec M/X est un module semi simple injectif.

Le résultat suivant présente une caractérisation des modules μ -Hopfiens.

Théorème 8.3. [12] *Soit M un A -module, alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) M est μ -Hopfien.
- (2) Pour tout endomorphisme surjectif f de M , si $N \ll_{\mu} M$, alors $f^{-1}(N) \ll_{\mu} M$.
- (3) Si $N \leq M$ et s'il existe un épimorphisme $M/N \rightarrow M$, alors $N \ll_{\mu} M$.
- (4) Si M/N est non nul et cosingulier pour tout $N \leq M$ et si f est un endomorphisme surjectif de M alors $f(N) \neq M$.
- (5) Il existe un sous-module μ -superflu totalement invariant N de M tel que M/N est μ -Hopfien.
- (6) Pour tout module X tel qu'il existe un épimorphisme $M \rightarrow M \oplus X$, alors X est semi simple injectif.

L'exemple suivant montre que la classe des modules Hopfiens est une sous-classe propre des modules μ -Hopfiens.

Exemple 8.4. [12]

Soit $G = \mathbb{Z}_{p^{\infty}}$. Puisque dans G chaque sous-groupe propre est μ -superflu. Donc G est un groupe μ -Hopfien. Mais G n'est pas Hopfien car la multiplication par p induit un épimorphisme de G qui n'est pas un isomorphisme.

Théorème 8.5. [12] *Soit M un module (quasi-)projectif et soit $f \in \text{End}(M)$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) M est μ -Hopfien.
- (2) Si f est un épimorphisme, alors $\text{Ker}(f)$ est semi simple injectif.

Théorème 8.6. [12] *Soit A un anneau. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) *Tout A -module est μ -Hopfien.*
- (2) *Tout A -module projectif est μ -Hopfien.*
- (3) *Tout A -module libre est μ -Hopfien.*
- (4) *A est semi simple.*

Il est clair que tout module Hopfien généralisé est μ -Hopfien. L'exemple suivant montre que la réciproque n'est pas vraie en général. De plus, cet exemple montre aussi qu'un module μ -Hopfien n'est pas nécessairement Dedekind Fini.

Exemple 8.7. [12]

Soit A un anneau semi simple. Alors d'après le théorème 8.6, $M = A^{(\mathbb{N})}$ est un A -module μ -Hopfien. Puisque $A^{(\mathbb{N})} \cong A^{(\mathbb{N})} \oplus A^{(\mathbb{N})}$ et $A^{(\mathbb{N})} \neq 0$, M n'est pas un module Hopfien généralisé (Dedekind Fini) (voir [21, Corollaire 1.4]).

Proposition 8.8. [12] *Soit N un sous-module totalement invariant de M tel que M/N est Hopfien. Si N est μ -Hopfien alors M l'est.*

Proposition 8.9. [12] *Soit M un A -module. Si M vérifie CCA sur les sous modules non μ -superflus alors il est μ -Hopfien.*

Proposition 8.10. [12] *Soit M un A -module vérifie la propriété suivante, pour tout endomorphisme f de M il existe un entier $n \geq 1$ tel que $\text{Ker} f^n \cap \text{Im} f^n \ll_{\mu} M$. Alors M est μ -Hopfien.*

Théorème 8.11. [12] *La propriété μ -Hopfien est préservée par l'équivalence de Morita.*

Proposition 8.12. [12] *Tout facteur direct d'un module μ -Hopfien M est μ -Hopfien.*

Proposition 8.13. [12] *Soit $M = M_1 \oplus M_2$ un A -module. Si pour tout $i \in \{1, 2\}$, M_i est un sous-module totalement invariant de M , alors M est μ -Hopfien si et seulement si M_i est μ -Hopfien pour tout $i \in \{1, 2\}$.*

Définition 8.14. [12] *Soient M et N deux A -modules. M est appelé μ -Hopfien relatif à N , si pour tout épimorphisme $f : M \rightarrow N$, $\text{Ker}(f) \ll_{\mu} M$.*

9. MODULES δ - FAIBLEMENT HOPFIENS

Définition 9.1. [9]

Un A -module M est dit δ -faiblement Hopfien si tout endomorphisme surjectif δ -superflu ($\text{Ker} f \ll_{\delta} M$) de M est bijectif.

Exemple 9.2. [9] *Il existe un épimorphisme δ -superflu qui n'est pas un isomorphisme. Soit $G = \mathbb{Z}_{p^\infty}$, comme dans G tout sous groupe propre est δ -superflu (car dans G tout sous groupe propre est superflu), donc tout endomorphisme surjectif de G est δ -superflu, mais la multiplication par p induit un épimorphisme de G qui n'est pas un isomorphisme.*

Lemme 9.3. [9] *Soit M un A -module. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) *M est δ -faiblement Hopfien.*
- (2) *Pour tout sous-module δ -superflu K de M , $M/K \cong M$ si et seulement si $K = 0$.*

Proposition 9.4. [9] *Soit M un module δ -faiblement Hopfien. Si $M \cong M \oplus N$ pour certain module projectif semi simple N , alors $N = 0$. De plus, si M est projectif, alors la réciproque est vraie.*

Proposition 9.5. [9] *Soit A un anneau semi simple artinien. Alors un A -module libre F est δ -faiblement Hopfien si et seulement s'il est de rang fini.*

Le résultat suivant présente une caractérisation des modules projectifs δ -faiblement Hopfiens.

Théorème 9.6. [9] *Soit M un module projectif et $f \in \text{End}(M)$, alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) *M est δ -faiblement Hopfien.*
- (2) *Si f est inversible à droite et $\text{Ker}(f)$ est semi simple, alors f est inversible à gauche.*
- (3) *Si f est inversible à droite et $\text{Ker}(f) \ll_\delta M$, alors f est inversible à gauche.*
- (4) *Si f admet un inverse à droite g et $(1-gf)M \ll_\delta M$, alors f est inversible à gauche.*
- (5) *Si f est surjectif et $\text{Ker}(f)$ est semi simple projectif, alors f est inversible à gauche.*

Le résultat suivant présente une caractérisation des anneaux dans lesquels tout module quasi-projectif (projectif, libre) est δ -faiblement Hopfien.

Théorème 9.7. [9] *Soit A un anneau, alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) *Tout A -module quasi-projectif est δ -faiblement Hopfien.*
- (2) *Tout A -module projectif est δ -faiblement Hopfien.*
- (3) *Tout A -module libre est δ -faiblement Hopfien.*
- (4) *Tout idéal à droite maximal de A est essentiel dans A_A .*
- (5) *A n'a pas de A -module non nul semi simple projectif.*
- (6) *$\delta(A) = J(A)$.*

On dit qu'un anneau A est GV -anneau à droite [42], si tout A -module simple est soit projectif, soit injectif. Il est clair qu'un anneau A est GV -anneau si et

seulement si tout A -module simple singulier est injectif. Noter aussi que d'après [46, Corollaire 3.3], un anneau A est GV -anneau si et seulement si et seulement si tout A -module superflu est projectif.

Corollaire 9.8. [9] *Soit A un GV -anneau. Alors tout A -module superflu indécomposable est δ -faiblement Hopfien.*

Il est clair que tout module δ -faiblement Hopfien est faiblement Hopfien. L'exemple suivant montre que la réciproque n'est pas toujours vraie.

Exemple 9.9. [9] *D'après [52, Exemple 3.13] tout espace vectoriel de dimension infinie est faiblement Hopfien. Mais d'après [47, Lemme 2.9], $M \ll_{\delta} M$ si M est un A -module projectif semi simple, donc tout endomorphisme surjectif de M est δ -superflu. Alors M n'est pas δ -faiblement Hopfien lorsque M n'est pas Dedekind Fini, c'est le cas des espaces vectoriels de dimension infinie.*

Exemple 9.10. [9] *Soit P l'ensemble de tous les nombres premiers et $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} = \bigoplus_{p \in P} \mathbb{Z}_{p^{\infty}}$. Si $\bigoplus_{p \in P} \mathbb{Z}_{p^{\infty}}$ est un \mathbb{Z} -module δ -faiblement Hopfien, alors $\mathbb{Z}_{p^{\infty}}$ est δ -faiblement Hopfien d'après la proposition ??, contradiction avec l'exemple 9.2. Donc \mathbb{Q}/\mathbb{Z} n'est pas δ -faiblement Hopfien, mais \mathbb{Q} est un \mathbb{Z} -module δ -faiblement Hopfien.*

Théorème 9.11. [9] *Soit M un module quasi-projectif uniforme, si N est un sous-module non nul totalement invariant δ -superflu de M alors M/N est Hopfien.*

Définition 9.12. [57] *Soit \mathfrak{S} la classe de tous les modules simples singuliers. Pour un module M , soit $\delta(M) = \text{Rej}_M(\mathfrak{S}) = \bigcap \{N \subseteq M; M/N \in \mathfrak{S}\}$.*

Corollaire 9.13. [9] *Soit M un module quasi-projectif uniforme tel que $\delta(M)$ est δ -superflu dans M . Alors $M/\delta(M)$ est δ -faiblement Hopfien.*

Proposition 9.14. [9] *Soit M un module quasi-projectif, si M est co-Hopfien alors il est δ -faiblement Hopfien.*

Définition 9.15. [41] *Soit M un A -module. On dit que M est duo module si tout sous module de M est totalement invariant.*

Corollaire 9.16. [9] *Soit $M = M_1 \oplus M_2$ un duo module. Alors M est δ -faiblement Hopfien si et seulement si M_1 et M_2 sont δ -faiblement Hopfiens.*

Il est clair que tout module Hopfien est δ -faiblement Hopfien. L'exemple suivant montre que la réciproque n'est pas toujours vraie, Ainsi il montre qu'un module δ -faiblement Hopfien n'est pas toujours Dedekind Fini.

Exemple 9.17. [9] *Si M est un A -module singulier semi simple, alors le seul sous-module δ -superflu de M est zéro. Donc tout endomorphisme surjectif δ -superflu de M est injectif. Mais M n'est pas Dedekind Fini et donc n'est pas Hopfien.*

Théorème 9.18. [9] *Soit M un A -module vérifiant la CCA sur les sous-modules δ -superflus. Alors M est δ -faiblement Hopfien.*

Définition 10.1. [13]

Un A -module M est appelé γ -Hopfien, si pour tout endomorphisme surjectif f de M , le noyau de f est γ -superflu dans M ($\text{Ker } f \ll_{\gamma} M$).

Le résultat suivant présente une caractérisation des Modules γ -Hopfiens.

Théorème 10.2. [13] Soit M un A -module, alors les assertions suivantes sont équivalentes:

- (1) M est γ -Hopfien,
- (2) Pour tout endomorphisme surjectif f de M , si $N \ll_{\gamma} M$, alors $f^{-1}(N) \ll_{\gamma} M$.
- (3) Si $N \leq M$ et s'il existe un épimorphisme $M/N \rightarrow M$, alors $N \ll_{\gamma} M$.
- (4) Si M/N est non nul et non cosingulier pour tout $N \leq M$ et si f est un endomorphisme surjectif de M alors $f(N) \neq M$.

L'exemple suivant montre que la classe des modules Hopfiens est une sous-classe propre des modules γ -Hopfiens.

Exemple 10.3. [13]

Soit $G = \mathbb{Z}_{p^{\infty}}$. Puisque G est creux alors tout sous-groupe propre de G est γ -superflu, donc G est un groupe γ -Hopfien. Mais G n'est pas Hopfien car la multiplication par p induit un épimorphisme de G qui n'est pas un isomorphisme.

Lemme 10.4. [13] Soit M un A -module et soit N un sous-module de M , alors les assertions suivantes sont équivalentes:

- (1) $N \ll_{\gamma} M$.
- (2) Si $X + N = M$, alors X est un facteur direct de M avec M/X est un module semi simple cosingulier.

Théorème 10.5. [13] Soit M un A -module, alors les assertions suivantes sont équivalentes:

- (1) M est γ -Hopfien,
- (2) Pour tout module X tel qu'il existe un épimorphisme $M \rightarrow M \oplus X$, alors X est semi simple cosingulier.

Théorème 10.6. [13] Soit A un anneau. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:

- (1) Tout A -module est γ -Hopfien,
- (2) Tout A -module projectif est γ -Hopfien,
- (3) Tout A -module libre est γ -Hopfien,
- (4) A est semi simple cosingulier.

Il est clair que chaque module Hopfien généralisé est γ -Hopfien. L'exemple suivant montre que la réciproque n'est pas vraie en général. De plus, cet exemple montre aussi qu'un module γ -Hopfien n'est pas en général Dedekind Fini.

Exemple 10.7. [13]

Soit A un anneau semi simple cosingulier. Alors d'après le théorème 10.6, $M = A^{(\mathbb{N})}$ est un A -module γ -Hopfien. Puisque $A^{(\mathbb{N})} \cong A^{(\mathbb{N})} \oplus A^{(\mathbb{N})}$ et $A^{(\mathbb{N})} \neq 0$, M n'est pas un module Hopfien généralisé (Dedekind Fini) (voir [21, Corollaire 1.4]).

Théorème 10.8. [13] La propriété γ -Hopfien est préservée par l'équivalence de Morita.

Corollaire 10.9. [13] Soit $n \geq 2$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes pour un anneau A :

- (1) Tout A -module engendré par n éléments est γ -Hopfien.
- (2) Tout $M_n(A)$ -module cyclique est γ -Hopfien.

Théorème 10.10. [13] Soit M un A -module, alors les assertions suivantes sont équivalentes:

- (1) M est γ -Hopfien.
- (2) Il existe un sous-module γ -superflu totalement invariant N de M tel que M/N est γ -Hopfien.

Corollaire 10.11. [13] Soit M un module faiblement co-Hopfien. Si M vérifie CCA sur les sous-modules non γ -superflus N tel que M/N est faiblement co-Hopfien, alors M est γ -Hopfien.

Proposition 10.12. Soit M un A -module. Si M vérifie CCD sur les sous-modules non γ -superflus alors il est γ -Hopfien.

Proposition 10.13. [13] Soit M un A -module vérifie la propriété suivante, pour tout endomorphisme f de M il existe un entier $n \geq 1$ tel que $\text{Ker } f^n \cap \text{Im } f^n \ll_{\gamma} M$. Alors M est γ -Hopfien.

Dans le corollaire suivant, on donne une caractérisation d'un anneau A dans lequel tout A -module libre de type fini est γ -Hopfien.

Corollaire 10.14. [13] Soit A un anneau. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:

- (1) Tout A -module libre de type fini est γ -Hopfien.
- (2) Tout A -module projectif de type fini est γ -Hopfien.
- (3) $M_n(A)$ est un $M_n(A)$ -module γ -Hopfien pour tout $n \geq 1$.

Proposition 10.15. [13] Soit M un module semi Hopfien, si M est co-Hopfien alors il est γ -Hopfien.

11. MODULES JACOBSON HOPFIENS

Définition 11.1. [10]

Un A -module M est appelé Jacobson Hopfien, si pour tout endomorphisme surjectif f de M , le noyau de f est Jacobson-superflu dans M ($\text{Ker } f \ll_J M$).

Le résultat suivant présente une caractérisation des Modules Jacobson Hopfiens.

Théorème 11.2. [10] *Soit M un A -module, alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) M est Jacobson Hopfien.
- (2) Pour tout endomorphisme surjectif f de M , si $N \ll_J M$, alors $f^{-1}(N) \ll_J M$.
- (3) Pour tout épimorphisme $f : M/N \rightarrow M$, on a $N \ll_J M$.
- (4) Si M/N est non nul et $\text{Rad}(M/N) = M/N$ pour tout $N \leq M$ et si f est un endomorphisme surjectif de M alors $f(N) \neq M$.

L'exemple suivant montre que la classe des modules Hopfiens est une sous-classe propre des modules Jacobson Hopfiens.

Exemple 11.3. [10]

Soit $M = \mathbb{Z}_{p^\infty}$. Puisque tout sous-module de M est Jacobson-superflu dans M car M est creux, alors il est clair que M est Jacobson Hopfien mais M n'est pas Hopfien. Noter que la multiplication par p induit un épimorphisme de G qui n'est pas un isomorphisme.

Remarque 11.4. [10] *Selon les définitions, tout module creux est Jacobson Hopfien, mais la réciproque n'est pas vraie en général. Noter que $M = \mathbb{Z}_6$ est un \mathbb{Z} -module semi simple n'est pas creux. Puisque pour tout module semi simple M on a $\text{Rad}(M) = 0$, alors tout sous-module propre est Jacobson-superflu dans M mais M n'a aucun sous-module superflu non nul.*

Lemme 11.5. [10] *Soit M un A -module et soit K un sous-module de M , alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) $K \ll_J M$.
- (2) Si $X + K = M$, alors X est un facteur direct de M avec M/X est un module semi simple.

Théorème 11.6. [10] *Soit M un A -module, alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) M est Jacobson Hopfien.
- (2) Pour tout module X tel qu'il existe un épimorphisme $M \rightarrow M \oplus X$, alors X est semi simple.

Théorème 11.7. [10] *Soit M un module (quasi-)projectif et $f \in \text{End}(M)$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) M est Jacobson Hopfien.
- (2) Si f est un épimorphisme, alors $\text{Ker}(f)$ est semi simple.

Théorème 11.8. [10] *Soit A un anneau. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) Tout A -module est Jacobson Hopfien.

- (2) *Tout A -module projectif est Jacobson Hopfien.*
- (3) *Tout A -module libre est Jacobson Hopfien.*
- (4) *A est semi simple.*

Il est clair que chaque module Hopfien généralisé est Jacobson Hopfien. L'exemple suivant montre que la réciproque n'est pas vraie en général. De plus, cet exemple montre aussi qu'un module Jacobson Hopfien n'est pas en général Dedekind Fini.

Exemple 11.9. [10]

Soit A un anneau semi simple. Alors d'après le théorème 11.8, $M = A^{(\mathbb{N})}$ est un A -module Jacobson Hopfien. Puisque $A^{(\mathbb{N})} \cong A^{(\mathbb{N})} \oplus A^{(\mathbb{N})}$ et $A^{(\mathbb{N})} \neq 0$, M n'est pas Hopfien généralisé (Dedekind Fini) (voir [21, Corollaire 1.4]).

Théorème 11.10. [10] *Soit M un A -module, alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) *M est Jacobson Hopfien.*
- (2) *Il existe un sous-module Jacobson-superflu totalement invariant N de M tel que M/N est Jacobson Hopfien.*

Proposition 11.11. [10] *Soit N un sous-module totalement invariant de M tel que M/N est Hopfien. Si N est Jacobson Hopfien alors M est Jacobson Hopfien.*

Proposition 11.12. [10] *Soit M un A -module. Si M vérifie CCA sur les sous modules non Jacobson-superflus alors il est Jacobson Hopfien.*

Proposition 11.13. [10] *Soit M un A -module. Si M vérifie CCD sur les sous modules non Jacobson-superflus alors il est Jacobson Hopfien.*

Proposition 11.14. [10] *Soit M un A -module vérifie la propriété suivante, pour tout endomorphisme f de M il existe un entier $n \geq 1$ tel que $\text{Ker } f^n \cap \text{Im } f^n \ll_J M$. Alors M est Jacobson Hopfien.*

Exemples 11.15. (1) *Tout sous-module propre de module semi simple M est Jacobson-superflu, alors pour tout endomorphisme f de M il existe un entier $n \geq 1$ tel que $\text{Ker } f^n \cap \text{Im } f^n \ll_J M$. Donc M est Jacobson Hopfien.*
 (2) *Si M est noethérien, alors pour tout endomorphisme f de M il existe un entier $n \geq 1$ tel que $\text{Ker } f^n \cap \text{Im } f^n = 0$. Donc M est Jacobson Hopfien.*

Dans le corollaire suivant, on donne une caractérisation d'un anneau A dans lesquels tout A -module libre de type fini est Jacobson Hopfien.

Corollaire 11.16. [10] *Soit A un anneau. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) *Tout A -module libre de type fini est Jacobson Hopfien.*
- (2) *Tout A -module projectif de type fini est Jacobson Hopfien.*
- (3) *$M_n(A)$ est un $M_n(A)$ -module Jacobson Hopfien pour tout $n \geq 1$.*

Proposition 11.17. *Soit M un module semi Hopfien, si M est co-Hopfien alors il est Jacobson Hopfien.*

12. PROPRIÉTÉS DES EXTENSIONS POLYNOMIALES

Soit M un A -module. D'après [48], nous allons rappeler brièvement les définitions des modules $M[x]$ et $M[x]/(x^{n+1})$. Les éléments de $M[x]$ sont des sommes formelles de la forme $a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k$ avec k un entier supérieur ou égal à 0 et $a_i \in M$. On note cette somme par $\sum_{i=0}^k a_ix^i$. Pour l'addition en ajoutant les coefficients correspondants. La structure de $A[x]$ -module est définie par

$$\left(\sum_{i=0}^k \lambda_ix^i\right) \cdot \left(\sum_{j=0}^z a_jx^j\right) = \sum_{\mu=0}^{k+z} c_\mu x^\mu,$$

où $c_\mu = \sum_{i+j=\mu} \lambda_ia_j$, pour tout $\lambda_i \in A$, $a_j \in M$.

Tout élément non nul β de $M[x]$ s'écrit uniquement sous la forme $(\sum_{i=k}^l m_ix^i)$ avec $l \geq k \geq 0$, $m_i \in M$, $m_k \neq 0$ et $m_l \neq 0$. Dans ce cas, nous nous référons à k comme l'ordre de β , l comme le degré de β , et m_k comme le coefficient initial de β .

Soit n un entier supérieur ou égal à 0 et

$$I_{n+1} = \{0\} \cup \{\beta; 0 \neq \beta \in A[x], \text{l'ordre de } \beta \geq n+1\}.$$

Alors I_{n+1} est un idéal bilatéral de $A[x]$. L'anneau quotient $A[x]/I_{n+1}$ est appelé l'anneau polynomial tronqué, tronqué au degré $n+1$. Si A est unitaire, I_{n+1} est l'idéal engendré par x^{n+1} . Si A n'est pas unitaire, nous désignerons "symboliquement" l'anneau $A[x]/I_{n+1}$ par $A[x]/(x^{n+1})$. Tout élément de $A[x]/(x^{n+1})$ s'écrit uniquement sous la forme $(\sum_{i=0}^n \lambda_ix^i)$ avec $\lambda_i \in A$.

Soit

$$D_{n+1} = \{0\} \cup \{\beta; 0 \neq \beta \in M[x], \text{l'ordre de } \beta \geq n+1\}.$$

Alors D_{n+1} est un $A[x]$ -sous-module de $M[x]$. Puisque $I_{n+1}M[x] \subset D_{n+1}$, on dit que $A[x]/(x^{n+1})$ agit sur $M[x]/D_{n+1}$. On note le module $M[x]/D_{n+1}$ par $M[x]/(x^{n+1})$. L'action de $A[x]/(x^{n+1})$ sur $M[x]/(x^{n+1})$ est donnée par

$$\left(\sum_{i=0}^n \lambda_ix^i\right) \cdot \left(\sum_{j=0}^n a_jx^j\right) = \sum_{\mu=0}^n c_\mu x^\mu,$$

où $c_\mu = \sum_{i+j=\mu} \lambda_ia_j$, pour tout $\lambda_i \in A$, $a_j \in M$.

Tout élément non nul β de $M[x]/D_{n+1}$ s'écrit uniquement sous la forme $(\sum_{i=k}^n m_ix^i)$ avec $n \geq k \geq 0$, $m_i \in M$, $m_k \neq 0$. Dans ce cas, nous nous référons à k comme l'ordre de β et m_k comme le coefficient initial de β .

Le $A[x_1, \dots, x_k]/(x_1^{n_1+1}, \dots, x_k^{n_k+1})$ -module $M[x_1, \dots, x_k]/(x_1^{n_1+1}, \dots, x_k^{n_k+1})$ est défini de la même manière.

Lemme 12.1. [20, Lemme 2.1]. *Soit M un A -module et $K \ll M$. Alors $K[x]/(x^{n+1}) \ll M[x]/(x^{n+1})$ comme $A[x]/(x^{n+1})$ -modules, où $n \geq 0$.*

Lemme 12.2. [50, Lemme 1.7]. *Soit N un A -sous-module de M . Alors les assertions suivantes sont équivalentes:*

- (1) N est un A -module essentiel dans M .
- (2) $N[x]$ est un $A[x]$ -module essentiel dans $M[x]$.
- (3) $N[x]/(x^{n+1})$ est un $A[x]/(x^{n+1})$ -module essentiel dans $M[x]/(x^{n+1})$.

Théorème 12.3. [11] *Soit M un A -module. Si $M[x]/(x^{n+1})$ est un $A[x]/(x^{n+1})$ -module faiblement Hopfien, alors M est un A -module faiblement Hopfien.*

Théorème 12.4. [11] *Soit M un A -module. Si $M[x]/(x^{n+1})$ est un $A[x]/(x^{n+1})$ -module co-Hopfien généralisé, alors M est un A -module co-Hopfien généralisé.*

Théorème 12.5. [11] *Soit M un A -module. Si $M[x_1, \dots, x_k]/(x_1^{n_1+1}, \dots, x_k^{n_k+1})$ est un $A[x_1, \dots, x_k]/(x_1^{n_1+1}, \dots, x_k^{n_k+1})$ -module faiblement Hopfien (resp, co-Hopfien généralisé), alors M est un A -module faiblement Hopfien (resp, co-Hopfien généralisé).*

Lemme 12.6. [14] *Soit M un A -module et soit N un sous-module de M . Si $N[x]/(x^{n+1})$ est un facteur direct de $M[x]/(x^{n+1})$, alors N est un facteur direct de M .*

Théorème 12.7. [14] *Soit M un A -module. Si $M[x]/(x^{n+1})$ est un $A[x]/(x^{n+1})$ -module semi Hopfien, alors M est un A -module semi Hopfien.*

Théorème 12.8. [14] *Soit M un A -module. Si $M[x]/(x^{n+1})$ est un $A[x]/(x^{n+1})$ -module semi co-Hopfien, alors M est un A -module semi co-Hopfien.*

Théorème 12.9. [14] *Soit M un A -module. Si $M[x_1, \dots, x_k]/(x_1^{n_1+1}, \dots, x_k^{n_k+1})$ est un $A[x_1, \dots, x_k]/(x_1^{n_1+1}, \dots, x_k^{n_k+1})$ -module semi Hopfien (resp, semi co-Hopfien), alors M est un A -module semi Hopfien (resp, semi co-Hopfien).*

Lemme 12.10. [12] *Soient M un A -module et $K \ll_{\mu} M$. Alors $K[x]/(x^{n+1}) \ll_{\mu} M[x]/(x^{n+1})$ comme $A[x]/(x^{n+1})$ -modules, où $n \geq 0$.*

Théorème 12.11. [12] *Soit M un A -module. Alors $M[x]/(x^{n+1})$ est un $A[x]/(x^{n+1})$ -module μ -Hopfien si et seulement si M est un A -module μ -Hopfien.*

Corollaire 12.12. [12] *Soit M un A -module. Alors $M[x_1, \dots, x_k]/(x_1^{n_1+1}, \dots, x_k^{n_k+1})$ est $A[x_1, \dots, x_k]/(x_1^{n_1+1}, \dots, x_k^{n_k+1})$ -module μ -Hopfien si et seulement si M est un A -module μ -Hopfien.*

REFERENCES

- [1] Anderson, F. W., Fuller, K. R.: Rings and Categories of Modules, Grad. Texts in Math. Springer-Verlag, New York. vol. **13**, (1992).
- [2] Armendariz, E.P., Fisher, J.W., and Snider, R.L.: On injective and surjective endomorphisms of finitely generated modules, *Comm. Alg.* **6**(7), 659-672 (1978).
- [3] Aydogdu, P., Ozcan, A.C.: Semi co-Hopfian and Semi Hopfian Modules, *East West J. Math.*, 10(1) (2008), 57–72.
- [4] Azumaya, G.: Strongly π -regular rings, *J. Fac. Sci. Hokaido Univ.* **13**, 34-39, (1954).
- [5] Barry, M., Diop, P. C.: Some properties related to commutative weakly FGI-rings. *JP Journal of algebra, number theory and application.* **19**(2), 141-153 (2010).
- [6] Breaz, S., Calugareanu, G., Schultz, P.: Modules with Dedekind finite Endomorphism Rings. *Mathematica. Tome 53* **76**(1), 15-28 (2011).
- [7] Camillo, V., Nicholson, W. K.: On rings where left principal ideals are left principal annihilators, *Int. Electron. J. Algebra*, **17**, 199-214 (2015).
- [8] Dischinger, F.: Sur les anneaux fortement π -réguliers, *C. R. Acad. Sci. Paris Ser. A* **283**, 571-573, (1976).
- [9] El Moussaouy, A., Khoramdel, M., Moniri Hamzekolaei, A. R., and Ziane, M.: Weak Hopfcity and singular modules. *Annali dell' Università di Ferrara*, **68**, 69–78 (2022).
- [10] El Moussaouy, A., Moniri Hamzekolaei, A. R., and Ziane, M.: Jacobson Hopfian Modules, *Algebra and Discrete Mathematics*, **33**(1), 116-127 (2022).
- [11] El Moussaouy, A., Ziane, M.: Some properties of endomorphism of modules, *Palestine Journal of Mathematics*, **11**(1), 122-129 (2022)
- [12] El Moussaouy, A., Ziane, M.: Modules in which every surjective endomorphism has a μ -small kernel. *Ann Univ Ferrara* **66**, 325-337 (2020).
- [13] El Moussaouy, A., Ziane, M.: Modules whose surjective endomorphisms have a γ -small kernels. *Algebraic Structures and Their Applications*, **9**(2), 121-133 (2022).
- [14] El Moussaouy, A., Ziane, M.: Notes on Generalizations of Hopfian and co-Hopfian modules. *Jordan Journal of Mathematics and Statistics*, **15**(1), 43 - 54 (2022).
- [15] El Moussaouy, A., Ziane, M.: On Generalizations of Hopfoan Modules. *International ICON-TECH SYMPOSIUM-3 on Innovative Surveys in Positive Sciences*, (2021).
- [16] El Moussaouy, A., Ziane, M.: T-weakly Hopfian modules. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* **12**(14), 4265-4270 (2021).
- [17] El Moussaouy, A.: Hopfcity and Jacobson small submodules. *Algebraic Structures and Their Applications*. Articles in Press. DOI: 10.22034/AS.2023.3002
- [18] El Moussaouy, A.: Jacobson monofom modules. *Journal of Algebraic Systems* (Accepted for publication).
- [19] Moussaouy, A., Ziane, M.: A New Generalization of Hopfian Modules. *Palestine Journal of Mathematics* (Accepted for publication).
- [20] Gang, Y., Zhong-kui, L.: Notes on Generalized Hopfian and Weakly co-Hopfian Modules. *Comm. Algebra.* **38**, 3556-3566 (2010).
- [21] Ghorbani, A., Haghany, A.: Generalized Hopfian modules. *J. Algebra.* **255**(2), 324-341 (2002).
- [22] Ghorbani, A., Haghany, A.: Duality for Weakly co-Hopfien and Generalized Hopfian modules. *Comm. Algebra.* **31**(6), 2811-2817 (2003).
- [23] Goodearl K. R.: Ring Theory. Non-singular Rings and Modules. Marcel Dekker, New York, 1976.
- [24] Haghany, A., Vedadi, M.R.: Modules whose injective endomorphisms are essential. *J. Algebra* **243**(2), 765-779 (2001).

- [25] Haghany, A.: Hopfcivity and co-Hopfcivity for Morita contexts. *Comm. Algebra* **27**(1), 477–492 (1999).
- [26] Hiremath, V. A.: Hopfian rings and Hopfian modules, *Indian J. Pure Appl.Math.* **17**(7), 895-900 (1986).
- [27] Hmaimou, A., Kaidi, A., Sanchez Campos, E.: Generalized Fitting modules and rings. *J. Algebra.* **308**, 199-214 (2007).
- [28] Kabban, A., Wasan, K.: On jacobson-small Submodules. *Iraqi Journal of Science.* **60**(7), 1584-1591 (2019).
- [29] Kaidi, A., Mamadou, S.: Une caracterisation des anneaux artiniens a ideaux principaux. In: Bueso, J.L., Jara, P., Torrecillas, B. (eds.) *Ring Theory. LNM*, vol. 1328, pp. 245–254. Springer, Heidelberg (1988).
- [30] Kaplansky, I.: Topological representations of algebras, II, *Trans. Amer. Math. Soc.* **68**, 62-75, (1950).
- [31] Koehler, A.: Quasi-projective and quasi-injective modules. *Pacific J. Math.* **36**(3), 713-720 (1971).
- [32] Kumar, V., Gupta, A. J., Pandeya, B. M., Patel, M.K.: M-SP-Projective Modules, *International Journal of Algebra*, **5**(12), 563-568 (2011).
- [33] Leonard W. W.: Small modules, *Proc. Am. Math. Soc.* **17**, 527-531 (1966).
- [34] Liu, Z. K.: A note on Hopfian module. *Comm. Algebra.* **28**(6), 3031–3040 (2000).
- [35] M. Hosseinpour, A. R. M. Hamzekolae, γ -Small submodules and γ -Lifting modules. *East West J. Math.*, **22**(1) (2020), 52–63.
- [36] Mohamed, S. H., Muller, B. J.: *Continuous and Discrete Modules*, London Mathematical Society, Lecture Note Series 147. (1990).
- [37] Momtahan, E.: Remarks On N_0 -injectivity, *Journal of Mathematical Extension.* **6**(1), 95-111 (2012).
- [38] Nicholson, W.K., Park, J.K., and Yousif, M.F.: Principally quasi-injective modules. *Comm. Algebra* **27**, 1683-1693 (1999).
- [39] Ozcan, A.C., Harmanci, A.: Characterizations of Some Rings by Functor $Z^*(.)$, *Turkish J.Math.* **21**, 325-331 (1997).
- [40] Ozcan, A. C.: Modules with small cyclic submodules in their injective hulls, *comm. In Algebra.* **30**(4), 1575-1589 (2002).
- [41] Özcan A. C., Harmanci A. and Smith P.F.: Duo modules, *Glasgow Math. J.* **48**, 533–545 (2006).
- [42] Ramamurthy V.S. and Rangaswamy K.M.: Generalized V -rings, *Math. Scand.* **31**, 69-77 (1972).
- [43] Ribenboim, P.: *Rings and Modules*, Tracts in Math. 24, Intersciences Publ, New York, (1969).
- [44] Schwiebert, R. C.: *Faithful Torsion Modules and Rings*, A dissertation presented to the faculty of the college of Arts and Sciences of Ohio University, (2011).
- [45] Rotman, Joseph.: *An introduction to homological algebra*, Springer, New York, 2nd edition (2009).
- [46] Talebi Y., Moniri Hamzekolae A. R., Hosseinpour M., Harmanci A. and Ungor, B.: Rings for which every cosingular module is projective, *Hacet. J. Math. Stat.* **48**(4), 973–984 (2019).
- [47] Triback, R.: On δ -Local Modules and Amply δ -Supplemented Modules, *Journal of Algebra and Its Applications.* **12**(2), 125-144 (2013).
- [48] Varadarajan, K.: A generalization of Hilbert’s basis theorem. *Comm. Algebra* **10**(20), 2191-2204 (1982).

- [49] Varadarajan, K.: Hopfian and co-Hopfian objects. *Publications Mathematiques*. **36**, 293-317 (1992).
- [50] Varadarajan, K.: On a theorem of Shock, *Comm. Algebra*. **10**(20), 2205-2222 (1982).
- [51] Vasconcelos, W. V.: On finitely generated flat modules. *Trans.Amer.Math.Soc.* **138**, 505-512 (1969).
- [52] Wang, Y.: Generalizations of Hopfian and co-Hopfian modules. *Int. J. Math. Sci.* **9**, 1455-1460 (2005).
- [53] Wasan, K., Enas, M. K.: On a Generalization of small submodules. *Sci.Int.(Lahore)*, **30**(3), 359-365 (2018).
- [54] Wisbauer,R.: *Foundations of Module and Ring Theory, Algebra, Logic and Applications*, vol. 3, Gordon and Breach Science Publishers, Pennsylvania, 1991.
- [55] Xue, W. M.: Hopfian modules and co-Hopfian modules. *Comm. Algebra* **23**(4), 1219–1229 (1995).
- [56] Yang, G., Liu, Z. K.: On Hopfian and co-Hopfian modules. *Vietnam J. Math.* **35**(1):73–80 (2007).
- [57] Zhou, Y.: Generalizations of perfect, semiperfect, and semiregular rings, *Algebra Colloquium*, **7**(3), 305-318 (2000).

ABDERRAHIM EL MOUSSAOUY: DEPARTMENT OF MATHEMATICS, FACULTY OF SCIENCES,
UNIVERSITY OF MOHAMMED FIRST, OUJDA, MOROCCO

Email address: a.elmoussaouy@ump.ac.ma