

# Медленное убывание корреляций для типичных перемешивающих автоморфизмов

В.В. РЫЖИКОВ

## Аннотация

**Slow decay of correlations for generic mixing automorphisms.** Given  $\psi(n) \rightarrow +0$  and nonzero  $f \in L_2(\mu)$ , we prove that for the Alpern-Tikhonov generic mixing automorphism  $T$  of  $(X, \mu)$  the set  $\{n : |(T^n f, f)| > \psi(n)\}$  is infinite.

Для произвольной последовательности  $\psi(n) \rightarrow +0$  и интегрируемой в квадрате ненулевой функции  $f$  для типичного относительно метрики Альперна-Тихонова перемешивающего автоморфизма  $T$  установлено медленное убывание корреляций относительно  $\psi(n)$ : неравенство  $|(T^n f, f)| > \psi(n)$  выполняется для бесконечного множества значений  $n$ .

## 1 Введение

Пусть  $T$  – автоморфизм вероятностного пространства  $(X, \mu)$ , мы также обозначаем через  $T$  отвечающий ему унитарный оператор в  $L_2(\mu)$ . В работах [2],[10] С. Альперн и С.В. Тихонов ввели полную метрику на множестве  $Mix$  всех перемешивающих автоморфизмов пространства  $(X, \mu)$ . В связи с этим возникают задачи о типичности в смысле Бэра тех или иных свойств перемешивающих преобразований. Традиционно говорят "типичный автоморфизм обладает сингулярным спектром" (это доказано в [10]) вместо "все элементы некоторого плотного  $G_\delta$ -множества обладают сингулярным спектром".

В заметке дан ответ на вопрос И.В. Подвигина о медленном убывании корреляций для типичного перемешивающего автоморфизма. Решение использует конструкции ранга один и метод аппроксимации перемешивающего преобразования неперемешивающими, изложенный в [7]. Свойство неперемешивающих преобразований (в нашем случае медленное убывание корреляций) наследуются предельным перемешивающим автоморфизмом. Теорема Баштанова [3] о плотности класса сопряженности в  $Mix$  позволяет из одного такого специального примера стандартным способом получить плотное  $G_\delta$ -множество перемешивающих автоморфизмов с медленным убыванием корреляций.

В заключительной части заметки мы покажем, что гипотеза о перемешивающих преобразованиях из работы [6] неверна. Не только перемешивающие автоморфизмы, как это предполагала гипотеза, но все мягко перемешивающие автоморфизмы (и только они) не допускают сходимости ненулевых средних  $\frac{1}{k_n} \sum_{i=1}^{k_n} T^i f(x)$  со скоростью  $o(\frac{1}{k_n})$ .

**Замечание.** Отметим, что типичный перемешивающий автоморфизм обладает рангом один [3]. Автор предложил в [9] другой метод доказательства этого факта и получил аналогичный результат для перемешивающих потоков ([9], теорема 7.1). Из этого вытекает, что такие потоки обладают тривиальным централизатором. С учетом результатов работы [7] можно доказать, что для типичных перемешивающих автоморфизмов и потоков их симметрические тензорные степени имеют однократный спектр.

## 2 Убывание корреляций для типичных перемешивающих автоморфизмов

В силу эргодической теоремы следующее утверждение содержательно для функций  $f$  с нулевым средним, когда корреляции стремятся к 0.

**Теорема 1.** Пусть  $0 \neq f \in L_2(\mu)$  и  $\psi(n) \rightarrow +0$  при  $n \rightarrow \infty$ . Для типичного перемешивающего автоморфизма  $T$  множество  $\{n : |(T^n f, f)| > \psi(n)\}$  бесконечно.

Отметим, что аналогичный результат справедлив для перемешивающих потоков. Напомним, как определяется метрика  $r$  на  $Mix$ , пространстве перемешивающих автоморфизмов. На группе  $Aut(\mu)$  всех автоморфизмов задана метрика Халмوشа  $\rho$ :

$$\rho(S, T) = \sum_i 2^{-i} \left( \mu(SA_i \Delta TA_i) + \mu(S^{-1}A_i \Delta T^{-1}A_i) \right),$$

где  $\{A_i\}$  – некоторое фиксированное семейство, плотное в алгебре всех  $\mu$ -измеримых множеств. Введем на  $Aut(\mu)$  метрику  $d_w$ :

$$d_w(S, T) = \sum_{i,j} 2^{-i-j} |\mu(SA_i \cap A_j) - \mu(TA_i \cap A_j)|.$$

На  $Mix$  метрика  $r$  задается следующим образом:

$$r(S, T) = \rho(S, T) + \sup_{n>0} d_w(S^n, T^n).$$

В [10] доказано, что пространство  $(Mix, r)$  является полным и сепарабельным.

Чтобы найти типичное множество автоморфизмов с медленным убыванием корреляций, нам нужно предъявить пример такого автоморфизма. Говорим, что  $T$  обладает  $(1 - \varepsilon)$ -перемешиванием, если всякий слабый предел его степеней  $T^{n_i}$ ,  $n_i \rightarrow \infty$ , ограниченный на пространство функций с нулевым средним, имеет норму, не превосходящую  $\varepsilon$ . Отметим, что 1-перемешивание совпадает с обычным перемешиванием. Автоморфизм  $T$  обладает  $\varepsilon$ -жесткостью, если для некоторой последовательности  $m_k \rightarrow \infty$  выполняется  $T^{m_k} \rightarrow \varepsilon I$ . Для автоморфизма  $T$  при одновременном выполнении свойств  $\varepsilon$ -жесткости и  $(1 - \varepsilon)$ -перемешивания и функции  $f$  с нулевым средним имеем

$$(T^{m_k} f, f) \rightarrow \varepsilon(f, f).$$

Воспользовавшись методом работы [7], мы предъявим последовательность автоморфизмов  $T_k$  таких, что  $T_k$  обладает  $(1 - \varepsilon_k)$ -перемешиванием и  $\varepsilon_k$ -жесткостью,  $\varepsilon_k \rightarrow +0$ . Для заранее фиксированного набора функций  $f_i \neq 0$ ,  $i = 1, 2, \dots, k$  будет выполнено  $(T_k^{m_k} f_i, f_i) > \psi(m_k)$ . Автоморфизмы  $T_k$  в смысле работы [7] аппроксимируют перемешивающий автоморфизм  $T$ , который наследует корреляции:

$$(T^{m_k} f_i, f_i) > \psi(m_k), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Сформулируем вспомогательные утверждения и выведем из них теорему.

**Лемма 2.** Пусть  $\psi(n) \rightarrow +0$  и задана последовательность функций  $f_k \in L_2(\mu)$ ,  $\|f_k\| = 1$ . Для некоторого перемешивающего автоморфизма  $T$  верно, что для всяких  $k$ ,  $t$  найдется  $n > t$ , для которого

$$|(T^n f_i, f_i)| > \psi(n), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Лемму 2 докажем позже. Для доказательства теоремы нам понадобится ее частный случай, когда  $f_k = J_k f$  для некоторых автоморфизмов  $J_k$ .

**Лемма 3.** Пусть  $\psi(n) \rightarrow +0$ ,  $\|f\|_2 = 1$  и задан счетный набор автоморфизмов  $J_i$ . Найдется перемешивающий автоморфизм  $T$  такой, что для любых  $k$ ,  $t$  для некоторого  $n > t$  выполнено

$$|(J_i^{-1} T^n J_i f, f)| > \psi(n), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

**Доказательство теоремы 1.** Определим открытые в  $Mix$  множества

$$Y_m = \{T \in Mix : |(T^m f, f)| > \psi(m)\}$$

и  $G_\delta$ -множество

$$G = \bigcap_{M} \bigcup_{m > M} Y_m.$$

Нам нужно доказать, что  $G$  плотно относительно метрики  $r$ . Пусть семейство  $\{J_k\}$  плотно в  $Aut(\mu)$  относительно метрики  $\rho$ . Рассмотрим перемешивающий автоморфизм  $T$  из леммы 3, тогда  $\{J_k^{-1} T J_k\} \subset G$ . Теорема Баштанова [3] утверждает, что класс сопряженности  $\{J^{-1} T J : J \in Aut\}$  плотен в  $Mix$ . Но в нем плотно относительно метрики  $r$  семейство  $\{J_k^{-1} T J_k : k \in \mathbf{N}\}$ , что вытекает, например, из леммы 10 [10]. Поясним этот факт для полноты изложения. Из сходимости  $J_{k'} \rightarrow_\rho J$  (здесь  $k'$  – некоторая последовательность) в силу неравенства

$$|\mu(T^n J_{k'} A_i \cap J_{k'} A_j) - \mu(T^n J A_i \cap J A_j)| \leq \mu(J_{k'} A_i \Delta J A_i) + \mu(J_{k'} A_j \Delta J A_j)$$

вытекает равномерная по  $n$  сходимость

$$\mu(T^n J_{k'} A_i \cap J_{k'} A_j) \rightarrow \mu(T^n J A_i \cap J A_j).$$

Получаем, что  $J^{-1}TJ$  в метрике  $d_w$ , следовательно, и в метрике  $r$  приближается последовательностью  $J_{k'}^{-1}TJ_{k'}$ . Значит, семейство  $\{J_k^{-1}TJ_k\}$  плотно в  $\text{Mix}$ . Множество  $G$  типично в  $\text{Mix}$ . Теорема доказана.

### 3 Конструкции ранга один

Для удобства читателя мы напомним определение преобразований ранга один. Из них мы позже выберем нужные примеры перемешивающих автоморфизмов  $T$ .

Фиксируем натуральное число  $h_1 \geq 1$  (высота башни на этапе  $j = 1$ ), последовательность  $r_j \rightarrow \infty$  (число колонн, на которые виртуально разрезается башня этапа  $j$ ) и последовательность целочисленных векторов (параметров надстроек)

$$\bar{s}_j = (s_j(1), s_j(2), \dots, s_j(r_j - 1), s_j(r_j)).$$

На шаге  $j = 1$  задан полуинтервал  $C_1$ . Пусть на шаге  $j$  определена система непересекающихся полуинтервалов  $C_j, TC_j, \dots, T^{h_j-1}C_j$ , причем на  $C_j, \dots, T^{h_j-2}C_j$  преобразование  $T$  является параллельным переносом. Такой набор полуинтервалов называется башней этапа  $j$ , их объединение обозначается через  $X_j$  и тоже называется башней.

Представим  $C_j$  в виде дизъюнктного объединения полуинтервалов  $C_j^i$ ,  $i = 1, 2, \dots, r_j$ , одинаковой длины. Для каждого  $i = 1, 2, \dots, r_j$  рассмотрим так называемую колонну

$$C_j^i, TC_j^i, T^2C_j^i, \dots, T^{h_j-1}C_j^i.$$

К каждой колонне с номером  $i$  добавим  $s_j(i)$  непересекающихся полуинтервалов (этажей) длины, равной длине интервала  $C_j^i$ . Полученные наборы интервалов при фиксированных  $i, j$  называем надстроенными колоннами  $X_{i,j}$ . Отметим, что при фиксированном  $j$  по построению колонны  $X_{i,j}$  не пересекаются. Используя параллельный перенос интервалов, преобразование  $T$  теперь доопределим так, чтобы колонны  $X_{i,j}$  имели вид

$$C_j^i, TC_j^i, \dots, T^{h_j}C_j^i, T^{h_j+1}C_j^i, \dots, T^{h_j+s_j(i)-1}C_j^i,$$

а верхние этажи колонн  $X_{i,j}$  ( $i < r_j$ ) преобразование  $T$  параллельным переносом отображало в нижние этажи колонн  $X_{i+1,j}$ :

$$T^{h_j+s_j(i)}C_j^i = C_j^{i+1}, \quad 0 < i < r_j.$$

Положив  $C_{j+1} = C_j^1$ , замечаем, что все указанные этажи надстроенных колонн в новых обозначениях имеют вид

$$C_{j+1}, TC_{j+1}, T^2C_{j+1}, \dots, T^{h_{j+1}-1}C_{j+1},$$

образуя башню этапа  $j + 1$  высоты

$$h_{j+1} = h_j r_j + \sum_{i=1}^{r_j} s_j(i).$$

Частичное определение преобразования  $T$  на этапе  $j$  сохраняется на всех последующих этапах. В результате получаем пространство  $X = \cup_j X_j$  и обратимое преобразование  $T : X \rightarrow X$ , сохраняющее стандартную меру Лебега  $\mu$  на  $X$ .

#### 4 Доказательство леммы 2. Вынуждение перемешивания

Известно, что в случае  $r_j \rightarrow \infty$ ,  $s_j(i) = i$ , соответствующая лестничная конструкция  $S$  является перемешивающей [1], [9]. Пусть конструкция  $T$  похожа на  $S$ :

$$s_j(i) = i, \quad 1 \leq i \leq [(1 - \varepsilon_j)r_j], \quad 0 < \varepsilon_j < 1.$$

Для  $i > [(1 - \varepsilon_j)r_j]$  параметры  $s_j(i)$  выбираем произвольно, но будем считать, что высоты  $h_j$  у конструкций  $S$  и  $T$  одинаковы, т.е. суммы  $\sum_{i=1}^{r_j} s_j(i)$  одинаковы для  $S$  и  $T$ .

Для нас важно, что при  $\varepsilon_j \rightarrow +0$  конструкция  $T$  перемешивает, это доказывается так же, как и для лестничной конструкции  $S$ .

##### Частичная жесткость, частичное перемешивание.

Пусть  $0 < \varepsilon < 1$ ,  $\varepsilon_j = \varepsilon$ , рассмотрим конструкцию с параметрами

$$s_j(i) = i, \text{ если } 0 < i \leq [(1 - \varepsilon)r_j],$$

$$s_j(i) = v_j, \text{ если } [(1 - \varepsilon)r_j] < i < r_j,$$

$s_j(r_j)$  выбираем так, чтобы высоты  $h_j$  для  $T$  и  $S$  были одинаковы.

Указанная конструкция  $T$  обладает  $\varepsilon$ -жесткостью: если  $\|f\| = 1$ ,  $\int_X f d\mu = 0$ , то

$$(T^{h_j+v_j} f, f) \rightarrow \varepsilon.$$

**Вынуждение перемешивания.** Пусть  $\varepsilon_k \rightarrow +0$ , фиксированны функции  $f_1, f_2, \dots$ . Мы находим последовательность конструкций  $T_k$  и возрастающую последовательность этапов  $j_k$  такую, что при  $n > k$  параметры конструкций  $T_n$  и  $T_k$  одинаковы для всех  $j \leq j_k$  при  $m_k = h_{j_k} + v_{j_k}$  будет выполнено

$$(T_k^{m_k} f_i, f_i) > \psi(m_k), \quad i = 1, 2, \dots, k. \quad (k)$$

Конструкция  $T$  по определению на всех этапах  $j \leq j_k$  имеет те же параметры, что и конструкция  $T_k$ , поэтому она будет перемешивающей (напомним, что свойство перемешивания для нее доказывается также как и для обычной лестничной конструкции).

Благодаря произвольному выбору (сколь угодно быстро растущих) этапов  $j_k$  мы можем обеспечить выполнение неравенства (k) при подстановке  $T$  вместо  $T_k$  (автоморфизмы  $T$  и  $T_k$  отличаются на множестве такой малой меры, что неравенство сохраняется). Это завершает доказательство леммы 2.

## 5 Эргодические средние и мягкое перемешивание

Переформулируем слегка теорему 1 работы [6].

**Теорема 2.** Пусть для эргодического автоморфизма  $T$ , некоторой ненулевой функции  $f \in L_1$  с нулевым средним и последовательности  $k_n \rightarrow \infty$  для почти всех  $x$  выполнено

$$\frac{1}{k_n} \sum_{i=1}^{k_n} T^i f(x) = o\left(\frac{1}{k_n}\right).$$

Тогда для почти всех  $x$  имеет место сходимость

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N T^{k_n} f(x) \rightarrow f(x).$$

В [6] показано, что перемешивающие автоморфизмы не удовлетворяют условиям теоремы 2, и высказана гипотеза о том, что этим свойством обладают только перемешивающие автоморфизмы. На самом деле этот класс существенно шире: он включает все мягко перемешивающие автоморфизмы, т.е. автоморфизмы без жесткого фактора (термин предложен в работе [4]). Отсутствие жесткого фактора означает отсутствие непостоянной функции  $\chi \in L_1$  такой, что для некоторой  $k_n \rightarrow \infty$  выполнено

$$\|T^{k_n} \chi - \chi\|_1 \rightarrow 0.$$

Покажем, что при выполнении условий цитируемой теоремы автоморфизм  $T$  не обладает мягким перемешиванием. Пусть последовательность функций  $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N T^{k_n} f$  сходится к  $f$  п.в., тогда она сходится по мере. С учетом абсолютной непрерывности интеграла Лебега получим сходимость по норме:

$$\left\| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N T^{k_n} f - f \right\|_1 \rightarrow 0, \quad (2)$$

что является несложным упражнением. Будем считать, что  $f$  - вещественная функция (общий случай сводится к этому стандартным способом). Пусть  $A = \{x : a < f(x) < b\}$ , причем выполнено  $0 < \mu(A) < 1$ . Так как  $f \neq const$ , такое множество  $A$  найдется. Из (2) вытекает, что

$$\left\| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N T^{k_n} \chi_A - \chi_A \right\|_1 \rightarrow 0.$$

Но это означает, что для фиксированного  $\varepsilon > 0$  для большинства индексов  $n$  выполнено  $\|T^{k_n}\chi_A - \chi_A\|_1 < \varepsilon$ . Устремляя  $\varepsilon$  к нулю, выбираем последовательность  $n(i)$  такую, что

$$\|T^{k_{n(i)}}\chi_A - \chi_A\|_1 \rightarrow 0, \quad k_{n(i)} \rightarrow \infty.$$

Таким образом,  $T$  не является мягко перемешивающим. Замечаем также, что ограничение автоморфизма  $T$  на минимальную  $T$ -инвариантную сигма-алгебру, относительно которой измерима функция  $f$ , является жестким фактором. При наличии жесткого фактора быструю сходимость средних обеспечивают кограницы [6]. Подведем итог.

**Теорема 3.** *Эргодический автоморфизм  $T$  удовлетворяет условию теоремы 2 только в том случае, когда он обладает нетривиальным жестким фактором.*

Среди многообразия мягко перемешивающих автоморфизмов, не обладающих свойством перемешивания, классическим примером является преобразование Чакона [5]. Среди недавних примеров отметим пуассоновские надстройки над преобразованиями ранга один с полиномиальными слабыми пределами, предложенными в [8]. Частично жесткие автоморфизмы из §4 также перемешивают мягко, но доказательство этого факта требует значительных усилий.

**Благодарности.** Автор признателен рецензенту за замечания.

## Список литературы

- [1] T.M. Adams, Smorodinsky’s conjecture on rank-one mixing, Proc. Amer. Math. Soc., 126 (1998), 739-744
- [2] St. Alpern, Conjecture: In general a mixing transformation is not two-fold mixing, Ann. Probab., 13:1 (1985), 310-313
- [3] А.И. Баштанов, Типичное перемешивание имеет ранг 1, Матем. заметки, 93:2 (2013), 163-171;  
A.I. Bashtanov, Generic Mixing Transformations Are Rank 1, Math. Notes, 93:2 (2013), 209-216
- [4] H. Furstenberg and B. Weiss, The finite multipliers of infinite transformation, Lecture Notes in Maths 688 Springer: 1978, 127-132.
- [5] A. del Junco, A.M. Rahe, L. Swanson, Chacon’s automorphism has minimal self-joinings, J. Analyse Math., 37 (1980), 276-284
- [6] И. В. Подвигин, О возможных оценках скорости поточечной сходимости в эргодической теореме Биркгофа, Сиб. матем. журн., 63:2 (2022), 379-390;  
I.V. Podvigin, On possible estimates of the rate of pointwise convergence in the Birkhoff ergodic theorem, Siberian Math. J., 63:2 (2022), 316-325
- [7] В.В. Рыжиков, Слабые пределы степеней, простой спектр симметрических произведений и перемешивающие конструкции ранга 1, Матем. сб., 198:5 (2007), 137-159;  
V.V. Ryzhikov, Weak limits of powers, simple spectrum of symmetric products, and rank-one mixing constructions, Sb. Math., 198:5 (2007), 733-754

- [8] В. В. Рыжиков, Слабое замыкание бесконечных действий ранга 1, присоединения и спектр, Матем. заметки, 106:6 (2019), 894-903;  
V.V. Ryzhikov, Weak Closure of Infinite Actions of Rank 1, Joinings, and Spectrum, Math. Notes, 106:6 (2019), 957-965
- [9] В.В. Рыжиков, О сохраняющих меру преобразованиях ранга один, Тр. ММО, 81:2 (2020), 281-318;  
V.V. Ryzhikov, Measure-preserving rank one transformations, Trans. Moscow Math. Soc., 81:2 (2020), 229-259
- [10] С.В. Тихонов, Полная метрика на множестве перемешивающих преобразований, Матем. сб., 198:4 (2007), 135-158;  
S.V. Tikhonov, A complete metric in the set of mixing transformations, Sb. Math., 198:4 (2007), 575-596



V. V. Ryzhikov

**Generic correlations and ergodic averages for strongly and mildly mixing automorphisms**

For a sequence  $\psi(n) \rightarrow +0$  and a square integrable non-zero function  $f$  for the generic mixing automorphisms  $T$  the set  $\{n : |(T^n f, f)| > \psi(n)\}$  is infinite. The mildly mixing automorphisms  $T$  do not have a convergence of nonzero averages  $\frac{1}{k_n} \sum_{i=1}^{k_n} T^i f(x)$  with the rate  $o\left(\frac{1}{k_n}\right)$ .

*Key words:* correlations, ergodic averages, generic mixing automorphisms, partial and mild mixing, partial rigidity.