

Gaussian factors, spectra, and P -entropy

Valery V. Ryzhikov

There is an infinite set (of continual cardinality) of pairwise disjoint Gaussian automorphisms with spectrally isomorphic even factors with Lebesgue spectrum.

1 Gaussian automorphisms with completely positive P -entropy

Among the transformations T preserving infinite measure there are a lot of T with singular spectrum whose convolution powers are equivalent to Lebesgue [9]. The corresponding Gaussian automorphisms $G(T)$ and Poisson suspensions $P(T)$ (see [1],[2], [3]) over such T have zero entropy. The metric properties of $G(T)$ and $P(T)$ can be very different: for example, Gaussian automorphisms are infinitely divisible, hence, $G(T)$ have large centralizers, while $P(T)$ have the trivial ones (see [4], [3]). The even factors $G_{ev}(T)$ ([2]) of such Gaussian automorphisms $G(T)$ are spectrally isomorphic: their spectrum is Lebesgue of infinite multiplicity. What non-spectral invariants of these factors can distinguish them? We use entropy invariants to show that *there is an uncountable family of orthogonal operators T such that the corresponding pairwise non-isomorphic Gaussian even factors $G_{ev}(T)$ have the same spectrum but different entropy properties.*

P -entropy. Let $P = \{P_j\}$ be a sequence of finite subsets in a countable infinite group. For a Probability-preserving action T of this group we define

$$h_j(T, \xi) = \frac{1}{|P_j|} H \left(\bigvee_{p \in P_j} T_p \xi \right),$$

$$h_P(T, \xi) = \limsup_j h_j(T, \xi),$$

$$h_P(T) = \sup_{\xi} h_P(T, \xi),$$

where ξ denotes a finite measurable partition of the probability space, and $H(\xi)$

is the entropy of the partition ξ :

$$H(\{C_1, C_2, \dots, C_n\}) = - \sum_{i=1}^n \mu(C_i) \ln \mu(C_i).$$

We will consider a special case of Kirillov-Kushnirenko entropy: the case of the action of the group Z , and the sets P_j are chosen in the form of increasing progressions $P_j = \{j, 2j, \dots, L(j)j\}$, $L(j) \rightarrow \infty$.

An automorphism G has **completely positive P-entropy** if $h_P(G, \xi) > 0$ for any non-trivial partition ξ .

Theorem 1. *If an automorphism S has zero entropy, then there is a Gaussian automorphism G and the sequence $P_j = \{j, 2j, \dots, L(j)j\}$, $L(j) \rightarrow \infty$, such that $h_P(S) = 0$ and G has completely positive P-entropy. Such S and G are disjoint: they do not admit nontrivial Markov wreath products.*

Lemma ([7]). *For a deterministic S there is a sequence of the form $P_j = \{j, 2j, \dots, L(j)j\}$, $L(j) \rightarrow \infty$, such that $h_P(S) = 0$.*

The disjointness of S and G follows from Theorem 4.1 of [8]. So we need to find a suitable G . Note that in [8] a suitable Poisson superstructure $P(T)$ was found over a specially selected transformation $T : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ of rank 1. If we consider T as an orthogonal operator on the space $L_2(\mathbf{R})$, which is endowed with a Gaussian measure, then the operator T induces an action $G(T)$ that preserves this measure.

Let an automorphism S be of zero entropy. By virtue of Lemma, we find a suitable sequence $P' = P_{j'}$ such that $h_{P'}(S) = 0$.

Following [8] and [9] for the sequence $P_{j'}$ we can find (see below) an orthogonal operator T and a subsequence $P = \{P_j\}$ such that the following conditions are satisfied:

- (i) T has a singular spectrum,
- (ii) the spectrum $T \otimes T$ is absolutely continuous,
- (iii) for T the condition (\perp^P) is satisfied.

Definition. Let H_j be a sequence of expanding finite-dimensional spaces in real $L_2(X)$ whose union is dense in $L_2(X)$. Let the orthogonal operator T satisfy

(\perp^P) : spaces $T^p H_j$, $p \in P_j$, are pairwise orthogonal.

Such T exists among Sidon transformations. Properties (i),(ii) have the constructions from [9], they are compatible with property (iii), which appeared in implicit form in the work of [8]. Let us recall what was made there. Some transformation T acted on $X = \cup_j X_j$, where X_j is an increasing sequence of sets whose measures tend to infinity. For each j , the sets $T^p X_j$, $p \in P_j$, do not intersect. Therefore, the spaces $T^p L_2(X_j)$, $p \in P_j$, where $L_2(X_j) := \{f \chi_{X_j} : f \in L_2(X)\}$ are pairwise orthogonal. We choose the required finite-dimensional H_j as subspaces of the spaces $L_2(X_j)$.

For a set $A \subset H_j$ measurable with respect to the Lebesgue measure on H_j , we define the cylindrical set $C_A = \{f : \pi_j f \in A\}$, where π_j is the orthoprojection on H_j . Due to the indicated orthogonality, we note that all sets $T^p C_A$, $p \in P_j$, are independent with respect to the Gaussian measure. The action of T on cylinders C_A is now denoted by $G(T)$. Due to the noted independence and asymptotical density of H_j , we obtain that $G(T)$ has completely positive P-entropy.

Thus, we can present an infinite set (in fact, of continual cardinality) of pairwise disjoint Gaussian automorphisms with spectrally similar even factors (with Lebesgue spectrum).

2 Гауссовские автоморфизмы с вполне положительной P-энтропией

P-энтропия (случай энтропии Кириллова-Кушниренко). Пусть $P = \{P_j\}$ — последовательность конечных подмножеств в счетной бесконечной группе. Для сохраняющего меру действия T этой группы на вероятностном пространстве определим

$$h_j(T, \xi) = \frac{1}{|P_j|} H \left(\bigvee_{p \in P_j} T_p \xi \right),$$

$$h_P(T, \xi) = \limsup_j h_j(T, \xi),$$

$$h_P(T) = \sup_{\xi} h_P(T, \xi),$$

где ξ обозначает конечное измеримое разбиение вероятностного пространства, а $H(\xi)$ — энтропия разбиения ξ :

$$H(\{C_1, C_2, \dots, C_n\}) = - \sum_{i=1}^n \mu(C_i) \ln \mu(C_i).$$

Мы рассмотрим случай действия группы Z , причем множества P_j выбираются в виде возрастающих прогрессий

$$P_j = \{j, 2j, \dots, L(j)j\}, \quad L(j) \rightarrow \infty.$$

Автоморфизм G имеет вполне положительную энтропию, если $h_P(G, \xi) > 0$ для всякого нетривиального разбиения ξ .

Теорема 1. *Если автоморфизм S имеет нулевую энтропию, то найдется гауссовский автоморфизм G и последовательность $P_j = \{j, 2j, \dots, L(j)j\}$, $L(j) \rightarrow \infty$, такие, что $h_P(S) = 0$ и G обладает вполне положительной P -энтропией. Такие S и G дизъюнкты: они не допускают нетривиальные марковские сплетения.*

Лемма ([7]). *Для детерминированного S найдется последовательность вида $P_j = \{j, 2j, \dots, L(j)j\}$, $L(j) \rightarrow \infty$, такая, что $h_P(S) = 0$.*

Дизъюнктность S и G вытекает из теоремы 4.1 работы [8]. Таким образом нам нужно найти подходящий G . Отметим, что в [8] была найдена подходящая пуассоновская надстройка $P(T)$ над специально подобранным преобразованием $T : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ранга 1. Если же рассматривать T как ортогональный оператор на пространстве $L_2(\mathbf{R})$, которое наделено гауссовской мерой, то оператор T индуцирует действие $G(T)$, которое сохраняет эту меру. Энтропийные свойства $P(T)$ и $G(T)$ в интересующей нас ситуации оказываются похожими.

Итак, дан автоморфизм S с нулевой энтропией. В силу леммы находим подходящую последовательность $P' = P_{j'}$, чтобы $h_{P'}(S) = 0$.

Следуя [8] для последовательности $P_{j'}$ найдем ортогональный оператор T и подпоследовательность $P = \{P_j\}$ такие, что выполнены условия:

- (i) T обладает сингулярным спектром,
- (ii) спектр $T \otimes T$ абсолютно непрерывен,
- (iii) для T выполнено условие (\perp^P) .

Определение. Пусть H_j – последовательность расширяющихся конечномерных пространств в $L_2(X)$, объединение которых плотно в $L_2(X)$. Пусть для ортогонального оператора T выполнено

(\perp^P) : пространства $T^p H_j$, $p \in P_j$, попарно ортогональны.

Такой T имеется среди сидоновских преобразований. Свойствами (i),(ii) обладают конструкции из работы [9], они совместимы со свойством (iii), которое в неявной форме фигурировало в работе [8]. Напомним, о чем там шла речь. Некоторое преобразование T действовало на $X = \cup_j X_j$, где X_j – возрастающая последовательность множеств, меры которых стремятся к бесконечности. Для каждого j множества $T^p X_j$, $p \in P_j$, не пересекаются. Поэтому пространства $T^p L_2(X_j)$, $p \in P_j$, где $L_2(X_j) := \{f \chi_{X_j} : f \in L_2(X)\}$ попарно ортогональны. Нужные конечномерные H_j выбираем как подпространства пространств $L_2(X_j)$.

Для множества $A \subset H_j$, измеримого относительно меры Лебега на H_j , определим цилиндрическое множество $C_A = \{f : \pi_j f \in A\}$, где π_j – ортогональная проекция на H_j . В силу указанной ортогональности замечаем, что все множества $T^p C_A$, $p \in P_j$, независимы относительно гауссовской меры. Действие T на цилиндрах C_A теперь обозначается через $G(T)$. В силу отмеченной независимости получается, что $G(T)$ обладает вполне положительной Р-энтропией.

Таким образом, мы можем предъявить бесконечно много (на самом деле континуум) попарно неизоморфных, но спектрально одинаковых четных факторов гауссовских автоморфизмов. Для пуассоновских надстроек ситуация иная. Метрические свойства $G(T)$ и $P(T)$ могут сильно различаться: например, гауссовы автоморфизмы бесконечно делимы, следовательно, $G(T)$ имеет обширный централизатор, а централизатор $P(T)$ для наших T будет тривиальным (см. [4], [6],[3]).

Список литературы

- [1] I.P. Kornfeld, Ya.G. Sinai, S.V. Fomin, Ergodic theory, Nauka, M., 1980.
- [2] D. Newton, W. Parry, On a factor automorphism of a normal dynamical system., Ann. Math. Stat. 37 (1966), 1528-1533.
- [3] F. Parreau, E. Roy, Prime Poisson suspensions, Ergodic Theory Dynam. Systems, 35:7 (2015), 2216-2230.
- [4] В. В. Рыжиков, Ж.-П. Тувено, Дизъюнктность, делимость и квазипростота сохраняющих меру действий, Функц. анализ и его прил., 40:3 (2006), 85-89
- [5] V. V. Ryzhikov, J.-P. Thouvenot, Disjointness, Divisibility, and Quasi-Simplicity of Measure-Preserving Actions, Funct. Anal. Appl., 40:3 (2006), 237-240
- [6] В. В. Рыжиков, Ж.-П. Тувено, О централизаторе бесконечного перемешивающего преобразования ранга один, Функц. анализ и его прил., 49:3 (2015), 88-91
V. V. Ryzhikov, J.-P. Thouvenot, On the Centralizer of an Infinite Mixing Rank-One Transformation, Funct. Anal. Appl., 49:3 (2015), 230-233
- [7] В.В. Рыжиков, Компактные семейства и типичные энтропийные инварианты сохраняющих меру действий, Тр. ММО, 82, № 1, МЦНМО, М., 2021, 137-145;
V.V. Ryzhikov, Compact families and typical entropy invariants of measure-preserving actions, Trans. Moscow Math. Soc., 82 (2021), 117-123
- [8] В. В. Рыжиков, Ж.-П. Тувено, Квазиподобие, энтропия и дизъюнктность эргодических действий, Функц. анализ и его прил., 58:1 (2024), 117-124;
V. Ryzhikov, J.-P. Thouvenot, Quasi-similarity, entropy and disjointness of ergodic actions, Funct. Anal. Appl., 58:1 (2024), 90-96
- [9] В.В. Рыжиков, Полиномиальная жесткость и спектр сидоновских автоморфизмов. Матем. сб., 215:7 (2024);
V.V. Ryzhikov, Polynomial rigidity and spectrum of Sidon automorphisms. Sb. Math., 215:7 (2024)