

# Spectral properties of dynamical tensor powers, and tensor factorizations of simple Lebesgue spectrum

Valery V. Ryzhikov

For every  $n > 0$  there is a unitary operator  $U$  such that the shift in  $l_2(\mathbf{Z})$  with simple Lebesgue spectrum is isomorphic to the tensor product  $U \otimes U^2 \otimes \dots \otimes U^{2^n}$ . There is an ergodic automorphism  $T$  with its symmetric tensor power  $T^{\odot n}$  of simple spectrum, and  $T^{\odot(n+1)}$  of absolutely continuous spectrum.

## 1 Introduction

A unitary operator  $U$  with simple spectrum (in other words, with spectrum of multiplicity 1) is equivalent to the operator of multiplication by a variable  $z \in \mathbf{C}$ ,  $|z| = 1$ , acting in space  $L_2(\mathbf{T}, \sigma)$ , where  $\sigma$  is a Borel measure on the unit circle  $\mathbf{T} = \{t : |t| = 1\}$ . Such a measure and any equivalent to it is called the spectral measure of the operator  $U$ . Direct sums (finite and countable) of such operators give a spectral representation for all possible unitary operators  $V$  in the separable Hilbert space.

The unitary operator is defined by the measure of the maximum spectral type  $\sigma_{max}$  and the function of spectral multiplicity  $\mathcal{M} : \mathbf{T} \rightarrow \mathbf{N} \cup \{\infty\}$ , measurable w.r. to  $\sigma_{max}$ .

One of the main questions in the spectral theory of actions with an invariant measure is: *which pairs  $(\sigma_{max}, \mathcal{M})$  correspond to the spectral representation of an ergodic automorphism  $T$ ?*

Is there an ergodic realization of the pair  $(\sigma_{max}, \mathcal{M})$  provided that  $\sigma_{max}$  is absolutely continuous, but the multiplicity function is bounded? This is unknown.

The special case when  $\mathcal{M} \equiv 1$  and  $\sigma_{max} = \lambda$  (the Lebesgue measure) is known as Banach's problem: in other words, is there an automorphism with simple Lebesgue spectrum?

The Banach problem consists of two problems. In Ulam's book he is talking about an automorphism of a space with infinite measure (isomorphic to a line

with the Lebesgue measure). In the case of an automorphism of a probability space, we consider its action on the space of functions from  $L_2$  with zero mean.

Candidates for the role of automorphisms with simple Lebesgue spectrum are automorphisms of rank 1 (see [1], [2]). Jean-Paul Thouvenot, however, suggested me that the examples are outside the class of rank 1 transformations. Without completely abandoning transformations of rank 1, we can still assume that a suitable example exists among products of the form  $S \otimes T$  and even among  $T \odot T$ , where  $S, T \in \text{Rank-1}$ . Such  $S, T$  must have singular spectra. Here, of course, only automorphisms of space with infinite measure are considered (for them, nonzero constants are not included in  $L_2$ , and the product  $S \otimes T$  has no coordinate factors). But even in the case of the probability space, the ergodic realization for the product  $S \otimes T$  of simple spectrum with an absolutely continuous component would be a new important result for the spectral theory of dynamical systems.

Thus we come to the question of compatibility of the following properties of ergodic automorphisms  $S, T$  (the case  $T = S$  is also of interest):

- (a.c.) the spectrum of  $S \otimes T$  is not singular;
- (f.m.) the spectrum  $S \otimes T$  is of finite multiplicity.

It is natural to first ask the question: *is there a pair of unitary operators  $S, T$  with continuous spectrum that satisfy (a.c.) + (f.m.)?*

The answer is yes even for  $T = S^2$ .

**Theorem 1.** *For every  $n > 0$  there is a unitary operator  $U$  such that the unitary operator with simple Lebesgue spectrum is isomorphic to the tensor product*

$$U \otimes U^2 \otimes \dots \otimes U^{2^n}.$$

Perhaps the reader will prefer to postpone reading this note and find the tensor factorization of the standard unitary shift in  $l_2(\mathbf{Z})$  in his own way, and then compare it with our approach.

Theorem 1 does not shed light on the Banach problem, since the spectra of operators of dynamic origin have their own specifics, but it can add enthusiasm

to the study spectra of automorphism tensor products.

As an example of some unusual behavior of the spectra of symmetric tensor powers, we present the following statement.

**Theorem 2.** *For  $n > 1$  there is an ergodic automorphism  $T$  such that the symmetric tensor power  $T^{\odot n}$  has simple spectrum, and the power  $T^{\odot(n+1)}$  has Lebesgue spectrum (the case  $n = 1$  is considered in [5]).*

We will describe the constructions of such automorphisms and communicate the idea proof of Theorem 2, restricting ourselves to the case  $n = 2$ .

## 2 Constructions

We fix the natural number  $h_1$ , the sequence  $r_j$  (the number of columns into which the tower of stage  $j$  is cut) and the sequence of integer vectors (spacer parameters)

$$\bar{s}_j = (s_j(1), s_j(2), \dots, s_j(r_j - 1), s_j(r_j)).$$

At step  $j$ , a system of disjoint half-intervals is defined

$$E_j, TE_j, T^2 E_j, \dots, T^{h_j-1} E_j,$$

and on half-intervals  $E_j, TE_j, \dots, T^{h_j-2} E_j$  the transformation  $T$  acts by parallel translation. Such a set of half-intervals is called a tower of stage  $j$ ; their union is denoted by  $X_j$  and is also called a tower.

Let us represent  $E_j$  as a disjoint union of  $r_j$  half-intervals

$$E_j^1, E_j^2, E_j^3, \dots, E_j^{r_j}$$

of the same length. For each  $i = 1, 2, \dots, r_j$  we define the column  $X_{i,j}$  as the union of intervals

$$E_j^i, TE_j^i, T^2 E_j^i, \dots, T^{h_j-1} E_j^i.$$

To each column  $X_{i,j}$  we add  $s_j(i)$  of disjoint half-intervals of the same measure as  $E_j^i$ , obtaining a set

$$E_j^i, TE_j^i, T^2 E_j^i, \dots, T^{h_j-1} E_j^i, T^{h_j} E_j^i, T^{h_j+1} E_j^i, \dots, T^{h_j+s_j(i)-1} E_j^i$$

(all these sets do not intersect). Denoting  $E_{j+1} = E_j^1$ , for  $i < r_j$  we set

$$T^{h_j+s_j(i)} E_j^i = E_j^{i+1}.$$

The set of superstructured columns is from now on considered as a tower of stage  $j + 1$ , consisting of half-intervals

$$E_{j+1}, TE_{j+1}, T^2 E_{j+1}, \dots, T^{h_{j+1}-1} E_{j+1},$$

Where

$$h_{j+1} + 1 = (h_j + 1)r_j + \sum_{i=1}^{r_j} s_j(i).$$

The partial definition of the transformation  $T$  at step  $j$  is preserved in all subsequent steps. As a result, an invertible transformation  $T : X \rightarrow X$  is defined on the space  $X = \cup_j X_j$ , preserving the standard Lebesgue measure on  $X$ .

Transformation  $T$  and its induced unitary operator  $T$ ,  $Tf(x) = f(Tx)$ , are denoted identically in the article. An automorphism of rank one is ergodic and has simple spectrum. It is known that the tower indicator  $X_1$  is a cyclic vector for the operator  $T$  with continuous spectrum, which is certainly true if the measure  $X$  is infinite.

## **An example of a construction $T$ for which $T^{\otimes 2}$ has spectral multiplicity 2, and spectrum of $T^{\otimes 3}$ is absolutely continuous.**

Let the sequence  $J_k$  be defined as follows:

$$J_1 = 1, J_{k+1} = J_k + (k + 1)^8.$$

**The parameters of  $T$ :**

$$r_j := (k + 1)^2, \text{ for } j(k) \leq j < j(k + 1);$$

$$s_j(1) := 2h_j - 1; \quad s_j(2) := 2h_j;$$

$$s_j(i) := 2^i h_j \text{ for } 2 < i \leq r_j,$$

$$\text{where } h_1 = 2, h_{j+1} = r_j h_j + \sum_{i=1}^{r_j} r_j s_j(i).$$

The value  $r_j = (k + 1)^2$  is repeated by many times, so for the sums

$$F_k = \sum_{J_k < j < J_{k+1}} \mathbf{1}_{T^{h_j} E_1} \otimes \mathbf{1}_{T^{h_j} E_1}$$

the functions  $F_k/\|F_k\|$  were asymptotically close to the indicator of the set

$$\bigsqcup_{0 \leq p,q \leq 1} T^p E_1 \times T^q E_1.$$

This is established by slightly modifying the methods of [5]. Thanks to such approximations, we obtain the following.

**Lemma.** *Let  $f = \mathbf{1}_{E_1} \times \mathbf{1}_{E_1}$ . Then for any  $m, n \in \mathbf{Z}$  any closed and  $T \otimes T$ -invariant space contains, together with the vector  $(T^m \otimes T^n)f$  all vectors*

$$(T^{m+1} \otimes T^n)f + (T^m \otimes T^{n+1})f.$$

From Lemma it now easily follows that  $T \otimes T$ -invariant space containing the vectors  $f$  and  $(T \otimes I)f$ , contains all vectors of the form  $(T^m \otimes T^n)f$ . This means that  $T \otimes T$  has a homogeneous spectrum of multiplicity 2. Consequently,  $T \odot T$  has simple spectrum, since

$$T \otimes T \cong (T \odot T) \oplus (T \odot T).$$

If  $\hat{\sigma}(n) = \mu(E_1 \cap T^n E_1)$ , then for the coefficients

$$c(n) := \hat{\sigma}(n)^3 = \hat{\sigma}^*(n)$$

the convergence of the series  $\sum_n c(n)^2$  can be directly verified. Consequently, the spectrum  $T^{\odot 3}$  is absolutely continuous, since the spectral type of the operator  $T^{\odot 3}$  is the convolution power  $\sigma^{\ast 3}$  of the spectral measure  $\sigma$  for the operator  $T$ . If the convergence of the indicated series is fast enough, then  $\sigma^{\ast 3}$  is guaranteed to be equivalent to the Lebesgue measure.

Numerous results on spectra of measure-preserving actions are described in [3]. To these the author can, for example, add constructive solutions to the Kolmogorov problem on the group property of the spectrum and the Rokhlin problem on the homogeneous spectrum in the class of mixing systems; solution of the Bergelson spectral question on the compatibility of rigid and mixing sequences; the answer to question of Oseledets on projections of a tensor square (spectral) measure.

### 3 Proof of Theorem 1

**Case n = 2.** On  $[0, 1]$  consider two sets  $A, B$ :

$$A = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{2^{2i}} : a_i \in \{0, 1\} \right\},$$

$$B = 2A = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2a_i}{2^{2i}} : a_i \in \{0, 1\} \right\}.$$

Now we define two measures with supports  $A$  and  $B$ , respectively. The first  $\sigma_1$  is the Bernoulli measure of type  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0)$ , the second measure  $\sigma_2$  is also Bernoulli of type  $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0)$ .

(i) Mapping  $C_2 : A \times B \rightarrow [0, 1]$ ,

$$C_2(a, b) = a + b,$$

we get an isomorphism of the spaces  $([0, 1]^2, \sigma_1 \times \sigma_2)$  and  $([0, 1], \lambda)$  ( $\lambda$  is the Lebesgue measure). This is easy to check (the standard method: the cylinder goes into the interval while maintaining the measure).

Let  $U$  be a multiplication operator acting in the space  $L_2([0, 1], \sigma_1)$  as follows:

$$Uf(x) = e^{2\pi ix} f(x).$$

Then the action of the operator  $V = U \otimes U^2$  on  $([0, 1]^2, \sigma_1 \times \sigma_1)$  is described by the formula

$$VF(x, x') = e^{2\pi i(x+2x')} F(x, x').$$

But for almost every  $y \in [0, 1]$  there are unique  $x, x' \in A$  such that  $x + 2x' = y$ , so by (i) the operator  $V$  is isomorphic to the operator of multiplication by  $z = e^{2\pi iy}$  in the space  $L_2([0, 1].\lambda)$ , which is what needed to be proved.

**Case n = 3.** Let's define

$$A = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{2^{3i}} : x_i \in \{0, 1\} \right\};$$

We note that for almost every  $y$  there are unique  $x, x', x'' \in A$  such that  $y = x + 2x' + 4x''$ , and the mapping

$$(x, x', x'') \rightarrow x + 2x' + 4x''$$

gives an isomorphism of spaces  $([0, 1]^3, \sigma_1^{\otimes 3})$  and  $([0, 1], \lambda)$ , where  $\sigma_1$  – Bernoulli measure of type  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0.0, 0, 0, 0.0)$ ,

Let  $U$  now denote the multiplication operator in the space  $L_2([0, 1], \sigma_1)$ :

$$Uf(x) = e^{2\pi ix} f(x).$$

Then the operator  $V_3 = U \otimes U^2 \otimes U^4$  is the multiplication by  $e^{2\pi i(x+2x'+4x'')}$  in the space  $([0, 1]^3, \sigma_1^{\otimes 3})$ , so it has simple Lebesgue spectrum.

Similar reasoning for  $\mathbf{n} > \mathbf{3}$ . On the set  $A$ ,

$$A = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{2^{ni}} : x_i \in \{0, 1\} \right\},$$

we consider halph-halp Bernoulli measure  $\sigma_1$ , then we see that the multiplication by  $e^{2\pi i(x+2x^1+\dots+2^nx^n)}$  is an operator on  $L_2(\sigma_1^{\otimes(n+1)})$  with simple Lebesgue spectrum. Thus, we get the operator  $U$ ,  $Uf(x) = e^{2\pi ix} f(x)$ , that acts in  $L_2(\sigma_1)$ , and the product  $U \otimes U^2 \otimes \dots \otimes U^{2^n}$  is of simple Lebesgue spectrum.

Theorem 1 is proved.

**Remarks.** We know how the spectral multiplicities of powers  $V^n$  grow: they are equal to  $n$ . We hope the reader will agree that it is interesting to know how the spectral multiplicities of the powers of  $U^n$  grow? They cannot grow asymptotically linearly, since in a tensor product we would see a superlinear growth. Similar question on the structure of the spectrum of the operator

$$\text{Gauss}(U)^n = \exp(U^n) = \bigoplus_{d=0}^{\infty} (U^{\odot d})^n$$

is interesting as well.

In [4] one of Oseledets' problems is solved: there exists a (spectral) measure  $\sigma$  such that for some dense set of directions the corresponding projections of  $\sigma \times \sigma$

(on the horizontal line) are absolutely continuous. At the same time for other directions that are dense too the corresponding projections along these directions are singular measures.

Let some projection of the measure  $\sigma \times \sigma$  be absolutely continuous, and all other projections that are sufficiently close in direction give singular measures. Osledets conjectured the impossibility of such a situation. Our example of  $\sigma_{1,1}$ , due to its self-similarity does not provide a counterexample, but perhaps a little similar to it.

Is there an operator  $U$  with  $U^{\odot n}$  of simple absolutely continuous spectrum?

## Список литературы

- [1] J. Bourgain, On the spectral type of Ornstein's class one transformation, Israel J. Math., 84 (1993), 53-63
- [2] V. V. Ryzhikov, Ergodic homoclinic groups, Sidon constructions and Poisson suspensions, Trans. Moscow Math. Soc., 75 (2014), 77-85
- [3] A. Kanigowski, M. Lemanczyk, Spectral theory of dynamical systems, Encyclopedia of Complexity and Systems Science, ed. R. Meyers, Springer, Berlin, 2020
- [4] V.V. Ryzhikov, Absolute continuity and singularity of spectra for the flows  $T_t \otimes T_{at}$ , Funct. Anal. Appl., 56:3 (2022), 225-228
- [5] V.V. Ryzhikov, Polynomial rigidity and spectrum of Sidon automorphisms. Sb. Math., 215:7 (2024)

# Спектральные свойства тензорных степеней преобразования и тензорные факторизации простого лебеговского спектра

В.В. Рыжиков

**Введение.** Унитарный оператор  $U$  с простым спектром (т.е. спектральная кратность равна 1, иначе говоря, у оператора есть циклический вектор) эквивалентен оператору умножения на переменную  $z \in \mathbf{C}$ ,  $|z| = 1$ , действующему в пространстве  $L_2(\mathbf{T}, \sigma)$ , где  $\sigma$  – борелевская мера на единичной окружности  $\mathbf{T} = \{t : |t| = 1\}$ . Такую меру и всякую эквивалентную ей называют спектральной мерой оператора  $U$ . Прямые суммы (конечные и счетные) таких операторов дают спектральное представление для всевозможных унитарных операторов  $V$  в сепарабельном гильбертовом пространстве.

Унитарный оператор полностью определяется мерой максимального спектрального типа  $\sigma_{max}$  и функцией кратности спектра  $\mathcal{M} : \mathbf{T} \rightarrow \mathbf{N} \cup \{\infty\}$ , измеримой относительно  $\sigma_{max}$ .

Один из главных вопросов спектральной теории действий с инвариантной мерой звучит так: *какие пары  $(\sigma_{max}, \mathcal{M})$  отвечают спектральному представлению эргодического автоморфизма  $T$ ?*

Есть ли эргодическая реализация пары  $(\sigma_{max}, \mathcal{M})$  при условии, что  $\sigma_{max}$  абсолютно непрерывна, а функция кратности ограничена? Это неизвестно.

Специальный случай, когда  $\mathcal{M} \equiv 1$  и  $\sigma_{max} = \lambda$  – мера Лебега, известен как проблема Банаха: иначе говоря, существует ли автоморфизм с простым (однократным) лебеговским спектром?

Проблема Банаха состоит из двух задач. В книге Улама речь идет об автоморфизме пространства с бесконечной мерой (изоморфному прямой с мерой Лебега). В случае автоморфизма вероятностного пространства, рассматривается его действие на пространстве функций из  $L_2$  с нулевым средним.

Кандидатами на роль автоморфизмов с однократным лебеговским спектром являются автоморфизмы ранга 1 (см. [1], [2]). Жан-Поль Тувено, однако, высказывал предположение о том, что примеры находятся вне класса

са преобразований ранга 1. Не расставаясь полностью с преобразованиями ранга 1, можно предположить, что подходящий пример есть среди произведений вида  $S \otimes T$  и даже среди  $T \odot T$ , где  $S, T \in \text{Rank} - 1$ . Такие  $S, T$  должны обладать сингулярным спектром. Здесь, конечно, рассматриваются только автоморфизмы пространства с бесконечной мерой (для них ненулевые константы не входят в  $L_2$ , координатные факторы у произведения  $S \otimes T$  отсутствуют). Но и в случае вероятностного пространства эргодическая реализация для произведения  $S \otimes T$  простого спектра с абсолютно непрерывной компонентой была бы новым важным результатом для спектральной теории динамических систем.

Таким образом, мы подошли к вопросу о совместности следующих свойств пары  $S, T$  эргодических автоморфизмов (случай  $T = S$  также представляет интерес):

- (a.c.) спектр  $S \otimes T$  имеет абсолютно непрерывную компоненту,
- (f.m.) спектр  $S \otimes T$  конечнократный.

Естественно предварительно задаться вопросом: найдется ли пара унитарных операторов  $S, T$  с непрерывным спектром, удовлетворяющих (a.c.) + (f.m.)?

Ответ положительный даже при  $T = S^2$ .

**Теорема 1.** Для всякого  $n > 0$  найдется унитарный оператор  $U$  такой, что унитарный оператор с простым лебеговским спектром изоморфен тензорному произведению

$$U \otimes U^2 \otimes \dots \otimes U^{2^n}.$$

Быть может, читатель предпочтет отложить чтение этой заметки и найти тензорную факторизацию стандартного унитарного сдвига в  $l_2(\mathbf{Z})$  своим способом, а потом сравнить его с нашим подходом. Поэтому доказательство теоремы изложим чуть позже.

Теорема 1 не проливает свет на проблему Банаха, так как спектры операторов динамического происхождения имеют свою специфику, но может доба-

вить энтузиазма в изучении спектров тензорных произведений автоморфизмов.

В качестве примера непривычного поведения спектров симметрических тензорных степеней приведем следующее утверждение.

**Теорема 2.** Для  $n > 1$  найдется эргодический автоморфизм  $T$  такой, что симметрическая тензорная степень  $T^{\odot n}$  имеет простой спектр, а степень  $T^{\odot(n+1)}$  имеет лебеговский спектр (случай  $n = 1$  рассмотрен в [5]).

Ограничевшись случаем  $n = 2$ , опишем соответствующую конструкцию и сообщим схему доказательства.

**Конструкции автоморфизмов ранга один.** По традиции напоминаем нужное нам определение класса конструкций. Фиксируем натуральное  $h_1$ , последовательность  $r_j$  (число колонн, на которые разрезается башня этапа  $j$ ) и последовательность целочисленных векторов (параметров надстроек)

$$\bar{s}_j = (s_j(1), s_j(2), \dots, s_j(r_j - 1), s_j(r_j)).$$

На шаге  $j$  определена система непересекающихся полуинтервалов

$$E_j, TE_j, T^2E_j, \dots, T^{h_j-1}E_j,$$

а на полуинтервалах  $E_j, TE_j, \dots, T^{h_j-2}E_j$  преобразование  $T$  действует параллельным переносом. Такой набор полуинтервалов называется башней этапа  $j$ , их объединение обозначается через  $X_j$  и также называется башней.

Представим  $E_j$  как дизъюнктное объединение  $r_j$  полуинтервалов

$$E_j^1, E_j^2 E_j^3, \dots E_j^{r_j}$$

одинаковой длины. Для каждого  $i = 1, 2, \dots, r_j$  определим колонну  $X_{i,j}$  как объединение интервалов

$$E_j^i, TE_j^i, T^2E_j^i, \dots, T^{h_j-1}E_j^i.$$

К каждой колонне  $X_{i,j}$  добавим  $s_j(i)$  непересекающихся полуинтервалов той же меры, что у  $E_j^i$ , получая набор

$$E_j^i, TE_j^i, T^2 E_j^i, \dots, T^{h_j-1} E_j^i, T^{h_j} E_j^i, T^{h_j+1} E_j^i, \dots, T^{h_j+s_j(i)-1} E_j^i$$

(все эти множества не пересекаются). Обозначив  $E_{j+1} = E_j^1$ , для  $i < r_j$  положим

$$T^{h_j+s_j(i)} E_j^i = E_j^{i+1}.$$

Набор надстроенных колонн с этого момента рассматривается как башня этапа  $j + 1$ , состоящая из полуинтервалов

$$E_{j+1}, TE_{j+1}, T^2 E_{j+1}, \dots, T^{h_{j+1}-1} E_{j+1},$$

где

$$h_{j+1} + 1 = (h_j + 1)r_j + \sum_{i=1}^{r_j} s_j(i).$$

Частичное определение преобразования  $T$  на этапе  $j$  сохраняется на всех следующих этапах. В итоге на пространстве  $X = \bigcup_j X_j$  определено обратимое преобразование  $T : X \rightarrow X$ , сохраняющее стандартную меру Лебега на  $X$ .

Преобразование  $T$  и индуцированный им унитарный оператор  $T$ ,  $Tf(x) = f(Tx)$ , в статье обозначаются одинаково. Автоморфизм ранга один эргодичен, имеет простой (однократный) спектр. Известно, что индикатор башни  $X_1$  является циклическим вектором для оператора  $T$  с непрерывным спектром, что заведомо выполнено, если мера  $X$  бесконечна.

**Пример конструкции  $T$ , для которой  $T^{\otimes 2}$  имеет спектральную кратность 2, спектр  $T^{\otimes 3}$  лебеговский.**

Пусть последовательность  $J_k$  определена так:

$$J_1 = 1, J_{k+1} = J_k + (k+1)^8.$$

Положим

$$r_j := (k+1)^2, \text{ при } j(k) \leq j < j(k+1);$$

$$s_j(1) := 2h_j - 1; \quad s_j(2) := 2h_j;$$

$$s_j(i) := 2^i h_j \text{ при } 2 < i \leq r_j,$$

где  $h_1 = 2$ ,  $h_{j+1} = r_j h_j + \sum_{i=1} r_j s_j(i)$ .

Значение  $r_j = (k+1)^2$  повторяется много раз ( $r_j^4$ ), чтобы для сумм

$$F_k = \sum_{J_k < j < J_{k+1}} \mathbf{1}_{T^{h_j} E_1} \otimes \mathbf{1}_{T^{h_j} E_1}$$

функции  $F_k / \|F_k\|$  асимптотически были близки к индикатору множества

$$\bigsqcup_{0 \leq p, q \leq 1} T^p E_1 \times T^q E_1.$$

Это устанавливается путем модификации метода работы [5]. Благодаря указанной аппроксимации получаем следующее утверждение.

**Лемма.** *Пусть  $f = \mathbf{1}_{E_1} \times \mathbf{1}_{E_1}$ . Тогда для всяких  $m, n \in \mathbf{Z}$  любое замкнутое и инвариантное относительно оператора  $T \otimes T$  пространство вместе с вектором  $(T^m \otimes T^n)f$  содержит вектор*

$$(T^{m+1} \otimes T^n)f + (T^m \otimes T^{n+1})f.$$

Из леммы легко вытекает, что  $T \otimes T$ -инвариантное пространство, содержащее векторы  $f$  и  $(T \otimes I)f$ , содержит все векторы вида  $(T^m \otimes T^n)f$ . Значит,  $T \otimes T$  обладает однородным спектром кратности 2. Следовательно,  $T \odot T$  имеет простой спектр, так как

$$T \otimes T \cong (T \odot T) \oplus (T \odot T).$$

Если  $\hat{\sigma}(n) = \mu(E_1 \cap T^n E_1)$ , то для коэффициентов

$$c(n) := \hat{\sigma}(n)^3 = \hat{\sigma}^*(n)$$

непосредственно проверяется сходимость ряда  $\sum_n c(n)^2$ . Следовательно, спектр  $T^{\odot 3}$  абсолютно непрерывный, так как спектральный тип оператора  $T^{\odot 3}$  есть сверточная степень  $\sigma^{*3}$  спектральной меры  $\sigma$  оператора  $T$ . Если сходимость указанного ряда достаточно быстрая, то  $\sigma^{*3}$  гарантированно эквивалентна лебеговской мере.

Многочисленные результаты о спектрах сохраняющих меру действий описаны в недавнем обзоре [3]. К ним автор может добавить, например, конструктивные решения задачи Колмогорова о групповом свойстве спектра и задачи Рохлина об однородном спектре в классе перемешивающих систем; новые реализации спектров для гауссовских и пуассоновских систем; решение задачи Оседедца о проекциях тензорного квадрата (спектральной) меры (см. работы 2020-2024 гг).

**Доказательство теоремы 1.** Сперва рассмотрим **случай  $n = 2$** . На отрезке  $[0, 1]$  определим множества  $A, B$ :

$$A = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{4^i} : a_i \in \{0, 1\} \right\},$$

$$B = 2A = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{b_i}{4^i} : b_i \in \{0, 2\} \right\}.$$

Рассмотрим теперь меры с носителями  $A$  и  $B$ , соответственно. Первая  $\sigma_1$  – бернуллиевская мера типа  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0)$ , вторая мера  $\sigma_2$  – бернуллиевская типа  $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0)$ .

(i) Отображение  $C_2 : A \times B \rightarrow [0, 1]$ ,

$$C_2(a, b) = a + b,$$

является изоморфизмом пространств  $([0, 1]^2, \sigma_1 \times \sigma_2)$  и  $([0, 1], \lambda)$  ( $\lambda$  – мера Лебега). Это несложно проверить (способ стандартный: цилиндр переходит в интервал с сохранением меры).

Пусть  $U$  – оператор умножения, действующий в пространстве  $L_2([0, 1], \sigma_1)$ ,

$$Uf(x) = e^{2\pi i x} f(x).$$

Тогда действие оператора  $V = U \otimes U^2$  на  $([0, 1]^2, \sigma_1 \times \sigma_1)$  описывается формулой

$$VF(x, x') = e^{2\pi i(x+2x')} F(x, x').$$

Но для почти всякого  $y \in [0, 1]$  найдутся единственныe  $x, x' \in A$  такие, что  $x + 2x' = y$ , поэтому в силу (i) оператор  $V$  изоморфен оператору умножения на  $z = e^{2\pi iy}$  в пространстве  $L_2([0, 1].\lambda)$ , что и требовалось доказать.

**Случай n = 3.** Определим

$$A = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{8^i} : x_i \in \{0, 1\} \right\};$$

Следует сказать, что определение множества  $A$  зависит от  $n$ .

Замечаем, что для почти всякого  $y$  найдутся единственныe  $x, x', x'' \in A$  такие, что  $y = x + 2x' + 4x''$ , причем отображение

$$(x, x', x'') \rightarrow x + 2x' + 4x''$$

является изоморфизмом пространств  $([0, 1]^3, \sigma_1^{\otimes 3})$  и  $([0, 1], \lambda)$ , где  $\sigma_1$  – мера Бернулли типа  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ .

Пусть  $U$  теперь обозначает оператор умножения в пространстве  $L_2([0, 1], \sigma_1)$ :

$$Uf(x) = e^{2\pi ix} f(x).$$

Тогда оператор  $V_3 = U \otimes U^2 \otimes U^4$  есть умножение на  $e^{2\pi i(x+2x'+4x'')}$  в пространстве  $([0, 1]^3, \sigma_1^{\otimes 3})$ , а в силу сказанного он имеет простой лебеговский спектр.

Общий случай  $n > 3$  рассматривается аналогично очевидным образом. Теорема доказана.

### Замечания, вопросы.

Мы знаем, как растут спектральные кратности степеней  $V^n$ , они равны  $n$ . Надеюсь, читатель согласится с тем, что любопытно узнать, как как растут спектральные кратности степеней  $U^n$ ? Они не могут асимптотически расти линейно, так как в тензорном произведении мы бы увидели степенной рост. Аналогичный вопрос об устройстве спектра оператора

$$Gauss(U)^n = \exp(U^n) = \bigoplus_{d=0}^{\infty} (U^{\odot d})^n$$

тоже интересен.

В [4] решена задача Оседедца: найдется мера  $\sigma$  такая, что плотны направления, когда проекции  $\sigma \times \sigma$  абсолютно непрерывны и одновременно плотны направления (на горизонтальную прямую), когда проекции  $\sigma \times \sigma$  сингулярны.

В.И. Оседедец высказал интересную гипотезу: *невозможна ситуация, когда проекция меры  $\sigma \times \sigma$  для некоторого направления абсолютно непрерывна, а все достаточно близкие направления дают сингулярные меры.* Наш пример, в силу самоподобия меры  $\sigma_1$  не дает контрпримера к гипотезе, но, быть может, слегка на него похож.

Существует ли оператор  $U$  такой, что  $U^{\odot n}$  обладает простым абсолютно непрерывным спектром?

## Список литературы

- [1] J. Bourgain, On the spectral type of Ornstein's class one transformation, Israel J. Math., 84 (1993), 53-63
- [2] V. V. Ryzhikov, Ergodic homoclinic groups, Sidon constructions and Poisson suspensions, Trans. Moscow Math. Soc., 75 (2014), 77-85
- [3] A. Kanigowski, M. Lemanczyk, Spectral theory of dynamical systems, Encyclopedia of Complexity and Systems Science, ed. R. Meyers, Springer, Berlin, 2020
- [4] V.V. Ryzhikov, Absolute continuity and singularity of spectra for the flows  $T_t \otimes T_{at}$ , Funct. Anal. Appl., 56:3 (2022), 225-228
- [5] V.V. Ryzhikov, Polynomial rigidity and spectrum of Sidon automorphisms. Sb. Math., 215:7 (2024)