

Лоренцевы задачи на группе Гейзенберга*

И.А. Галяев[†], Ю.Л. Сачков[‡]

11 июля 2024 г.

Аннотация

Рассмотрены две левоинвариантные лоренцевы задачи на группе Гейзенберга. К обеим задачам применен принцип максимума Понтрягина, получена параметризация аномальных и нормальных экстремальных траекторий. Исследованы множества достижимости и существование оптимальных траекторий.

Содержание

1	Группа Гейзенберга	2
2	Первая задача	2
2.1	Постановка задачи	2
2.2	Аномальный случай принципа максимума Понтрягина . . .	3
2.3	Нормальный случай принципа максимума Понтрягина . . .	5
2.4	Множество достижимости и существование оптимальных траекторий	7
3	Вторая задача	7
3.1	Постановка задачи	7
3.2	Аномальный случай принципа максимума Понтрягина . . .	8
3.3	Нормальный случай принципа максимума Понтрягина . . .	9
3.4	Множество достижимости и существование лоренцевых длиннейших	11
4	Заключение	12

*Работа поддержана грантом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС», грант No. 23-7-1-16-1.

[†]Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, ivan.galyaev@yandex.ru

[‡]Институт программных систем им. А.К.Айламазяна РАН, yusachkov@gmail.com

1 Группа Гейзенберга

Группа Гейзенберга есть пространство $G \simeq \mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$, это нильпотентная группа Ли с базисом левоинвариантных векторных полей

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial x} - \frac{y}{2} \frac{\partial}{\partial z}, \quad X_2 = \frac{\partial}{\partial y} + \frac{x}{2} \frac{\partial}{\partial z}, \quad X_3 = \frac{\partial}{\partial z}.$$

2 Первая задача

2.1 Постановка задачи

Сформулируем первую задачу Лоренца на группе Гейзенберга следующим образом [1]:

$$\dot{q} = \sum_{i=1}^3 u_i X_i, \quad q = (x, y, z) \in G, \quad (1)$$

$$u \in U = \{(u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3 \mid u_1^2 + u_2^2 - u_3^2 \leq 0, u_3 \geq 0\}, \quad (2)$$

$$q(0) = q_0 = (0, 0, 0), \quad q(t_1) = q_1, \quad (3)$$

$$J(\gamma) = \int_0^{t_1} \sqrt{u_3^2 - u_1^2 - u_2^2} dt \rightarrow \max. \quad (4)$$

Система управления (1) записывается в координатах следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{x} = u_1, \\ \dot{y} = u_2, \\ \dot{z} = -\frac{y}{2}u_1 + \frac{x}{2}u_2 + u_3, \end{cases} \quad (5)$$

Запишем общий вид функции Понтрягина

$$h_u^\nu = \langle p, \sum_{i=1}^3 u_i X_i \rangle - \nu \sqrt{u_3^2 - u_1^2 - u_2^2}, \quad p \in T^*M, \quad \nu \leq 0.$$

Пусть процесс $(u(t), q(t))$, $t \in [0, T]$, будет оптимальным, тогда выполняются следующие условия:

1. Гамильтонова система $\dot{p} = -\frac{\partial h_u^\nu}{\partial q}$, $\dot{q} = \frac{\partial h_u^\nu}{\partial p}$;
2. Условие максимума $h_{u(t)}^\nu(p(t), q(t)) = \max_{u \in \mathbb{R}^3} h_u^\nu(p(t), q(t))$;

3. Условие нетривиальности $(p(t), \nu) \neq (0, 0) \forall t \in [0, T]$.

Обозначим $h_i = \langle p, X_i \rangle$. Тогда функция Понтрягина выражается следующим образом:

$$h_u^\nu = u_1 h_1 + u_2 h_2 + u_3 h_3 - \nu \sqrt{u_3^2 - u_1^2 - u_2^2}.$$

В формулировке принципа максимума Понтрягина (ПМП), не ограничивая общности, достаточно рассмотреть два случая: $\nu = 0$ — аномальный случай и $\nu = -1$ — нормальный случай. Рассмотрим их подробно.

2.2 Аномальный случай принципа максимума Понтрягина

Пусть $\nu = 0$.

Определим $(a, b, c) = (p_1, p_2, p_3)$ как компоненты ковектора p в канонических координатах. Они изменяются по закону $\dot{p}_i = -\frac{\partial h_u^0}{\partial q_i}$.

Систему управления можно записать в виде:

$$\begin{cases} \dot{x} = u_1, \\ \dot{y} = u_2, \\ \dot{z} = -\frac{y}{2}u_1 + \frac{x}{2}u_2 + u_3, \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{a} = -c\frac{u_2}{2}, \\ \dot{b} = c\frac{u_1}{2}, \\ \dot{c} = 0. \end{cases}$$

Связь между h_i и p_i явно записывается как

$$\begin{cases} h_1 = a - c\frac{y}{2}, \\ h_2 = b + c\frac{x}{2}, \\ h_3 = c. \end{cases}$$

Функция Понтрягина h_u^0 принимает вид $h_u^0 = u_1 h_1 + u_2 h_2 + u_3 h_3$. Выясним, при каких условиях функция h_u^0 достигает максимума, и на каких управлениях $u \in U$.

h_i суть наперед заданные константы. Опишем пространство h_i , разделив его на 4 подмножества.

1) $h_1^2 + h_2^2 - h_3^2 \leq 0, h_3 \geq 0$.

Запишем ограничения для случая 1:

$$\begin{cases} u_3^2 \geq u_1^2 + u_2^2, \\ h_3^2 \geq h_1^2 + h_2^2. \end{cases}$$

Тогда справедливы следующие неравенства:

$$u_3^2 h_3^2 \geq u_1^2 h_1^2 + h_2^2 u_2^2 + u_1^2 h_2^2 + u_2^2 h_1^2,$$

$$u_1^2 h_1^2 + h_2^2 u_2^2 + u_1^2 h_2^2 + u_2^2 h_1^2 - (u_1 h_1 + u_2 h_2)^2 = (u_1 h_2 - u_2 h_1)^2 \geq 0.$$

Откуда следует, что

$$|u_3 h_3| \geq |u_1 h_1| + |u_2 h_2|.$$

Исследуем $u_3 h_3$. Если $h_3 > 0$, в совокупности с неограниченностью u_3 , то и $u_3 h_3$ неограниченна.

$u_3 = 0$ означает и $u_1 = u_2 = 0$.

Максимум функции h_u^0 либо не существует, либо решение тривиально.

2) $h_1^2 + h_2^2 - h_3^2 = 0, h_3 < 0$.

Согласно предыдущему пункту, $|u_3 h_3| \geq |u_1 h_1| + |u_2 h_2|$. Тогда:

$$h_u^0 \leq 0.$$

h_u^0 достигает максимума, когда $u_3^2 = u_1^2 + u_2^2$. Тривиальный случай дает максимум $h_u^0 = 0$. Рассмотрим и другие случаи достижения максимума.

3) $h_1^2 + h_2^2 - h_3^2 < 0, h_3 < 0$.

Почти аналогично 1 случаю.

$$\begin{cases} u_3^2 \geq u_1^2 + u_2^2, \\ h_3^2 \geq h_1^2 + h_2^2, \end{cases}$$

Только из-за строгого равенства $h_u^0 \neq 0$. То есть в любом случае функция отрицательна. Максимума нет.

4) $h_1^2 + h_2^2 - h_3^2 > 0$.

При $u = k(h_1, h_2, \sqrt{h_1^2 + h_2^2})$ получаем $h_u = k\sqrt{h_1^2 + h_2^2}(\sqrt{h_1^2 + h_2^2} + h_3) \rightarrow +\infty$ при $k \rightarrow +\infty$.

Поэтому в случае 4) максимума не существует.

В случае 2) $u_3^2 = u_1^2 + u_2^2$. Выбираем натуральную параметризацию $u_1^2 + u_2^2 = 1$. Максимум функции $h_u^0 = h_1 u_1 + h_2 u_2 + h_3 u_3 = 0$, когда она равна 0.

$$h_1 u_1 + h_2 u_2 - \sqrt{h_1^2 + h_2^2} \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 0.$$

$$u_1 = \frac{h_1}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}, u_2 = \frac{h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}.$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{h_1}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}, \\ \dot{y} = \frac{h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}, \\ \dot{z} = -\frac{yh_1}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} + \frac{xh_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} + 1, \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{h}_1 = -h_3h_2, \\ \dot{h}_2 = h_3h_1, \\ \dot{h}_3 = 0. \end{cases}$$

Положим $h_1^2 + h_2^2 = 1$, $h_3 = 1$. Перейдем к полярной координате $h_1 = \cos \theta$, $h_2 = \sin \theta$, $\theta = t + \theta_0$. Поэтому

$$\begin{cases} x = \sin(t - \theta_0) + \sin \theta_0, \\ y = \cos(t - \theta_0) - \cos \theta_0, \\ z = (t + \sin t)/2. \end{cases}$$

2.3 Нормальный случай принципа максимума Понтрягина

Пусть $\nu = -1$.

Выищем функцию Понтрягина для нормального случая:

$$h_u = h_u^{-1} = u_1h_1 + u_2h_2 + u_3h_3 + \sqrt{u_3^2 - u_1^2 - u_2^2}.$$

Рассмотрим несколько вариантов

1) $h_1^2 + h_2^2 - h_3^2 \leq 0$, $h_3 \geq 0$.

Если выбрать $(u_1, u_2, u_3) = k(h_1, h_2, h_3)$, то

$$h_u^{-1} \rightarrow +\infty, \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

Поэтому в случае 1) максимума не существует.

2) $h_1^2 + h_2^2 - h_3^2 > 0$.

При $u = k(h_1, h_2, \sqrt{h_1^2 + h_2^2})$ получаем $h_u = k\sqrt{h_1^2 + h_2^2}(\sqrt{h_1^2 + h_2^2} + h_3) \rightarrow +\infty$ при $k \rightarrow +\infty$.

Поэтому в случае 2) максимума не существует.

3) $h_1^2 + h_2^2 - h_3^2 = 0$, $h_3 < 0$.

Положим

$$\begin{aligned} u_3 &= \rho \cosh \alpha, & u_1 &= \rho \sinh \alpha \cos \beta, & u_2 &= \rho \sinh \alpha \sin \beta, \\ h_3 &= -R, & h_1 &= R \cos b, & h_2 &= R \sin b. \end{aligned}$$

Тогда $h_u = \rho(R(\sinh \alpha \cos(\beta - b) - \cosh \alpha) + 1) \rightarrow +\infty$ при $\beta = b$, $\alpha \rightarrow +\infty$, $\rho \rightarrow +\infty$.

Поэтому в случае 3) максимума не существует.

$$4) h_1^2 + h_2^2 - h_3^2 < 0, h_3 < 0.$$

Положим

$$\begin{aligned} u_3 &= \rho \cosh \alpha, & u_1 &= \rho \sinh \alpha \cos \beta, & u_2 &= \rho \sinh \alpha \sin \beta, \\ h_3 &= -R \cosh a, & h_1 &= R \sinh a \cos b, & h_2 &= R \sinh a \sin b. \end{aligned}$$

Тогда $h_u = \rho(R(\sinh \alpha \sinh a \cos(\beta - b) - \cosh \alpha \cosh a) + 1)$.

Если $R < 1$, то $h_u \rightarrow +\infty$ при $\beta = b$, $\alpha = a$, $h_u = \rho(1 - R)$, $\rho \rightarrow +\infty$.

Если $R > 1$, то $\max h_u = 0$ при $\rho = 0$.

Если $R = 1$, то $\max h_u = \sqrt{h_1^2 + h_2^2 - h_3^2} + 1$ при

$$(u_1, u_2, u_3) = (h_1, h_2, -h_3) / \sqrt{h_1^2 + h_2^2 - h_3^2}.$$

Поэтому в нормальном случае экстремали суть траектории гамильтоновой системы с гамильтонианом $H = (h_1^2 + h_2^2 - h_3^2)/2$:

$$\dot{h}_1 = -h_2 h_3, \quad (6)$$

$$\dot{h}_2 = h_1 h_3, \quad (7)$$

$$\dot{h}_3 = 0, \quad (8)$$

$$\dot{q} = h_1 X_1 + h_2 X_2 - h_3 X_3. \quad (9)$$

Без ограничения общности полагаем $h_1^2 + h_2^2 - h_3^2 = 1$. Тогда $H = 1/2$.

$$\begin{cases} \dot{x} = h_1, \\ \dot{y} = h_2, \\ \dot{z} = -y h_1 / 2 + x h_2 / 2 - h_3, \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{h}_1 = -h_2 h_3, \\ \dot{h}_2 = h_1 h_3, \\ \dot{h}_3 = 0. \end{cases}$$

Положим

$$h_3 = -\cosh a, \quad h_1 = \sinh a \cos \theta, \quad h_2 = \sinh a \sin \theta.$$

Тогда подсистема для h_i примет вид

$$\begin{cases} \dot{\theta} = -\cosh a, \\ \dot{h}_3 = 0. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} \theta = \theta_0 - t \cosh a, \\ h_1 = \sinh a \cos(\theta_0 - t \cosh a), \\ h_2 = \sinh a \sin(\theta_0 - t \cosh a), \\ h_3 = -\cosh a. \end{cases}$$

и

$$\begin{cases} x = \operatorname{th} a(\sin \theta_0 - \sin(\theta_0 - t \cosh a)), \\ y = \operatorname{th} a(\cos(\theta_0 - t \cosh a) - \cos \theta_0), \\ z = t(1/\cosh a + \cosh a)/2 + \operatorname{th}^2 a \sin(t \cosh a)/2. \end{cases}$$

2.4 Множество достижимости и существование оптимальных траекторий

Теорема 1. Система (1), (2) глобально управляема.

Доказательство. Следует из принципа максимума Понтрягина в геометрической формулировке [3]. \square

Следствие 1. Для любой точки $q \in M$ существует замкнутая допустимая траектория системы (1), (2) положительной длины (4).

Следствие 2. Для любых точек $q_0, q_1 \in M$ лоренцево расстояние между ними есть $d(q_0, q_1) = +\infty$. Поэтому не существует лоренцевой длинной, их соединяющей.

3 Вторая задача

3.1 Постановка задачи

Сформулируем вторую лоренцеву задачу на группе Гейзенберга следующим образом [1]:

$$\dot{q} = \sum_{i=1}^3 u_i X_i, \quad q = (x, y, z) \in G, \quad (10)$$

$$u \in U = \{(u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3 \mid -u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 \leq 0, u_1 \geq 0\}, \quad (11)$$

$$q(0) = q_0 = (0, 0, 0), \quad q(t_1) = q_1, \quad (12)$$

$$J(\gamma) = \int_0^{t_1} \sqrt{u_1^2 - u_2^2 - u_3^2} dt \rightarrow \max. \quad (13)$$

Обозначим $h_i = \langle p, X_i \rangle$. Тогда функция Понтрягина выражается следующим образом:

$$h_u^\nu = u_1 h_1 + u_2 h_2 + u_3 h_3 - \nu \sqrt{u_1^2 - u_2^2 - u_3^2}.$$

3.2 Аномальный случай принципа максимума Понтрягина

Пусть $\nu = 0$.

Определим $(a, b, c) = (p_1, p_2, p_3)$ как компоненты ковектора p в канонических координатах. Они изменяются по закону $\dot{p}_i = -\frac{\partial h_u^0}{\partial q_i}$:

Систему управления можно записать в виде:

$$\begin{cases} \dot{x} = u_1, \\ \dot{y} = u_2, \\ \dot{z} = -\frac{y}{2}u_1 + \frac{x}{2}u_2 + u_3, \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{a} = -c\frac{u_2}{2}, \\ \dot{b} = c\frac{u_1}{2}, \\ \dot{c} = 0. \end{cases}$$

Связь между h_i и p_i явно записывается как:

$$\begin{cases} h_1 = a - c\frac{y}{2}, \\ h_2 = b + c\frac{x}{2}, \\ h_3 = c. \end{cases}$$

Функция Понтрягина h_u^0 принимает вид $h_u^0 = u_1h_1 + u_2h_2 + u_3h_3$. Выясним, при каких условиях функция h_u^0 достигает максимума, и на каких управлениях $u \in U$.

h_i суть наперед заданные константы. Опишем пространство h_i , разделив его на 4 подмножества.

1) $h_2^2 + h_3^2 - h_1^2 \leq 0, h_1 \geq 0$.

Запишем ограничения для случая 1):

$$\begin{cases} u_1^2 \geq u_2^2 + u_3^2, \\ h_1^2 \geq h_2^2 + h_3^2, \end{cases}$$

Тогда справедливы следующие неравенства:

$$u_1^2h_1^2 \geq u_2^2h_2^2 + h_3^2u_3^2 + u_2^2h_3^2 + u_3^2h_2^2,$$

$$u_2^2h_2^2 + h_3^2u_3^2 + u_2^2h_3^2 + u_3^2h_2^2 - (u_2h_2 + u_3h_3)^2 = (u_2h_3 - u_3h_2)^2 \geq 0.$$

Откуда следует, что

$$|u_1h_1| \geq |u_2h_2| + |u_3h_3|.$$

Исследуем u_1h_1 . Если $h_1 > 0$, в совокупности с неограниченностью u_1 , то и u_1h_1 неограниченна.

$u_1 = 0$ означает и $u_2 = u_3 = 0$.

Максимум функции h_u^0 либо не существует, либо решение тривиально.

$$2) h_2^2 + h_3^2 - h_1^2 < 0, h_1 < 0.$$

Почти аналогично случаю 1).

$$\begin{cases} u_1^2 \geq u_2^2 + u_3^2, \\ h_1^2 \geq h_2^2 + h_3^2, \end{cases}$$

Только из-за строгого равенства $h_u^0 \neq 0$. То есть в любом случае функция отрицательна. Максимум нет.

$$3) h_2^2 + h_3^2 - h_1^2 > 0.$$

При $u = k(\sqrt{h_2^2 + h_3^2}, h_2, h_3)$ получаем $h_u = k\sqrt{h_2^2 + h_3^2}(\sqrt{h_2^2 + h_3^2} + h_1) \rightarrow +\infty$ при $k \rightarrow +\infty$.

Поэтому в случае 3) максимума не существует.

$$4) h_2^2 + h_3^2 - h_1^2 = 0, h_1 < 0.$$

$u_1^2 = u_2^2 + u_3^2$. Выбираем натуральную параметризацию $u_3 = -1, u_1^2 = u_2^2 + 1$.

Максимум функции $h_u^0 = h_1u_1 + h_2u_2 + h_3u_3 = 0$, когда она равна 0.
 $h_1^2 = h_2^2 + h_3^2, h_1^2 = h_2^2 + 1$, при этом $h_3 = -1. h_1u_1 + h_2u_2 + \sqrt{h_1^2 - h_2^2}\sqrt{u_1^2 - u_2^2} = 0$.

В аномальном случае управление имеет вид $u = (\sqrt{h_2^2 + h_3^2}, h_2, h_3)$, поэтому аномальные траектории светоподобны.

Пусть $h_1^0 = -\sqrt{(h_2^0)^2 + h_3^2}$. Тогда аномальные экстремали имеют следующий вид.

Если $h_3 = 0$, то $h_1, h_2 \equiv \text{const}$ и $x = -h_1^0 t, y = h_2^0 t, z = 0$.

Если $h_3 \neq 0$, то

$$\begin{aligned} h_1 &= |h_3|(\cosh C - \cosh \tau) + h_1^0, \\ h_2 &= h_3 \sinh \tau, \\ h_3 &\equiv \text{const}, \\ x &= \sinh \tau - \sinh C, \\ y &= \text{sgn } h_3(\cosh \tau - \cosh C), \\ z &= (h_3 t + \sinh(h_3 t))/2, \\ C &= \text{arsinh } \frac{h_2^0}{h_3}, \quad \tau = C + |h_3|t. \end{aligned}$$

3.3 Нормальный случай принципа максимума Понтрягина

Пусть $\nu = -1$.

Выпишем функцию Понтрягина для нормального случая:

$$h_u = h_u^{-1} = u_1 h_1 + u_2 h_2 + u_3 h_3 + \sqrt{u_1^2 - u_2^2 - u_3^2}.$$

Рассмотрим несколько вариантов

1) $h_2^2 + h_3^2 - h_1^2 \leq 0, h_1 \geq 0.$

Если выбрать $(u_1, u_2, u_3) = k(h_1, h_2, h_3)$, то

$$h_u^{-1} \rightarrow +\infty, \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

Поэтому в случае 1) максимума не существует.

2) $h_2^2 + h_3^2 - h_1^2 > 0.$

При $u = k(\sqrt{h_2^2 + h_3^2}, h_2, h_3)$ получаем $h_u = k\sqrt{h_2^2 + h_3^2}(h_1 + \sqrt{h_2^2 + h_3^2}) \rightarrow +\infty$ при $k \rightarrow +\infty.$

Поэтому в случае 2) максимума не существует.

3) $h_2^2 + h_3^2 - h_1^2 = 0, h_1 < 0.$

Положим

$$\begin{aligned} u_1 &= \rho \cosh \alpha, & u_2 &= -\rho \sinh \alpha \cos \beta, & u_3 &= -\rho \sinh \alpha \sin \beta, \\ h_1 &= -R \cosh b, & h_2 &= -R \sinh b, & h_3 &= -R. \end{aligned}$$

Тогда $h_u = \rho(R(-\cosh \alpha \cosh b + \sinh \alpha \sinh b \cos \beta + \sinh \alpha \sin \beta) + 1) \rightarrow +\infty$ при $b = 0, b \rightarrow +\infty, \alpha \rightarrow +\infty, \rho \rightarrow +\infty.$

Поэтому в случае 3) максимума не существует.

4) $h_2^2 + h_3^2 - h_1^2 < 0, h_1 < 0.$

Положим

$$\begin{aligned} u_1 &= \rho \cosh \alpha, & u_2 &= \rho \sinh \alpha \cos \beta, & u_3 &= \rho \sinh \alpha \sin \beta, \\ h_1 &= -R \cosh b, & h_2 &= R \sinh b, & h_3 &= R. \end{aligned}$$

Тогда $h_u = \rho(R(-\cosh \alpha \cosh b + \sinh \alpha \sinh b \cos \beta + \sinh \alpha \sin \beta) + 1) \rightarrow +\infty$ при $b = 0, b \rightarrow +\infty, \alpha \rightarrow +\infty, \rho \rightarrow +\infty.$

Если $R < 1$, то $h_u \rightarrow +\infty$ при $\beta = 0, b = \alpha, h_u = \rho(1 - R). \rho \rightarrow +\infty.$

Если $R > 1$, то $\max h_u = 0$ при $\rho = 0.$

Если $R = 1$, то $\max h_u = \sqrt{h_2^2 + h_3^2 - h_1^2} + 1$ при

$$(u_1, u_2, u_3) = (-h_1, h_2, h_3) / \sqrt{h_2^2 + h_3^2 - h_1^2}.$$

Поэтому в нормальном случае экстремали суть траектории гамильтоновой системы с гамильтонианом $H = (h_1^2 + h_2^2 - h_3^2)/2$:

$$\dot{h}_1 = -h_2 h_3, \quad (14)$$

$$\dot{h}_2 = h_1 h_3, \quad (15)$$

$$\dot{h}_3 = 0, \quad (16)$$

$$\dot{q} = -h_1 X_1 + h_2 X_2 + h_3 X_3. \quad (17)$$

Без ограничения общности полагаем $h_2^2 + h_3^2 - h_1^2 = 1$. Тогда $H = 1/2$.

$$\begin{cases} \dot{x} = -h_1, \\ \dot{y} = h_2, \\ \dot{z} = y h_1/2 + x h_2/2 + h_3, \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{h}_1 = -h_2 h_3, \\ \dot{h}_2 = h_1 h_3, \\ \dot{h}_3 = 0. \end{cases}$$

Если $h_3 = 0$, то $h_1, h_2 \equiv \text{const}$ и $x = -h_1 t$, $y = h_2 t$, $z = 0$.

Если $h_3 \neq 0$, то

$$\begin{aligned} x &= (h_2^0 (\cosh s - 1) - h_1^0 \sinh s)/h_3, \\ y &= (h_2^0 \sinh s - h_1^0 (\cosh s - 1))/h_3, \\ z &= ((2h_3^2 - (h_1^0)^2 + (h_2^0)^2)s + ((h_1^0)^2 - (h_2^0)^2) \sinh s)/(2h_3^2), \\ s &= h_3 t. \end{aligned}$$

3.4 Множество достижимости и существование лоренцевых длиннейших

Теорема 2. *Множество достижимости системы (10), (11) из точки q_0 за произвольное неотрицательное время есть*

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{q_0} &= \\ &= \{(x, y, z) \in M \mid 0 < |z| \leq (t + \sinh t)/2, t = \text{arcosh}((x^2 - y^2)/2 + 1)\} \cup \\ &\quad \cup \{(x, y, z) \in M \mid x \geq |y|, z = 0\}. \end{aligned}$$

Доказательство. Следует из теоремы Адамара о глобальном диффеоморфизме [4]. \square

Теорема 3. *Для любых точек $q_0 \in M$, $q_1 \in \mathcal{A}_{q_0}$ существует лоренцева длиннейшая, их соединяющая.*

Доказательство. Следует из теоремы о существовании лоренцевых длиннейших в глобально гиперболических лоренцевых многообразиях [1]. \square

4 Заключение

В данной работе начато исследование двух лоренцевых задач на группе Гейзенберга. К обеим задачам применен принцип максимума Понтрягина, получена параметризация аномальных и нормальных экстремальных траекторий. Исследованы множества достижимости и существование оптимальных траекторий.

В будущем планируется рассмотреть оптимальный синтез для первой задачи.

Список литературы

- [1] Beem, J.K., Ehrlich, P.E., Easley, K.L.: *Global Lorentzian Geometry*. Monographs Textbooks Pure Appl. Math. 202, Marcel Dekker Inc. (1996)
- [2] Сачков Ю.Л. *Введение в геометрическую теорию управления*, М.: URSS, 2021
- [3] А.А. Аграчев, Ю. Л. Сачков, *Геометрическая теория управления*, Физматлит, 2005.
- [4] Krantz S. G., Parks H. R., *The Implicit Function Theorem: History, Theory, and Applications*, Birkhauser, 2001.