

Некоммутирующие автоморфизмы с расходящимися эргодическими средними

В.В. Рыжиков

Аннотация

Остин и независимо Хуанг, Шао и Е нашли примеры пар некоммутирующих автоморфизмов, обладающих расходящимися двукратными эргодическими средними. Мы предлагаем новые примеры среди гауссовских и пуассоновских надстроек над специально подобранными преобразованиями с инвариантной сигма-конечной мерой.

Ключевые слова: расходимость эргодических средних, преобразования ранга один, гауссовские и пуассоновские надстройки, нулевая энтропия.

1 Введение

В статье [1] был задан вопрос о сходимости в пространстве $L_2(X, \mu)$ средних для последовательности вида $\{S^n f T^n g\}$, где $f, g \in L_\infty(\mu)$, а S, T – детерминированные автоморфизмы вероятностного пространства (X, μ) . Отметим, что авторы [1] доказали, что для таких S, T при $p \geq 2$ имеет место сходимость средних вида

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N S^n f T^{np} g.$$

В работах [2] и [3] разными способами построены подходящие пары T, S и $f, g \in L_\infty(X, \mu)$ с расходящейся последовательностью

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \int T^n f S^n g d\mu.$$

В нашей заметке предлагается еще одно решение, основанное на применении преобразований с сигма-конечной инвариантной мерой, будем называть их бесконечными преобразованиями. Пуассоновские и гауссовские надстройки над

подходящими преобразованиями дают упомянутый эффект расходимости. Опишем свойства наших автоморфизмов S, T . Для некоторого множества C , на большом временном промежутке для времени n из этого промежутка выполняется $S^n C = T^n C$, а потом для n из другого более долгого промежутка множества $S^n C$ и $T^n C$ являются независимыми. Эту ситуацию легко реализовать для бернуллиевского сдвига S и сопряженного с ним T . А для реализации с нулевой энтропией роль таких S, T успешно играют пуассоновские надстройки. В нашем случае $S = S' \times S'$, множество C и все $S^n C$ принадлежит координатной алгебре первого сомножителя S' . Степени T^n таковы, что длительное время, начиная с какого-то момента, мы наблюдаем $T^n C = S^n C$, потом T -динамика начинает постепенно перекачивать множества $T^n C$ в из одной в другую координатную алгебру. Начинается временной интервал, когда множества $T^n C$ долго пребывают во второй координатной алгебре автоморфизма S и по этой причине независимы от множеств $S^n C$, лежащих в первой координатной алгебре. Потом происходит перекачка обратно и наступает долгий период, когда $T^n C = S^n C$. Далее возрастающие интервалы совпадений чередуются с интервалами независимости множеств $T^n C$ и $S^n C$, обеспечивая расходимость обсуждаемых средних.

Теорема 1. *Существуют бесконечные автоморфизмы \mathbf{S}, \mathbf{T} , множество A положительной конечной меры и последовательность $\{N_m\}$ такая, что $|N_{m+1}|/|N_m| \rightarrow \infty$, причем $T^i A \cap S^i A = \emptyset$ для $i \in [N_{4k}, N_{4k+1}]$ и $T^i A = S^i A$ для $i \in [N_{4k+2}, N_{2k+3}]$.*

Для соответствующих гауссовских и пуассоновских надстроек S, T над \mathbf{S}, \mathbf{T} для некоторой неотрицательной функции $f \in L_\infty$ будет расходиться последовательность

$$a_N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \int T^n f S^n f d\mu.$$

При этом предельные точки последовательности a_N образуют отрезок $[c^2, c]$, $c = \int f d\mu$. Искомые S, T могут быть как перемешивающими, так и перемешивающими автоморфизмами с нулевой энтропией.

2 Бесконечные преобразования T, S .

Приступим к построению нужных примеров бесконечных преобразований. Ищем их в виде \mathbf{Z}_2 -расширений некоторой конструкции R ранга один. Определим ее.

Пусть заданы параметры $h_1 = 1$, $r_j \geq 2$ и наборы натуральных чисел

$$\bar{s}_j = (s_j(1), s_j(2), \dots, s_j(r_j)), \quad s_j(i) \geq 0, \quad j \in \mathbf{N}.$$

Фазовое пространство X для преобразования R , определенного ниже, представляет собой объединение башен

$$X_j = \bigsqcup_{i=0}^{h_j-1} R^i E_j,$$

где $R^i E_j$ — непересекающиеся полуинтервалы, называемые этажами.

На этапе j преобразование R определено как обычный перенос интервалов (этажей), но на верхнем этаже $R^{h_j-1} E_j$ башни X_j преобразование пока не определено. Башня X_j разрезается на r_j одинаковых узких подбашен $X_{j,i}$ (они называются колоннами), и над каждой колонной $X_{j,i}$ добавляется $s_j(i)$ новых этажей. Преобразование R по-прежнему определяется как подъем на этаж выше, но самый последний надстроенный этаж над колонной с номером i преобразование R отправляет в нижний этаж колонны с номером $i + 1$. Таким образом возникает новая башня

$$X_{j+1} = \bigsqcup_{i=0}^{h_{j+1}-1} R^i E_{j+1}$$

высоты

$$h_{j+1} = r_j h_j + \sum_{i=1}^{r_j} s_j(i),$$

где E_{j+1} — нижний этаж колонны $X_{j,1}$. Отметим, что доопределяя преобразование, мы полностью сохраняем предыдущие построения. Продолжая этот процесс до бесконечности, получаем обратимое преобразование $R : X \rightarrow X$, сохраняющее меру Лебега на объединении $X = \bigsqcup_j X_j$.

Автоморфизмы \mathbf{T}, \mathbf{S} . Пусть R — конструкция ранга один с параметрами $r_j = j$, $s_j(i) = jh_j$. Положим

$$\mathbf{X} = X \times \mathbf{Z}_2, \quad E = \bigsqcup_j (R^{h_{2j}} E_{2j} \sqcup R^{2jh_{2j}} E_{2j}).$$

Определим \mathbf{T}, \mathbf{S} следующим образом:

$$\begin{aligned} \mathbf{S}(x, z) &= (Rx, z), \\ \mathbf{T}(x, z) &= (Rx, z + 1), \quad x \in E, \\ \mathbf{T}(x, z) &= (Rx, z), \quad x \notin E. \end{aligned}$$

Лемма 2. Для $A = X_1 \times 0 \subset \mathbf{X}$ множества $\mathbf{T}^i A$ и $\mathbf{S}^i A$ не пересекаются при $h_{2j} < i < 2jh_{2j}$ и совпадают при $h_{2j+1} < i < 2jh_{2j+1}$.

Доказательство. Назовем координату z уровнем. Пусть $x \in X_1$. Заметим, что уровень точек $\mathbf{T}^i(x, z)$ меняется, когда точка $R^i x$ окажется в множестве $R^{h_{2j}} E_{2j}$. Поэтому $\mathbf{S}^i A$ и $\mathbf{T}^i A$ расположены на разных уровнях при $h_{2j} < i < 2jh_{2j}$. Уровень снова изменится, когда $R^i x$ встретит множество $R^{2jh_{2j}} E_{2j}$. При $h_{2j+1} < i < 2jh_{2j+1}$ выполняется $\mathbf{T}^i(x, z) = \mathbf{S}^i(x, z)$ и тем самым $\mathbf{S}^i A = \mathbf{T}^i A$.

3 Пуассоновские надстройки

Рассмотрим конфигурационное пространство X_\circ , состоящее из всех бесконечных счетных множеств x_\circ таких, что каждый интервал из пространств X содержит лишь конечное число элементов множества x_\circ .

Пространство X_\circ оснащается мерой Пуассона. Напомним ее определение. Подмножествам $A \subset X$ конечной μ -меры в конфигурационном пространстве X_\circ сопоставлены цилиндрические множества $C(A, k)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, по формуле

$$C(A, k) = \{x_\circ \in X_\circ : |x_\circ \cap A| = k\}.$$

Всевозможные конечные пересечения вида $\bigcap_{i=1}^N C(A_i, k_i)$ образуют полукольцо. На этом полукольце определена мера μ_\circ следующим образом: при условии, что измеримые множества A_1, A_2, \dots, A_N не пересекаются и имеют конечную

меру, положим

$$\mu_{\circ}(\bigcap_{i=1}^N C(A_i, k_i)) = \prod_{i=1}^N \frac{\mu(A_i)^{k_i}}{k_i!} e^{-\mu(A_i)}. \quad (*)$$

Пояснение: если множества A, B не пересекаются, то вероятность $\mu_{\circ}(C(A, k) \cap C(B, m))$ одновременного появления k точек конфигурации x_{\circ} в A и m точек конфигурации x_{\circ} в B равна произведению вероятностей $\mu_{\circ}(C(A, k))$ и $\mu_{\circ}(C(B, m))$. Другими словами, события $C(A, k)$ и $C(B, m)$ независимы. Так как множества A_1, A_2, \dots, A_N не пересекаются, в формуле (*) фигурирует произведение соответствующих вероятностей.

Классическое продолжение меры является пространством Пуассона (X_{\circ}, μ_{\circ}) , изоморфным стандартному вероятностному пространству Лебега. Автоморфизм T пространства (X, μ) естественным образом индуцирует автоморфизм T_{\circ} пространства (X_{\circ}, μ_{\circ}) , называемый пуассоновской надстройкой над T .

4 Доказательство теоремы 1

Пусть $A = X_1 \times \{0\} \subset \mathbf{X}$, рассмотрим цилиндр $C = C(A, m)$, фиксируя m . Из леммы 2 и определений пуассоновских надстроек непосредственно получаем следующее утверждение.

Лемма 3. *Обозначим $T = \mathbf{T}_{\circ}$, $S = \mathbf{S}_{\circ}$. Множества $S^i C$ и $T^i C$ независимы при $h_{2j} < i < 2jh_{2j}$ и совпадают при $h_{2j+1} < i < 2jh_{2j+1}$.*

Пусть $f = \chi_C$, $\mu_{\circ}(C) = c$, тогда из леммы 3 получим

$$\frac{1}{2jh_{2j}} \sum_{i=1}^{2jh_{2j}} \int S^i f T^i f d\mu_{\circ} \rightarrow c^2$$

и

$$\frac{1}{2jh_{2j+1}} \sum_{i=1}^{2jh_{2j+1}} \int S^i f T^i f d\mu_{\circ} \rightarrow c.$$

Аutomорфизмы S и T имеют нулевую энтропию. Пуассоновская надстройка S' над конструкцией ранга один имеют нулевую энтропию, поэтому энтропия $S = S' \times S'$ также нулевая.

Автоморфизмы S и T сопряжены, так как $\mathbf{V}\mathbf{S}\mathbf{V} = \mathbf{T}$, где инволюция \mathbf{V} определяется следующим образом: $\mathbf{V}(x, z) = (x, z + 1)$ для x из множества $\sqcup_j \sqcup_{i=h_{2j}+1}^{2jh_{2j}} R^i E_{2j}$, а для других x выполнено $\mathbf{V}(x, z) = (x, z)$.

Перемешивающие примеры S, T . Чтобы получить перемешивающие преобразования имеется много разных возможностей. Воспользуемся, например, бесконечными конструкциями R ранга один из работы [4]. Пусть $r_j = j$ и для большинства этапов выполнено $s_j(i) = jh_j + i$ (лестничные надстройки). Другие этапы пусть обеспечивают сингулярность (и даже простоту) спектра соответствующих гауссовских и пуассоновских надстроек, как это было изложено в см.[4].

Полагаем

$$\mathbf{X} = X \times \mathbf{Z}_2$$

и для некоторого бесконечного множества J (отвечающего немодифицированным этапам) определим

$$E = \bigsqcup_{j \in J} (R^{h_{2j}} E_{2j} \sqcup R^{2jh_{2j}} E_{2j})$$

и повторим определение преобразований \mathbf{S}, \mathbf{T} :

$$\mathbf{S}(x, z) = (Rx, z),$$

$$\mathbf{T}(x, z) = (Rx, z + 1), \quad x \in E, \quad \mathbf{T}(x, z) = (Rx, z), \quad x \notin E.$$

Для соответствующих пуассоновских надстроек также выполняется утверждение леммы 3.

Для гауссовских настроек аргументация расходимости по сути ничем не отличается от пуассоновского случая. Рассмотрим \mathbf{S}, \mathbf{T} как ортогональные операторы в L_2 , пусть S и T обозначают теперь их действия в вещественном пространстве L_2 , оснащенном инвариантной гауссовской мерой. Пользуясь тем, что ортогональность пространств обеспечивает независимость соответствующих цилиндрических множеств, в качестве f выбираем индикатор цилиндра с основанием на одномерном пространстве вектора χ_A . Так как \mathbf{S}, \mathbf{T} обладают сингулярным спектром, энтропия надстроек нулевая. Отметим, что гауссовские ав-

томорфизмы использовались в работе [2], для них другим способом подбирались подходящим образом ортогональные операторы.

Остается лишь заметить, что при $N_{4j} = h_{2j}$, $N_{4j+1} = 2jh_{2j}$, $N_{4j+2} = h_{2j+1}$, $N_{4j+3} = 2jh_{2j+1}$ выполняется утверждение теоремы 1.

5 Замечания

Автоморфизмы S и T оказались сопряженными. Это не случайно, поясним почему. Джойнинг ν автоморфизмов S и T – это $(S \times T)$ -инвариантная мера на $X \times X$ с проекциями μ на сомножители в $X \times X$. Пусть S и T дизъюнкты, то есть они обладают только тривиальным джойнингом $\nu = \mu \otimes \mu$. Известно, что из всякой последовательности $N' \rightarrow \infty$ можно выбрать подпоследовательность N_i такую, что для некоторого джойнинга ν выполнено

$$a_{N_i} = \frac{1}{N_i} \sum_{n=1}^{N_i} \int T^n f S^n g d\mu \rightarrow \int f \otimes g d\nu.$$

По условию S и T дизъюнкты, значит, $\nu = \mu \otimes \mu$, поэтому

$$a_{N_i} \rightarrow \int T f d\mu \int g d\mu.$$

В силу произвольного выбора $N' \rightarrow \infty$ получаем, что исходная последовательность a_N сходится. Таким образом, для контрпримера необходима недизъюнктность S и T , случай изоморфизма S и T здесь оптимален.

Отметим, что для типичной (в смысле категорий Бэра) пары автоморфизмов S, T верно, что S и T дизъюнкты, поэтому типична сходимость обсуждаемых средних.

Автоморфизмы S и T дизъюнкты, например, если S обладает нулевой, а T вполне положительной P -энтропией Кириллова-Кушниренко, что показано в работе [5]. Подходящие примеры в [5] предъявлены тоже в виде пуассоновских надстроек над преобразованиями ранга один.

Список литературы

- [1] N. Frantzikinakis, B. Host, Multiple recurrence and convergence without commutativity, *J.Lond. Math.Soc.(2)*107(2023),no.5,1635–1659.
- [2] T. Austin, Non-convergence of some non-commuting double ergodic averages, arXiv:2407.08630
- [3] W. Huang, S. Shao, X. Ye, A counterexample on multiple convergence without commutativity, arXiv:2407.10728
- [4] A.I. Danilenko, V.V. Ryzhikov, Mixing constructions with infinite invariant measure and spectral multiplicities, *Ergod. Th. Dynam. Sys.*, 31:3 (2011), 853-873
- [5] В.В. Рыжиков, Ж.-П. Тувено, Квазиподобие, энтропия и дизъюнктность эргодических действий, *Функц. анализ и его прил.*, 58:1 (2024), 117-124;
V. Ryzhikov, J.-P. Thouvenot, Quasi-similarity, entropy and disjointness of ergodic actions, *Funct. Anal. Appl.*, 58:1 (2024), 90-96