

# Über Chemotaxis

S. L. Vesely<sup>1</sup>

September 28, 2017

<sup>1</sup>I.T.B., C.N.R., via Fratelli Cervi 93, I-20090 Segrate(MI)  
Italy

email: [sara.vesely@itb.cnr.it](mailto:sara.vesely@itb.cnr.it)

**Keywords:** chemotaxis, brownian motion

**PACS:** 87.10+e – General theory and mathematical aspects

## Abstract

Wir bringen eine Analogie zwischen der im Titel erwähnten Eigenschaft von Lebewesen und den durch einen Temperaturgradienten hervorgerufenen Erscheinungen in Gasen. Dazu erörtern wir zwei einfache mathematische Verfahren zur Behandlung von Messdaten.

## 1 Einleitung

Chemotaxis ist ein bei Lebewesen beschriebener Vorgang [1]. Darunter versteht man das Streben von ein- sowie mehrzelligen Wesen in Richtung auf den Ursprung eines chemischen Reizes oder von ihm fort. Ersteres nennt man positive, zweiteres negative Chemotaxis.

Unser Interesse an dieser Erscheinung gilt hauptsächlich ihrer physikalischen Deutung. Im Unterschied zur rein mathematischen Modellierung, bei der es sich um die Wiedergabe einer bereits vorliegenden Erklärung handelt, sollte erstere die unmittelbaren, vertrauten Erfahrungen an Lebewesen ansprechen, und Kriterien und Mittel anwenden, die ihr eigen sind [2][3][4][5]. Damit wünschen wir keineswegs einen Vergleich zwischen der physikalischen und der biologischen Auffassung anzustellen, sind wir ja an keinem Wettbewerb um die Wahrheit, sondern an gemeinsame Erkenntnisse beteiligt.

Eine ziemliche Verwirrung entsteht dennoch, wenn man beiderseits von dem gleichen Bekenntnis ausgeht, dass biologische Abläufe aus den anorganischen Verbindungen lauter außerordentlichen und eigentümlichen Ereignissen zufolge auftauchen. Die Deutung eines Phänomens als „Wunder“ ist für sich genommen noch kein Widerspruch gegen seine Erklärbarkeit. Weil sich jedoch Wundern eine gewisse Einmaligkeit gesellt, und weil es sich gleichsam von selbst verbietet etwa vitalistische Prinzipien oder unwiederholbare Gesetzmäßigkeiten

in die Physiklehre einzuführen, greift der Physiker schließlich zu reduktionistischen Ansätzen.

Der angeführte Standpunkt - dass das Dasein alle üblichen Naturerscheinungen weit übertrifft - ist, was die Erlebnisse des einzelnen Individuums betrifft, vollkommen gerechtfertigt, und auch vom biologischen und ethischen Gesichtspunkt haben wir für diese Auffassung vieles übrig. Aber wenn es darum geht, ein nach physikalischen Kriterien vernünftiges Bild wiederholbarer Ereignisse zu entwerfen, um bestimmte empirische und experimentelle Befunde zu deuten, erscheint uns zweckmäßiger die Lebewesen schlechthin zu den beschreibbaren Naturerscheinungen zu zählen. Dazu kommt, dass der Logos Leben eher begrifflich von fachwissenschaftlichen Bestimmungen geprägt als kausal durch das komplexe Zusammenwirken der Systembestandteile bedingt zu sein scheint.

Nachdem wir diesen uns am Herzen liegenden Punkt vorausgeschickt haben, möchten wir noch zwei Punkte berühren. Zum ersten gibt es Tropismen, die wohl von Feldgradienten gesteuert werden könnten, darunter z.B. Phototropismus. In diesem Fall ruft das Lebewesen durch seine eigene Stellung im Lichtfeld eine Störung hervor, die es aus der zur Quelle gewandten Seite als einen hellen Umriss, aus der gegenüberliegenden Seite als einen Schatten wahrnehmen lässt. Im Unterschied dazu weist die Chemotaxis keinen starken Feldgradient auf. Wir sind nun der Meinung, dass eine physikalische Modellierung diesen Unterschied in der Beschreibung berücksichtigen sollte.

Der zweite Punkt ist folgender: Bei hochentwickelten Arten könnte man für positive Chemotaxis beispielsweise folgende Darstellungen bieten:

- Das Tier nimmt das chemische Signal wahr;
- Es stellt die Windrichtung fest;
- Um das Ziel zu erreichen, bewegt es sich gegen den Wind.

Oder auch:

- Das Tier bestimmt die Größe des chemischen Signals;
- Es speichert sie und seine zeitweilige Lage;
- Es erreicht probeweise eine neue Stelle, oder ändert nur seine Nasenspitzenstellung;
- Es schätzt die neue Intensität und vergleicht sie mit der gespeicherten Größe;
- Es schlägt die Richtung des zunehmenden Reizes ein.

Sollten sich derartige Darstellungen in allen Fällen als die einzig möglichen erweisen, dann verschöbe sich das Problem auf das Zentralnervensystem.

Doch wie steht es mit der Bewegung von Samenzellen zu den Eileitern? Sind Spermatozoen schon imstande etwas zu gewahren und sich daran zu erinnern? Wir werden versuchen diese wichtige Frage zu verneinen, indem wir eine von den Obengenannten abweichende Darstellung geben.

Die von uns zu beschreibenden Gegenstände sollen also, ohne das ortsabhängige Konzentrationsgefälle des Reizstoffes zu bemerken, sich in Richtung auf das chemische Ziel zu bewegen, und durch nichts weiteres als eine statistische Geschwindigkeitsverteilung gekennzeichnet sein.

Als erstes möchten wir ein Beispiel dieses statistischen Merkmals aus der Physiklehre entlehnen, damit jegliche Verknüpfung mit der Biologie aus bleibt. Dann beschreiben wir zwei weitere mathematische Modelle, die uns einfach genug erscheinen, um dasselbe Merkmal deutlich erkennen zu lassen, und die in unserer Hoffnung einem experimentellen Forscher erlauben sollten, nach und nach das mathematische Verfahren mit den Versuchsergebnissen zu vergleichen.

## 2 Anknüpfung an die kinetische Gastheorie

Wir möchten zunächst das chemotaktische Verhalten der mit einem optischen Mikroskop gut beobachtbaren Einzeller der brownischen Bewegung weniger nicht absetzender Körnchen in einer Wasserlösung gegenüberstellen [6]. Aus dem Vergleich zwischen diesen beiden Erscheinungen ergibt sich letzten Endes das mathematische Modell [7][8]. Beide Mal stellt sich während der Untersuchung ein Gefälle ein. Ein Mal ist es ein von der Beleuchtung des Präparats herrührendes Temperaturgefälle zwischen der dem Kondensator zugewandten Glasplatte des Objektträgers und dem Deckglas. Das andere Mal haben die aufgelösten Chemikalien auf den Wanderungssinn der Zellen Einfluss. Wir werden hier annehmen, dass der ganze Unterschied in der Stärke dieser Steigung bestehe. Weil die mittlere freie Weglänge der Zellen von ihrer Beweglichkeit, ihrer Konzentration und ihren Dimensionen abhängt, müssen die statistischen Schwankungen beider Systeme Verschiedenheiten aufweisen [1]. Aber der angenommenen Ähnlichkeit mit der brownischen Bewegung wegen, liefert dasselbe mathematische Modell unter günstigen Umständen, d.h. wenn wir Konvektionsterme vernachlässigen dürfen, auch die mittlere Verschiebung der Einzeller.

Zur Anwendung der kinetischen Gastheorie auf das Phänomen der Chemotaxis, brauchen wir noch auf die thermischen Erscheinungen der Gase, die eben mittels der erwähnten Theorie gedeutet wurden, Bezug zu nehmen. Dazu denken wir uns etwa die vertraute Erscheinung einer in feuchter Luft sich beschlagender Fensterscheibe. Wenn wir zwei eine Flüssigkeit enthaltende Reagenzgläser, von denen das eine auf einer tieferen Temperatur gehalten wird, mit einem leeren Rohr verbinden, beobachten wir, dass die Flüssigkeit sich im wärmeren Probierglas verdampft und auf der kälteren Glaswand verdichtet (und eventuell als Tröpfchen herabrinnt). Bekanntlich erklärt die kinetische Theorie diesen Sachverhalt, indem sie sich vom Gas ein aus vielen Massenzuständen bestehendes Muster anfertigt. Danach verlassen die „Gasmoleküle“ statistisch den Ort, wo ihre vom Wärmezustand bedingte Geschwindigkeit die größeren Werte hat, um zur kalten Wand hin zu wandern. Die gegen einen Reiz zu strebenden Einzeller bilden nun ein genaues Pendant dazu, wenn wir annehmen, dass ihre Bewegung in Richtung einer Verringerung der Geschwindigkeit erfolgt. Unserer Beschreibung nach wirkt folglich der chemische Reiz bei positiver Chemo-

taxis als Hemmstoff der Geschwindigkeit, während umgekehrt im Fall negativer Chemotaxis die Geschwindigkeit mit der Entfernung von der Quelle zunehmen soll. Nun heben wir hervor, dass das übernommene Modell im Prinzip direkt auf die Daten Anwendung findet, da die relative Lage der Zellen anhand des Mikroskops tatsächlich ermittelt werden kann. Deshalb stützt sich weder die positive noch die negative Chemotaxis auf thermodynamische Prinzipien und beide modellieren weiterhin zwei voneinander unabhängige Erscheinungen. Es handelt sich um ein Modell, weil Einzeller nicht in jeder Hinsicht als Punkte darstellbar sind.

Um das Molekülmodell durch ein für Zellen passendes Modell zu ersetzen, brauchen wir also in der Zustandsgleichung idealer Gase den Mittelwert der Geschwindigkeit der Zellen anstelle der Temperatur, und deren Konzentration mal derselben Geschwindigkeit statt des Druckes anzuwenden.

Wir möchten zum Schluss folgende zwei Bemerkungen machen:

- Zellen sind Energieverbraucher. Erhaltungssätze für mechanische Energie und Impuls gelten dagegen für den vollkommen elastischen Stoss zwischen Gasmolekeln.
- Die Proportionalität des Wertes von Konzentration mal Temperatur zum Druck entspricht keiner Eigenschaft des Systems mehr. Sie ist eher als Ansatz anzusehen.

### 3 Anwendung von Differentialgleichungen

Die Auffassung, wonach die Chemotaxis von einem über der Umgebung des Reizes aufgebauten (stetigen) Konzentrationsgradient eines chemischen Stoffes verursacht wird, scheint uns nicht ganz stichhaltig. Zum ersten: Physikalisch spielt dieser Gradient, was das Diffusionsbestreben der Zellen betrifft, etwa die Rolle eines osmotischen Drucks. Da laut Annahme die Erscheinung auf Chemikalien beruht, muss sich die örtliche Funktionalabhängigkeit des jeweiligen Stoffes angeben lassen. Aber entweder ist die Punktkonzentration des Reizes überall verschwindend klein, oder dessen Dichte, als Masse pro Volumeneinheit definiert, wächst über alle Maßen. Beruft man sich statt dessen auf eine mittlere Belegungsdichte, dann treten die Schwierigkeiten bei der Erklärung des Konzentrationsgradienten auf [9].

Zweitens. Soll die (stetige) Fortbewegung eines Einzellers strikt von der lagebedingten Versorgung mit Nahrungsmitteln bzw. Giften gesteuert werden, dann muss irgendein Mechanismus sowohl die Feststellung ihrer Zunahme als auch die Übertragung des Verspeisten auf Bewegung erlauben. In erster Annäherung, d.h. wenn das Tierchen als punktförmig angenommen wird, scheint uns die Vorstellung, wonach zwei angebrachte Fühler das Konzentrationsunterschied zu ermitteln erlaubten, nicht ganz befriedigend. Außerdem kann die Frage, ob der Zuwachs nicht zu geringfügig und zu sehr mit Schwankungen behaftet sei, um

eine gerichtete Fortbewegung im Gang zu setzen, trotzdem aufgeworfen werden. Wird der chemische Reiz über Chemorezeptoren ausschliesslich als Signal gespeichert, dann kommt die Umwandlung in Bewegung der Einschaltung eines Zentralnervensystems gleich [10][11].

Drittens. Wenn wir auf das mechanische Verständnis des biologisch ohnehin komplizierten Vorgangs [12][13] verzichten und die positive Chemotaxis laut der im vorigen Paragraph vorgeschlagenen Ähnlichkeit mit einer Verzögerung in Zusammenhang bringen, dürfen wir uns nicht mehr auf das gewöhnliche Newtonsche Bild der Bewegung stützen. Entsprechend erfahren Raum- und Zeitkoordinaten keine dynamische Deutung mehr, weshalb wir nur mangels eines besseren Ausdruckes von einer Diffusions*geschwindigkeit* weiterreden. Die mittlere Einzellerlage und deren Zeitabhängige Verteilung können aber in dem Wahrscheinlichkeitsraum gedeutet werden.

Wenn die Konzentration des die Beschleunigung oder die Verzögerung erregenden Stoffes stationär und von der Zellenbewegung unabhängig ist, dann hängt der Betrag der Zellengeschwindigkeit nur vom Ort (Zufallsvariable) ab. In einem eindimensionalen Bezugssystem (z.B. einem Rohr mit konstantem Durchmesser), gilt dann folgende Beziehung:

$$\frac{\partial}{\partial t}c(x, t) \propto \frac{\partial^2}{\partial x^2}[c(x, t)|\nu(x)|] \quad (1)$$

bei deren Ableitung man nach ähnlichen Methoden wie bei Diffusionsgleichungen vorgeht, wobei der Geschwindigkeitsbetrag  $|\nu(x)|$  ausdrücklich eingeführt worden ist.  $c(x, t)$  bezeichnet die Zellenanzahl pro Volumeneinheit.

Im Folgenden nehmen wir an, dass die Zellen sich auf einer im Ursprung des Achsenkreuzes liegenden Quelle zusammendrängen (positive Chemotaxis). Wir begnügen uns mit der Anwendung auf den stationären Zustand, also wenn:

$$\frac{\partial}{\partial t}c(x, t) = 0 \quad (2)$$

gilt, so dass, wenn wir:

$$c(x, t) = c_\infty(x) \quad (3)$$

setzen, die neue Gleichung

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}[c_\infty(x)|\nu(x)|] = 0 \quad (4)$$

gilt, deren Lösung

$$c_\infty(x)|\nu(x)| = k_1x + k \quad (5)$$

lautet. Da aber für ein willkürliches  $x$   $c_\infty(x) \geq 0$  und  $|\nu(x)| \geq 0$  gelten sollen, muss  $k_1 = 0$  sein. Somit erhält die Gleichung die von uns anzuwendende Form:

$$c_\infty(x) = \frac{k}{|\nu(x)|} \quad (6)$$

Da die Geschwindigkeit ein Minimum für  $x = 0$ , wo sich die Quelle befindet, besitzt, hat hier  $c_\infty(x)$  sein Maximum, wenn die (6) bezüglich Null beschränkt bleibt.

Als Anwendung auf unseres Modell führen wir noch zwei gegensätzliche Möglichkeiten an.

### 3.1 Positive Chemotaxis, 1. Grenzverteilung

Wenn der Hemmstoff ausreichend schwach ist, um  $|v(x)| > 0$  auch bei Null zu genügen, und der Raum sich zwischen den Grenzen  $[-1, +1]$  erstreckt, dann ist  $c_\infty(x)$  beschränkt, und man erkennt:

$$\int_{-1}^{+1} c_\infty(x) = N_{tot}$$

und

$$k = \frac{N_{tot}}{\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{v(x)}}$$

wo  $N_{tot}$  die Zellenanzahl ist.

### 3.2 Positive Chemotaxis, 2. Grenzverteilung

Wenn der Inhibitor stark genug ist, folgende Bedingungen zu erfüllen:

$$|v(x) = 0|$$

in  $x = 0$ , und

$$\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{v(x)} \rightarrow \infty,$$

dann häufen sich die Zellen im Ursprung auf.

## 4 Anwendung von Differenzengleichungen

Wenn wir eine geringe Anzahl von Einzellern im Mikroskop betrachten und die Beobachtungen nur für eine endliche Zeitspanne vornehmen, können wir zur Darstellung der Zellenfortpflanzung statt der Differentialgleichungen Differenzen anwenden.

Fassen wir zunächst einen einzigen Einzeller ins Auge [14]. Wenn wir jeweils dessen Verlagerung zum vorgegebenen Zeitpunkt notierten, handelten wir als ob wir bestrebt wären den zeitlichen Ablauf der Bewegung eines Massenpunktes in tabellarischer Form zusammenzufassen. Wird die Tabelle für äquidistante Zeiten angeschrieben, wie wir jetzt voraussetzen wollen, so sind die Differenzen (erste Steigungen) bereits in der von uns anzuwendenden Form erklärt. Aus diesen Steigungen lässt sich hinterher der Zeitverlauf anhand der Newtonschen Interpolationsformel berechnen. Obwohl sich ein bestimmter Verlauf ergibt, ändert jede neue Messung, sowie jede Wahl einer gröberen Zeitfolge auf die bereits angesammelten Daten das Ergebnis stark. Rein analytisch besagt das nur, dass der Steigungen keine eindeutige Kurve zugeordnet ist denn, gesetzt

die Kurve wäre differenzierbar, würde die Interpolationsformel zur ersten Ordnung eine Näherung dafür liefern. Der Unterschied zwischen der kinematischen Vorstellung der Bewegung und der von uns jetzt beabsichtigten Schätzung eines Mittelwertes für die zurückzulegende Strecke besteht also lediglich darin, dass wir, statt eines bestimmten Verlaufes anzunehmen, die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen wollen, dass nach  $n$  *voneinander unabhängigen* Schritten der Abstand von der Anfangslage einen bestimmten Wert beträgt. Es ist ersichtlich, dass die (klassischen) wahrscheinlichkeitstheoretischen Betrachtungen erst nach Preisgabe der Vorstellung, laut welcher die vorliegende Anordnung der Schritte mit der Entwicklung von sinnvollen Ereignissen verbunden ist, zur Geltung treten können. Dem gemäß kann die Bewegung *einer* Zelle weder als passives Gesteuertwerden noch als aktives Streben gedeutet werden.

Sinnvolle bzw. kennzeichnende Ereignisse treten auch bei mechanischer Reduktion nicht gut ein. Im Bereich der Mechanik fordert man zwar aus logischen Gründen, dass jede Veränderung der Bewegung eines bestimmten, vorgefassten Körpers einer Ursache bedürfen soll. Sind die Ursachen von Bestand, dann stimmt der Zeitverlauf mit dem aus der Bahn feststellbaren Werdegang dieses Körpers überein. Aber die dynamische Zeit erhellt aus keinem innigen Zusammenhang der Geschehnisse, sondern sie ist aus der (linearen) dynamischen Darstellung heraus erklärt worden. Dass keine zeitliche Entfaltung der Umstände vorliegt, leuchtet auch aus folgendem vielgebrauchtem Verfahren ein. Wenn wir die Strecke zwischen zwei Marken anhand eines Variationsprinzips bestimmen, enthält die Eulersche Differentialgleichung zum Problem eine beliebige Funktion des Zeitparameters. Nehmen wir nun nach Galilei an, dass bei freier Bewegung die Zeit proportional der durchlaufenen Strecke sei. Dann löst die Gleichung der Gerade das Extremalproblem im Sinne von Newtons erstem Gesetz. Die Zeit nach Galilei-Newton ist danach derjenige Parameter, nach dem die geodätische Kurve einen linearen Ausdruck erhält. Um Lage und Geschwindigkeit eines bestimmten Massenpunktes festzusetzen, müssen die Anfangsbedingungen dazu genommen werden, weil sie sich aus der Bahngleichung nicht ergeben. Sobald nun die Ursachen der Bewegung von den bewährten Kräften fernab stehen, und die Mechanik nur die Rolle eines Modells erfüllt, stellt die Bahn keinen Werdegang mehr dar. Dessenungeachtet sind von der Mathematik her die Anfangsbedingungen genauso willkürlich wie eher. Und ohne diese *jederzeit* frei wählbaren Angaben kennzeichnet man nicht den Zeitverlauf eines Teilchens, sondern nur die beste aller möglichen Bahnen zwischen zwei Marken.

Da nun unserer Meinung nach die mechanische Deutung der Chemotaxis weder der Steuerung der Diffusion noch der Nachahmung eines Erinnerungsvermögens dienen kann, setzen wir bis auf weiteres für ein (stichprobenweise) Einzeller:

$x_m$  die  $m$ .te Verschiebung

$f_m = \pm 1$  eine stochastische Funktion

$v_m = \alpha \cdot f_m \cdot x_m$  die  $m$ .te Geschwindigkeit

$\Delta t = \Delta t_1 = \Delta t_2 = \dots = \Delta t_m$  die gemeinsame Zeitspanne.

Das Glied  $m+1$  lautet dann:

$$x_{m+1} = x_m + \nu_m \cdot \Delta t_m \quad (7)$$

Anhand der eben gesetzten Definitionen können wir die (7) als:

$$x_{m+1} = x_m + \alpha \cdot f_m \cdot x_m \cdot \Delta t \quad (8)$$

oder als

$$\frac{x_{m+1}}{x_m} = 1 + \alpha \cdot f_m \cdot \Delta t \quad (9)$$

umschreiben. Für  $m = 1, 2, 3, \dots, n-1$  lautet sie explizite:

$$\begin{aligned} \frac{x_1}{x_0} &= 1 + \alpha \cdot \Delta t \cdot f_0 & m = 0 \\ \frac{x_2}{x_1} &= 1 + \alpha \cdot \Delta t \cdot f_1 & m = 1 \\ &\vdots \\ \frac{x_{n-1}}{x_{n-2}} &= 1 + \alpha \cdot \Delta t \cdot f_{n-2} & m = n - 2 \\ \frac{x_n}{x_{n-1}} &= 1 + \alpha \cdot \Delta t \cdot f_{n-1} & m = n - 1 \end{aligned} \quad (10)$$

Wenn wir in Reih und Glied beiderseits multiplizieren, bilden wir das Produkt:

$$\prod_{m=0}^{m=n-1} \frac{x_{m+1}}{x_m} = \prod_{m=0}^{m=n-1} (1 + \alpha \cdot \Delta t \cdot f_m) \quad (11)$$

oder:

$$\frac{x_1}{x_0} \cdot \frac{x_2}{x_1} \cdot \frac{x_3}{x_2} \dots \frac{x_n}{x_{n-1}} = (1 + \alpha \cdot \Delta t \cdot f_0) \dots (1 + \alpha \cdot \Delta t \cdot f_{n-1}) \quad (12)$$

das als

$$\frac{x_n}{x_0} = \prod_{m=0}^{m=n-1} (1 + \alpha \cdot \Delta t \cdot f_m) \quad (13)$$

ausgedrückt werden kann, wobei  $f_m$   $k$  mal den Wert  $+1$ , und folglich  $n-k$  mal den Wert  $n$  annimmt, und also  $x_n$   $n$  verschiedene Werte hat. Auf die Reihenfolge der Schritte kommt es, wie gesagt, nicht an.

Was die Statistik über  $n$  Zellen betrifft, wollen wir folgendes angeben. Für  $k = 0$  besteht eine einzige Lösung, weil  $f_m = -1$  für jedes  $m = 1, 2, \dots, n$ .

Für  $k = 1$  sind die Lösungen  $n$ , da man in die (13)  $f_m = 1$  für  $m = 1, 2, \dots, n$  der Reihe nach einzusetzen, und es jedes Mal mit den  $n-1$  übrigen Faktoren, in denen  $f_m$  den Wert  $-1$  beibehält, zu multiplizieren hat.

Man kann die kombinatorische Rechnung anwenden, um das allgemeine Resultat als

$$x_n = \begin{cases} x_0 \cdot (1 - \alpha \cdot \Delta t)^n & \binom{n}{0} = 1 \\ x_0 \cdot (1 - \alpha \cdot \Delta t)^{n-1} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta t) & \binom{n}{1} = n \\ \vdots & \\ x_0 \cdot (1 - \alpha \cdot \Delta t)^{n-k} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta t)^k & \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} \\ \vdots & \\ x_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta t)^n & \binom{n}{n} = 1 \end{cases} \quad (14)$$

auszudrücken.

Aus  $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$  ermittelt man zum Schluss die Wahrscheinlichkeiten  $P_n$  als

$$x_n = \begin{cases} x_0 \cdot (1 - \alpha \cdot \Delta t)^n & P_0 = \frac{1}{2^n} \\ \vdots & \\ x_0 \cdot (1 - \alpha \cdot \Delta t)^{n-k} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta t)^k & P_k = \frac{1}{2^n} \cdot \frac{n!}{(n-k)!k!} \\ \vdots & \\ x_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta t)^n & P_n = \frac{1}{2^n} \end{cases} \quad (15)$$

Ist  $n$  gerade, so gibt es ein einziges Häufigkeitsmaximum, und es beträgt:

$$x_n = x_0 (1 - \alpha \cdot \Delta t)^{n/2} (1 + \alpha \cdot \Delta t)^{n/2} = x_0 \{1 - \alpha^2 \cdot (\Delta t)^2\}^{n/2} \quad (16)$$

Ist dagegen  $n$  ungerade, dann ergeben sich zwei gleichwahrscheinliche Maxima:

$$\begin{aligned} x'_n &= x_0 (1 - \alpha \cdot \Delta t)^{(n+1)/2} (1 + \alpha \cdot \Delta t)^{(n-1)/2} = \\ &= x_0 (1 - \alpha^2 \cdot (\Delta t)^2)^{(n-1)/2} (1 - \alpha \cdot \Delta t) \\ x''_n &= x_0 (1 + \alpha \cdot \Delta t)^{(n+1)/2} (1 - \alpha \cdot \Delta t)^{(n-1)/2} = \\ &= x_0 (1 - \alpha^2 \cdot (\Delta t)^2)^{(n-1)/2} (1 + \alpha \cdot \Delta t) \end{aligned} \quad (17)$$

Lässt man  $n$  unbeschränkt wachsen und wird  $\alpha^2 (\Delta t)^2 < 1$  gewählt, so strebt diese Folge gegen Null.

Da man mit „Chemotaxis“ das Wandern von Zellen in Richtung eines chemischen Reizes oder fort von ihm bezeichnet, und wir Verfahren zur Berechnung vom Mittelwert der Entfernung von dem Reiz gebracht haben, erscheint uns unser Ansatz angemessen.

Nun möchten wir unseren Fall durch die Festlegung einiger Veränderlichen ergänzen: Zuerst haben wir die Stelle, aus der die chemische Anregung geht, auf Null zu setzen. Weiter verlangen wir, dass eine fingierte Reizdichte auf solche Weise zu- oder abnimmt, dass die Zellengeschwindigkeit linear von der Entfernung abhängt.  $\alpha\Delta t$  ist ein zusätzlicher Parameter. Die Bedingung, dass dessen Quadrat kleiner als Eins bleibt, schränkt die zulässigen Zellenverschiebungen auf Werte ein, welche kleiner als die jeweilige Entfernung vom Ursprung sind.

## 5 Zusammenfassung

Absicht dieser Schrift ist an einem Beispiel nachzuweisen, dass man keiner Vorstellung eines besonderen Mechanismus bedarf, um die Chemotaxis zu *beschreiben*. Die Modellierung lässt sich nämlich auf enzymatische Reaktionen, deren Anwendungen im Bereich der Erreger-Hemmstoffgleichungen liegen, zurückführen. Das bedeutet aber, dass man auf die Verwicklung mit komplexen integrierten Mechanismen verzichten kann, was bezüglich Einzeller von Bedeutung ist. Die hier gebrachten Modelle könnten anhand von Experimenten vielleicht weiterentwickelt und erweitert werden. Hier begnügen wir uns mit dem einfachen Schluss, dass ein chemischer Verzögerer der Bewegung eine positive (d.h. gegen den Ursprung), ein Beschleuniger dagegen eine negative Chemotaxis verursacht.

## Anmerkung

Das ist meine Wiedergabe einer während meines Doktorats auf Englisch geschriebenen Arbeit [15]. Auf der ArXiv-Datenbank erscheint sie, knappe fünf Jahre nach dem verfrühten Tod meines Doktorvaters, Herrn Prof. Dr. G. Viggiano.

## References

- [1] J. Adler, M. M. Dahl, J. gen. Microbiol **46** (1967) 161  
J. Adler, B. Templeton, J. gen. Microbiol **46** (1967) 175
- [2] E. Schrödinger, What is Life? - Cambridge University Press, Cambridge 1967
- [3] D. Hilbert, Natur und mathematisches Erkennen - Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin (1992)
- [4] S. Bleecken, Naturwissenschaften **77** (1990) 277

- [5] B.C. Mazzag, <http://arXiv:math.ca/0306245v1>
- [6] A. Böhm, A. Oppel, Taschenbuch der mikroskopischen Technik, **Nr.422** - Druck und Verlag von R.Oldenbourg, München u. Berlin 1912
- [7] E.F. Keller, L.A. Segel, J. theor. Biol. **30** (1971) 225  
E.F. Keller, L.A. Segel, J. theor. Biol. **30** (1971) 235
- [8] J.-P. Boon, B. Hergigny, Bull. Math. Biol. **48**,1 (1986) 1
- [9] A. Einstein, Z. Elektrochem. Angew. Chem. **13** (1907) 41  
A. Einstein, Z. Elektrochem. Angew. Chem. **14** (1908) 235
- [10] R.M. MacNab, D.E. Koshland Jr., Proc. Nat. Acad. Sci USA **69**,9 (1972) 2509
- [11] J.B. Armstrong, J. Adler, M.M. Dahl, J. Bacteriol. **93**,1 390
- [12] H.C. Berg, Nature **321** (1986) 200
- [13] G. Viggiano, C. Ho, Proc. Nat. Acad. Sci. USA **76** (1979) 3673
- [14] H.C. Berg, D.A. Brown, Nature **239** (1972) 500
- [15] R. Santamaria, E. Fontanella, S. Vesely, G. Viggiano, E. Tartaglione, Rend. Acad. Sci. Med. Chir. (Napoli) **140**(1986) 367