

РЕГУЛЯРНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА В  
ДВУСТОРОННЕЙ УТОЧНЕННОЙ ШКАЛЕ ПРОСТРАНСТВ

REGULAR ELLIPTIC BOUNDARY-VALUE PROBLEM IN  
A TWO-SIDED REFINED SCALE OF SPACES

В. А. МИХАЙЛЕЦ (V. A. MIKHAILETS), А. А. МУРАЧ (A. A. MURACH)

АННОТАЦИЯ. A regular elliptic boundary-value problem over a bounded domain with a smooth boundary is studied. We prove that the operator of this problem is a Fredholm one in the two-sided refined scale of the functional Hilbert spaces and generates a complete collection of isomorphisms. Elements of this scale are the isotropic spaces of Hörmander–Volevich–Paneah and some its modifications. A priori estimate for the solution is established and its regularity is investigated.

**Введение.** В работах Ж.-Л. Лионса, Э. Мадженеса [1] и Ю. М. Березанского, С. Г. Крейна, Я. А. Ройтберга [2, 3, 4, 5] установлены теоремы о полном наборе изоморфизмов, который осуществляет оператор регулярной эллиптической краевой задачи в двусторонней шкале пространств функций/распределений. Полнота набора означает, что указанные изоморфизмы выполняются между пространствами функций/распределений, которые имеют соответственно  $s$  и  $s - 2q$  производных, где  $s$  — произвольное вещественное число, а  $2q$  — порядок оператора. Позитивная часть двусторонней шкалы ( $s \geq 2q$ ) состоит из пространств Соболева, а негативная часть ( $s < 2q$ ) — из модифицированных специальным образом соболевских пространств. Известны две такие модификации. Модификация Лионса-Мадженеса состоит из некоторых *сужений* соболевских пространств, что позволяет обеспечить непрерывность краевых операторов в них. Иной подход предложен Я. А. Ройтбергом [3, 4, 5] и основывается на *расширении* соболевских пространств. Более того, обобщенное решение краевой задачи трактуется как вектор, компоненты которого принадлежат соболевским пространствам и связаны определенным образом между собой. Это позволило исследовать эллиптическую краевую задачу, правые части которой являются произвольными распределениями.

Теоремы о полном наборе изоморфизмов были доказаны Я. А. Ройтбергом [5] также для нерегулярных эллиптических краевых задач и краевых задач для эллиптических систем дифференциальных уравнений. В наиболее общем виде они установлены

---

*Date:* 10/12/2007.

2000 *Mathematics Subject Classification.* 35J40, 46E35.

*Key words and phrases.* Regular elliptic boundary-value problem, generalized solution, the Fredholm property, local smoothness of a solution, the Hörmander spaces, regularly varying function, interpolation with function parameter.

А. Н. Кожевниковым [6] для псевдодифференциальных эллиптических краевых задач. Эти теоремы имеют ряд важных приложений (см. [5] и приведенную там литературу). Среди них особое место занимают утверждения о повышении локальной гладкости решения эллиптической краевой задачи. В этой связи является актуальным изучение эллиптических задач в двусторонних шкалах пространств, дающих более тонкую градацию гладкостных свойств распределений, чем соболевская шкала. К их числу относятся гильбертова шкала специальных изотропных пространств Хермандера – Волевича – Панеяха [7, 8, 9, 10]

$$H^{s,\varphi} := H_2^{(\cdot)^s \varphi(\cdot)}, \quad \langle \xi \rangle := (1 + |\xi|^2)^{1/2},$$

где  $s \in \mathbb{R}$ , а функциональный параметр  $\varphi$  является медленно меняющейся на  $+\infty$  по Карамата функцией  $t \gg 1$ . В частности, допустима любая эталонная функция

$$\varphi(t) = (\log t)^{r_1} (\log \log t)^{r_2} \dots (\log \dots \log t)^{r_n}, \quad \{r_1, r_2, \dots, r_n\} \subset \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Эта *уточненная* шкала введена и изучена в [11, 12]. Она содержит соболевскую шкалу  $\{H^s\} \equiv \{H^{s,1}\}$ , привязана к ней числовым параметром  $s$ , но много тоньше нее.

Пространства  $H^{s,\varphi}$  очень естественно возникают в ряде спектральных задач: сходимости спектральных разложений самосопряженных эллиптических операторов почти всюду, по норме пространства  $L_p$  с  $p > 2$  или  $C$  (см. обзор [13]); спектральная асимптотика общих самосопряженных эллиптических операторов в ограниченной области, формула Г. Вейля, точная оценка остаточного члена в ней (см. [14, 15]) и др. Можно ожидать, что они окажутся полезными и в иных "тонких" вопросах. Благодаря своим интерполяционным свойствам  $H^{s,\varphi}$  занимают особое место среди пространств обобщенной гладкости, которые все активнее исследуются и используются в последние годы (см. обзор [16], недавние работы [17, 18] и приведенную там литературу).

В настоящей статье изучается регулярная эллиптическая краевая задача в двусторонней уточненной шкале пространств, негативная часть которой модифицирована по Ройтбергу. Доказано, что оператор этой задачи ограничен, фредгольмов и порождает полный набор изоморфизмов в такой шкале. Исследована уточненная локальная гладкость решения эллиптической задачи. В качестве приложения дано достаточное условие классичности обобщенного решения задачи.

Отметим для полноты изложения, что в позитивной части уточненной шкалы неоднородная эллиптическая краевая задача изучена ранее в [19, 12, 20]. *Полуоднородные* эллиптические краевые задачи можно исследовать в *двусторонних* уточненных шкалах *без* их модификации (см. [21, 22]). Однако, неоднородная краевая задача в негативной части шкалы не сводится к двум полуоднородным, т. к. их решения являются распределениями разной природы. Случай эллиптических ПДО в двусторонней уточненной шкале пространств на замкнутом компактном многообразии исследован авторами в [23, 24, 25]. Укажем также на работы [26, 27], где эллиптическая краевая задача изучалась в двусторонних модифицированных шкалах пространств Лизоркина-Трибеля и Никольского-Бесова.

**1. Постановка задачи и основной результат.** Пусть  $\Omega$  — ограниченная область в евклидовом пространстве  $\mathbb{R}^n$  ( $n \geq 2$ ) с границей  $\Gamma$ , которая является бесконечно гладким

замкнутым многообразием размерности  $n - 1$ . Предполагается, что область  $\Omega$  локально лежит по одну сторону от  $\Gamma$ . Обозначим  $\bar{\Omega} = \Omega \cup \Gamma$ .

Рассмотрим следующую неоднородную краевую задачу в области  $\Omega$ :

$$Au = f \text{ в } \Omega, \quad B_j u = g_j \text{ на } \Gamma \text{ при } j = 1, \dots, q. \quad (1.1)$$

Здесь и далее  $A$  — линейное дифференциальное выражение в  $\bar{\Omega}$  произвольного четного порядка  $2q \geq 2$ , а  $B_j$ , где  $j = 1, \dots, q$ , — граничное линейное дифференциальное выражение на  $\Gamma$  порядка  $m_j \leq 2q - 1$ . Все коэффициенты выражений  $A$  и  $B_j$  являются комплекснозначными функциями, бесконечно гладкими в  $\bar{\Omega}$  и на  $\Gamma$  соответственно. Положим  $B := (B_1, \dots, B_q)$ .

Всюду далее предполагается, что краевая задача (1.1) *регулярная эллиптическая*. Это означает [1, с. 137 - 138], [28, с. 167], что выражение  $A$  правильно эллиптическое в  $\bar{\Omega}$ , а набор граничных выражений  $B$  нормальный и удовлетворяет условию дополненности по отношению к  $A$  на  $\Gamma$ . Из условия нормальности вытекает, что порядки  $m_j$  граничных дифференциальных выражений все различны.

Наряду с задачей (1.1) рассмотрим краевую задачу

$$A^+ v = \omega \text{ в } \Omega, \quad B_j^+ v = h_j \text{ на } \Gamma \text{ при } j = 1, \dots, q. \quad (1.2)$$

Она формально сопряжена к задаче (1.1) относительно формулы Грина:

$$(Au, v)_\Omega + \sum_{j=1}^q (B_j u, C_j^+ v)_\Gamma = (u, A^+ v)_\Omega + \sum_{j=1}^q (C_j u, B_j^+ v)_\Gamma, \quad u, v \in C^\infty(\bar{\Omega}).$$

Здесь  $A^+$  — сопряженное к  $A$  линейное дифференциальное выражение порядка  $2q$  с коэффициентами класса  $C^\infty(\bar{\Omega})$ , а  $\{B_j^+\}$ ,  $\{C_j\}$ ,  $\{C_j^+\}$  — некоторые нормальные системы линейных дифференциальных граничных выражений с коэффициентами класса  $C^\infty(\Gamma)$ . Их порядки удовлетворяют условию:

$$\text{ord } B_j + \text{ord } C_j^+ = \text{ord } C_j + \text{ord } B_j^+ = 2q - 1.$$

Здесь через  $(\cdot, \cdot)_\Omega$  и  $(\cdot, \cdot)_\Gamma$  обозначены скалярные произведения в пространствах  $L_2(\Omega)$  и  $L_2(\Gamma)$  функций, интегрируемых с квадратом в  $\Omega$  и на  $\Gamma$  соответственно, а также естественные расширения по непрерывности этих скалярных произведений.

Положим

$$N := \{u \in C^\infty(\bar{\Omega}) : Au = 0 \text{ в } \Omega, \quad B_j u = 0 \text{ на } \Gamma \text{ для } j = 1, \dots, q\},$$

$$N^+ := \{v \in C^\infty(\bar{\Omega}) : A^+ v = 0 \text{ в } \Omega, \quad B_j^+ v = 0 \text{ на } \Gamma \text{ для } j = 1, \dots, q\}.$$

Поскольку задачи (1.1) и (1.2) являются регулярными эллиптическими, пространства  $N$  и  $N^+$  конечномерны [1, с. 191], [28, с. 168].

Для простоты формулировок предположим в этом пункте, что  $N = N^+ = \{0\}$ .

Напомним следующий классический результат [1, с. 191], [28, с. 169]: оператор  $(A, B)$ , соответствующий задаче (1.1), определяет топологический изоморфизм

$$(A, B) : H^s(\Omega) \leftrightarrow H^{s-2q}(\Omega) \times \prod_{j=1}^q H^{s-m_j-1/2}(\Gamma) \quad \text{при } s \geq 2q. \quad (1.3)$$

Здесь  $H^\sigma(\Omega)$  и  $H^\sigma(\Gamma)$ , где  $\sigma \in \mathbb{R}$ , — гильбертовы пространства Соболева в  $\Omega$  и на  $\Gamma$  соответственно.

Легко заметить, что этот результат не верен в случае произвольного вещественного  $s$ . Так, при  $s \leq m_j + 1/2$  нельзя задать на пространстве  $H^s(\Omega)$  граничный дифференциальный оператор  $B_j$ . Я. А. Ройтбергом [3], [5](п. 2.4) (см. также [4](гл. III, §6), [29](п. 7.9)) предложено следующее определение обобщенного решения краевой задачи (1.1), устраняющее этот недостаток.

В окрестности границы  $\Gamma$  запишем дифференциальные выражения  $A$  и  $B_j$  в виде

$$A = \sum_{k=0}^{2q} A_k D_\nu^k \quad \text{и} \quad B_j = \sum_{k=0}^{m_j} B_{j,k} D_\nu^k. \quad (1.4)$$

Здесь  $D_\nu := i \partial / \partial \nu$ , где  $\nu$  — орт внутренней нормали к границе  $\Gamma$ , а  $A_k$  и  $B_{j,k}$  — некоторые тангенциальные дифференциальные выражения. Интегрируя по частям, запишем следующую формулу Грина:

$$(Au, v)_\Omega = (u, A^+v)_\Omega - i \sum_{k=1}^{2q} (D_\nu^{k-1}u, A^{(k)}v)_\Gamma \quad (1.5)$$

для произвольных функций  $u, v \in C^\infty(\bar{\Omega})$ . Здесь  $A^{(k)} := \sum_{r=k}^{2q} D_\nu^{r-k} A_r^+$ , где  $A_r^+$  — дифференциальное выражение, сопряженное к  $A_r$ . С помощью предельного перехода получаем, что формула (1.5) справедлива для каждого распределения  $u \in H^{2q}(\Omega)$ . Обозначим:

$$u_0 := u \quad \text{и} \quad u_k := (D_\nu^{k-1}u) \upharpoonright \Gamma \quad \text{при} \quad k = 1, \dots, 2q. \quad (1.6)$$

В силу (1.4), (1.5) краевая задача (1.1) относительно искомой функции  $u \in H^{2q}(\Omega)$  равносильна системе условий

$$(u_0, A^+v)_\Omega - i \sum_{k=1}^{2q} (u_k, A^{(k)}v)_\Gamma = (f, v)_\Omega \quad \text{для любого} \quad v \in C^\infty(\bar{\Omega}), \quad (1.7)$$

$$\sum_{k=0}^{m_j} B_{j,k} u_{k+1} = g_j \quad \text{на} \quad \Gamma \quad \text{при} \quad j = 1, \dots, q. \quad (1.8)$$

Заметим, что эти условия имеют смысл в случае произвольных (вообще говоря, нерегулярных) распределений

$$u_0 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), \quad \text{supp } u_0 \subseteq \bar{\Omega}, \quad u_1, \dots, u_q \in \mathcal{D}'(\Gamma). \quad (1.9)$$

Здесь, как обычно, через  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  и  $\mathcal{D}'(\Gamma)$  обозначены линейные топологические пространства Шварца распределений в  $\mathbb{R}^n$  и на  $\Gamma$  соответственно. Поэтому введем следующее определение.

Вектор  $u = (u_0, u_1, \dots, u_{2q})$ , удовлетворяющий условию (1.9), называется *обобщенным (по Ройтбергу) решением* краевой задачи (1.1), если выполняются условия (1.7), (1.8).

Мы будем изучать обобщенные решения задачи (1.1) в специально подобранных парах гильбертовых пространств, построенных на основе семейства пространств

$$\{H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n) : s \in \mathbb{R}, \varphi \in \mathcal{M}\}.$$

Оно изучено авторами в [12] и названо *уточненной* шкалой в  $\mathbb{R}^n$ . Определение пространства  $H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$  приведено ниже в п. 2. Здесь отметим лишь, что это пространство гильбертово и состоит из распределений в  $\mathbb{R}^n$ , гладкость которых охарактеризована с помощью двух параметров — числового  $s$  и функционального  $\varphi$ . Последний пробегает достаточно широкое множество  $\mathcal{M}$ , состоящее из медленно меняющихся (по Карамата) на  $+\infty$  функций, и уточняет основную (степенную) гладкость, задаваемую параметром  $s$ . В частном случае  $\varphi \equiv 1$  пространство  $H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$  совпадает с пространством Соболева  $H^s(\mathbb{R}^n)$ .

Пусть  $s \in \mathbb{R}$ ,  $\varphi \in \mathcal{M}$ . В случае  $s \geq 0$  обозначим через  $H^{s,\varphi,(0)}(\Omega)$  гильбертово пространство сужений в область  $\Omega$  всех распределений из  $H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$ . Далее, в случае  $s < 0$  обозначим через  $H^{s,\varphi,(0)}(\Omega)$  пространство, сопряженное к пространству  $H^{-s,1/\varphi,(0)}(\Omega)$  относительно полуторалинейной формы  $(\cdot, \cdot)_\Omega$ . (Здесь уместно отметить, что  $\varphi \in \mathcal{M} \Leftrightarrow 1/\varphi \in \mathcal{M}$ .) Кроме того, обозначим через  $H^{s,\varphi}(\Gamma)$  гильбертово пространство распределений на  $\Gamma$ , принадлежащих локально пространству  $H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$ . (Детально указанные пространства будут определены ниже в п. 2). Для каждого  $s \in \mathbb{R} \setminus \{1/2, 3/2, \dots, 2q - 1/2\}$  положим

$$K_{s,\varphi,(2q)}(\Omega, \Gamma) := \left\{ (u_0, u_1, \dots, u_{2q}) : u_0 \in H^{s,\varphi,(0)}(\Omega), u_k \in H^{s-k+1/2,\varphi}(\Gamma), k = 1, \dots, 2q, \right. \\ \left. \text{причем } u_k = (D_\nu^{k-1}u) \upharpoonright \Gamma \text{ если } s > k - 1/2 \right\}. \quad (1.10)$$

Сформулируем основной результат статьи.

**Теорема 1.1.** *В предположении  $N = N^+ = \{0\}$  оператор  $(A, B)$ , соответствующий задаче (1.1), определяет топологический изоморфизм*

$$(A, B) : K_{s,\varphi,(2q)}(\Omega, \Gamma) \leftrightarrow H^{s-2q,\varphi,(0)}(\Omega) \times \prod_{j=1}^q H^{s-m_j-1/2,\varphi}(\Gamma) \quad (1.11)$$

для произвольных параметров  $s \in \mathbb{R} \setminus \{1/2, 3/2, \dots, 2q - 1/2\}$  и  $\varphi \in \mathcal{M}$ . При этом решение  $u = (u_0, u_1, \dots, u_{2q})$  задачи (1.1) понимается как обобщенное.

Отождествляя функцию  $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$  с вектором  $(u_0, u_1, \dots, u_{2q})$ , компоненты которого вычисляются согласно (1.6), получаем, что операторы (1.3) и (1.11) совпадают на множестве классических решений  $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$  краевой задачи (1.1). Это множество плотно в пространствах  $H^s(\Omega)$  и  $K_{s,\varphi,(2q)}(\Omega, \Gamma)$ , являющихся областями определения указанных операторов.

Более общее утверждение, чем теорема 1.1 приведено и доказано в п. 5.

**2. Уточненные шкалы пространств.** Сначала дадим определение уточненной шкалы в  $\mathbb{R}^n$ , где  $n \in \mathbb{N}$  (см. [12]). Обозначим через  $\mathcal{M}$  множество всех функций  $\varphi : [1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$  таких, что:

- а)  $\varphi$  измерима по Борелю на полуоси  $[1, +\infty)$ ;
- б) функции  $\varphi$  и  $1/\varphi$  ограничены на каждом отрезке  $[1, b]$ , где  $1 < b < +\infty$ ;
- в) функция  $\varphi$  медленно меняющаяся на  $+\infty$  по Карамата, т. е. [30](п. 1.1)

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(\lambda t)}{\varphi(t)} = 1 \quad \text{для любого } \lambda > 0.$$

Пусть  $s \in \mathbb{R}$ ,  $\varphi \in \mathcal{M}$ . Обозначим через  $H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$  пространство всех медленно растущих распределений  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  таких, что преобразование Фурье  $\widehat{u}$  распределения  $u$  является локально суммируемой по Лебегу в  $\mathbb{R}^n$  функцией, удовлетворяющей условию

$$\int \langle \xi \rangle^{2s} \varphi^2(\langle \xi \rangle) |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi < \infty.$$

Здесь интеграл берется по  $\mathbb{R}^n$ , а  $\langle \xi \rangle = (1 + \xi_1^2 + \dots + \xi_n^2)^{1/2}$  — сглаженный модуль вектора  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$ . В пространстве  $H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$  в качестве скалярного произведения возьмем величину

$$(u, v)_{H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)} := \int \langle \xi \rangle^{2s} \varphi^2(\langle \xi \rangle) \widehat{u}(\xi) \overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi.$$

Она естественным образом порождает норму. Отметим, что мы рассматриваем распределения, являющиеся *антимлинейными* функционалами.

Пространство  $H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$  — это частный изотропный гильбертов случай пространств, рассмотренных Л. Хермандером [7, с. 54], [8, с. 13] и Б. П. Волевичем, Л. Р. Панеяхом [9, с. 14], [10, с. 45]. В частном случае  $\varphi \equiv 1$  пространство  $H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n) = H^{s,1}(\mathbb{R}^n)$  совпадает с пространством Соболева  $H^s(\mathbb{R}^n)$  порядка  $s$ . В общем случае справедливы включения

$$\bigcup_{\varepsilon > 0} H^{s+\varepsilon}(\mathbb{R}^n) =: H^{s+}(\mathbb{R}^n) \subset H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n) \subset H^{s-}(\mathbb{R}^n) := \bigcap_{\varepsilon > 0} H^{s-\varepsilon}(\mathbb{R}^n). \quad (2.1)$$

Они означают, что в семействе гильбертовых сепарабельных пространств

$$\{H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n) : s \in \mathbb{R}, \varphi \in \mathcal{M}\}$$

функциональный параметр  $\varphi$  *уточняет* основную (степенную)  $s$ -гладкость. Поэтому это семейство естественно назвать *уточненной* шкалой в  $\mathbb{R}^n$  (по отношению к соболевской шкале).

Теперь, следуя стандартной процедуре, определим аналоги пространства  $H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$  для областей  $\overline{\Omega}$  и  $\Omega$  (см. [22]).

Обозначим

$$H_{\overline{\Omega}}^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n) := \{u \in H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n) : \text{supp } u \subseteq \overline{\Omega}\}.$$

Отметим, что  $H_{\overline{\Omega}}^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$  — гильбертово сепарабельное пространство относительно скалярного произведения в  $H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$ .

Далее, положим

$$H^{s,\varphi}(\Omega) := \{u \upharpoonright \Omega : u \in H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)\}, \quad \|v\|_{H^{s,\varphi}(\Omega)} := \inf \{ \|u\|_{H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)} : u = v \text{ в } \Omega \}.$$

Пространство  $H^{s,\varphi}(\Omega)$  сепарабельное и гильбертово, поскольку норма в нем порождена скалярным произведением

$$(v_1, v_2)_{H^{s,\varphi}(\Omega)} := (u_1 - \Pi u_1, u_2 - \Pi u_2)_{H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)}.$$

Здесь  $u_j \in H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$ ,  $u_j = v_j$  в  $\Omega$ , где  $j = 1, 2$ , а  $\Pi$  — ортопроектор пространства  $H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$  на подпространство  $\{u \in H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n) : \text{supp } u \subseteq \mathbb{R}^n \setminus \Omega\}$ .

Таким образом, пространство  $H_{\overline{\Omega}}^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$  состоит из распределений, сосредоточенных в замкнутой области  $\overline{\Omega}$ , а пространство  $H^{s,\varphi}(\Omega)$  — из распределений, заданных в открытой

области  $\Omega$ . Отметим следующие их свойства [22](теорема 3.2). Множество

$$C_0^\infty(\Omega) := \{u \in C^\infty(\mathbb{R}^n) : \text{supp } u \subset \Omega\}$$

плотно в  $H_{\overline{\Omega}}^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$ , а множество  $C^\infty(\overline{\Omega})$  плотно в  $H^{s,\varphi}(\Omega)$ . Пространства  $H_{\overline{\Omega}}^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$  и  $H^{-s,1/\varphi}(\Omega)$  взаимно сопряжены с равенством норм относительно расширения по непрерывности полуторалинейной формы  $(u, v)_\Omega$ , где  $u \in C_0^\infty(\Omega)$ ,  $v \in C^\infty(\overline{\Omega})$ . Заметим здесь, что пространство  $H^{-s,1/\varphi}(\Omega)$  определено, поскольку  $1/\varphi \in \mathcal{M}$ .

Рассмотрим также пространства распределений на многообразии  $\Gamma$ . Возьмем конечный атлас из  $C^\infty$ -структуры на  $\Gamma$ , образованный локальными картами  $\alpha_j : \mathbb{R}^n \leftrightarrow U_j$ , где  $j = 1, \dots, k$ . Здесь открытые множества  $U_j$  составляют конечное покрытие многообразия  $\Gamma$ . Пусть функции  $\chi_j \in C^\infty(\Gamma)$ , где  $j = 1, \dots, k$ , образуют разбиение единицы на  $\Gamma$ , удовлетворяющее условию  $\text{supp } \chi_j \subset U_j$ . Положим

$$H^{s,\varphi}(\Gamma) := \{g \in \mathcal{D}'(\Gamma) : (\chi_j g) \circ \alpha_j \in H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^{n-1}) \text{ для каждого } j = 1, \dots, k\},$$

$$(g_1, g_2)_{H^{s,\varphi}(\Gamma)} := \sum_{j=1}^k ((\chi_j g_1) \circ \alpha_j, (\chi_j g_2) \circ \alpha_j)_{H^{s,\varphi}(\mathbb{R}^{n-1})}. \quad (2.2)$$

Здесь  $h \circ \alpha_j$  — представление распределения  $h \in \mathcal{D}'(\Gamma)$  в локальной карте  $\alpha_j$ . Скалярное произведение (2.2) естественным образом порождает норму в пространстве  $H^{s,\varphi}(\Gamma)$ . Это пространство гильбертово сепарабельное и с точностью до эквивалентных норм не зависит от выбора атласа и разбиения единицы [12](п. 3). Множество  $C^\infty(\Gamma)$  плотно в  $H^{s,\varphi}(\Gamma)$ .

Отметим далее следующее [12] (п. 3). Если  $s > 1/2$ , то для каждой функции  $u \in H^{s,\varphi}(\Omega)$  определен по замыканию ее след на границе  $\Gamma$  — функция  $u \upharpoonright \Gamma \in H^{s-1/2,\varphi}(\Gamma)$ . При этом

$$H^{s-1/2,\varphi}(\Gamma) = \{u \upharpoonright \Gamma : u \in H^{s,\varphi}(\Omega)\}, \quad \|g\|_{H^{s-1/2,\varphi}(\Gamma)} \asymp \inf \left\{ \|u\|_{H^{s,\varphi}(\Omega)} : u \upharpoonright \Gamma = g \right\}.$$

В случае  $s < 1/2$  нельзя корректно определить след произвольного распределения  $u \in H^{s,\varphi}(\Omega)$  на границе  $\Gamma$ . Вводимые ниже пространства  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$ , где  $r \in \mathbb{N}$ , лишены этого недостатка.

Определим для каждого целого  $r \geq 0$  шкалу пространств

$$\{H^{s,\varphi,(r)}(\Omega) : s \in \mathbb{R}, \varphi \in \mathcal{M}\}. \quad (2.3)$$

Она сыграет центральную роль при изучении эллиптической краевой задачи (1.1).

Пусть сначала  $r = 0$ . В случае  $s \geq 0$  обозначим через  $H^{s,\varphi,(0)}(\Omega)$  гильбертово пространство  $H^{s,\varphi}(\Omega)$ . В случае  $s < 0$  обозначим через  $H^{s,\varphi,(0)}(\Omega)$  гильбертово пространство  $H_{\overline{\Omega}}^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n)$ , сопряженное к пространству  $H^{-s,1/\varphi}(\Omega)$  относительно полуторалинейной формы  $(\cdot, \cdot)_\Omega$ .

С точки зрения приложений к дифференциальным операторам удобна трактовка пространства  $H^{s,\varphi,(0)}(\Omega)$  как пополнения линеала  $C^\infty(\overline{\Omega})$  по соответствующей норме. Действительно, пространство  $H^{s,\varphi,(0)}(\Omega)$  при  $s \geq 0$  совпадает с пополнением линеала  $C^\infty(\overline{\Omega})$  по норме пространства  $H^{s,\varphi}(\Omega)$ . Далее заметим, что естественно отождествлять функции из пространства  $L_2(\Omega) = H^0(\Omega)$  с их продолжениями нулем в  $\mathbb{R}^n$ ; в этом смысле

$L_2(\Omega) = H_{\bar{\Omega}}^0(\mathbb{R}^n)$ . При таком отождествлении получим в силу (2.1) включения

$$C_0^\infty(\Omega) \subset C^\infty(\bar{\Omega}) \subset L_2(\Omega) = H_{\bar{\Omega}}^0(\mathbb{R}^n) \subset H_{\bar{\Omega}}^{s,\varphi}(\mathbb{R}^n) = H^{s,\varphi,(0)}(\Omega) \text{ при } s < 0.$$

Отсюда вытекает, что функции класса  $C^\infty(\bar{\Omega})$  (продолженные нулем в  $\mathbb{R}^n$ ) образуют плотный линейал в пространстве  $H^{s,\varphi,(0)}(\Omega)$  при  $s < 0$ . Значит, это пространство является пополнением множества функций  $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$  по норме

$$\sup \left\{ \frac{|(u, v)_\Omega|}{\|v\|_{H^{-s,1/\varphi}(\Omega)}} : v \in H^{-s,1/\varphi}(\Omega), v \neq 0 \right\}.$$

Пусть теперь  $r \in \mathbb{N}$ . Положим  $E_r := \{k - 1/2 : k = 1, \dots, r\}$ . В случае  $s \in \mathbb{R} \setminus E_r$  обозначим через  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  пополнение линейного пространства  $C^\infty(\bar{\Omega})$  по норме

$$\|u\|_{H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)} := \left( \|u\|_{H^{s,\varphi,(0)}(\Omega)}^2 + \sum_{k=1}^r \|(D_\nu^{k-1}u) \upharpoonright \Gamma\|_{H^{s-k+1/2,\varphi}(\Gamma)}^2 \right)^{1/2}.$$

Эта норма гильбертова, следовательно, и пространство  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  гильберново. Оно сепарабельно, как будет показано ниже в п. 4.

В случае  $s \in E_r$  определим пространство  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  посредством интерполяции:

$$H^{s,\varphi,(r)}(\Omega) := [H^{s-\varepsilon,\varphi,(r)}(\Omega), H^{s+\varepsilon,\varphi,(r)}(\Omega)]_{1/2} \text{ при } 0 < \varepsilon < 1. \quad (2.4)$$

Определение использованного здесь интерполяционного метода приведено в п. 3. Далее в п. 7 будет показано, что пространство (2.4) с точностью до эквивалентных норм не зависит от  $\varepsilon$ .

Семейство гильбертовых сепарабельных пространств (2.3) называем *модифицированной* по Ройтбергу уточненной шкалой порядка  $r$ . В случае  $\varphi \equiv 1$  (пространства Соболева) эта шкала введена и изучена Я. А. Ройтбергом [3], [5](п. 2.4) (см. также [4](гл. III, §6), [28, с. 171], [29](п. 7.9)).

В силу определения модифицированной шкалы, оператор следа  $u \mapsto u \upharpoonright \Gamma$ ,  $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$ , продолжается по непрерывности до ограниченного оператора, действующего из пространства  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  в пространство  $H^{s-1/2,\varphi}(\Gamma)$  при любых  $s \in \mathbb{R}$ ,  $r \in \mathbb{N}$ . Более того, для произвольного  $u \in H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega)$  корректно определен по формулам (1.6) посредством замыкания вектор  $(u_0, u_1, \dots, u_{2q})$ . Поэтому можно трактовать  $u$  как обобщенное решение  $(u_0, u_1, \dots, u_{2q})$  задачи (1.1).

**3. Интерполяция с функциональным параметром.** Интерполяция с функциональным параметром пар гильбертовых пространств — это естественное обобщение классического интерполяционного метода [1, с. 21-23], [28, с. 251] на случай, когда в качестве параметра интерполяции вместо степенной берется более общая функция. Приведем определение и некоторые свойства такой интерполяции. Для наших целей достаточно ограничиться сепарабельными гильбертовыми пространствами.

Упорядоченную пару  $[X_0, X_1]$  комплексных гильбертовых пространств  $X_0$  и  $X_1$  будем называть *допустимой*, если пространства  $X_0, X_1$  сепарабельные и справедливо непрерывное плотное вложение  $X_1 \hookrightarrow X_0$ .



Пусть задана допустимая пара  $X := [X_0, X_1]$  гильбертовых пространств. Как известно [1, с. 22], для  $X$  существует такой изометрический изоморфизм  $J : X_1 \leftrightarrow X_0$ , что  $J$  является самосопряженным положительно определенным оператором в пространстве  $X_0$  с областью определения  $X_1$ . Оператор  $J$  называется *порождающим* для пары  $X$ , этот оператор определяется парой  $X$  однозначно.

Обозначим через  $\mathcal{B}$  множество всех функций, заданных положительных и измеримых по Борелю на полуоси  $(0, +\infty)$ . Пусть  $\psi \in \mathcal{B}$ . Поскольку спектр оператора  $J$  является подмножеством полуоси  $(0, +\infty)$ , в пространстве  $X_0$  определен как функция от  $J$  оператор  $\psi(J)$ . Область определения оператора  $\psi(J)$  есть линейное многообразие, плотное в  $X_0$ . Обозначим через  $[X_0, X_1]_\psi$  или, короче,  $X_\psi$  область определения оператора  $\psi(J)$ , наделенную скалярным произведением графика

$$(u, v)_{X_\psi} = (u, v)_{X_0} + (\psi(J)u, \psi(J)v)_{X_0}.$$

Пространство  $X_\psi$  гильбертово сепарабельное, причем справедливо непрерывное плотное вложение  $X_\psi \hookrightarrow X_0$ .

Функцию  $\psi \in \mathcal{B}$  называем *интерполяционным параметром*, если для произвольных допустимых пар  $X = [X_0, X_1], Y = [Y_0, Y_1]$  гильбертовых пространств и для любого линейного отображения  $T$ , заданного на  $X_0$ , выполняется следующее условие. Если при  $j = 0, 1$  сужение отображения  $T$  на пространство  $X_j$  является ограниченным оператором  $T : X_j \rightarrow Y_j$ , то и сужение отображения  $T$  на пространство  $X_\psi$  является ограниченным оператором  $T : X_\psi \rightarrow Y_\psi$ .

Иными словами, функция  $\psi$  является интерполяционным параметром тогда и только тогда, когда отображение  $X \mapsto X_\psi$  является интерполяционным функтором, заданным на категории допустимых пар  $X$  гильбертовых пространств (см. [31], п. 1.2.2). В этом случае будем говорить, что *пространство  $X_\psi$  получено в результате интерполяции пары  $X$  с функциональным параметром  $\psi$* .

Классический результат [1, с. 41], [28, с. 250–255] в теории интерполяции гильбертовых пространств состоит в том, что степенная функция  $\psi(t) = t^\theta$  порядка  $\theta \in (0, 1)$  является интерполяционным параметром. В этом случае  $\theta$  естественным образом выступает в качестве числового параметра интерполяции и интерполяционное пространство  $X_\psi$  обозначается через  $X_\theta$ . Нам понадобится следующий, более широкий чем степенной, класс интерполяционных параметров [11] (теорема 2.1, лемма 2.1).

**Предложение 3.1.** *Пусть функция  $\psi \in \mathcal{B}$  ограничена на каждом отрезке  $[a; b]$ , где  $0 < a < b < +\infty$ . Пусть, кроме того,  $\psi$  — правильно меняющаяся на  $+\infty$  по Карамата функция порядка  $\theta$ , где  $0 < \theta < 1$ , т. е. [30](п. 1.1)*

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\psi(\lambda t)}{\psi(t)} = \lambda^\theta \quad \text{для любого } \lambda > 0.$$

Тогда  $\psi$  является интерполяционным параметром. При этом справедливы непрерывные плотные вложения  $X_1 \hookrightarrow X_\psi \hookrightarrow X_0$ .

Ниже будут использованы следующие свойства интерполяции.

**Предложение 3.2** ([19], теорема 4). *Пусть задано конечное число допустимых пар  $[X_0^{(k)}, X_1^{(k)}]$  гильбертовых пространств, где  $k = 1, \dots, m$ . Тогда для любой функции  $\psi \in$*

$\mathcal{B}$  справедливо

$$\left[ \prod_{k=1}^m X_0^{(k)}, \prod_{k=1}^m X_1^{(k)} \right]_{\psi} = \prod_{k=1}^m [X_0^{(k)}, X_1^{(k)}]_{\psi} \quad \text{с равенством норм.}$$

**Предложение 3.3** ([32], теорема 2). Пусть интерполяционные параметры  $\zeta, \eta, \chi \in \mathcal{B}$  удовлетворяют следующему условию: для каждого числа  $\varepsilon > 0$  существуют положительные числа  $c_1(\varepsilon), c_2(\varepsilon)$  такие, что

$$1 \leq c_1(\varepsilon) \zeta(t) \leq c_2(\varepsilon) \eta(t) \quad \text{и} \quad 1 \leq c_1(\varepsilon) \chi(t) \quad \text{при} \quad t > \varepsilon.$$

Тогда для произвольной допустимой пары  $X$  гильбертовых пространств справедливо равенство пространств  $[X_{\zeta}, X_{\eta}]_{\chi} = X_{\psi}$  с эквивалентностью норм. Здесь функция  $\psi(t) := \zeta(t) \chi(\eta(t)/\zeta(t))$  аргумента  $t > 0$  является интерполяционным параметром.

Напомним следующее определение. Линейный ограниченный оператор  $T : X \rightarrow Y$ , где  $X, Y$  — банаховы пространства, называется *фредгольмовым*, если его ядро конечномерно, а область значений  $T(X)$  замкнута в  $Y$  и имеет там конечную коразмерность. Индексом фредгольмова оператора  $T$  называется число  $\text{ind } T = \dim \ker T - \dim(Y/T(X))$ .

**Предложение 3.4** ([33], предложение 5.2). Пусть задано две допустимые пары  $X = [X_0, X_1]$  и  $Y = [Y_0, Y_1]$  гильбертовых пространств. Пусть, кроме того, на  $X_0$  задано линейное отображение  $T$ , для которого существуют ограниченные фредгольмовы операторы  $T : X_j \rightarrow Y_j$ , где  $j = 0, 1$ , имеющие общее ядро  $N$  и одинаковый индекс  $\kappa$ . Тогда для произвольного интерполяционного параметра  $\psi \in \mathcal{B}$  ограниченный оператор  $T : X_{\psi} \rightarrow Y_{\psi}$  фредгольмов с ядром  $N$ , областью значений  $Y_{\psi} \cap T(X_0)$  и тем же индексом  $\kappa$ .

**4. Свойства модифицированной уточненной шкалы.** Сначала изучим модифицированную шкалу (2.3) порядка  $r = 0$ . Отметим следующие ее свойства, установленные в [22] (теорема 3.3).

**Предложение 4.1.** Пусть  $s, \sigma \in \mathbb{R}$  и  $\varphi, \chi \in \mathcal{M}$ . Тогда:

а) если  $|s| < 1/2$ , то нормы в пространствах  $H_{\Omega}^{s, \varphi}(\mathbb{R}^n)$  и  $H^{s, \varphi}(\Omega)$  эквивалентны на плотном линейном многообразии  $C_0^{\infty}(\Omega)$ , что означает следующее равенство пространств с эквивалентностью норм в них:

$$H^{s, \varphi, (0)}(\Omega) = H_{\Omega}^{s, \varphi}(\mathbb{R}^n) = H^{s, \varphi}(\Omega) \quad \text{при} \quad |s| < 1/2; \quad (4.1)$$

б) пространства  $H^{s, \varphi, (0)}(\Omega)$  и  $H^{-s, 1/\varphi, (0)}(\Omega)$  взаимно сопряжены (при  $s \neq 0$  с равенством норм, а при  $s = 0$  с эквивалентностью норм) относительно полуторалинейной формы  $(\cdot, \cdot)_{\Omega}$ ;

в) если  $s < \sigma$ , то справедливо компактное плотное вложение  $H^{\sigma, \chi, (0)}(\Omega) \hookrightarrow H^{s, \varphi, (0)}(\Omega)$ ;

г) если  $\varphi(t) \leq c \chi(t)$  при  $t \gg 1$  для некоторого числа  $c > 0$ , то справедливо непрерывное плотное вложение  $H^{\sigma, \chi, (0)}(\Omega) \hookrightarrow H^{s, \varphi, (0)}(\Omega)$ ; это вложение компактно, если  $\varphi(t)/\chi(t) \rightarrow 0$  при  $t \rightarrow +\infty$ ;

д) неравенство

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t \varphi^2(t)} < \infty, \quad (4.2)$$

равносильно непрерывности вложения  $H^{\rho+n/2, \varphi, (0)}(\Omega) \hookrightarrow C^\rho(\bar{\Omega})$ , где целое  $\rho \geq 0$ ; непрерывность такого вложения влечет его компактность.

В связи с пунктами в), г) предложения 4.1 отметим следующее. Плотное непрерывное вложение  $H^{\sigma, \chi, (0)}(\Omega) \hookrightarrow H^{s, \varphi, (0)}(\Omega)$  понимается следующим образом. Существует число  $c > 0$  такое, что

$$\|u\|_{H^{s, \varphi, (0)}(\Omega)} \leq c \|u\|_{H^{\sigma, \chi, (0)}(\Omega)} \quad \text{для любого } u \in C^\infty(\bar{\Omega}).$$

Кроме того, тождественное отображение, заданное на плотном линейном многообразии  $C^\infty(\bar{\Omega})$ , продолжается по непрерывности до ограниченного линейного инъективного оператора  $I : H^{\sigma, \chi, (0)}(\Omega) \rightarrow H^{s, \varphi, (0)}(\Omega)$  (он называется оператором вложения). Аналогично понимается плотное непрерывное вложение  $H^{\sigma, \chi, (r)}(\Omega) \hookrightarrow H^{s, \varphi, (r)}(\Omega)$  (см. ниже).

Следующая теорема устанавливает тот факт, что каждое пространство  $H^{s, \varphi, (0)}(\Omega)$  может быть получено в результате интерполяции пары соболевских пространств с подходящим функциональным параметром.

**Теорема 4.1.** Пусть заданы функция  $\varphi \in \mathcal{M}$  и положительные числа  $\varepsilon, \delta$ . Положим  $\psi(t) := t^{\varepsilon/(\varepsilon+\delta)} \varphi(t^{1/(\varepsilon+\delta)})$  при  $t \geq 1$  и  $\psi(t) := \varphi(1)$  при  $0 < t < 1$ . Тогда:

а) функция  $\psi \in \mathcal{B}$  является интерполяционным параметром;

б) для каждого числа  $s \in \mathbb{R}$  такого, что  $s - \varepsilon > -1/2$  или  $s + \delta < 1/2$ , справедливо

$$[H^{s-\varepsilon, 1, (0)}(\Omega), H^{s+\delta, 1, (0)}(\Omega)]_\psi = H^{s, \varphi, (0)}(\Omega) \quad \text{с эквивалентностью норм.}$$

**Доказательство.** Пункт а). Непосредственно проверяется, что функция  $\psi \in \mathcal{B}$  удовлетворяет условию предложения 3.1, где  $\theta = \varepsilon/(\varepsilon + \delta) \in (0, 1)$ . Следовательно, она является интерполяционным параметром.

Пункт б). Как установлено в [12] (теоремы 3.5, 3.7) и [22] (теорема 3.1), для произвольного  $s \in \mathbb{R}$  справедливы следующие равенства пространств с эквивалентностью норм в них:

$$[H^{s-\varepsilon, 1}(\Omega), H^{s+\delta, 1}(\Omega)]_\psi = H^{s, \varphi}(\Omega), \quad (4.3)$$

$$[H_{\bar{\Omega}}^{s-\varepsilon, 1}(\mathbb{R}^n), H_{\bar{\Omega}}^{s+\delta, 1}(\mathbb{R}^n)]_\psi = H_{\bar{\Omega}}^{s, \varphi}(\mathbb{R}^n). \quad (4.4)$$

Если  $s - \varepsilon > -1/2$ , то в силу (4.1) и (4.3) получаем

$$[H^{s-\varepsilon, 1, (0)}(\Omega), H^{s+\delta, 1, (0)}(\Omega)]_\psi = [H^{s-\varepsilon, 1}(\Omega), H^{s+\delta, 1}(\Omega)]_\psi = H^{s, \varphi}(\Omega) = H^{s, \varphi, (0)}(\Omega).$$

Если  $s + \varepsilon < 1/2$ , то в силу (4.1) и (4.4) имеем

$$[H^{s-\varepsilon, 1, (0)}(\Omega), H^{s+\delta, 1, (0)}(\Omega)]_\psi = [H_{\bar{\Omega}}^{s-\varepsilon, 1}(\mathbb{R}^n), H_{\bar{\Omega}}^{s+\delta, 1}(\mathbb{R}^n)]_\psi = H_{\bar{\Omega}}^{s, \varphi}(\mathbb{R}^n) = H^{s, \varphi, (0)}(\Omega).$$

Здесь наряду с равенством пространств выполняется эквивалентность норм в них. Пункт б) доказан.

Далее изучим модифицированную шкалу (2.3) порядка  $r \in \mathbb{N}$ . Нам понадобятся следующие свойства пространства  $H^{s, \varphi}(\Gamma)$ , установленные в [12] (теоремы 3.5, 3.6, 3.8).

**Предложение 4.2.** Пусть  $s, \sigma \in \mathbb{R}$  и  $\varphi, \chi \in \mathcal{M}$ . Тогда:

а) для произвольных положительных чисел  $\varepsilon, \delta$  справедливо

$$[H^{s-\varepsilon,1}(\Gamma), H^{s+\delta,1}(\Gamma)]_\psi = H^{s,\varphi}(\Gamma) \quad \text{с эквивалентностью норм,}$$

где  $\psi$  — интерполяционный параметр из теоремы 4.1;

б) пространства  $H^{s,\varphi}(\Gamma)$  и  $H^{-s,1/\varphi}(\Gamma)$  взаимно сопряжены (с эквивалентностью норм) относительно полуторалинейной формы  $(\cdot, \cdot)_\Gamma$ ;

в) пункты в), г) предложения 4.1 сохраняют силу, если в их формулировках заменить пространства  $H^{\sigma,\chi,(0)}(\Omega)$ ,  $H^{s,\varphi,(0)}(\Omega)$ ,  $H^{s,\chi,(0)}(\Omega)$  на пространства  $H^{\sigma,\chi}(\Gamma)$ ,  $H^{s,\varphi}(\Gamma)$ ,  $H^{s,\chi}(\Gamma)$  соответственно;

г) неравенство (4.2) равносильно непрерывности вложения  $H^{\rho+(n-1)/2,\varphi}(\Gamma) \hookrightarrow C^\rho(\Gamma)$ , где целое  $\rho \geq 0$ ; непрерывность такого вложения влечет его компактность.

д) для любых  $k \in \mathbb{N}$ ,  $s > k - 1/2$  линейное отображение  $u \mapsto (D_\nu^{k-1}u) \upharpoonright \Gamma$ , где  $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$ , продолжается по непрерывности до ограниченного оператора, действующего из пространства  $H^{s,\varphi,(0)}(\Omega) = H^{s,\varphi}(\Omega)$  в пространство  $H^{s-k+1/2,\varphi}(\Gamma)$ .

Для произвольных  $s \in \mathbb{R}$ ,  $\varphi \in \mathcal{M}$  положим

$$\Pi_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma) := H^{s,\varphi,(0)}(\Omega) \times \prod_{k=1}^r H^{s-k+1/2,\varphi}(\Gamma).$$

Кроме того, если  $s \notin E_r$ , обозначим (см. (1.10))

$$K_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma) := \{ (u_0, u_1, \dots, u_r) \in \Pi_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma) :$$

$$u_k = (D_\nu^{k-1}u) \upharpoonright \Gamma \text{ для всех } k = 1, \dots, r \text{ таких, что } s > k - 1/2 \}.$$

В силу предложения 4.2 д),  $K_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma)$  — (замкнутое) подпространство в  $\Pi_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma)$ .

**Теорема 4.2.** Пусть  $r \in \mathbb{N}$ ,  $s \in \mathbb{R} \setminus E_r$ ,  $\varphi \in \mathcal{M}$ . Тогда:

а) линейное отображение

$$T_r : u \mapsto (u, u \upharpoonright \Gamma, \dots, (D_\nu^{r-1}u) \upharpoonright \Gamma), \quad u \in C^\infty(\bar{\Omega}), \quad (4.5)$$

продолжается по непрерывности до изометрического изоморфизма

$$T_r : H^{s,\varphi,(r)}(\Omega) \leftrightarrow K_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma); \quad (4.6)$$

б) для произвольных положительных чисел  $\varepsilon, \delta$  таких, что числа  $s, s - \varepsilon, s + \delta$  принадлежат одному из интервалов

$$\alpha_0 := (-\infty, 1/2), \quad \alpha_k := (k - 1/2, k + 1/2), \quad k = 1, \dots, r - 1, \quad \alpha_r := (r - 1/2, +\infty),$$

справедливо

$$[H^{s-\varepsilon,1,(r)}(\Omega), H^{s+\delta,1,(r)}(\Omega)]_\psi = H^{s,\varphi,(r)}(\Omega) \quad \text{с эквивалентностью норм,} \quad (4.7)$$

где  $\psi$  — интерполяционный параметр из теоремы 4.1.

**Доказательство.** В случае  $\varphi \equiv 1$  (модификация соболевских пространств) пункт а) установлен Я. А. Ройтбергом [5] (лемма 2.2.1). Выведем отсюда пункт б) для произвольного  $\varphi \in \mathcal{M}$ , а затем пункт а).

Обозначим через  $X_\psi$  левую часть равенства (4.7). Рассмотрим изометрические операторы

$$T_r : H^{\sigma,1,(r)}(\Omega) \rightarrow \Pi_{\sigma,1,(r)}(\Omega, \Gamma), \quad \sigma \in \{s - \varepsilon, s + \delta\}.$$

Применив к ним интерполяцию с параметром  $\psi$ , получим ограниченный оператор

$$T_r : X_\psi \rightarrow [\Pi_{s-\varepsilon,1,(r)}(\Omega, \Gamma), \Pi_{s+\delta,1,(r)}(\Omega, \Gamma)]_\psi. \quad (4.8)$$

В силу предложений 3.2, 4.2 а) и теоремы 4.1 имеем

$$\begin{aligned} & [\Pi_{s-\varepsilon,1,(r)}(\Omega, \Gamma), \Pi_{s+\delta,1,(r)}(\Omega, \Gamma)]_\psi = \\ & = [H^{s-\varepsilon,1,(0)}(\Omega), H^{s+\delta,1,(0)}(\Omega)]_\psi \times \prod_{k=1}^r [H^{s-\varepsilon-k+1/2,1}(\Gamma), H^{s+\delta-k+1/2,1}(\Gamma)]_\psi = \\ & = H^{s,\varphi,(0)}(\Omega) \times \prod_{k=1}^r H^{s-k+1/2,\varphi}(\Gamma) = \Pi_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma) \end{aligned}$$

с эквивалентностью норм. Следовательно,

$$\|u\|_{H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)} = \|T_r u\|_{\Pi_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma)} \leq c_1 \|u\|_{X_\psi} \quad \text{для всех } u \in C^\infty(\overline{\Omega}). \quad (4.9)$$

Здесь  $c_1$  — норма оператора (4.8).

Докажем неравенство, обратное к (4.9). По условию,  $s, s-\varepsilon, s+\delta \in \alpha_p$  для некоторого номера  $p \in \{0, 1, \dots, r\}$ . Рассмотрим линейное отображение

$$T_{r,p} : u \mapsto (u, \{(D_\nu^{k-1}u) \upharpoonright \Gamma : p+1 \leq k \leq r\}), \quad u \in C^\infty(\overline{\Omega}).$$

(Как и прежде, индекс  $k$  целый.) Это отображение продолжается по непрерывности до топологического изоморфизма

$$T_{r,p} : H^{\sigma,1,(r)}(\Omega) \leftrightarrow H^{\sigma,1,(0)}(\Omega) \times \prod_{p+1 \leq k \leq r} H^{\sigma-k+1/2,1}(\Gamma), \quad \sigma \in \{s-\varepsilon, s+\delta\}. \quad (4.10)$$

Действительно, существование и ограниченность оператора (4.10) следует из определения пространства  $H^{\sigma,1,(r)}(\Omega)$ . Покажем, что этот оператор биективный. Пусть  $u \in H^{\sigma,1,(r)}(\Omega)$ ,

$$(u_0, \{u_k : p+1 \leq k \leq r\}) \in H^{\sigma,1,(0)}(\Omega) \times \prod_{p+1 \leq k \leq r} H^{\sigma-k+1/2,1}(\Gamma).$$

Положим  $u_k := (D_\nu^{k-1}u_0) \upharpoonright \Gamma$  при  $1 \leq k \leq p$ . Распределение  $u_k$  определено корректно в силу предложения 4.2 д), поскольку  $\sigma > k - 1/2$  для указанных номеров  $k$ . Заметим, что  $\sigma < k - 1/2$  при  $p+1 \leq k \leq r$ . Поэтому  $(u_0, u_1, \dots, u_r) \in K_{\sigma,1,(r)}(\Omega, \Gamma)$ . Как говорилось выше, пункт а) известен в случае  $\varphi \equiv 1$ . Значит, существуют топологические изоморфизмы

$$T_r : H^{\sigma,1,(r)}(\Omega) \leftrightarrow K_{\sigma,1,(r)}(\Omega, \Gamma), \quad \sigma \in \{s-\varepsilon, s+\delta\}.$$

Отсюда, поскольку

$$T_r u = (u_0, u_1, \dots, u_r) \Leftrightarrow T_{r,p} u = (u_0, \{u_k : p+1 \leq k \leq r\}),$$

вытекает, что ограниченный оператор (4.10) биективный. Следовательно, по теореме Банаха об обратном операторе, (4.10) — топологический изоморфизм.

Применим к (4.10) интерполяцию с параметром  $\psi$ . В силу предложений 3.2, 4.2 а) и теоремы 4.1 получим топологический изоморфизм

$$T_{r,p} : X_\psi \leftrightarrow H^{s,\varphi,(0)}(\Omega) \times \prod_{p+1 \leq k \leq r} H^{s-k+1/2,\varphi}(\Gamma). \quad (4.11)$$

Отсюда вытекает неравенство, обратное к (4.9):

$$\|u\|_{X_\psi} \leq c_2 \left( \|u\|_{H^{s,\varphi,(0)}(\Omega)}^2 + \sum_{p+1 \leq k \leq r} \|(D_\nu^{k-1}u) \upharpoonright \Gamma\|_{H^{s-k+1/2,\varphi}(\Gamma)}^2 \right)^{1/2} \leq c_2 \|u\|_{H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)}$$

для всех  $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$ . Здесь  $c_2$  — норма оператора, обратного к (4.11). Таким образом, нормы в пространствах  $X_\psi$  и  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  эквивалентны на множестве  $C^\infty(\bar{\Omega})$ . Оно плотно в  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  по определению и в  $X_\psi$  в силу предложения 3.1. Следовательно,  $X_\psi = H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  с точностью до эквивалентных норм. Пункт б) доказан.

Докажем пункт а). Согласно определению пространства  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  отображение (4.5) продолжается по непрерывности до изометрического оператора

$$T_r : H^{s,\varphi,(r)}(\Omega) \rightarrow \Pi_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma). \quad (4.12)$$

На основании предложения 4.2 д) справедливо включение  $T_r(H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)) \subseteq K_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma)$ . Докажем обратное включение. Пусть  $(u_0, u_1, \dots, u_r) \in K_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma)$ . В силу (4.11) и равенства  $X_\psi = H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  существует топологический изоморфизм

$$T_{r,p} : H^{s,\varphi,(r)}(\Omega) \leftrightarrow H^{s,\varphi,(0)}(\Omega) \times \prod_{p+1 \leq k \leq r} H^{s-k+1/2,\varphi}(\Gamma).$$

Поэтому найдется такое  $u \in H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$ , что

$$T_{r,p}u = (u_0, \{u_k : p+1 \leq k \leq r\}).$$

Отсюда в силу предложения 4.2 д) вытекает равенство  $T_r u = (u_0, u_1, \dots, u_r)$ . Тем самым, доказано включение  $K_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma) \subseteq T_r(H^{s,\varphi,(r)}(\Omega))$ . Таким образом,  $T_r(H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)) = K_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma)$ , что вместе с изометрическим оператором (4.12) влечет изометрический изоморфизм (4.6). Пункт а) доказан.

Теорема 4.2 доказана.

**Теорема 4.3.** Пусть  $r \in \mathbb{N}$ ,  $s, \sigma \in \mathbb{R}$  и  $\varphi, \chi \in \mathcal{M}$ . Тогда:

- а) гильбертово пространство  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  сепарабельное;
- б) множество  $C^\infty(\bar{\Omega})$  плотно в пространстве  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$ ;
- в) если  $s > r - 1/2$ , то  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega) = H^{s,\varphi}(\Omega)$  с эквивалентностью норм;
- г) пункты в), г) предложения 4.1 сохраняют силу, если в их формулировках в обозначениях пространств заменить (0) на (r).

**Доказательство.** Пункт а). Для  $s \notin E_r$  сепарабельность пространства  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  вытекает из теоремы 4.2 а) и сепарабельности пространства  $K_{s,\varphi,(r)}(\Omega, \Gamma)$ . Если  $s \in E_r$ , то пространство  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$  сепарабельно в силу (2.4) как результат интерполяции сепарабельных гильбертовых пространств.

Пункт б) в случае  $s \notin E_r$  содержится в определении пространства  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega)$ . Если  $s \in E_r$ , то в силу (2.4) и предложения 3.1 справедливо непрерывное плотное вложение

$H^{s+\varepsilon, \varphi, (r)}(\Omega) \hookrightarrow H^{s, \varphi, (r)}(\Omega)$  для достаточно малого  $\varepsilon > 0$ . Поскольку  $s + \varepsilon \notin E_r$ , множество  $C^\infty(\bar{\Omega})$  плотно в пространстве  $H^{s+\varepsilon, \varphi, (r)}(\Omega)$ . Следовательно, это множество плотно и в пространстве  $H^{s, \varphi, (r)}(\Omega)$ .

*Пункт в).* Если  $s > r - 1/2$ , то в силу предложения 4.2 д) нормы в пространствах  $H^{s, \varphi, (r)}(\Omega)$  и  $H^{s, \varphi, (0)}(\Omega) = H^{s, \varphi}(\Omega)$  эквивалентны на плотном линейном многообразии  $C^\infty(\bar{\Omega})$ . Следовательно, эти пространства равны.

*Пункт г)* для  $s, \sigma \notin E_r$  вытекает из предложений 4.1 в), г) и 4.2 в) в силу теоремы 4.2 а). Если  $\{s, \sigma\} \cap E_r \neq \emptyset$  и  $s < \sigma$ , то в силу (2.4) и предложения 3.1 для достаточно малого числа  $\varepsilon > 0$  справедливы непрерывные плотные вложения

$$H^{\sigma, \chi, (r)}(\Omega) \hookrightarrow H^{\sigma-\varepsilon, \chi, (r)}(\Omega) \hookrightarrow H^{s+\varepsilon, \varphi, (r)}(\Omega) \hookrightarrow H^{s, \varphi, (r)}(\Omega).$$

Наконец, если  $s \in E_r$ , то в силу (2.4) имеем

$$H^{s \mp \varepsilon, \chi, (r)}(\Omega) \hookrightarrow H^{s \mp \varepsilon, \varphi, (r)}(\Omega) \Rightarrow H^{s, \chi, (r)}(\Omega) \hookrightarrow H^{s, \varphi, (r)}(\Omega),$$

причем наследуется как непрерывность, так и компактность [31] (п. 1.16.4) вложений.

Теорема 4.3 доказана.

### 5. Эллиптическая краевая задача в модифицированной уточненной шкале.

Напомним, что краевая задача (1.1) регулярная эллиптическая, а  $N$  и  $N^+$  — конечномерные бесконечно гладкие ядра операторов задач (1.1) и (1.2) соответственно.

**Теорема 5.1.** *Для произвольных параметров  $s \in \mathbb{R}$  и  $\varphi \in \mathcal{M}$  линейное отображение*

$$(A, B) : u \rightarrow (Au, B_1u, \dots, B_q u), \quad u \in C^\infty(\bar{\Omega}), \quad (5.1)$$

*продолжается по непрерывности до ограниченного оператора*

$$(A, B) : H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega) \rightarrow H^{s-2q, \varphi, (0)}(\Omega) \times \prod_{j=1}^q H^{s-m_j-1/2, \varphi}(\Gamma) =: \mathcal{H}_{s, \varphi}(\Omega, \Gamma). \quad (5.2)$$

*Этот оператор фредгольмов. Его ядро совпадает с  $N$ , а область значений равна множеству*

$$\left\{ (f, g_1, \dots, g_q) \in \mathcal{H}_{s, \varphi}(\Omega, \Gamma) : (f, v)_\Omega + \sum_{j=1}^q (g_j, C_j^+ v)_\Gamma = 0 \text{ для всех } v \in N^+ \right\}. \quad (5.3)$$

*Индекс оператора (5.2) равен  $\dim N - \dim N^+$  и не зависит от  $s, \varphi$ .*

**Доказательство.** В соболевском случае  $\varphi \equiv 1$  эта теорема установлена Я. А. Ройтбергом [5] (теоремы 4.1.1 и 5.3.1). Отсюда мы выведем общий случай  $\varphi \in \mathcal{M}$  с помощью интерполяции.

Сначала предположим, что  $s \notin E_{2q}$ . Пусть положительное число  $\varepsilon = \delta$  такое как в теореме 4.2 б). Отображение (5.1) продолжается по непрерывности до ограниченных фредгольмовых операторов

$$(A, B) : H^{s \mp \varepsilon, 1, (2q)}(\Omega) \rightarrow \mathcal{H}_{s \mp \varepsilon, 1}(\Omega, \Gamma). \quad (5.4)$$

Они имеют общие ядро  $N$ , дефектное подпространство

$$\{(v, C_1^+ v, \dots, C_q^+ v) : v \in N^+\} \quad (5.5)$$

и индекс  $\dim N - \dim N^+$ . Применим к (5.4) интерполяцию с функциональным параметром  $\psi$  из теоремы 4.1. В силу предложения 3.4 получим ограниченный фредгольмов оператор

$$(A, B) : [H^{s-\varepsilon, 1, (2q)}(\Omega), H^{s+\varepsilon, 1, (2q)}(\Omega)]_{\psi} \rightarrow [\mathcal{H}_{s-\varepsilon, 1}(\Omega, \Gamma), \mathcal{H}_{s+\varepsilon, 1}(\Omega, \Gamma)]_{\psi}$$

Он означает существование оператора (5.2), удовлетворяющего условию настоящей теоремы. Это вытекает из теорем 4.1 б), 4.2 б) и предложений 3.2, 4.2 а).

Предположим теперь, что  $s \in E_{2q}$ . Выберем произвольное число  $\varepsilon \in (0, 1)$ . Поскольку  $s \mp \varepsilon \notin E_{2q}$ , существуют, как было доказано, ограниченные фредгольмовы операторы

$$(A, B) : H^{s \mp \varepsilon, \varphi, (2q)}(\Omega) \rightarrow \mathcal{H}_{s \mp \varepsilon, \varphi}(\Omega, \Gamma),$$

имеющие общие ядро  $N$ , дефектное подпространство (5.5) и индекс  $\dim N - \dim N^+$ . Применив к этим операторам интерполяцию со степенным параметром  $t^{1/2}$ , получим в силу предложения 3.4 и формулы (2.4) ограниченный фредгольмов оператор

$$(A, B) : H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega) \rightarrow [\mathcal{H}_{s-\varepsilon, \varphi}(\Omega, \Gamma), \mathcal{H}_{s+\varepsilon, \varphi}(\Omega, \Gamma)]_{1/2}. \quad (5.6)$$

Он имеет те же ядро, дефектное подпространство и индекс.

Покажем, что

$$[\mathcal{H}_{s-\varepsilon, \varphi}(\Omega, \Gamma), \mathcal{H}_{s+\varepsilon, \varphi}(\Omega, \Gamma)]_{1/2} = \mathcal{H}_{s, \varphi}(\Omega, \Gamma) \quad \text{с эквивалентностью норм.} \quad (5.7)$$

Пусть число  $\delta > 0$  такое, что  $s - \varepsilon - \delta > -1/2$  (это возможно, поскольку  $s \geq 1/2$ ). На основании теоремы 4.1 и предложений 3.2, 4.2 а) запишем

$$\mathcal{H}_{s \mp \varepsilon, \varphi}(\Omega, \Gamma) = [\mathcal{H}_{s-\varepsilon-\delta, 1}(\Omega, \Gamma), \mathcal{H}_{s+\varepsilon+\delta, 1}(\Omega, \Gamma)]_{\psi_{\mp}} \quad \text{с эквивалентностью норм.}$$

Здесь интерполяционные параметры  $\psi_{\mp}$  определяются по формулам

$$\psi_{-}(t) := t^{\delta/(2\varepsilon+2\delta)} \varphi(t^{1/(2\varepsilon+2\delta)}), \quad \psi_{+}(t) := t^{(2\varepsilon+\delta)/(2\varepsilon+2\delta)} \varphi(t^{1/(2\varepsilon+2\delta)}) \quad \text{при } t \geq 1$$

и  $\psi_{\mp}(t) := 1$  при  $0 < t < 1$ . Отсюда в силу теоремы 3.3 о повторной интерполяции получаем следующие равенства пространств с эквивалентностью норм в них:

$$\begin{aligned} & [\mathcal{H}_{s-\varepsilon, \varphi}(\Omega, \Gamma), \mathcal{H}_{s+\varepsilon, \varphi}(\Omega, \Gamma)]_{1/2} = \\ & = \left[ [\mathcal{H}_{s-\varepsilon-\delta, 1}(\Omega, \Gamma), \mathcal{H}_{s+\varepsilon+\delta, 1}(\Omega, \Gamma)]_{\psi_{-}}, [\mathcal{H}_{s-\varepsilon-\delta, 1}(\Omega, \Gamma), \mathcal{H}_{s+\varepsilon+\delta, 1}(\Omega, \Gamma)]_{\psi_{+}} \right]_{1/2} = \\ & = [\mathcal{H}_{s-\varepsilon-\delta, 1}(\Omega, \Gamma), \mathcal{H}_{s+\varepsilon+\delta, 1}(\Omega, \Gamma)]_{\psi}. \end{aligned} \quad (5.8)$$

Здесь интерполяционный параметр  $\psi$  определяется по формулам

$$\psi(t) := \psi_{-}(t) (\psi_{+}(t)/\psi_{-}(t))^{1/2} = t^{(\varepsilon+\delta)/(2\varepsilon+2\delta)} \varphi(t^{1/(2\varepsilon+2\delta)}) \quad \text{при } t \geq 1$$

и  $\psi(t) = 1$  при  $0 < t < 1$ . Поэтому на основании тех же теоремы 4.1 и предложений 3.2, 4.2 а) имеем

$$[\mathcal{H}_{s-\varepsilon-\delta, 1}(\Omega, \Gamma), \mathcal{H}_{s+\varepsilon+\delta, 1}(\Omega, \Gamma)]_{\psi} = \mathcal{H}_{s, \varphi}(\Omega, \Gamma) \quad \text{с эквивалентностью норм.} \quad (5.9)$$

Теперь равенства (5.8), (5.9) влекут формулу (5.7).

В силу (5.7) ограниченный фредгольмов оператор (5.6) означает существование оператора (5.2), удовлетворяющего условию настоящей теоремы. Теорема 5.1 доказана.

Как отмечалось выше, теорема 5.1 уточняет применительно к шкале пространств  $H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega)$  известный результат Я. А. Ройтберга о свойствах эллиптической краевой



задачи в модифицированной шкале соболевских пространств [3], [5] (см. также [28, с. 169], [4, с. 248]). В этой теореме  $s$  — произвольное вещественное число. Поэтому фредгольмовость оператора задачи установлена в *двусторонней* (иначе говоря, *полной*) модифицированной уточненной шкале пространств. Заметим, что этот оператор оставляет инвариантным параметр  $\varphi \in \mathcal{M}$ , характеризующий уточненную гладкость.

В силу теоремы 4.2 а) равенство  $(A, B)u = f$ , где  $u \in H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega)$ ,  $f \in \mathcal{H}_{s, \varphi}(\Omega, \Gamma)$ , равносильно тому, что вектор  $(u_0, u_1, \dots, u_{2q}) := T_{2q}u$  является обобщенным решением по Ройтбергу задачи (1.1). Указанный элемент  $u$  часто отождествляется с вектором  $(u_0, u_1, \dots, u_{2q})$  и также называется обобщенным решением задачи (1.1).

Из теоремы 4.3 в) вытекает, что оператор (5.2) совпадает с оператором

$$(A, B) : H^{s, \varphi}(\Omega) \rightarrow \mathcal{H}_{s, \varphi}(\Omega, \Gamma) \quad \text{при} \quad s > 2q - 1/2.$$

Его фредгольмовость установлена в [12] (теорема 4.1).

В частном случае  $N = N^+ = \{0\}$  оператор (5.2) является топологическим изоморфизмом в силу теоремы 5.1 и теоремы Банаха об обратном операторе. Следовательно, теорема 5.1 содержит теорему 1.1. В общем случае изоморфизм удобно задавать с помощью следующих проекторов (ср. [5], леммы 4.1.2 и 5.3.2).

**Лемма 5.1.** *Для произвольных  $s \in \mathbb{R}$  и  $\varphi \in \mathcal{M}$  существуют следующие разложения пространств  $H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega)$  и  $\mathcal{H}_{s, \varphi}(\Omega, \Gamma)$  в прямые суммы замкнутых подпространств:*

$$H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega) = N \dot{+} \{u \in H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega) : (u_0, w)_\Omega = 0 \text{ для любого } w \in N\}, \quad (5.10)$$

$$\mathcal{H}_{s, \varphi}(\Omega, \Gamma) = \{(v, 0, \dots, 0) : v \in N^+\} \dot{+} (A, B)(H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega)). \quad (5.11)$$

Здесь  $u_0$  — начальная компонента вектора  $(u_0, u_1, \dots, u_{2q}) := T_{2q}u$ . Обозначим через  $P$  косой проектор пространства  $H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega)$  на второе слагаемое суммы (5.10), а через  $Q^+$  косой проектор пространства  $\mathcal{H}_{s, \varphi}(\Omega, \Gamma)$  на второе слагаемое суммы (5.11) (параллельно первому слагаемому). Эти проекторы не зависят от  $s, \varphi$ .

**Доказательство.** Докажем (5.10). Из определения пространства  $H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega)$  вытекает, что отображение  $u \mapsto u_0$  является ограниченным оператором  $T_0 : H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega) \rightarrow H^{s, \varphi, (0)}(\Omega)$ . Поэтому, второе слагаемое суммы (5.10) — замкнутое подпространство. Оно имеет тривиальное пересечение с  $N$ . В силу предложения 4.1 б) и конечномерности подпространства  $N$  справедливо разложение

$$H^{s, \varphi, (0)}(\Omega) = N \dot{+} \{u_0 \in H^{s, \varphi, (0)}(\Omega) : (u_0, w)_\Omega = 0 \text{ для любого } w \in N\}.$$

Обозначим через  $\Pi$  косой проектор на первое слагаемое этой суммы параллельно второму слагаемому. Для произвольного  $u \in H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega)$  запишем  $u = u' + u''$ , где  $u' := \Pi u_0 \in N$ , а  $u'' := u - \Pi u_0 \in H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega)$  удовлетворяет условию  $(u'', w)_\Omega = (u_0 - \Pi u_0, w)_\Omega = 0$  при любом  $w \in N$ . Равенство (5.10) доказано.

Равенство (5.11) вытекает из того, что в силу теоремы 5.1 подпространства, записанные в сумме (5.11), замкнутые, имеют тривиальное пересечение и конечная размерность первого пространства совпадает с коразмерностью второго. Независимость проекторов  $P$  и  $Q^+$  от параметров  $s, \varphi$  вытекает из включений  $N, N^+ \subset C^\infty(\bar{\Omega})$ . Лемма 5.1 доказана.

**Теорема 5.2.** *Для произвольных параметров  $s \in \mathbb{R}$ ,  $\varphi \in \mathcal{M}$  сужение оператора (5.2) на подпространство  $P(H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega))$  является топологическим изоморфизмом*

$$(A, B) : P(H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega)) \leftrightarrow Q^+(\mathcal{H}_{s, \varphi, (2q)}(\Omega, \Gamma)). \quad (5.12)$$

**Доказательство.** Согласно теореме 5.1,  $N$  — ядро, а  $Q^+(\mathcal{H}_{s,\varphi,(2q)}(\Omega, \Gamma))$  — область значений оператора (5.2). Следовательно, оператор (5.12) — биекция. Кроме того, он ограничен. Значит, оператор (5.12) является топологическим изоморфизмом в силу теоремы Банаха об обратном операторе.

**Замечание 5.1.** Теорема 5.2 остается верной, если заменить проектор  $Q^+$  на оператор проектирования  $Q_1^+$  пространства  $\mathcal{H}_{s,\varphi,(2q)}(\Omega, \Gamma)$  на подпространство  $(A, B)(H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega))$  параллельно дефектному подпространству (5.5).

Из теоремы 5.2 вытекает следующая априорная оценка решения эллиптической краевой задачи (1.1).

**Теорема 5.3.** Для произвольных фиксированных параметров  $s \in \mathbb{R}$ ,  $\varphi \in \mathcal{M}$  и  $\sigma < s$  существует число  $c > 0$  такое, что для каждого  $u \in H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega)$  справедливо неравенство

$$\|u\|_{H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega)} \leq c \left( \|(A, B)u\|_{\mathcal{H}_{s,\varphi}(\Omega, \Gamma)} + \|u\|_{H^{\sigma,1,(2q)}(\Omega)} \right). \quad (5.13)$$

**Доказательство.** Пусть  $u \in H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega)$ . Так как  $N$  — конечномерное подпространство в пространствах  $H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega)$  и  $H^{\sigma,1,(2q)}(\Omega)$ , нормы в этих пространствах эквивалентны на  $N$ . В частности, для функции  $u - Pu \in N$  справедливо неравенство

$$\|u - Pu\|_{H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega)} \leq c_1 \|u - Pu\|_{H^{\sigma,1,(2q)}(\Omega)}$$

с постоянной  $c_1 > 0$ , не зависящей от  $u$ . Отсюда получаем

$$\begin{aligned} \|u\|_{H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega)} &\leq c_1 \|u - Pu\|_{H^{\sigma,1,(2q)}(\Omega)} + \|Pu\|_{H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega)} \leq \\ &\leq c_1 c_2 \|u\|_{H^{\sigma,1,(2q)}(\Omega)} + \|Pu\|_{H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega)}, \end{aligned} \quad (5.14)$$

где  $c_2$  — норма проектора  $1 - P$ , действующего в пространстве  $H^{\sigma,1,(2q)}(\Omega)$ . Далее, поскольку  $(A, B)Pu = (A, B)u$ , то  $Pu \in H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega)$  — прообраз распределения  $(A, B)u \in \mathcal{H}_{s,\varphi}(\Omega, \Gamma)$  при топологическом изоморфизме (5.12). Следовательно,

$$\|Pu\|_{H^{s,\varphi,(2q)}(\Omega)} \leq c_3 \|(A, B)u\|_{\mathcal{H}_{s,\varphi}(\Omega, \Gamma)},$$

где  $c_3$  — норма оператора, обратного к (5.12). Отсюда и из неравенства (5.14) вытекает оценка (5.13). Теорема 5.3 доказана.

**6. Локальная гладкость решения.** Предположим, что правые части эллиптической краевой задачи (1.1) имеют на некотором открытом в  $\bar{\Omega}$  множестве дополнительную гладкость в уточненной шкале пространств. Покажем, что обобщенное решение  $u$  унаследует такую же дополнительную гладкость на этом множестве. Предварительно рассмотрим случай дополнительной гладкости во всей области  $\bar{\Omega}$ .

**Теорема 6.1.** Пусть  $s \in \mathbb{R}$ . Предположим, что элемент  $u \in H^{s,1,(2q)}(\Omega)$  является обобщенным решением задачи (1.1), где

$$f \in H^{s+\varepsilon-2q,\varphi,(0)}(\Omega) \quad \text{и} \quad g_j \in H^{s+\varepsilon-m_j-1/2,\varphi}(\Gamma) \quad \text{при} \quad j = 1, \dots, q$$

для некоторых  $\varepsilon \geq 0$  и  $\varphi \in \mathcal{M}$ . Тогда  $u \in H^{s+\varepsilon,\varphi,(2q)}(\Omega)$ .

**Доказательство.** По условию и теореме 5.1 имеем

$$F := (f, g_1, \dots, g_q) = (A, B)u \in (A, B)(H^{s,1,(2q)}(\Omega)) \cap \mathcal{H}_{s+\varepsilon,\varphi}(\Omega, \Gamma) = (A, B)(H^{s+\varepsilon,\varphi,(2q)}(\Omega)).$$

Следовательно, существует такое  $v \in H^{s+\varepsilon, \varphi, (2q)}(\Omega)$ , что  $(A, B)v = F$ . Отсюда получаем  $(A, B)(u - v) = 0$ , что в силу теоремы 5.1 влечет  $w := u - v \in N \subset C^\infty(\overline{\Omega})$ . Таким образом, поскольку  $C^\infty(\overline{\Omega}) \subset H^{s+\varepsilon, \varphi, (2q)}(\Omega)$ , справедливо  $u = v + w \in H^{s+\varepsilon, \varphi}(\Omega)$ , что и требовалось доказать.

Рассмотрим теперь случай локальной гладкости. Пусть  $U$  — открытое непустое подмножество замкнутой области  $\overline{\Omega}$ . Положим  $\Omega_0 := U \cap \Omega$  и  $\Gamma_0 := U \cap \Gamma$  (возможен случай  $\Gamma_0 = \emptyset$ ). Введем следующие локальные аналоги пространств  $H^{\sigma, \varphi, (r)}(\Omega)$  и  $H^{\sigma, \varphi}(\Gamma)$ , где  $\sigma \in \mathbb{R}$ ,  $\varphi \in \mathcal{M}$  и целое  $r \geq 0$ . Положим

$$H_{\text{loc}}^{\sigma, \varphi, (r)}(\Omega_0, \Gamma_0) := \left\{ u \in \bigcup_{s \in \mathbb{R}} H^{s, 1, (r)}(\Omega) : \chi u \in H^{\sigma, \varphi, (r)}(\Omega) \text{ для всех } \chi \in C^\infty(\overline{\Omega}), \text{ supp } \chi \subset \Omega_0 \cup \Gamma_0 \right\},$$

$$H_{\text{loc}}^{\sigma, \varphi}(\Gamma_0) := \{ h \in \mathcal{D}'(\Gamma) : \chi h \in H^{\sigma, \varphi}(\Gamma) \text{ для всех } \chi \in C^\infty(\Gamma), \text{ supp } \chi \subset \Gamma_0 \}.$$

В связи с определением пространства  $H_{\text{loc}}^{\sigma, \varphi, (r)}(\Omega_0, \Gamma_0)$  отметим, что для произвольной функции  $\chi \in C^\infty(\overline{\Omega})$  отображение  $u \mapsto \chi u$ ,  $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$ , продолжается по непрерывности до ограниченного оператора в каждом пространстве  $H^{s, 1, (r)}(\Omega)$  [5] (п. 2.3). Тем самым для  $u \in H^{s, 1, (r)}(\Omega)$  корректно определено произведение  $\chi u \in H^{s, 1, (r)}(\Omega)$ .

**Теорема 6.2.** Пусть  $s \in \mathbb{R}$ . Предположим, что элемент  $u \in H^{s, 1, (2q)}(\Omega)$  является обобщенным решением задачи (1.1), где

$$f \in H_{\text{loc}}^{s+\varepsilon-2q, \varphi, (0)}(\Omega_0, \Gamma_0) \quad \text{и} \quad g_j \in H_{\text{loc}}^{s+\varepsilon-m_j-1/2, \varphi}(\Gamma_0) \quad \text{при} \quad j = 1, \dots, q \quad (6.1)$$

для некоторых  $\varepsilon \geq 0$  и  $\varphi \in \mathcal{M}$ . Тогда  $u \in H_{\text{loc}}^{s+\varepsilon, \varphi, (2q)}(\Omega_0, \Gamma_0)$ .

**Доказательство.** Покажем сначала, что из условия (6.1) вытекает следующее свойство повышения локальной гладкости решения  $u$ : для каждого числа  $r \geq 1$  справедлива импликация

$$u \in H_{\text{loc}}^{s+\varepsilon-r, \varphi, (2q)}(\Omega_0, \Gamma_0) \Rightarrow u \in H_{\text{loc}}^{s+\varepsilon-r+1, \varphi, (2q)}(\Omega_0, \Gamma_0). \quad (6.2)$$

Выберем произвольно функции  $\chi, \eta$  такие, что

$$\chi, \eta \in C^\infty(\overline{\Omega}); \quad \text{supp } \chi, \text{ supp } \eta \subset \Omega_0 \cup \Gamma_0 \quad \text{и} \quad \eta = 1 \quad \text{в окрестности} \quad \text{supp } \chi. \quad (6.3)$$

Переставив оператор умножения на функцию  $\chi$  с дифференциальными операторами  $A$  и  $B_j$ , где  $j = 1, \dots, q$ , можно записать для произвольного  $v \in C^\infty(\overline{\Omega})$  следующие равенства:

$$(A, B)(\chi v) = (A, B)(\chi \eta v) = \chi(A, B)(\eta v) + (A', B')(\eta v) = \chi(A, B)v + (A', B')(\eta v). \quad (6.4)$$

Здесь  $A'$  — некоторое линейное дифференциальное выражение в  $\overline{\Omega}$ , а  $B' = (B'_1, \dots, B'_q)$  — набор граничных линейных дифференциальных выражений на  $\Gamma$ . Коэффициенты этих выражений бесконечно гладкие, а порядки удовлетворяют условиям  $\text{ord } A' \leq 2k - 1$  и  $\text{ord } B'_j \leq m_j - 1$ . Отсюда следует, что отображение  $v \mapsto (A', B')v$ , где  $v \in C^\infty(\overline{\Omega})$ , продолжается по непрерывности до ограниченного оператора

$$(A', B') : H^{\sigma, \varphi, (2q)}(\Omega) \rightarrow \mathcal{H}_{\sigma+1, \varphi}(\Omega, \Gamma) \quad \text{для произвольного} \quad \sigma \in \mathbb{R}. \quad (6.5)$$

В случае  $\varphi \equiv 1$  это доказано в [5] (п. 2.3). Отсюда общий случай  $\varphi \in \mathcal{M}$  выводится с помощью интерполяции также как и в доказательстве теоремы 5.1. Аналогично доказывается, что оператор умножения на функцию класса  $C^\infty(\overline{\Omega})$  ограничен в пространствах  $H^{\sigma, \varphi, (r)}(\Omega)$  и  $\mathcal{H}_{\sigma, \varphi}(\Omega, \Gamma)$  для каждого  $\sigma \in \mathbb{R}$ . Следовательно, равенство (6.4) продолжается по непрерывности на класс функций  $v \in H^{\sigma, \varphi, (r)}(\Omega)$ . Возьмем в этом равенстве  $v := u$ , где  $u$  — указанное в условии решение задачи (1.1). Запишем

$$(A, B)(\chi u) = \chi F + (A', B')(\eta u). \quad (6.6)$$

Здесь вектор  $F := (f, g_1, \dots, g_q)$  удовлетворяет в силу (6.1) и (6.3) условию

$$\chi F \in \mathcal{H}_{s+\varepsilon, \varphi}(\Omega, \Gamma). \quad (6.7)$$

Предположим, что  $u \in H_{\text{loc}}^{s+\varepsilon-r, \varphi, (2q)}(\Omega_0, \Gamma_0)$  для некоторого числа  $r \geq 1$ . Тогда  $\eta u \in H^{s+\varepsilon-r, \varphi, (2q)}(\Omega)$ , что вместе с формулами (6.5) – (6.7) влечет включение

$$(A, B)(\chi u) \in \mathcal{H}_{s+\varepsilon-r+1, \varphi}(\Omega, \Gamma).$$

Отсюда в силу теоремы 6.1 следует свойство  $\chi u \in H^{s+\varepsilon-r+1, \varphi, (2q)}(\Omega)$ . Оно ввиду произвольности выбора функции  $\chi$ , удовлетворяющей условию (6.3), означает включение  $u \in H_{\text{loc}}^{s+\varepsilon-r+1, \varphi, (2q)}(\Omega_0, \Gamma_0)$ . Импликация (6.2) доказана.

Теперь легко вывести теорему из (6.2). В силу теоремы 4.3 г) имеем

$$u \in H^{s, 1, (2q)}(\Omega) \subset H^{s+\varepsilon-k, \varphi, (2q)}(\Omega) \subseteq H_{\text{loc}}^{s+\varepsilon-k, \varphi, (2q)}(\Omega_0, \Gamma_0)$$

для целого  $k > \varepsilon$ . Применив импликацию (6.2) последовательно для значений  $r = k, \dots, 1$ , получим

$$u \in H_{\text{loc}}^{s+\varepsilon-k, \varphi, (2q)}(\Omega_0, \Gamma_0) \Rightarrow u \in H_{\text{loc}}^{s+\varepsilon-k+1, \varphi, (2q)}(\Omega_0, \Gamma_0) \Rightarrow \dots \Rightarrow u \in H_{\text{loc}}^{s+\varepsilon, \varphi, (2q)}(\Omega_0, \Gamma_0),$$

что и требовалось доказать.

В соболевском случае  $\varphi \equiv 1$  теоремы 6.1, 6.2 доказаны Я. А. Ройтбергом [3], [5] (гл. 7) (см. также [4], гл. III, §6).

В качестве приложения теорем 6.1 и 6.2 приведем одно достаточное условие того, что обобщенное по Ройтбергу решение  $u$  эллиптической краевой задачи (1.1) является классическим, т.е. удовлетворяет условию

$$u \in H^{\sigma+2q, 1}(\Omega) \cap C^{2q}(\Omega) \cap C^m(\overline{\Omega}), \quad (6.8)$$

где  $\sigma > -1/2$ ,  $m := \max\{m_1, \dots, m_q\}$ . Это условие возникает следующим образом. В силу теоремы 4.3 в) и предложения 4.2 д) из включения

$$u \in H^{\sigma+2q, 1, (2q)}(\Omega) = H^{\sigma+2q, 1}(\Omega)$$

вытекает, что элемент  $u$  является решением задачи (1.1) в смысле теории распределений, заданных в области  $\Omega$ . Теперь корректно рассматривать включение  $u \in C^{2q}(\Omega) \cap C^m(\overline{\Omega})$ . Оно означает, что в (1.1) функции  $A_i u$  и  $B_j u$  вычисляются с помощью классических производных, т.е. решение  $u$  классическое.

**Теорема 6.3.** Пусть  $s \in \mathbb{R}$ . Предположим, что элемент  $u \in H^{s, 1, (2q)}(\Omega)$  является обобщенным решением задачи (1.1), где

$$f \in H_{\text{loc}}^{n/2, \varphi, (0)}(\Omega, \emptyset) \cap H^{m-2q+n/2, \varphi, (0)}(\Omega) \cap H^{\sigma, 1, (0)}(\Omega), \quad (6.9)$$

$$g_j \in H^{m-m_j+(n-1)/2, \varphi}(\Gamma) \cap H^{\sigma+2q-m_j-1/2, 1}(\Gamma) \quad \text{при } j = 1, \dots, q \quad (6.10)$$

для некоторых числа  $\sigma > -1/2$  и функционального параметра  $\varphi \in \mathcal{M}$ , удовлетворяющего неравенству (4.2). Тогда решение  $u$  классическое.

**Доказательство.** В силу теорем 6.1, 6.2 из условий (6.9), (6.10) вытекает включение

$$u \in H_{\text{loc}}^{2q+n/2, \varphi, (2q)}(\Omega, \emptyset) \cap H^{m+n/2, \varphi, (2q)}(\Omega) \cap H^{\sigma+2q, 1, (2q)}(\Omega).$$

Отсюда на основании предложения 4.1 д) и теоремы 4.3 в) имеем:

$$u \in H^{m+n/2, \varphi, (2q)}(\Omega) \cap H^{\sigma+2q, 1, (2q)}(\Omega) = H^{m+n/2, \varphi}(\Omega) \cap H^{\sigma+2q, 1}(\Omega) \subset C^m(\overline{\Omega}) \cap H^{\sigma+2q, 1}(\Omega).$$

(Последнее равенство становится ясным, если рассмотреть отдельно случаи  $m + n/2 \geq \sigma + 2q$  и  $m + n/2 < \sigma + 2q$  и воспользоваться пунктом г) теоремы 4.3.) Кроме того,

$$\chi u \in H^{2q+n/2, \varphi, (2q)}(\Omega) = H^{2q+n/2, \varphi}(\Omega) \subset C^{2q}(\overline{\Omega})$$

для любой функции  $\chi \in C_0^\infty(\Omega)$ , что влечет включение  $u \in C^{2q}(\Omega)$ . Таким образом, выполняется условие (6.8), т. е.  $u$  — классическое решение. Теорема 6.3 доказана.

**7. Корректность определения некоторых пространств.** Покажем, что пространство (2.4) не зависит от использованного в его определении параметра  $\varepsilon$ .

**Теорема 7.1.** Пусть  $r \in \mathbb{N}$ ,  $s \in E_r$  и  $\varphi \in \mathcal{M}$ . Пространство

$$H^{s, \varphi, (r)}(\Omega, \varepsilon) := [H^{s-\varepsilon, \varphi, (r)}(\Omega), H^{s+\varepsilon, \varphi, (r)}(\Omega)]_{1/2}$$

не зависит с точностью до эквивалентности норм от параметра  $\varepsilon \in (0, 1)$ .

**Доказательство.** Предположим сначала, что  $r = 2q$  — четное число. Рассмотрим какую-либо регулярную эллиптическую краевую задачу (1.1), для которой пространства  $N$  и  $N^+$  тривиальны. (Например, задачу Дирихле для  $A := (1 - \Delta^q)$ , где  $\Delta$  — оператор Лапласа.) Согласно теореме 5.1 существует топологический изоморфизм

$$(A, B) : H^{s, \varphi, (2q)}(\Omega, \varepsilon) \leftrightarrow \mathcal{H}_{s, \varphi}(\Omega, \Gamma) \quad \text{при } 0 < \varepsilon < 1.$$

Отсюда немедленно следует теорема для четного  $r = 2q$ .

Предположим далее, что число  $r$  нечетное. В силу теоремы 4.2 для любого числа  $\sigma \in (-\infty, r + 1/2) \setminus E_r$  существуют изометрические изоморфизмы

$$T_r : H^{\sigma, \varphi, (r)}(\Omega) \leftrightarrow K_{\sigma, \varphi, (r)}(\Omega, \Gamma),$$

$$T_{r+1} : H^{\sigma, \varphi, (r+1)}(\Omega) \leftrightarrow K_{\sigma, \varphi, (r+1)}(\Omega, \Gamma) = K_{\sigma, \varphi, (r)}(\Omega, \Gamma) \times H^{\sigma-r-1/2, \varphi}(\Gamma).$$

Поэтому композиция отображений

$$u \mapsto T_{r+1} u =: (u_0, u_1, \dots, u_r, u_{r+1}) \mapsto (T_r^{-1}(u_0, u_1, \dots, u_r), u_{r+1}), \quad u \in H^{\sigma, \varphi, (r+1)}(\Omega),$$

определяет изометрический изоморфизм

$$T : H^{\sigma, \varphi, (r+1)}(\Omega) \leftrightarrow H^{\sigma, \varphi, (r)}(\Omega) \times H^{\sigma-r-1/2, \varphi}(\Gamma).$$

Возьмем здесь  $\sigma = s \mp \varepsilon$ , где  $0 < \varepsilon < 1$ , и применим интерполяцию со степенным параметром  $t^{1/2}$ . Получим топологический изоморфизм

$$T : H^{s, \varphi, (r+1)}(\Omega, \varepsilon) \leftrightarrow H^{s, \varphi, (r)}(\Omega, \varepsilon) \times H^{s-r-1/2, \varphi}(\Gamma) := X(\varepsilon). \quad (7.1)$$

При этом используется предложение 3.2 и интерполяционное равенство

$$\left[ H^{s-\varepsilon-r-1/2,\varphi}(\Gamma), H^{s+\varepsilon-r-1/2,\varphi}(\Gamma) \right]_{1/2} = H^{s-r-1/2,\varphi}(\Gamma) \quad \text{с эквивалентностью норм,}$$

которое доказывается аналогично равенству (5.7). Теперь в силу (7.1) имеем

$$\|u\|_{H^{s,\varphi,(r)}(\Omega,\varepsilon)} = \|(u, 0)\|_{X(\varepsilon)} \asymp \|T^{-1}(u, 0)\|_{H^{s,\varphi,(r+1)}(\Omega,\varepsilon)}.$$

Отсюда, поскольку параметр  $r + 1$  четный, вытекает, по доказанному, что нормы в пространствах  $H^{s,\varphi,(r)}(\Omega,\varepsilon)$ , где  $0 < \varepsilon < 1$ , эквивалентны. Значит, эти пространства равны, поскольку множество  $C^\infty(\bar{\Omega})$  плотно в каждом из них согласно теореме 4.3 б). Теорема 7.1 доказана.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] *Лионс Ж.-Л., Мадженес Э.* Неоднородные граничные задачи и их приложения. – Москва: Мир, 1971. – 372 с.
- [2] *Березанский Ю. М., Крейн С. Г., Ройтберг Я. А.* Теорема о гомеоморфизмах и локальное повышение гладкости вплоть до границы решений эллиптических уравнений // Докл. АН СССР. – 1963. – **148**, № 4. – С. 745 – 748.
- [3] *Ройтберг Я. А.* Эллиптические задачи с неоднородными граничными условиями и локальное повышение гладкости вплоть до границы обобщенных решений // Докл. АН СССР. – 1964. – **157**, № 4. – С. 798 – 801.
- [4] *Березанский Ю. М.* Разложение по собственным функциям самосопряженных операторов. – Киев: Наукова думка, 1965. – 800 с.
- [5] *Roitberg Ya. A.* Elliptic boundary value problems in the spaces of distributions. – Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 1996. – 427 p.
- [6] *Kozhevnikov A.* Complete scale of isomorphisms for elliptic pseudodifferential boundary-value problems // J. London Math. Soc. (2-nd series). – 2001. – **64**, № 2. – P. 409 – 422.
- [7] *Хермандер Л.* Линейные дифференциальные операторы с частными производными. – Москва: Мир, 1965. – 380 с.
- [8] *Хермандер Л.* Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными: В 4-х т. Т. 2. Дифференциальные операторы с постоянными коэффициентами. – Москва: Мир, 1986. – 456 с.
- [9] *Волевич Л.Р., Панелях Б.П.* Некоторые пространства обобщенных функций и теоремы вложения // Успехи мат. наук. – 1965. – **20**, № 1. – С. 3 – 74.
- [10] *Paneah B.* The oblique derivative problem. The Poincaré problem. – Berlin etc: Wiley-VCH, 2000. – 348 p.
- [11] *Mikhailets V. A., Murach A. A.* Improved scale of spaces and elliptic boundary-value problems. I // Ukrainian Math. J. – 2006. – **58**, № 2. – P. 244–262.
- [12] *Mikhailets V. A., Murach A. A.* Improved scale of spaces and elliptic boundary-value problems. II // Ukrainian Math. J. – 2006. – **58**, № 3. – P. 398–417.
- [13] *Alimov Sh. A., Il'in V. A., Nikishin E. M.* Convergence problems of multiple trigonometric series and spectral decompositions. I // Russian Math. Surveys. – 1976. – **31**, № 6. – P. 29 – 86.
- [14] *Mikhailets V. A.* Asymptotics of the spectrum of elliptic operators and boundary conditions // Soviet Math. Dokl. – 1982. – **266**, № 5. – P. 464–468.
- [15] *Mikhailets V. A.* A precise estimate of the remainder in the spectral asymptotics of general elliptic boundary problems // Funct. Anal. Appl. – 1989. – **23**, № 2. – P. 137–139.
- [16] *Kalyabin G. A., Lizorkin P. I.* Spaces of functions of generalized smoothness // Math. Nachr. – 1987. – **133**, № 1. – P. 7 – 32.
- [17] *Haroske D. D., Moura S. D.* Continuity envelopes of spaces of generalised smoothness, entropy and approximation numbers // J. Approximation Theory. – 2004. – **128**. – P. 151–174.

- [18] *Farkas W., Leopold H.-G.* Characterisations of function of generalized smoothness // *Ann. Mat. Pura Appl.* – 2006. – **185**, № 1. – P. 1–62.
- [19] *Шлензак Г.* Эллиптические задачи в уточненной шкале пространств // *Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, мат., мех.* – 1974. – **29**, № 4. – С. 48 – 58.
- [20] *Михайлец В. А., Мурач А. А.* Уточненные шкалы пространств и эллиптические краевые задачи. III // *Укр. мат. журн.* – 2007. – **59**, № 5. – С. 679 – 701.
- [21] *Mikhailets V. A., Murach A. A.* Regular elliptic boundary-value problem for a homogeneous equation in a two-sided improved scale of spaces // *Ukrainian Math. J.* – 2006. – **58**, № 11. – P. 1748–1767.
- [22] *Mikhailets V. A., Murach A. A.* Elliptic operator with homogeneous regular boundary conditions in two-sided refined scale of spaces // *Ukr. Math. Bull.* – 2006. – **3**, № 4. – P. 529–560.
- [23] *Мурач А. А.* Эллиптические псевдодифференциальные операторы в уточненной шкале пространств на замкнутом многообразии // *Укр. мат. журн.* – 2007. – **59**, № 6. – С. 798 – 814.
- [24] *Mikhailets V. A., Murach A. A.* Elliptic systems of pseudodifferential equations in a refined scale on a closed manifold // *arXiv:0711.2164v1 [math.AP]*. – 14 Nov 2007. – 6 p.
- [25] *Mikhailets V. A., Murach A. A.* Interpolation with a function parameter and refined scale of spaces // *arXiv:0712.1135v1 [math.AP]*. – 7 Dec 2007. – 23 p.
- [26] *Мурач А. А.* Эллиптические краевые задачи в полных шкалах пространств типа Лизоркина–Трибеля // *Докл. АН Украины.* – 1994. – № 12. – С. 36 – 39.
- [27] *Murach A. A.* Elliptic boundary value problems in complete scales of Nikolskii-type spaces // *Ukrainian Math. J.* – 1994. – **46**, № 12. – P. 1827 – 1835.
- [28] *Функциональный анализ* / Под общ. ред. С. Г. Крейна. – Москва: Наука, 1972. – 544 с.
- [29] *Agranovich M. S.* Elliptic boundary problems // *Encycl. Math. Sci.*, 79. Part. Different. Equat. – Berlin: Springer, 1997. – P. 1 – 144.
- [30] *Сенета Е.* Правильно меняющиеся функции. – Москва: Наука, 1985. – 142 с.
- [31] *Трибель Х.* Теория интерполяции, функциональные пространства, дифференциальные операторы. – Москва: Мир, 1980. – 664 с.
- [32] *Михайлец В. А., Мурач А. А.* Интерполяция с функциональным параметром и пространства дифференцируемых функций // *Доп. НАН України.* – 2006. – № 6. – С. 13 – 18.
- [33] *Geymonat G.* Sui problemi ai limiti per i sistemi lineari ellittici // *Annali di Matematica Pura ed Applicata. Ser. 4.* – 1965. – **69**. – P. 207 – 284.

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАИНЫ, УЛ. ТЕРЕЩЕНКИВСЬКА 3, КИЕВ, УКРАИНА, 01601

*E-mail address:* mikhailets@imath.kiev.ua

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАИНЫ, УЛ. ТЕРЕЩЕНКИВСЬКА 3, КИЕВ, УКРАИНА, 01601,  
ЧЕРНИГОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УЛ. ШЕВЧЕНКА 95, ЧЕРНИГОВ 14027, УКРАИНА

*E-mail address:* murach@imath.kiev.ua