

Über die Berechnung der geographischen Längen und Breiten aus geodätischen Vermessungen*

F. W. Bessel

Königsberger Sternwarte

(Originally published: October 1825; transcribed: August 13, 2009; revised: March 29, 2012)

1.

Die Aufgabe: aus der gegebenen Polhöhe eines Punkts A , aus der, auf der geodätischen Linie gemessenen Entfernung eines anderen Punkts B von dem ersteren, und aus dem Winkel dieser Linie mit dem Meridiane von A , die Polhöhe und den Mittagsunterschied des zweiten Punkts, so wie den Winkel der geodätischen Linie mit dem Meridiane desselben zu finden, ist von so häufiger Anwendung, daß ich die Mittheilung der von mir, zur Erleichterung der Rechnung entworfenen Tafeln, nicht für unnütz halte. Wie die Vermessungen so berechnet werden können, daß man die Entfernungen aller Punkte derselben, von dem Hauptpunkte, auf geodätischen Linien gemessen, und die Azimuthe dieser Linien erhält, habe ich in Nr. 3 und 6 der Astronomischen Nachrichten gezeigt.

Meine Tafeln weichen, in ihrer Einrichtung, von anderen, desselben Zwecks wegen bekannt gemachten Tafeln ab, und können auch im Resultate, mit der oft angewandten *Dusejournschen* Berechnungsart nicht ganz übereinstimmen, indem diese die Entfernungen und Azimuthe nicht auf die geodätischen Linien bezieht. Um dieselben deutlich erklären zu können, werde ich die Entwicklungen, worauf sie beruhen, ganz mittheilen, und dabei mit der Ableitung der Eigenschaften der geodätischen Linien auf dem Rotationssphäroid anfangen, selbst wenn Bekanntes dadurch wiederholt wird. Da das hier nothwendige sich kurz genug fassen läßt, so darf der Vortheil, alles hierhergehörige beisammen zu haben, nicht theuer erkauft werden.

2.

Wenn man zwei Punkte A und B , auf der Oberfläche eines Rotations-Sphäroids, durch eine nach irgend einem Gesetze gezogene Curve verbindet, und in derselben zwei unendlich nahe Punkte annimmt, welchen die Polhöhen ϕ und $\phi + d\phi$, und die vom Meridiane von A gezählten geographischen Längen w und $w + dw$ (östlich positiv, westlich negativ

genommen) zugehören; wenn man ferner die Entfernung derselben durch ds , den Winkel, in welchem der von A kommende Theil der Curve den Meridian durchschneidet (von Norden rechts herum, von 0 bis 360° gezählt) durch α , den Halbmesser des Parallelkreises durch r , den Krümmungshalbmesser durch R bezeichnet, so hat man:

$$\begin{aligned} ds \cos \alpha &= -R d\phi = \frac{dr}{\sin \phi} \\ ds \sin \alpha &= -r dw \end{aligned} \quad (1)$$

woraus folgt

$$ds = \sqrt{R^2 d\phi^2 + r^2 dw^2}$$

oder, wenn man, um abzukürzen, p für $d\phi/dw$ und U für $\sqrt{R^2 p^2 + r^2}$ schreibt,

$$ds = U dw.$$

Die Entfernung der beiden Punkte A und B , auf der Curve gemessen, ist daher

$$s = \int U dw$$

das Integral von A bis B genommen. Soll die Curve die geodätische oder kürzeste Linie sein, so muß ihr Gesetz, oder die Relation zwischen ϕ und w , so angenommen werden, daß dieses Integral ein Minimum wird; oder wenn man, statt derjenigen Relation zwischen ϕ und w , welche dieses leistet, eine andere setzt, in welcher demselben w nicht ϕ , sondern $\phi + z$ zugehört, wo z eine willkürliche Function von w ist, welche an den Punkten A und B verschwindet, indem diese Punkte beiden Curven gemeinschaftlich sind, so muß

$$s' = \int U' dw$$

großer sein als s und zwar für ein unbestimmtes z .

Man erhält aber, nach dem *Taylor'schen* Lehrsatz,

$$U' = U + \left(\frac{dU}{d\phi}\right)z + \left(\frac{dU}{dp}\right)\frac{dz}{dw} + \dots$$

und daher

$$s' = s + \int \left(\frac{dU}{d\phi}\right)z dw + \int \left(\frac{dU}{dp}\right)dz + \dots$$

*This transcription of *Astronomische Nachrichten* 4(86), 241–254 (1825), doi:10.1002/asna.18260041601, has been edited by Charles F. F. Karney (charles.karney@sri.com) and Rodney E. Deakin (rod.deakin@rmit.edu.au). The paper also appears in *Abhandlungen von Friedrich Wilhelm Bessel*, Vol. 3 (W. Engelmann, Leipzig, 1876). The text follows the original; however the mathematical notation has been updated to conform to current conventions. Several errors have been corrected and the tables have been recomputed. An English translation of this paper is available at arXiv:0908.1824.

wo die geschriebenen Glieder von der Ordnung von z , die nur angedeuteten aber von höheren Ordnungen sind; es muß also

$$\int \left(\frac{dU}{d\phi} \right) z dw + \int \left(\frac{dU}{dp} \right) dz + \dots$$

keinen negativen Werth haben, welche Function man auch für z annehmen mag. Da dieses auch für entgegengesetzte Annahmen, z und $-z$ gelten muß, und man die Freiheit hat, z so klein anzunehmen, daß die Glieder der ersten Ordnung größer werden, als die Summe der übrigen, außer wenn jene verschwinden, so folgt, daß das Minimum nur stattfinden kann, wenn die Glieder der ersten Ordnung verschwinden: man hat also die Bedingung des Minimums,

$$0 = \int \left(\frac{dU}{d\phi} \right) z dw + \int \left(\frac{dU}{dp} \right) dz$$

und wenn man für das zweite Glied $z(dU/dp) - \int z d(dU/dp)$ setzt und sich erinnert, daß z für beide Grenzen des Integrals verschwindet,

$$0 = \int z \left\{ \left(\frac{dU}{d\phi} \right) dw - d \left(\frac{dU}{dp} \right) \right\}.$$

Da dieses Integral für ein unbestimmtes z verschwinden muß, so ist

$$0 = \left(\frac{dU}{d\phi} \right) dw - d \left(\frac{dU}{dp} \right)$$

oder, durch Multiplication mit $d\phi/dw = p$

$$0 = \left(\frac{dU}{d\phi} \right) d\phi - p d \left(\frac{dU}{dp} \right)$$

wovon das Integral

$$\text{const.} = U - p \left(\frac{dU}{dp} \right)$$

ist. Setzt man für U seinen Ausdruck, nämlich $\sqrt{r^2 + R^2 p^2}$, so erhält man

$$\text{const.} = \frac{r}{\sqrt{1 + (R^2/r^2)p^2}} = -r \sin \alpha$$

welches die bekannte charakteristische Eigenschaft der geodätischen Linie ist.

Man hat also, wenn das Azimuth der geodätischen Linie am Punkte A , durch α' , und die Entfernung dieses Punkts von der Drehungsaxe durch r' bezeichnet werden,

$$r' \sin(\alpha' + 180^\circ) = r \sin \alpha$$

oder

$$r' \sin \alpha' = -r \sin \alpha \quad (2)$$

3.

Bezeichnet man die größte Entfernung des Sphäroids von der Rotationsaxe durch a , so sind r und r' kleiner, oder wenigstens nicht größer als a , und man kann setzen

$$r' = a \cos u'; \quad r = a \cos u$$

wodurch die Gleichung (2) die Form

$$\cos u' \sin \alpha' = -\cos u \sin \alpha \quad (3)$$

annimmt. Diese Gleichung enthält die Relation zwischen zwei Seiten eines sphärischen Dreiecks $90^\circ - u'$ und $90^\circ - u$ und den ihnen gegenüberstehenden Winkeln $360^\circ - \alpha$ und α' . Die dritte Seite desselben sphärischen Dreiecks und der ihr gegenüberstehende Winkel, welche ich durch σ und ω bezeichnen werde, geben, wenn man sie in die Rechnung einführt, elegante Ausdrücke für die zusammengehörigen Veränderungen von s , u und w . Man hat nämlich, durch die bekannten Differentialformeln der sphärischen Trigonometrie

$$\begin{aligned} du &= -\cos \alpha d\sigma \\ \cos u d\omega &= -\sin \alpha d\sigma \end{aligned}$$

und wenn man dieses in die Gleichungen (1) setzt, nachdem man in denselben r durch u ausgedrückt hat,

$$\begin{aligned} ds &= a \frac{\sin u}{\sin \phi} d\sigma \\ dw &= \frac{\sin u}{\sin \phi} d\omega \end{aligned} \quad (4)$$

4.

Die Erdmeridiane werde ich jetzt als elliptisch annehmen, und ihre halbe große Axe durch a , die halbe kleine Axe durch b , die Excentricität durch e bezeichnen. Differentiirt man die Gleichung der Ellipse für Coordinaten aus dem Mittelpunkte

$$1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

und setzt man $-\cot \phi$ für dy/dx , so erhält man

$$0 = \frac{x \sin \phi}{a^2} - \frac{y \cos \phi}{b^2}$$

und aus der Verbindung beider Gleichungen

$$x = \frac{a \cos \phi}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}}.$$

Dieses x ist unser r , also $= a \cos u$, woraus man erhält

$$\begin{aligned} \cos u &= \frac{\cos \phi}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}}; & \cos \phi &= \frac{\cos u \sqrt{1 - e^2}}{\sqrt{1 - e^2 \cos^2 u}} \\ \sin u &= \frac{\sin \phi \sqrt{1 - e^2}}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}}; & \sin \phi &= \frac{\sin u}{\sqrt{1 - e^2 \cos^2 u}} \\ \tan u &= \tan \phi \sqrt{1 - e^2}; & \tan \phi &= \frac{\tan u}{\sqrt{1 - e^2}} \end{aligned}$$

und

$$\frac{\sin u}{\sin \phi} = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 u}$$

Substituiert man dieses in den Differentialen (4), so erhält man für das elliptische Rotationssphäroid

$$\begin{aligned} ds &= a\sqrt{1 - e^2 \cos^2 u} d\sigma \\ dw &= \sqrt{1 - e^2 \cos^2 u} d\omega \end{aligned} \quad (5)$$

5.

Um das erste dieser Differentiale zu integrieren, werde ich den drei Gleichungen zwischen u' , u , α' , α und σ ,

$$\begin{aligned} \sin u &= \sin u' \cos \sigma + \cos u' \sin \sigma \cos \alpha' \\ \cos u \cos \alpha &= \sin u' \sin \sigma - \cos u' \cos \sigma \cos \alpha' \\ \cos u \sin \alpha &= -\cos u' \sin \alpha' \end{aligned} \quad (6)$$

durch Einführung der Hülfswinkel m und M , welche ich nach den Formeln

$$\begin{aligned} \sin u' &= \cos m \sin M \\ \cos u' \cos \alpha' &= \cos m \cos M \\ \cos u' \sin \alpha' &= \sin m \end{aligned} \quad (7)$$

bestimme, die Form

$$\begin{aligned} \sin u &= \cos m \sin(M + \sigma) \\ \cos u \cos \alpha &= -\cos m \cos(M + \sigma) \\ \cos u \sin \alpha &= -\sin m \end{aligned} \quad (8)$$

geben. Dadurch erhält man

$$\cos^2 u = 1 - \cos^2 m \sin^2(M + \sigma)$$

und

$$ds = a\sqrt{1 - e^2 + e^2 \cos^2 m \sin^2(M + \sigma)} d\sigma \quad (9)$$

Die Integration dieses Differentials hängt von den elliptischen Transcendenten ab und ist von *Legendre*, in den Exercices de calcul intégral, gegeben. Allein die Hilfsmittel zur Berechnung dieser Transcendenten, scheinen noch nicht eine solche Vollständigkeit oder Geschmeidigkeit erlangt zu haben, daß die Entwicklung in eine Reihe, welche, bei der Kleinheit von e^2 sehr schnell convergirt, nicht bequemer sein sollte. Man erhält dieselbe am leichtesten durch Zerfallung der Größe unter dem Wurzelzeichen in zwei imaginäre Factoren, nämlich

$$ds = \frac{1}{2}a d\sigma \left(\sqrt{1 - e^2 \sin^2 m} + \sqrt{1 - e^2} \right) \times \left(1 - \epsilon c^{2i(M+\sigma)} \right)^{1/2} \left(1 - \epsilon c^{-2i(M+\sigma)} \right)^{1/2}$$

wo c die Grundzahl der natürlichen Logarithmen und i die Quadratwurzel aus -1 bezeichnen, und ϵ für

$$\frac{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 m} - \sqrt{1 - e^2}}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 m} + \sqrt{1 - e^2}}$$

geschrieben ist. Setzt man hier

$$\frac{e \cos m}{\sqrt{1 - e^2}} = \tan E.$$

so wird $\epsilon = \tan^2 \frac{1}{2}E$ und

$$ds = a\sqrt{1 - e^2} \frac{\cos^2 \frac{1}{2}E}{\cos E} d\sigma \times \sqrt{1 - \epsilon c^{2i(M+\sigma)}} \sqrt{1 - \epsilon c^{-2i(M+\sigma)}}$$

Löst man die beiden Factoren unter dem Wurzelzeichen in unendliche Reihen auf, und multiplicirt man diese in einander, so erhält man

$$ds = a\sqrt{1 - e^2} \frac{\cos^2 \frac{1}{2}E}{\cos E} d\sigma [A - 2B \cos 2(M + \sigma) - 2C \cos 4(M + \sigma) - 2D \cos 6(M + \sigma) - \dots]$$

wo $A, B, C \dots$ folgende unendliche Reihen bezeichnen:

$$\begin{aligned} A &= 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \epsilon^2 + \left(\frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4}\right)^2 \epsilon^4 + \left(\frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^2 \epsilon^6 + \dots \\ B &= \frac{1}{2}\epsilon - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} \frac{1}{2} \epsilon^3 - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} \epsilon^5 \\ &\quad - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \epsilon^7 - \dots \\ C &= \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} \epsilon^2 - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{1}{2} \epsilon^4 - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} \epsilon^6 \\ &\quad - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \epsilon^8 - \dots \end{aligned}$$

etc.

Das Integral dieses Differentials, von $\sigma = 0$ angerechnet, ist daher

$$\begin{aligned} s &= b \frac{\cos^2 \frac{1}{2}E}{\cos E} [A\sigma - 2B \cos(2M + \sigma) \sin \sigma \\ &\quad - \frac{2}{3}C \cos(4M + 2\sigma) \sin 2\sigma \\ &\quad - \frac{2}{5}D \cos(6M + 3\sigma) \sin 3\sigma \\ &\quad - \dots] \end{aligned} \quad (10)$$

6.

Diese Reihe giebt die Entfernung s der Punkte A und B , durch u' , α' und σ ausgedrückt; sind dagegen s und α' durch die Vermessung und u' durch die Polhöhe des Punkts A , bekannt, so findet man σ durch Auflösung der eben gegebenen transcendenten Gleichung; die Polhöhe des Punkts B und das Azimuth der geodätischen Linie an demselben, finden sich dann nach (8). Die Auflösung der transcendenten Gleichung kann man, entweder durch Umkehrung der Reihe (10), oder durch successive Annäherungen erhalten; — der letzte Weg ist aber der bequemste, wenn man ihn durch die Tafeln erleichtert, welche ich hier mittheile.

Ich setze nämlich

$$\sigma = \frac{\alpha}{b}s + \beta \cos(2M + \sigma) \sin \sigma + \gamma \cos(4M + 2\sigma) \sin 2\sigma + \dots \quad (11)$$

wo

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{648\,000}{\pi} \frac{\cos E}{\cos^2 \frac{1}{2}E} \frac{1}{A} \\ \beta &= \frac{648\,000}{\pi} \frac{2B}{A} \\ \gamma &= \frac{648\,000}{\pi} \frac{C}{A} \\ \delta &= \frac{648\,000}{\pi} \frac{2D}{3A} \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Die Tafeln enthalten die Logarithmen von α , β , γ und sind so eingerichtet, daß ihr Argument

$$= \log \frac{e \cos m}{\sqrt{1-e^2}}$$

ist. Durch diese Einrichtung erlangt man den Vortheil, daß die Zahlen in der Tafel für $\log \beta$, immer sehr nahe um die doppelte Differenz des Arguments, und in der Tafel für $\log \gamma$, um die vierfache Differenz des Arguments wachsen, wodurch der Gebrauch der Tafeln sehr erleichtert wird.

Man nimmt $\alpha s/b$ als den ersten Näherungswerth von σ an, substituirt denselben im zweiten Gliede und erhält dadurch einen zweiten Näherungswerth, mit welchem man das zweite Glied neu berechnet und das dritte hinzufügt. Die Convergenz der Reihe ist so groß, daß, wenn man das Argument auch 9,1 annimmt (welchen Werth es nur bei einer Abplattung $> \frac{1}{128}$ erlangen kann), die Näherung nie weiter getrieben zu werden braucht, ohne σ um 0,001'' fehlerhaft zu geben. Das von δ abhängige Glied beträgt, für diesen Werth des Arguments, nur 0,0005''.

7.

Die Tafel für $\log \alpha$ hat 8 Decimalen; ein Fehler einer halben Einheit der letzten Decimale erzeugt erst für $\sigma = 12^\circ 4'$, oder für etwa 700 000 Toisen Entfernung, einen Fehler von 0,0005'', welcher 0,008 Toisen entspricht. Für denselben Werth von σ rechnet man, mit der Tafel für $\log \beta$, wenn man alle Decimalen benutzt, welche sie enthält, bis auf eine noch kleinere Größe genau; da eine größere Genauigkeit kein Interesse zu haben scheint, indem die Genauigkeit der Tafeln die Sicherheit der Vermessungen schon weit überschreitet, so daß es unnütz sein würde, mit mehr als 8 Decimalen zu rechnen, so habe ich der Tafel für $\log \beta$ zwar am Ende 6 Decimalen gegeben, allein früher davon so viele weggelassen, als geschehen konnte, ohne das Resultat 0,0005'' zweifelhaft zu machen. Das dritte Glied ist, für den angegebenen Werth von σ , selbst am Ende der Tafel, nie größer als 0,17'', weshalb ich der Tafel für $\log \gamma$ nur 3 Decimalen gegeben habe. — Die Tafeln werden also, wenn die Entfernungen nicht größer sind als

700 000 Toisen, die Annäherung eines Tausendtheils einer Secunde geben, und selbst wenn die Entfernung einen Erdquadranten betrüge, so würden die Tafeln ein Hundertheil einer Secunde nicht zweifelhaft lassen.

8.

Um den Gebrauch der Tafeln durch ein Beispiel zu erläutern, werde ich die Lage von Dünkirchen, gegen Seeberg, so annehmen, wie sie Herr General-Lieutenant *von Müffling* im 27^{sten} Stücke der Astronomischen Nachrichten, aus seiner großen Vermessung gefolgt hat; nämlich

$$\begin{aligned} \log s &= 5,478\,303\,14 \\ \alpha' &= 274^\circ 21' 3,18'' \end{aligned}$$

ferner nehme ich die Polhöhe der Seeberger Sternwarte $\phi' = 50^\circ 56' 6,7''$; $\log b = 6,513\,354\,64$, $\log e = 8,905\,4355$.

Aus der Formel $\tan u' = \sqrt{1-e^2} \tan \phi'$ findet man,

$$\begin{aligned} \log \tan \phi' &= 0,090\,626\,65 \\ \log \sqrt{1-e^2} &= 9,998\,590\,60 \\ \log \tan u' &= 0,089\,217\,25; \quad u' = 50^\circ 50' 39,057'' \end{aligned}$$

Aus u' and α' erhält man M , $\cos m$ und $\sin m$:

$$\begin{aligned} \log \sin u' &= 9,889\,543\,51 \\ \log \cos u' &= 9,800\,326\,27 \\ \log \cos \alpha' &= 8,880\,037\,33 \\ \log \sin \alpha' &= 9,998\,746\,62(-) \\ \log(\cos m \sin M) &= 9,889\,543\,51 \\ \log(\cos m \cos M) &= 8,680\,363\,60 \\ \log \sin m &= 9,799\,072\,89(-) \\ M &= 86^\circ 27' 53,949''; \quad 2M = 172^\circ 55' 47,9'' \\ \log \cos m &= 9,890\,370\,63 \quad 4M = 345^\circ 51' 36'' \end{aligned}$$

Das Argument der Tafeln ist $\log((e/\sqrt{1-e^2}) \cos m)$:

$$\begin{aligned} \log \frac{e}{\sqrt{1-e^2}} &= 8,906\,845 \\ \log \cos m &= 9,890\,371 \\ \text{Argument} &= 8,797\,216 \end{aligned}$$

hiermit erhält man aus den Tafeln $\log \alpha$, wodurch $\alpha s/b$ berechnet wird:

$$\begin{aligned} \log \alpha &= 5,313\,998\,92 \\ \text{colog } b &= 3,486\,645\,36 \\ \log s &= 5,478\,303\,14 \\ \log \frac{\alpha s}{b} &= 4,278\,947\,42; \quad \frac{\alpha}{b}s = 5^\circ 16' 48,481'' \end{aligned}$$

Dieses als erste Annäherung an den Werth von σ angenommen, findet sich die zweite, durch Hinzufügung des ersten Gliedes der Reihe (11):

$$\begin{aligned} \log \beta &= 2,305\ 94 \\ \log \cos(2M + \sigma) &= 9,999\ 79(-) \\ \log \sin \sigma &= 8,963\ 91 \\ \hline 1,269\ 64(-) &= -18,61'' \end{aligned}$$

Die genauere Berechnung dieses Gliedes, mit der zweiten Annäherung von $\sigma = 5^\circ 16' 29,9''$, so wie die des dritten, ergibt:

$$\begin{aligned} \log \beta &= 2,305\ 94 \\ \log \cos(2M + \sigma) &= 9,999\ 79(-) \\ \log \sin \sigma &= 8,963\ 48 \\ \hline 1,269\ 21(-) &= -18,587'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log \gamma &= 8,394 \\ \log \cos(4M + 2\sigma) &= 9,999 \\ \log \sin 2\sigma &= 9,263 \\ \hline 7,656 &= +0,005'' \end{aligned}$$

Man hat also $\sigma = 5^\circ 16' 29,899''$, und endlich α , u und ϕ aus den Formeln (8)

$$\begin{aligned} M + \sigma &= 91^\circ 44' 23,848'' \\ \log \sin(M + \sigma) &= 9,999\ 799\ 71 \\ \log(-\cos(M + \sigma)) &= 8,482\ 349\ 32 \\ \log \cos m &= 9,890\ 370\ 63 \\ \log(-\sin m) &= 9,799\ 072\ 89 \\ \log \sin u &= 9,890\ 170\ 34 \\ \log(\cos u \cos \alpha) &= 8,372\ 719\ 95 \\ \log(\cos u \sin \alpha) &= 9,799\ 072\ 89 \\ \hline \alpha &= 87^\circ 51' 15,523'' \\ \log \cos u &= 9,799\ 377\ 50 \\ \log \tan u &= 0,090\ 792\ 84 \\ \operatorname{colog} \sqrt{1 - e^2} &= 0,001\ 409\ 40 \\ \log \tan \phi &= 0,092\ 202\ 24; \quad \phi = 51^\circ 2' 12,719'' \end{aligned}$$

In diesem Beispiele habe ich die trigonometrische Rechnung mit 8 Decimalen geführt, weil selbst bei dieser Annäherung, α und ϕ noch nicht die Sicherheit erhalten, welche die Tafeln für $\log \alpha$, $\log \beta$, $\log \gamma$, gewähren. Will man nur die gewöhnlichen Logarithmentafeln mit 7 Decimalstellen anwenden, so kann man auch in den Tafeln für $\log \alpha$, $\log \beta$, $\log \gamma$ die letzte Decimale vernachlässigen.

9.

Es ist nun noch der Mittagsunterschied w , durch die Integration des Differentials (5)

$$dw = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 u} du$$

zu finden. Dieses Integral enthält aber zwei getrennte Constanten m und e , welche sich nicht vereinigen lassen, so daß man die streng richtige Auflösung dieser Aufgabe, nicht auf Tafeln zurückführen kann, welche für alle Werthe von e gültig sind. Man darf aber, um dieses zu erreichen, von der strengen Richtigkeit nur so wenig aufopfern, daß es für die Anwendung von keinem Belange ist.

Setzt man

$$dw = d\omega - (1 - \sqrt{1 - e^2 \cos^2 u}) du$$

und schreibt man für dw , im zweiten Gliede

$$\frac{\sin \alpha' \cos u'}{\cos^2 u} d\sigma$$

so erhält man, nach der Integration,

$$w = \omega - \sin \alpha' \cos u' \int \frac{1 - \sqrt{1 - e^2 \cos^2 u}}{\cos^2 u} du$$

Setzt man ferner

$$\frac{1 - \sqrt{1 - e^2 \cos^2 u}}{\cos^2 u} = \frac{e^2}{2} (1 + e^2 p \cos^2 u)^q (1 + y)$$

so erhält man

$$\begin{aligned} 1 + y &= \frac{2(1 - \sqrt{1 - e^2 \cos^2 u})}{e^2 \cos^2 u (1 + e^2 p \cos^2 u)^q} \\ &= \frac{1 + \frac{1}{4}e^2 \cos^2 u + \frac{1}{8}e^4 \cos^4 u + \frac{5}{64}e^6 \cos^6 u + \dots}{\left(1 + qpe^2 \cos^2 u + \frac{q(q-1)}{1 \cdot 2} p^2 e^4 \cos^4 u + \frac{q(q-1)(q-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} p^3 e^6 \cos^6 u + \dots\right)} \end{aligned}$$

im Nenner dieses Ausdrucks werden die 3 ersten Glieder den drei ersten Gliedern im Zähler gleich, wenn man

$$p = -\frac{3}{4}; \quad q = -\frac{1}{3}$$

annimmt; man erhält dadurch

$$\begin{aligned} 1 + y &= \frac{1 + \frac{1}{4}e^2 \cos^2 u + \frac{1}{8}e^4 \cos^4 u + \frac{5}{64}e^6 \cos^6 u + \dots}{1 + \frac{1}{4}e^2 \cos^2 u + \frac{1}{8}e^4 \cos^4 u + \frac{7}{96}e^6 \cos^6 u + \dots} \\ &= 1 + \frac{1}{192}e^6 \cos^6 u + \dots \end{aligned}$$

woraus also hervorgeht, daß man durch die Vernachlässigung von y , nur einen Fehler von der Ordnung von e^8 begeht; das Maximum des Einflusses dieses Fehlers auf w ist $= \frac{1}{384}e^8 \sigma$, und daher selbst dann unmerklich, wenn man auch sehr weit ausgedehnte Vermessungen mit Logarithmentafeln von 10 Decimalen berechnen wollte.

Man kann also, für die Anwendung, $y = 0$ setzen und dann das Integral auf Tafeln reduciren, welche für jeden Werth von e gelten.

10.

Dieser Bemerkung zufolge ist

$$w = \omega - \frac{e^2}{2} \sin m \int \frac{d\sigma}{\sqrt[3]{1 - \frac{3}{4}e^2 \cos^2 u}}$$

$$= \omega - \frac{e^2}{2} \sin m \int \frac{d\sigma}{\sqrt[3]{1 - \frac{3}{4}e^2 + \frac{3}{4}e^2 \cos^2 m \sin^2(M + \sigma)}}$$

Wenn man

$$\tan E' = \frac{e\sqrt{\frac{3}{4}} \cos m}{\sqrt{1 - \frac{3}{4}e^2}}$$

und $\tan^2 \frac{1}{2}E' = \epsilon'$ setzt, so verwandelt sich das Integral im zweiten Gliede, in

$$\int \frac{d\sigma}{\sqrt[3]{1 - \frac{3}{4}e^2} \sqrt[3]{1 + \tan^2 E' \sin^2(M + \sigma)}}$$

und durch Zerlegung in zwei imaginäre Factoren, in

$$\int \frac{\sqrt[3]{(1 - \epsilon')^2}}{\sqrt[3]{1 - \frac{3}{4}e^2}} \frac{1}{(1 - \epsilon' c^{2i(M+\sigma)})^{1/3} (1 - \epsilon' c^{-2i(M+\sigma)})^{1/3}} d\sigma$$

Löst man die imaginären Factoren in unendliche Reihen auf, so giebt das Product derselben

$$\frac{2}{\sqrt[3]{1 - \frac{3}{4}e^2}} \int \left(\begin{array}{l} \alpha' + \beta' \cos 2(M + \sigma) \\ + 2\gamma' \cos 4(M + \sigma) + \dots \end{array} \right) d\sigma$$

wo

$$\alpha' = \frac{1}{2} \sqrt[3]{(1 - \epsilon')^2} \left[1 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \epsilon'^2 + \left(\frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6}\right)^2 \epsilon'^4 + \dots \right]$$

$$\beta' = \sqrt[3]{(1 - \epsilon')^2} \left[\frac{1}{3} \epsilon' + \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6} \frac{1}{3} \epsilon'^3 + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3 \cdot 6 \cdot 9} \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6} \epsilon'^5 + \dots \right]$$

$$\gamma' = \frac{1}{2} \sqrt[3]{(1 - \epsilon')^2} \left[\frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6} \epsilon'^2 + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3 \cdot 6 \cdot 9} \frac{1}{3} \epsilon'^4 + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12} \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6} \epsilon'^6 + \dots \right]$$

etc.

sind. Das Integral, von $\sigma = 0$ angerechnet, giebt daher

$$w = \omega - \frac{e^2 \sin m}{\sqrt[3]{1 - \frac{3}{4}e^2}} \left(\alpha' \sigma + \beta' \cos(2M + \sigma) \sin \sigma + \gamma' \cos(4M + 2\sigma) \sin 2\sigma + \dots \right) \quad (12)$$

11.

Die beiden ersten Coefficienten dieser Reihe sind in der 4^{sten} und 5^{sten} Columne der Tafel enthalten; das Argument derselben ist

$$\log \left(\frac{e\sqrt{\frac{3}{4}}}{\sqrt{1 - \frac{3}{4}e^2}} \cos m \right).$$

Die Annäherung ist der der 3 früheren Columnen der Tafel angemessen. Man berechnet daher ω nach einer dem sphärischen Dreiecke (§3) zugehörigen Formel, entweder

$$\sin \omega = \frac{\sin \sigma \sin \alpha'}{\cos u} = \frac{-\sin \sigma \sin \alpha}{\cos u'} = \frac{\sin \sigma \sin m}{\cos u \cos u'}$$

oder

$$\tan \frac{1}{2}\omega = \frac{\sin \frac{1}{2}(u' - u)}{\cos \frac{1}{2}(u' + u)} \cot \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha)$$

$$= \frac{\cos \frac{1}{2}(u' - u)}{\sin \frac{1}{2}(u' + u)} \cot \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha)$$

und die Reduction auf w mit Hilfe der Tafel.

Nach dieser Vorschrift werde ich das im 8 Art. berechnete Beispiel fortsetzen, um auch den Mittagsunterschied zwischen Dünkirchen und Seeberg zu bestimmen.

$$\log \sin \sigma = 8,963 483 83$$

$$\log(-\sin \alpha) = 9,999 695 39(-)$$

$$\text{colog } \cos u' = 0,199 673 73$$

$$\log \sin \omega = 9,162 852 95(-); \quad \omega = -8^\circ 21' 57,741''$$

Das Argument der beiden letzten Columnen der Tafel ist $\log((e\sqrt{\frac{3}{4}}/\sqrt{1 - \frac{3}{4}e^2}) \cos m)$

$$\log \frac{e\sqrt{\frac{3}{4}}}{\sqrt{1 - \frac{3}{4}e^2}} = 8,844 022$$

$$\log \cos m = 9,890 371$$

$$\text{Argument} = 8,734 393$$

$$\log \alpha' = 9,698 758$$

$$\log(-\sin m) = 9,799 073$$

$$\log \frac{e^2}{\sqrt[3]{1 - \frac{3}{4}e^2}} = 7,811 575$$

$$\log \sigma = 4,278 523$$

$$1,587 929 = +38,719''$$

$$\log \beta' = 1,703$$

$$\log(-\sin m) = 9,799$$

$$\log \frac{e^2}{\sqrt[3]{1 - \frac{3}{4}e^2}} = 7,812$$

$$\log(\cos(2M + \sigma) \sin \sigma) = 8,963(-)$$

$$8,277(-) = -0,019''$$

also die Summe beider Glieder = +38,700'', und der gesuchte Längenunterschied

$$w = -8^\circ 21' 19,041''$$

12.

Die Erklärung, welche ich von diesen Tafeln gegeben habe, zeigt, daß bei dem Gebrauche derselben nicht etwa höhere Potenzen der Excentricität vernachlässigt werden, sondern daß sie das Resultat so genau geben, als die Anzahl ihrer Decimalstellen erlaubt. Die Rechnung, welche dieses leistet, ist meistens dieselbe, welche man führen muß, wenn man die Erde als sphärisch annimmt, und es ist dieser sphärischen Rechnung, durch die Berücksichtigung der Ellipticität der Erde, nur die Auflösung der Gleichung (11) und die Berechnung der Reihe (12) hinzugekommen. — Da diese Rechnung, selbst für den häufigen Gebrauch, bequem genug ist, so scheint es mir unnöthig, Näherungen anzuwenden, welche auf der Bedingungen beruhen, daß die Vermessung eine geringe Ausdehnung besitzt.

(Die Tafeln werden einem der nächsten Stücke beigelegt.)

TAFELN zur Berechnung der geodätischen Vermessungen 1.

Arg	$\log \alpha$	$-\Delta$	$\log \beta$	Δ	$\log \gamma$	Δ	$\log \alpha'$	$-\Delta$	$\log \beta'$	Δ
6,4	5,314 425 13	1	7,5124	2000			9,698 970	0	7,035	200
6,5	5,314 425 12	0	7,7124	2000			9,698 970	0	7,235	200
6,6	5,314 425 12	1	7,9124	2000			9,698 970	0	7,435	200
6,7	5,314 425 11	2	8,1124	2000			9,698 970	0	7,635	200
6,8	5,314 425 09	3	8,3124	2000			9,698 970	0	7,835	200
6,9	5,314 425 06	4	8,5124	2000			9,698 970	0	8,035	200
7,0	5,314 425 02	6	8,7124	2000			9,698 970	0	8,235	200
7,1	5,314 424 96	10	8,9124	2000			9,698 970	0	8,435	200
7,2	5,314 424 86	16	9,1124	2000			9,698 970	0	8,635	200
7,3	5,314 424 70	25	9,3124	2000			9,698 970	0	8,835	200
7,4	5,314 424 45	40	9,5124	2000			9,698 970	1	9,035	200
7,50	5,314 424 05	5	9,7124	200			9,698 969	0	9,235	20
7,51	5,314 424 00	6	9,7324	200			9,698 969	0	9,255	20
7,52	5,314 423 94	5	9,7524	200			9,698 969	0	9,275	20
7,53	5,314 423 89	6	9,7724	200			9,698 969	0	9,295	20
7,54	5,314 423 83	6	9,7924	200			9,698 969	0	9,315	20
7,55	5,314 423 77	7	9,8124	200			9,698 969	0	9,335	20
7,56	5,314 423 70	7	9,8324	200			9,698 969	0	9,355	20
7,57	5,314 423 63	7	9,8524	200			9,698 969	0	9,375	20
7,58	5,314 423 56	7	9,8724	200			9,698 969	0	9,395	20
7,59	5,314 423 49	8	9,8924	200			9,698 969	0	9,415	20
7,60	5,314 423 41	8	9,9124	200			9,698 969	0	9,435	20
7,61	5,314 423 33	8	9,9324	200			9,698 969	0	9,455	20
7,62	5,314 423 25	9	9,9524	200			9,698 969	0	9,475	20
7,63	5,314 423 16	10	9,9724	200			9,698 969	0	9,495	20
7,64	5,314 423 06	9	9,9924	200			9,698 969	0	9,515	20
7,65	5,314 422 97	11	0,0124	200			9,698 969	1	9,535	20
7,66	5,314 422 86	10	0,0324	200			9,698 968	0	9,555	20
7,67	5,314 422 76	11	0,0524	200			9,698 968	0	9,575	20
7,68	5,314 422 65	12	0,0724	200			9,698 968	0	9,595	20
7,69	5,314 422 53	12	0,0924	200			9,698 968	0	9,615	20
7,70	5,314 422 41	13	0,1124	200			9,698 968	0	9,635	20
7,71	5,314 422 28	14	0,1324	200			9,698 968	0	9,655	20
7,72	5,314 422 14	14	0,1524	200			9,698 968	0	9,675	20
7,73	5,314 422 00	15	0,1724	200			9,698 968	0	9,695	20
7,74	5,314 421 85	15	0,1924	200			9,698 968	0	9,715	20
7,75	5,314 421 70	16	0,2124	200			9,698 968	0	9,735	20
7,76	5,314 421 54	17	0,2324	200			9,698 968	1	9,755	20
7,77	5,314 421 37	18	0,2524	200			9,698 967	0	9,775	20
7,78	5,314 421 19	18	0,2724	200			9,698 967	0	9,795	20
7,79	5,314 421 01	20	0,2924	200			9,698 967	0	9,815	20
7,80	5,314 420 81	20	0,3124	200			9,698 967	0	9,835	20
7,81	5,314 420 61	22	0,3324	200			9,698 967	0	9,855	20
7,82	5,314 420 39	22	0,3524	200			9,698 967	0	9,875	20
7,83	5,314 420 17	23	0,3724	200			9,698 967	0	9,895	20
7,84	5,314 419 94	25	0,3924	200			9,698 967	1	9,915	20
7,85	5,314 419 69	25	0,4124	200			9,698 966	0	9,935	20
7,86	5,314 419 44	27	0,4324	200			9,698 966	0	9,955	20
7,87	5,314 419 17	28	0,4524	200			9,698 966	0	9,975	20
7,88	5,314 418 89	30	0,4724	200			9,698 966	0	9,995	20
7,89	5,314 418 59	31	0,4924	200			9,698 966	1	0,015	20
7,90	5,314 418 28		0,5124				9,698 965		0,035	

TAFELN zur Berechnung der geodätischen Vermessungen 2,

Arg	$\log \alpha$	$-\Delta$	$\log \beta$	Δ	$\log \gamma$	Δ	$\log \alpha'$	$-\Delta$	$\log \beta'$	Δ
7,90	5,314 418 28	32	0,512 35	2000			9,698 965	0	0,035	20
7,91	5,314 417 96	34	0,532 35	2000			9,698 965	0	0,055	20
7,92	5,314 417 62	35	0,552 35	2000			9,698 965	0	0,075	20
7,93	5,314 417 27	37	0,572 35	2000			9,698 965	0	0,095	20
7,94	5,314 416 90	39	0,592 35	2000			9,698 965	1	0,115	20
7,95	5,314 416 51	41	0,612 35	2000			9,698 964	0	0,135	20
7,96	5,314 416 10	42	0,632 35	2000			9,698 964	0	0,155	20
7,97	5,314 415 68	45	0,652 35	2000			9,698 964	1	0,175	20
7,98	5,314 415 23	47	0,672 35	1999			9,698 963	0	0,195	20
7,99	5,314 414 76	48	0,692 34	2000			9,698 963	0	0,215	20
8,00	5,314 414 28	52	0,712 34	2000			9,698 963	1	0,235	20
8,01	5,314 413 76	53	0,732 34	2000			9,698 962	0	0,255	20
8,02	5,314 413 23	56	0,752 34	2000			9,698 962	0	0,275	20
8,03	5,314 412 67	59	0,772 34	2000			9,698 962	1	0,295	20
8,04	5,314 412 08	61	0,792 34	2000			9,698 961	0	0,315	20
8,05	5,314 411 47	65	0,812 34	2000			9,698 961	1	0,335	20
8,06	5,314 410 82	67	0,832 34	2000			9,698 960	0	0,355	20
8,07	5,314 410 15	71	0,852 34	1999			9,698 960	0	0,375	20
8,08	5,314 409 44	74	0,872 33	2000			9,698 960	1	0,395	20
8,09	5,314 408 70	77	0,892 33	2000			9,698 959	0	0,415	20
8,10	5,314 407 93	81	0,912 33	2000			9,698 959	1	0,435	20
8,11	5,314 407 12	85	0,932 33	2000			9,698 958	1	0,455	20
8,12	5,314 406 27	89	0,952 33	2000			9,698 957	0	0,475	20
8,13	5,314 405 38	93	0,972 33	1999			9,698 957	1	0,495	20
8,14	5,314 404 45	98	0,992 32	2000			9,698 956	0	0,515	20
8,15	5,314 403 47	102	1,012 32	2000			9,698 956	1	0,535	20
8,16	5,314 402 45	107	1,032 32	2000			9,698 955	1	0,555	20
8,17	5,314 401 38	112	1,052 32	2000			9,698 954	1	0,575	20
8,18	5,314 400 26	117	1,072 32	1999			9,698 953	0	0,595	20
8,19	5,314 399 09	123	1,092 31	2000			9,698 953	1	0,615	20
8,20	5,314 397 86	128	1,112 31	2000			9,698 952	1	0,635	20
8,21	5,314 396 58	135	1,132 31	2000			9,698 951	1	0,655	20
8,22	5,314 395 23	141	1,152 31	1999			9,698 950	1	0,675	20
8,23	5,314 393 82	147	1,172 30	2000			9,698 949	1	0,695	20
8,24	5,314 392 35	155	1,192 30	2000			9,698 948	1	0,715	20
8,25	5,314 390 80	162	1,212 30	1999	6,207	40	9,698 947	1	0,735	20
8,26	5,314 389 18	169	1,232 29	2000	6,247	40	9,698 946	1	0,755	20
8,27	5,314 387 49	177	1,252 29	2000	6,287	40	9,698 945	1	0,775	20
8,28	5,314 385 72	186	1,272 29	1999	6,327	40	9,698 944	2	0,795	20
8,29	5,314 383 86	195	1,292 28	2000	6,367	40	9,698 942	1	0,815	20
8,30	5,314 381 91	203	1,312 28	1999	6,407	40	9,698 941	1	0,835	20
8,31	5,314 379 88	213	1,332 27	2000	6,447	40	9,698 940	2	0,855	20
8,32	5,314 377 75	224	1,352 27	2000	6,487	40	9,698 938	1	0,875	20
8,33	5,314 375 51	234	1,372 27	1999	6,527	40	9,698 937	2	0,895	20
8,34	5,314 373 17	244	1,392 26	2000	6,567	40	9,698 935	1	0,915	20
8,35	5,314 370 73	257	1,412 26	1999	6,607	40	9,698 934	2	0,935	20
8,36	5,314 368 16	268	1,432 25	2000	6,647	40	9,698 932	2	0,955	20
8,37	5,314 365 48	281	1,452 25	1999	6,687	40	9,698 930	2	0,975	20
8,38	5,314 362 67	295	1,472 24	1999	6,727	40	9,698 928	2	0,995	20
8,39	5,314 359 72	308	1,492 23	2000	6,767	40	9,698 926	2	1,015	20
8,40	5,314 356 64		1,512 23		6,807		9,698 924		1,035	

TAFELN zur Berechnung der geodätischen Vermessungen 3.

Arg	$\log \alpha$	$-\Delta$	$\log \beta$	Δ	$\log \gamma$	Δ	$\log \alpha'$	$-\Delta$	$\log \beta'$	Δ
8,40	5,314 356 64	323	1,512 23	1999	6,807	40	9,698 924	2	1,035	20
8,41	5,314 353 41	338	1,532 22	1999	6,847	40	9,698 922	2	1,055	20
8,42	5,314 350 03	353	1,552 21	2000	6,887	40	9,698 920	2	1,075	20
8,43	5,314 346 50	371	1,572 21	1999	6,927	40	9,698 918	3	1,095	20
8,44	5,314 342 79	388	1,592 20	1999	6,967	40	9,698 915	2	1,115	20
8,45	5,314 338 91	406	1,612 19	1999	7,007	40	9,698 913	3	1,135	20
8,46	5,314 334 85	425	1,632 18	2000	7,047	40	9,698 910	3	1,155	20
8,47	5,314 330 60	446	1,652 18	1999	7,087	40	9,698 907	3	1,175	20
8,48	5,314 326 14	466	1,672 17	1999	7,127	40	9,698 904	3	1,195	20
8,49	5,314 321 48	489	1,692 16	1999	7,167	40	9,698 901	3	1,215	20
8,50	5,314 316 59	511	1,712 15	1999	7,207	40	9,698 898	4	1,235	20
8,51	5,314 311 48	535	1,732 14	1999	7,247	40	9,698 894	3	1,255	20
8,52	5,314 306 13	561	1,752 13	1999	7,287	40	9,698 891	4	1,275	20
8,53	5,314 300 52	587	1,772 12	1998	7,327	40	9,698 887	4	1,295	20
8,54	5,314 294 65	615	1,792 10	1999	7,367	40	9,698 883	4	1,315	20
8,55	5,314 288 50	644	1,812 09	1999	7,407	40	9,698 879	4	1,335	20
8,56	5,314 282 06	674	1,832 08	1999	7,447	40	9,698 875	5	1,355	20
8,57	5,314 275 32	705	1,852 07	1998	7,487	40	9,698 870	5	1,375	20
8,58	5,314 268 27	739	1,872 05	1999	7,527	40	9,698 865	4	1,395	20
8,59	5,314 260 88	774	1,892 04	1998	7,567	40	9,698 861	6	1,415	20
8,60	5,314 253 14	810	1,912 02	1998	7,607	39	9,698 855	5	1,435	20
8,61	5,314 245 04	848	1,932 00	1999	7,646	40	9,698 850	6	1,455	20
8,62	5,314 236 56	889	1,951 99	1998	7,686	40	9,698 844	6	1,475	20
8,63	5,314 227 67	930	1,971 97	1998	7,726	40	9,698 838	6	1,495	20
8,64	5,314 218 37	973	1,991 95	1998	7,766	40	9,698 832	6	1,515	20
8,65	5,314 208 64	1020	2,011 93	1998	7,806	40	9,698 826	7	1,535	20
8,66	5,314 198 44	1068	2,031 91	1998	7,846	40	9,698 819	7	1,555	20
8,67	5,314 187 76	1118	2,051 89	1998	7,886	40	9,698 812	8	1,575	20
8,68	5,314 176 58	1170	2,071 87	1997	7,926	40	9,698 804	7	1,595	20
8,69	5,314 164 88	1226	2,091 84	1998	7,966	40	9,698 797	9	1,615	20
8,70	5,314 152 62	1283	2,111 82	1997	8,006	40	9,698 788	8	1,635	19
8,71	5,314 139 79	1344	2,131 79	1998	8,046	40	9,698 780	9	1,654	20
8,72	5,314 126 35	1406	2,151 77	1997	8,086	40	9,698 771	9	1,674	20
8,73	5,314 112 29	1473	2,171 74	1997	8,126	40	9,698 762	10	1,694	20
8,74	5,314 097 56	1543	2,191 71	1997	8,166	40	9,698 752	11	1,714	20
8,75	5,314 082 13	1615	2,211 68	1997	8,206	40	9,698 741	10	1,734	20
8,76	5,314 065 98	1690	2,231 65	1996	8,246	40	9,698 731	12	1,754	20
8,77	5,314 049 08	1771	2,251 61	1997	8,286	40	9,698 719	11	1,774	20
8,78	5,314 031 37	1853	2,271 58	1996	8,326	40	9,698 708	13	1,794	20
8,79	5,314 012 84	1941	2,291 54	1996	8,366	39	9,698 695	13	1,814	20
8,800	5,313 993 43	1004	2,311 50	998	8,405	20	9,698 682	6	1,834	10
8,805	5,313 983 39	1028	2,321 48	998	8,425	20	9,698 676	7	1,844	10
8,810	5,313 973 11	1051	2,331 46	998	8,445	20	9,698 669	7	1,854	10
8,815	5,313 962 60	1076	2,341 44	998	8,465	20	9,698 662	7	1,864	10
8,820	5,313 951 84	1101	2,351 42	998	8,485	20	9,698 655	8	1,874	10
8,825	5,313 940 83	1127	2,361 40	997	8,505	20	9,698 647	7	1,884	10
8,830	5,313 929 56	1152	2,371 37	998	8,525	20	9,698 640	8	1,894	10
8,835	5,313 918 04	1180	2,381 35	998	8,545	20	9,698 632	8	1,904	10
8,840	5,313 906 24	1207	2,391 33	997	8,565	20	9,698 624	8	1,914	10
8,845	5,313 894 17	1234	2,401 30	998	8,585	20	9,698 616	8	1,924	10
8,850	5,313 881 83		2,411 28		8,605		9,698 608		1,934	

TAFELN zur Berechnung der geodätischen Vermessungen 4,

Arg	$\log \alpha$	$-\Delta$	$\log \beta$	Δ	$\log \gamma$	Δ	$\log \alpha'$	$-\Delta$	$\log \beta'$	Δ
8,850	5,313 881 83	1264	2,411 279	9974	8,605	20	9,698 608	8	1,934	10
8,855	5,313 869 19	1293	2,421 253	9974	8,625	20	9,698 600	9	1,944	10
8,860	5,313 856 26	1323	2,431 227	9974	8,645	20	9,698 591	9	1,954	10
8,865	5,313 843 03	1353	2,441 201	9973	8,665	20	9,698 582	9	1,964	10
8,870	5,313 829 50	1385	2,451 174	9972	8,685	20	9,698 573	9	1,974	10
8,875	5,313 815 65	1417	2,461 146	9972	8,705	20	9,698 564	10	1,984	10
8,880	5,313 801 48	1450	2,471 118	9971	8,725	20	9,698 554	9	1,994	10
8,885	5,313 786 98	1484	2,481 089	9970	8,745	20	9,698 545	10	2,004	10
8,890	5,313 772 14	1518	2,491 059	9970	8,765	20	9,698 535	10	2,014	9
8,895	5,313 756 96	1553	2,501 029	9969	8,785	19	9,698 525	11	2,023	10
8,900	5,313 741 43	1590	2,510 998	9968	8,804	20	9,698 514	10	2,033	10
8,905	5,313 725 53	1626	2,520 966	9968	8,824	20	9,698 504	11	2,043	10
8,910	5,313 709 27	1664	2,530 934	9966	8,844	20	9,698 493	11	2,053	10
8,915	5,313 692 63	1702	2,540 900	9966	8,864	20	9,698 482	11	2,063	10
8,920	5,313 675 61	1742	2,550 866	9965	8,884	20	9,698 471	12	2,073	10
8,925	5,313 658 19	1783	2,560 831	9965	8,904	20	9,698 459	12	2,083	10
8,930	5,313 640 36	1824	2,570 796	9963	8,924	20	9,698 447	12	2,093	10
8,935	5,313 622 12	1866	2,580 759	9963	8,944	20	9,698 435	12	2,103	10
8,940	5,313 603 46	1909	2,590 722	9962	8,964	20	9,698 423	13	2,113	10
8,945	5,313 584 37	1953	2,600 684	9961	8,984	20	9,698 410	13	2,123	10
8,950	5,313 564 84	1999	2,610 645	9960	9,004	20	9,698 397	13	2,133	10
8,955	5,313 544 85	2045	2,620 605	9959	9,024	20	9,698 384	14	2,143	10
8,960	5,313 524 40	2093	2,630 564	9958	9,044	20	9,698 370	14	2,153	10
8,965	5,313 503 47	2141	2,640 522	9957	9,064	19	9,698 356	14	2,163	10
8,970	5,313 482 06	2191	2,650 479	9956	9,083	20	9,698 342	15	2,173	10
8,975	5,313 460 15	2241	2,660 435	9956	9,103	20	9,698 327	15	2,183	10
8,980	5,313 437 74	2293	2,670 391	9954	9,123	20	9,698 312	15	2,193	10
8,985	5,313 414 81	2347	2,680 345	9953	9,143	20	9,698 297	16	2,203	9
8,990	5,313 391 34	2400	2,690 298	9952	9,163	20	9,698 281	15	2,212	10
8,995	5,313 367 34	2457	2,700 250	9951	9,183	20	9,698 266	17	2,222	10
9,000	5,313 342 77	2513	2,710 201	9950	9,203	20	9,698 249	17	2,232	10
9,005	5,313 317 64	2571	2,720 151	9948	9,223	20	9,698 232	17	2,242	10
9,010	5,313 291 93	2631	2,730 099	9948	9,243	20	9,698 215	17	2,252	10
9,015	5,313 265 62	2691	2,740 047	9946	9,263	19	9,698 198	18	2,262	10
9,020	5,313 238 71	2754	2,749 993	9945	9,282	20	9,698 180	18	2,272	10
9,025	5,313 211 17	2818	2,759 938	9943	9,302	20	9,698 162	19	2,282	10
9,030	5,313 182 99	2883	2,769 881	9943	9,322	20	9,698 143	19	2,292	10
9,035	5,313 154 16	2949	2,779 824	9941	9,342	20	9,698 124	20	2,302	10
9,040	5,313 124 67	3018	2,789 765	9939	9,362	20	9,698 104	20	2,312	10
9,045	5,313 094 49	3087	2,799 704	9939	9,382	20	9,698 084	20	2,322	10
9,050	5,313 063 62	3159	2,809 643	9936	9,402	20	9,698 064	21	2,332	10
9,055	5,313 032 03	3232	2,819 579	9936	9,422	20	9,698 043	22	2,342	9
9,060	5,312 999 71	3306	2,829 515	9934	9,442	19	9,698 021	22	2,351	10
9,065	5,312 966 65	3383	2,839 449	9932	9,461	20	9,697 999	22	2,361	10
9,070	5,312 932 82	3460	2,849 381	9931	9,481	20	9,697 977	23	2,371	10
9,075	5,312 898 22	3541	2,859 312	9929	9,501	20	9,697 954	24	2,381	10
9,080	5,312 862 81	3623	2,869 241	9928	9,521	20	9,697 930	24	2,391	10
9,085	5,312 826 58	3706	2,879 169	9926	9,541	20	9,697 906	25	2,401	10
9,090	5,312 789 52	3791	2,889 095	9924	9,561	20	9,697 881	25	2,411	10
9,095	5,312 751 61	3879	2,899 019	9922	9,581	19	9,697 856	26	2,421	10
9,100	5,312 712 82		2,908 941		9,600		9,697 830		2,431	