

---

# RATIONALITÉ D'UN FIBRÉ EN CONIQUES

*par*

Jean-Louis Colliot-Thélène

---

## 1. Introduction

Soit  $k$  un corps de caractéristique différente de 2 contenant un élément  $i$  de carré  $-1$ . La cubique  $C$  d'équation affine

$$y^2 = x(x^2 - 1)$$

sur le corps  $k$  admet l'automorphisme  $g$ , d'ordre 4, défini par

$$(x, y) \mapsto (-x, iy).$$

On considère le quotient du produit triple  $C \times_k C \times_k C$  par l'action diagonale de  $g$ .

Motivé par un travail antérieur de Ueno [9], Campana [1] montre, pour  $k$  le corps des complexes, que ce quotient est une variété rationnellement connexe et demande si cette variété est rationnelle. Pour  $k$  arbitraire, Catanese, Oguiso et Truong [2] (arXiv, 14 oct. 2013) montrent ensuite que c'est une variété  $k$ -unirationnelle. Pour ce faire, ils commencent par montrer [2, Prop. 2.5] que le quotient est  $k$ -birationnel à la  $k$ -variété  $X$  définie dans l'espace affine  $\mathbf{A}_k^4$  avec coordonnées  $s, t, u, v$  par l'équation

$$s^2v(v^2 - 1) - t^2u(u^2 - 1) + uv(u^2 - v^2) = 0.$$

Dans cette note, je montre que la  $k$ -variété  $X$  est  $k$ -rationnelle, c'est-à-dire que son corps des fonctions est transcendant pur sur  $k$ . Ceci répond à la question de Campana.

La rationalité de ce genre de quotient a récemment attiré l'attention des spécialistes de dynamique complexe [7].

La  $k$ -variété  $X$  est fibrée en coniques sur le plan affine de coordonnées  $u, v$ . Frédéric Campana avait suggéré de calculer la cohomologie non ramifiée de  $X$ , et en particulier son groupe de Brauer non ramifié (pour un rapport de synthèse sur la cohomologie non ramifiée, voir [3]). Pour les fibrations en coniques, on peut suivre la méthode d'Ojanguren et l'auteur [4]. Lors de ce calcul, il est apparu que la fibration en coniques concernée est  $k$ -birationnellement équivalente, au-dessus du plan affine, à une autre fibration en coniques dont l'espace total est clairement  $k$ -rationnel.

Je remercie Frédéric Campana de m'avoir informé de ce problème et de ses développements.

## 2. Rappels

Donnons quelques rappels sur les coniques et sur le groupe de Brauer des corps et des schémas. On renvoie le lecteur aux ouvrages [6], [8], [5].

On note  $G[2]$  le sous-groupe des éléments de 2-torsion d'un groupe abélien  $G$ .

Soit  $F$  un corps de caractéristique différente de 2. À la donnée de deux éléments  $a, b \in F^\times$  on associe la classe de l'algèbre de quaternions  $(a, b)$  dans le groupe de Brauer  $\text{Br}F$ . C'est un élément de 2-torsion.

On note  $C_{a,b} \subset \mathbf{P}_F^2$  la conique d'équation projective

$$X^2 - aY^2 - bT^2 = 0.$$

La classe  $(a, b)$  est nulle dans  $\text{Br}(F)$  si et seulement si la conique  $C_{a,b}$  sur le corps  $F$  a un point rationnel, ce qui est encore équivalent au fait que son corps des fonctions est transcendant pur sur  $F$ .

Plus généralement, on a la proposition suivante.

**Proposition 2.1.** — *Avec les notations ci-dessus, étant donnés quatre éléments  $a, b, a', b' \in F^\times$ , les énoncés suivants sont équivalents :*

- (i)  $(a, b) = (a', b') \in \text{Br}(F)$ .
- (ii) Les coniques  $C_{a,b}$  et  $C_{a',b'}$  sont isomorphes sur le corps  $F$ .
- (iii) Il existe une homographie, c'est-à-dire un élément de  $\text{PGL}_3(F)$  qui transforme la conique  $C_{a,b} \subset \mathbf{P}_F^2$  en la conique  $C_{a',b'} \subset \mathbf{P}_F^2$ .

L'équivalence de (i) et (ii) remonte à Witt [10, §2], voir [5, Thm. 1.4.2]. Soit  $f : C_1 \xrightarrow{\sim} C_2$  un  $k$ -isomorphisme abstrait de coniques lisses sur le corps  $k$ . L'inverse du faisceau canonique  $\omega_2$  sur  $C_2$  est le faisceau canonique  $\omega_1$  sur  $C_1$ . Tout plongement de  $C_i$  dans  $\mathbf{P}_k^2$  comme conique est

associé au choix d'une base de l'espace vectoriel  $H^0(C_i, \omega_i^{-1})$ , qui est de dimension 3. Ceci montre que (ii) implique (iii).

Soit  $A$  un anneau de valuation discrète de corps des fractions  $K$ , de corps résiduel  $\kappa$  de caractéristique différente de 2. On dispose d'une application résidu

$$\partial_A : \mathrm{Br}(K)[2] \rightarrow \kappa^\times / \kappa^{\times 2}$$

qui envoie une classe de quaternions  $(a, b)$  (avec  $a, b \in K^\times$ ) sur la classe de

$$(-1)^{v(a)v(b)} [a^{v(b)} / b^{v(a)}],$$

où  $[a^{v(b)} / b^{v(a)}]$  désigne la classe dans  $\kappa^\times / \kappa^{\times 2}$  de l'unité  $a^{v(b)} / b^{v(a)} \in A^\times$ . L'application résidu s'insère dans une suite exacte

$$0 \rightarrow \mathrm{Br}(A)[2] \rightarrow \mathrm{Br}(K)[2] \rightarrow \kappa^\times / \kappa^{\times 2} \rightarrow 1.$$

Soit  $X$  une  $k$ -variété lisse intègre de corps des fonctions  $k(X)$ . À chaque point  $x$  de codimension 1 on associe son anneau local, qui est un anneau de valuation discrète de corps des fractions  $k(X)$ , de corps résiduel  $\kappa(x)$ , le corps des fonctions de la sous-variété définie par  $x$ .

Supposant  $\mathrm{car}(k) \neq 2$ , on a une suite exacte

$$0 \rightarrow \mathrm{Br}(X)[2] \rightarrow \mathrm{Br}(k(X))[2] \rightarrow \bigoplus_{x \in X^{(1)}} \kappa(x)^\times / \kappa(x)^{\times 2},$$

où la flèche de droite est celle définie par les divers résidus en les points  $x \in X^{(1)}$ .

Pour  $X = \mathbf{A}_k^n$  l'espace affine sur un corps de caractéristique différente de 2, l'application naturelle  $\mathrm{Br}(k)[2] \rightarrow \mathrm{Br}(\mathbf{A}_k^n)[2]$  est un isomorphisme.

On a donc :

**Proposition 2.2.** — *Soit  $k$  un corps de caractéristique différente de 2, et soit  $n \geq 1$  un entier. Les applications résidus aux points de codimension 1 de l'espace affine  $\mathbf{A}_k^n$  donnent naissance à la suite exacte :*

$$0 \rightarrow \mathrm{Br}(k)[2] \rightarrow \mathrm{Br}(k(\mathbf{A}^n))[2] \rightarrow \bigoplus_{x \in X^{(1)}} \kappa(x)^\times / \kappa(x)^{\times 2},$$

On peut donner de ce résultat une formulation et une démonstration plus élémentaire en utilisant la cohomologie galoisienne [8]. Le cas  $n = 1$  est un cas particulier de la suite exacte de Faddeev [5, Cor. 6.4.6]. Le cas  $n > 1$  peut se ramener au cas  $n = 1$  par fibrations successives sur des espaces affines de dimension plus petite.

### 3. Le calcul

On considère la conique sur le corps  $k(u, v)$  définie par l'équation affine (variables  $s, t$ )

$$s^2v(v^2 - 1) - t^2u(u^2 - 1) + uv(u^2 - v^2) = 0$$

soit encore

$$s^2 - uv(u^2 - 1)(v^2 - 1)t^2 - u(v^2 - 1)(v^2 - u^2) = 0.$$

On associe à cette conique la classe de quaternions

$$\alpha = (uv(u^2 - 1)(v^2 - 1), u(v^2 - 1)(v^2 - u^2)) \in \text{Br}(k(u, v)).$$

Les seuls résidus non triviaux possibles aux points de codimension 1 de  $\mathbf{A}_k^2$  sont aux points donnés par l'annulation de l'un des facteurs  $uv(u^2 - 1)(v^2 - 1)$  ou  $u(v^2 - 1)(v^2 - u^2)$ .

Appliquant la formule rappelée au paragraphe 2, on trouve les résidus suivants

- En  $u = 0$ , la classe de  $v$  dans  $k(v)^\times/k(v)^{\times 2}$ .
- En  $v = 0$ , la classe de  $u$  dans  $k(u)^\times/k(u)^{\times 2}$ .
- En  $v - 1 = 0$ , la classe 1 dans  $k(u)^\times/k(u)^{\times 2}$ .
- En  $v + 1 = 0$ , la classe  $-1$  dans  $k(u)^\times/k(u)^{\times 2}$ .
- En  $u - 1 = 0$ , la classe 1 dans  $k(v)^\times/k(v)^{\times 2}$ .
- En  $u + 1 = 0$ , la classe  $-1$  dans  $k(v)^\times/k(v)^{\times 2}$ .
- En  $u - v = 0$ , la classe 1 dans  $k(u)^\times/k(u)^{\times 2}$ .
- En  $u + v = 0$ , la classe  $-1$  dans  $k(u)^\times/k(u)^{\times 2}$ .

Par ailleurs, les seuls résidus de  $(u, v) \in \text{Br}(k(u, v))$  aux points de codimension 1 de  $\mathbf{A}_k^2$  qui ne sont pas égaux à 1 sont la classe de  $v$  dans  $k(v)^\times/k(v)^{\times 2}$  en  $u = 0$  et la classe de  $u$  dans  $k(u)^\times/k(u)^{\times 2}$  en  $v = 0$ .

Comme on a supposé que  $-1 = 1 \in k^\times/k^{\times 2}$ , on voit que l'élément

$$\alpha - (u, v) \in \text{Br}(k(u, v))$$

a tous ses résidus triviaux aux points de codimension 1 de  $\mathbf{A}_k^2$ , donc par la Proposition 2.2 est la classe d'un élément de  $\gamma \in \text{Br}(k)$ .

Pour calculer  $\gamma$ , on considère la restriction de  $(u, v)$  et de

$$(uv(u^2 - 1)(v^2 - 1), u(v^2 - 1)(v^2 - u^2))$$

au point générique de la droite  $D$  d'équation  $v = 1 - u$ , de corps des fonctions  $k(u)$ . On a

$$(u, 1 - u) = 0 \in \text{Br}(k(u)).$$

La restriction de  $(uv(u^2-1)(v^2-1), u(v^2-1)(v^2-u^2))$  au point générique de la droite  $D$  est égale à

$$(u(1-u)(u^2-1)(u^2-2u), u(u^2-2u)(1-2u)) = (-(u+1)(u-2), (u-2)(1-2u))$$

dans  $\text{Br}(k(u))$ .

La restriction de  $\gamma = \alpha - (u, v)$  à la droite  $D$  a donc pour image  $(-(u+1)(u-2), (u-2)(1-2u)) \in \text{Br}(k(u))$ . Ce dernier symbole est dans le groupe de Brauer de l'anneau de valuation discrète anneau local de la droite  $D$  au point  $P$  de coordonnées  $u = 0, v = 1$ . Ainsi  $\gamma$  et  $(-(u+1)(u-2), (u-2)(1-2u))$  sont égaux dans  $\text{Br}(A)$ . En évaluant au point  $P$ , on trouve

$$\gamma = (2, -2) = 0.$$

On a donc  $\alpha = (u, v) \in \text{Br}(k(u, v))$ .

*Remarque.* Sur un corps  $k$  avec  $\text{Br}(k) = 0$ , tel que le corps des complexes ou plus généralement un corps de dimension cohomologique 1, le calcul ci-dessus n'est pas nécessaire. Sur un corps quelconque de caractéristique différente de 2, 3, 5, avec  $i \in k$ , on peut directement évaluer  $\alpha$  au point  $k$ -rationnel  $M$  de coordonnées  $u = 2, v = 3$ . Cela donne  $\alpha(M) = (2.3.3.8, 2.5.8) = 0 \in \text{Br}(k)$  puisque 2.3.3.8 est un carré. Par ailleurs  $(u, v)(M) = (2, 3) = 0$  car la conique d'équation

$$X^2 - 2Y^2 - 3T^2 = 0$$

possède le point rationnel  $(X, Y, T) = (1, i, 1)$ .

D'après la proposition 2.1, l'égalité  $\alpha = (u, v) \in \text{Br}(k(u, v))$  implique que les coniques dans  $\mathbf{P}_{k(u,v)}^2$  données en coordonnées homogènes  $S, T, R$  par

$$v(v^2-1)S^2 - u(u^2-1)T^2 + uv(u^2-v^2)R^2 = 0$$

et

$$S^2 - uT^2 - vR^2 = 0$$

sont isomorphes sur le corps  $k(u, v)$ .

En termes géométriques, cela signifie qu'au-dessus du plan affine  $\mathbf{A}_k^2$  de coordonnées  $u, v$ , les deux fibrations en coniques associées sont birationnelles par un isomorphisme qui préserve la fibration.

La  $k$ -variété d'équation affine

$$s^2 - ut^2 - v = 1$$

est clairement  $k$ -isomorphe à l'espace affine  $\mathbf{A}_k^3$  de coordonnées  $s, u, t$ . On en conclut que la  $k$ -variété d'équation affine

$$s^2v(v^2 - 1) - t^2u(u^2 - 1) + uv(u^2 - v^2) = 0$$

est  $k$ -rationnelle. D'après [2, Prop. 2.5], ceci implique que le quotient de  $C \times_k C \times_k C$  par l'automorphisme diagonal  $g$  d'ordre 4 considéré au-début de cette note est une  $k$ -variété  $k$ -rationnelle.

### Références

- [1] F. Campana, Remarks on an example of K. Ueno, Series of congress reports, *Classification of algebraic varieties*, Ed. : C. Faber, G. van der Geer and E. Looijenga, Société mathématique européenne, 2011, 115–121.
- [2] F. Catanese, K. Oguiso et T. T. Truong, Unirationality of Ueno–Campana's threefold, [arXiv:1310.3569v1](https://arxiv.org/abs/1310.3569v1) [mathAG].
- [3] J.-L. Colliot-Thélène, Birational invariants, purity and the Gersten conjecture, in *K-Theory and Algebraic Geometry : Connections with Quadratic Forms and Division Algebras*, AMS Summer Research Institute, Santa Barbara 1992, ed. W. Jacob and A. Rosenberg, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics **58**, Part I (1995) 1–64.
- [4] J.-L. Colliot-Thélène et M. Ojanguren, Variétés unirationnelles non rationnelles : au-delà de l'exemple d'Artin-Mumford, *Invent. math.* **97** (1989) 141–158.
- [5] P. Gille et T. Szamuely, *Central simple algebras and Galois cohomology*, Cambridge studies in advanced mathematics **101**, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- [6] A. Grothendieck, Le groupe de Brauer, in *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, 46–188, North-Holland, 1968.
- [7] K. Oguiso et T. T. Truong, Explicit Examples of rational and Calabi-Yau threefolds with primitive automorphisms of positive entropy, [arxiv.org/abs/1306.1590v3](https://arxiv.org/abs/1306.1590v3) [math.AG].
- [8] J.-P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, Lecture notes in Mathematics **5**, Cinquième édition (1994), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
- [9] K. Ueno, *Classification theory of algebraic varieties and compact complex spaces*, Notes written in collaboration with P. Cherenack, Lecture Notes in Mathematics **439**, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1975.
- [10] E. Witt, Über ein Gegenbeispiel zum Normensatz, *Math. Z.* **19** (1935) 462–467, *Gesammelte Abhandlungen*, Springer (1998) S. 63–68.

CNRS, UMR 8628, Mathématiques, Bâtiment 425, Université Paris-Sud,  
F-91405 Orsay, France

jlct@math.u-psud.fr

---

*arXiv v1, 21 octobre 2013 ; présente version, 21 novembre 2013*

JEAN-LOUIS COLLIOT-THÉLÈNE, CNRS, Université Paris-Sud, Mathématiques,  
Bâtiment 425, 91405 Orsay Cedex, France • *E-mail* : jlct@math.u-psud.fr