

Аналитические решения уравнений свертки на выпуклых множествах со смешанной структурой. I

С. Н. Мелихов, Л. В. Ханина

Аннотация

Доказан абстрактный критерий существования линейного непрерывного правого обратного к сюръективному оператору свертки в пространствах ростков функций, аналитических на выпуклых подмножествах комплексной плоскости со счетным базисом окрестностей из выпуклых областей. Он сформулирован в терминах существования специальных семейств субгармонических функций.

Ключевые слова: уравнение свертки, пространство ростков аналитических функций, линейный непрерывный правый обратный

1 Введение

Пусть Q – выпуклое подмножество \mathbb{C} с непустой внутренностью; $A(Q)$ – пространство всех функций, аналитических в некоторой окрестности Q . В данной работе рассматриваются множества Q , обладающие счетным базисом окрестностей, состоящим из выпуклых областей, а $A(Q)$ наделяется естественной топологией счетного индуктивного предела пространств Фреше функций, аналитических в базисных окрестностях (см. обзор В.П. Хавина [1]). Класс таких множеств Q содержит все выпуклые области и выпуклые компакты (с непустой внутренностью) в \mathbb{C} . Ю.Ф. Коробейником [2] показано, что часть ω границы ∂Q множества Q с упомянутым свойством, содержащаяся в Q , компактна. Поэтому (относительно) открытую часть $(\partial Q) \setminus \omega$ границы ∂Q можно рассматривать как (возможное) препятствие для аналитического продолжения функций из $A(Q)$. Зафиксируем выпуклый компакт K в \mathbb{C} и линейный непрерывный функционал μ на пространстве $A(K)$ всех ростков функций, аналитических на K . Отметим, что множество $Q + K$ также имеет счетный базис окрестностей, состоящий из выпуклых областей. Функционал μ задает оператор свертки T_μ , линейно и непрерывно отображающий $A(Q + K)$ в $A(Q)$: $T_\mu(f)(z) := \mu_t(f(t + z))$. Если $K = \{0\}$, то T_μ является дифференциальным оператором бесконечного порядка с постоянными коэффициентами. Хорошо известны критерии сюръективности

оператора $T_\mu : A(Q + K) \rightarrow A(Q)$ для выпуклой области Q (О.В. Епифанов [3], В.А. Ткаченко [4]), выпуклого компакта Q (О.В. Епифанов [5]). Для выпуклых множеств Q со смешанной геометрической структурой различные условия сюръективности оператора свертки $T_\mu : A(Q + K) \rightarrow A(Q)$ получены И.М. Мальцевым [6], [7], Ю.Ф. Коробейником [8], С.В. Знаменским и Е.А. Знаменской [9]. Отметим, что для множеств Q , как в этой статье, (ненулевой) оператор $T_\mu : A(Q + K) \rightarrow A(Q)$ сюръективен, например, в следующих ситуациях: если K совпадает с точкой или, более общим образом, если преобразование Лапласа $\hat{\mu}$ функционала μ , являющееся целой функцией экспоненциального типа, имеет индикатрису роста, равную опорной функции K , и медленно убывает (имеет вполне регулярный рост).

Для сюръективного оператора $T_\mu : A(Q + K) \rightarrow A(Q)$ возникает естественный вопрос о наличии линейного непрерывного правого обратного (далее ЛНПО) к оператору свертки $T_\mu : A(Q + K) \rightarrow A(Q)$ (его называют оператором решения для уравнения свертки $T_\mu(f) = g$). Идейно эта задача тесно связана с проблемой Л. Шварца наличия ЛНПО к дифференциальному оператору конечного порядка с постоянными коэффициентами в пространствах распределений и бесконечно дифференцируемых функций на открытых подмножествах \mathbb{R}^N (последняя была решена Р. Майзе, Б.А. Тейлором и Д. Фогтом [10] в конце 80-х годов прошлого века). Для пространств аналитических функций упомянутая задача была вначале решена для пространств целых функций, т. е. для случая $Q = \mathbb{C}$ и оператора $T_\mu : A(\mathbb{C}) \rightarrow A(\mathbb{C})$. Независимо друг от друга К.Д. Швердтфегер [11] и Б.А. Тейлор [12] доказали, что всякий ненулевой оператор $T_\mu : A(\mathbb{C}) \rightarrow A(\mathbb{C})$ имеет ЛНПО. Полное решение данной проблемы для выпуклых областей Q было получено Э. Моммом [13] (для $K = \{0\}$), [14] (для произвольного выпуклого компакта K). В случае, когда Q – отрезок, критерий наличия ЛНПО к оператору T_μ был доказан М. Лангенбрухом [15]. Для произвольного выпуклого компакта Q соответствующий критерий установлен в статье [16]. Для многоугольных множеств Q , не обязательно являющихся областями или компактами, условия существования ЛНПО к оператору свертки T_μ установлены Ю.Ф. Коробейником [17]. В работе [18] был рассмотрен случай выпуклого локально замкнутого (т. е. содержащего относительно открытую часть своей границы) множества Q . Класс таких множеств Q тоже содержит все выпуклые области и выпуклые компакты, но по своим геометрическим свойствам и вытекающим из них свойствам рассматриваемых пространств двойственен к рассматриваемому в данной статье. В статье А.В. Абанина и Ле Хай Хоя [19] изучена проблема наличия ЛНПО к оператору свертки T_μ , действующему в пространствах аналитических функций полиномиального роста. Для множеств Q , как в данной работе, в [20] доказан абстрактный критерий (в терминах существования специальных семейств субгармонических функций) наличия ЛНПО к дифференциальному оператору бесконечного порядка $T_\mu : A(Q) \rightarrow A(Q)$. Отметим также исследования, относящиеся к многомерной ситуации. Р. Майзе и Б.А. Тейлор [21] показали, что любой ненулевой оператор свертки, действующий

щий в пространстве целых функций многих комплексных переменных, имеет ЛНПО. Для пространств функций, аналитических в выпуклых областях, на выпуклых компактах и на выпуклых локально замкнутых множествах в \mathbb{C}^N и для операторов свертки в них соответствующие результаты были получены, соответственно, в [22], [23], [18].

Начиная с работ К.Д. Швердтфегера [11], Б.А. Тейлора [12], Р. Майзе, З. Момма, Б.А. Тейлора [24] обозначилось два подхода к решению рассматриваемой проблемы и ей подобных. Один, восходящий к [11], использует структурную теорию пространств Фреше (различные инварианты, критерии расщепляемости коротких точных последовательностей пространств Фреше и, в частности, пространств степенных рядов). Второй, идущий от [12], [24] и существенно развитый М. Лангенбрухом и З. Моммом [25], связан с применением результатов о наличии ЛНПО к $\bar{\partial}$ -оператору, существованием специальных семейств (плюри)субгармонических функций. Эти подходы (применяемые зачастую одновременно) используют следующий общий метод. Задача о существовании ЛНПО к $T_\mu : A(Q + K) \rightarrow A(Q)$ сводится к проблеме дополняемости подмодуля $\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q$, порожденного символом оператора свертки T_μ – преобразованием Лапласа $\hat{\mu}$ функционала μ , в пространстве \mathcal{A}_{Q+K} . При этом \mathcal{A}_Q (соотв. \mathcal{A}_{Q+K}) – весовое пространство целых функций, изоморфное посредством преобразования Лапласа сильному сопряженному к $A(Q)$ (соотв. $A(Q + K)$). Дополняемость подмодуля $\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q$ равносильна существованию ЛНПО к факторотображению $\mathcal{A}_{Q+K} \rightarrow \mathcal{A}_{Q+K} / (\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q)$. Для решения проблемы наличия ЛНПО к этому фактор-отображению нужна подходящая реализация факторпространства $\mathcal{A}_{Q+K} / (\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q)$ в виде весового пространства векторнозначных последовательностей, а по сути, необходимы "хорошие" оценки снизу для символа $\hat{\mu}$. Отметим, что первый подход применялся для пространств (исходных или связанных с ними), имеющих несмешанную структуру: к пространствам Фреше или счетным индуктивным пределам банаховых пространств.

В настоящей работе мы используем второй из упомянутых выше подходов. При этом возникают трудности, связанные как со смешанной геометрической структурой множества Q и, как следствие, со смешанной топологической структурой возникающих пространств, так и с тем, что Q может быть неограниченным. Первая из них частично преодолена с помощью гомологического метода, предложенного В.П. Паламодовым [26], [27], и равенства $\text{Proj}^1 \mathcal{X} = 0$, подробно исследованного Д. Фогтом [28] для конкретных проективных спектров \mathcal{X} счетных индуктивных пределов банаховых пространств. Существенную роль в их преодолении играет описание весового пространства \mathcal{A}_Q целых функций, изоморфного сильному сопряженному к $A(Q)$, как индуктивного предела весовых пространств Фреше \mathcal{A}_M , когда M пробегает семейство всех выпуклых компактных подмножеств Q . Получить его позволил результат А. Мартино [29] о совпадении естественных индуктивной и проективной топологий в пространстве ростков всех функций, аналитических на подмножестве \mathbb{C} . Важную роль играет доказанное здесь необходимое условие сюръективности T_μ , выражен-

ное в привычных терминах медленного убывания (полной регулярности роста) функции $\hat{\mu}$ в направлениях ограниченности и негармоничности опорной функции множества Q . Медленное убывание $\hat{\mu}$ позволяет реализовать описанный выше подход, получив удобное описание факторпространства $\mathcal{A}_{Q+K} / (\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q)$, а критерии дополняемости $\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q$ сформулировать в терминах существования специальных семейств субгармонических функций с равномерными оценками сверху и локальными оценками снизу. Отметим, что соответствующее условие $SH(A_{\hat{\mu}}, Q)$ существования таких семейств – опосредованное условие непрерывности линейного непрерывного правого обратного к оператору, реализующему фактор-отображение $\mathcal{A}_{Q+K} \rightarrow \mathcal{A}_{Q+K} / (\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q)$.

В данной статье (в § 3) доказан критерий существования линейного непрерывного правого обратного к оператору свертки $T_\mu : A(Q + K) \rightarrow A(Q)$ в терминах условия $SH(A_{\hat{\mu}}, Q)$. (Такой критерий мы называем абстрактным.) В § 2 приводятся сведения о множествах Q рассматриваемого типа, соответствующих пространствах и доказываются их новые свойства.

Наличие упомянутых семейств субгармонических функций, как и ранее для открытых и компактных выпуклых множеств Q , удастся выразить посредством граничного поведения выпуклых конформных отображений в направлениях сгущения нулей $\hat{\mu}$. Указанные отображения определяются внутренностью Q и замыканием Q , если Q ограничено, и ограниченной части Q , содержащей ω , если Q неограничено. Этому будет посвящена вторая часть данного исследования, составляющая предмет следующей публикации.

2 Пространства ростков аналитических функций. Их сопряженные. Оператор свертки

2.1 Пространства ростков аналитических функций

Далее будут рассматриваться выпуклые множества Q в \mathbb{C} , обладающие счетным базисом окрестностей, состоящим из выпуклых областей. Для множества $M \subset \mathbb{C}$ символы $\text{int } M$, \overline{M} , ∂M , $\text{conv } M$ обозначают, соответственно, внутренность, замыкание, границу, выпуклую оболочку M в \mathbb{C} .

Приведем характеристизацию множеств Q рассматриваемого типа. Полагаем $\omega := Q \cap \partial Q$.

Лемма 2.1. (I) Пусть Q – выпуклое подмножество \mathbb{C} , отличное от \mathbb{C} , с непустой внутренностью; $\omega \neq \emptyset$; $Q_0 = (\text{int } Q) \cup ((\partial Q) \setminus \omega)$. Следующие утверждения равносильны:

- (i) Q имеет счетный базис окрестностей, состоящий из выпуклых областей.
- (ii) Множество ω компактно, и пересечение Q_0 с любой прямой, опорной к \overline{Q} , замкнуто.
- (iii) Множество ω компактно и любая прямая, опорная к \overline{Q} , не может пересекать одновременно и ω , и $(\partial Q) \setminus \omega$.

(II) Пусть Q – выпуклое подмножество \mathbb{C} с пустой внутренностью. Q обладает счетным базисом окрестностей, состоящим из выпуклых областей, тогда и только тогда, когда Q является отрезком.

Доказательство. Утверждение (II) следует из [2, теорема]. Равносильность (i) и (ii) доказаны в [20, лемма 1.1]. При этом в [20] утверждение (ii) леммы 1.1 сформулировано неточно. Именно, его следует сформулировать так, как (ii) в лемме 2.1 здесь. Равносильность (ii) и (iii) очевидна. \square

В дальнейшем мы предполагаем, что Q – выпуклое подмножество \mathbb{C} с непустой внутренностью, обладающее счетным базисом окрестностей, состоящим из выпуклых областей, и $\omega = Q \cap \partial Q \neq \emptyset$.

Положим

$$B(t, r) := \{z \in \mathbb{C} \mid |z - t| < r\}, \quad \bar{B}(t, r) := \{z \in \mathbb{C} \mid |z - t| \leq r\}, \quad t \in \mathbb{C}, r > 0.$$

Замечание 1. Базис окрестностей Q образуют открытые множества $\tilde{Q}_n := (\text{int } Q) \cup (\omega + B(0, \frac{1}{n}))$, $n \in \mathbb{N}$, и выпуклые области $Q_n := \text{conv } \tilde{Q}_n$, $n \in \mathbb{N}$.

Пусть $A(Q)$ – пространство ростков всех функций, аналитических на Q , т. е. аналитических в некоторой открытой окрестности Q . Для открытого множества M в \mathbb{C} символ $A(M)$ обозначает пространство всех аналитических в M функций с топологией равномерной сходимости на компактных подмножествах M . С этой топологией $A(M)$ является пространством Фреше. Поскольку $A(Q) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A(Q_n)$, то введем в $A(Q)$ топологию индуктивного предела пространств $A(Q_n)$ (относительно естественных отображений вложения $A(Q_n)$ в $A(Q)$): $A(Q) := \text{ind}_{n \rightarrow} A(Q_n)$.

Для множества $M \subset \mathbb{C}$ символом H_M обозначим опорную функцию M : $H_M(z) := \sup_{t \in M} \text{Re}(zt)$, $z \in \mathbb{C}$. Положим $S := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.

Лемма 2.2. Для любого выпуклого компакта $K \subset \mathbb{C}$ выпуклое множество $Q + K$ обладает счетным базисом окрестностей, состоящим из выпуклых областей. Таким базисом является последовательность $(Q_n + K)_{n \in \mathbb{N}}$, где Q_n – множества, как в замечании 1.

Доказательство. Отметим, что $\text{int}(Q + K) \neq \emptyset$ и $\omega_1 := (Q + K) \cap \partial(Q + K)$ непусто. Покажем, что множество ω_1 компактно. Пусть $z_n \in \omega_1$, $n \in \mathbb{N}$. Существуют $a_n \in S$ такие, что $\text{Re}(z_n a_n) = H_{Q+K}(a_n) = H_Q(a_n) + H_K(a_n)$. Возьмем $x_n \in Q$ и $y_n \in K$, для которых $z_n = x_n + y_n$, $n \in \mathbb{N}$. Поскольку

$$\text{Re}(x_n a_n) + \text{Re}(y_n a_n) = \text{Re}(z_n a_n) = H_Q(a_n) + H_K(a_n), \quad n \in \mathbb{N},$$

то $\text{Re}(x_n a_n) = H_Q(a_n)$ и $\text{Re}(y_n a_n) = H_K(a_n)$, $n \in \mathbb{N}$. Следовательно, $x_n \in Q \cap \partial Q = \omega$. Поскольку ω , K и S компактны, то найдутся подпоследовательности

$(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}, (y_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}, (a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, сходящиеся (в \mathbb{C}) соответственно к $x \in \omega \subset Q$, $y \in K$ и $a \in S$.

Если $z := x + y$, то $z = \lim_{k \rightarrow \infty} z_{n_k} \in Q + K$. Кроме того, $z \in \partial(Q + K)$. Действительно, если $z \in \text{int}(Q + K)$, то найдется $\varepsilon > 0$ такое, что $\text{Re}(zb) + \varepsilon \leq H_{Q+K}(b) = H_Q(b) + H_K(b)$ для любого $b \in S$. Поскольку $\text{Re}(z_{n_k} a_{n_k}) \rightarrow \text{Re}(za)$, то это противоречит равенству $\text{Re}(z_{n_k} a_{n_k}) = H_Q(a_{n_k}) + H_K(a_{n_k})$ для больших k . Таким образом, множество ω_1 компактно.

Покажем далее, что любая опорная к $\overline{Q + K} = \overline{Q} + K$ прямая не может одновременно пересекать множество $(\partial(Q + K)) \setminus \omega_1$ и ω_1 . Предположим противное, т. е. что найдутся $z \in \omega_1$ и $v \in (\partial(Q + K)) \setminus \omega_1$, лежащие на одной опорной прямой $P := \{t \in \mathbb{C} \mid \text{Re}(ta) = H_{Q+K}(a)\}$ для некоторого $a \in S$. Так как $z \in Q + K$, то существуют $x \in Q$ и $y \in K$ такие, что $z = x + y$. При этом $x \in Q \cap \partial Q = \omega$. Поскольку $\partial(Q + K) \subseteq \partial Q + K$, то найдутся $u \in \partial Q$, $w \in K$ такие, что $v = u + w$. При этом отрезок $[x, u]$ лежит на опорной прямой $P_0 := \{t \in \mathbb{C} \mid \text{Re}(ta) = H_Q(a)\}$ к \overline{Q} . Так как P_0 , по лемме 2.1 (iii), не может одновременно пересекать ω и $(\partial Q) \setminus \omega$, то $u \in \omega \subseteq Q$. Значит, $v = u + w \in (Q + K) \cap \partial(Q + K) = \omega_1$. Получено противоречие. Следовательно, по лемме 2.1 (iii) множество $Q + K$ имеет счетный базис окрестностей, состоящий из выпуклых областей.

Отметим, что области

$$\begin{aligned} \tilde{Q}_n + K &= (\text{int } Q) \cup (\omega + B(0, 1/n)) + K = \\ &= ((\text{int } Q) + K) \cup (\omega + K + B(0, 1/n)), \quad n \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

образуют базис окрестностей $Q + K$. Действительно, пусть G – открытая окрестность $Q + K$. Поскольку $\omega + K$ – компакт и $\omega + K \subset G$, то существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $\omega + K + B(0, 1/n) \subset G$. Кроме того, $(\text{int } Q) + K \subset G$. Поэтому $\tilde{Q}_n + K \subset G$. Поскольку Q обладает базисом окрестностей, состоящим из выпуклых областей, то $(Q_n + K)_{n \in \mathbb{N}}$ является базисом окрестностей $Q + K$. \square

Из леммы 2.2 следует, что $A(Q + K) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A(Q_n + K)$. Введем в $A(Q + K)$ топологию индуктивного предела пространств Фреше $A(Q_n + K)$ относительно естественных отображений вложения $A(Q_n + K)$ в $A(Q + K)$: $A(Q + K) := \text{ind}_{n \rightarrow \infty} A(Q_n + K)$.

2.2 Сопряженное к $A(Q)$

Пусть $(G_m)_{m \in \mathbb{N}}$ – фундаментальная последовательность компактных подмножеств $\text{int } Q$. Без ограничения общности можно считать, что все компакты G_m выпуклые и $G_m \subset \text{int } G_{m+1}$ для любого $m \in \mathbb{N}$.

Положим

$$G_{mn} := \text{conv} \left(G_m \cup \left(\omega + \overline{B} \left(0, \frac{m}{n(1+m)} \right) \right) \right), \quad m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}.$$

Тогда $(G_{mn})_{m \in \mathbb{N}}$ – фундаментальная система компактных подмножеств Q_n .

Положим $H_{nm} := H_{G_{nm}}$, $n, m \in \mathbb{N}$. Тогда

$$H_{nm}(z) = \max \left(H_{G_m}(z); H_\omega(z) + \frac{m}{n(1+m)}|z| \right), \quad z \in \mathbb{C}, \quad n, m \in \mathbb{N}.$$

Преобразование Лапласа устанавливает линейный топологический изоморфизм между сильным сопряженным к $A(Q)$ и весовым пространством целых функций. Введем его. Для $n, m \in \mathbb{N}$ определим весовое банахово пространство целых функций

$$\mathcal{A}_{Q,n,m} := \left\{ f \in A(\mathbb{C}) \mid \|f\|_{n,m} := \sup_{z \in \mathbb{C}} \frac{|f(z)|}{\exp(H_{nm}(z))} < +\infty \right\}.$$

Ясно, что $\mathcal{A}_{Q,n+1,m} \subset \mathcal{A}_{Q,n,m} \subset \mathcal{A}_{Q,n,m+1}$ для любых $n, m \in \mathbb{N}$, и эти вложения непрерывны. Положим

$$\mathcal{A}_{Q,n} := \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \mathcal{A}_{Q,n,m}; \quad \mathcal{A}_Q := \bigcap_{m \in \mathbb{N}} \mathcal{A}_{Q,n}$$

и введем в $\mathcal{A}_{Q,n}$ топологию индуктивного предела пространств $\mathcal{A}_{Q,n,m}$ относительно их вложений в $\mathcal{A}_{Q,n}$, а в \mathcal{A}_Q – топологию проективного предела пространств $\mathcal{A}_{Q,n}$ относительно вложений \mathcal{A}_Q в $\mathcal{A}_{Q,n}$:

$$\mathcal{A}_{Q,n} := \text{ind}_{m \rightarrow} \mathcal{A}_{Q,n,m}; \quad \mathcal{A}_Q := \text{proj}_{\leftarrow n} \mathcal{A}_{Q,n}.$$

Для локально выпуклого пространства E символ E' обозначает топологическое сопряженное к E пространство. Положим $e_\lambda(z) := \exp(\lambda z)$, $\lambda, z \in \mathbb{C}$.

Следующая лемма доказана в [20, лемма 2.1].

Лемма 2.3. (i) Преобразование Лапласа $\mathcal{F}(\varphi)(\lambda) := \varphi(e_\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $\varphi \in A(Q)'$, является топологическим изоморфизмом сильного сопряженного $A(Q)'_b$ к $A(Q)$ на \mathcal{A}_Q .

(ii) Указанный в (i) изоморфизм задает двойственность между $A(Q)$ и \mathcal{A}_Q посредством билинейной формы $\langle g, f \rangle := \mathcal{F}^{-1}(f)(g)$, $g \in A(Q)$, $f \in \mathcal{A}_Q$.

(iii) Пространство $A(Q)$ монтелиевское, а значит, и рефлексивное.

Пусть $\mathcal{A}_{Q,\text{sp}}$ – проективный спектр пространств $\mathcal{A}_{Q,n}$ и отображений вложения $i_{n+1}^n : \mathcal{A}_{Q,n+1} \rightarrow \mathcal{A}_{Q,n}$ (см. [28]).

Замечание 2. Пространство \mathcal{A}_Q и $\mathcal{A}_{Q,\text{sp}}$ обладают следующими свойствами.

(i) \mathcal{A}_Q полно.

(ii) $\text{Proj}^1 \mathcal{A}_{Q,\text{sp}} = 0$.

(iii) \mathcal{A}_Q ультраборнологично, т. е. является индуктивным пределом некоторого семейства банаховых пространств.

(iv) Всякое ограниченное подмножество \mathcal{A}_Q равностепенно непрерывно (если \mathcal{A}_Q отождествить с топологическим сопряженным к $A(Q)$, как в лемме 2.3).

Доказательство. Утверждение (i) доказано в [20, лемма 2.1]. По поводу доказательства (ii) см. [20, доказательство леммы 2.3].

(iii): Заметим вначале, что каждое пространство $\mathcal{A}_{Q,n}$, $n \in \mathbb{N}$, плотно в \mathcal{A}_Q . Действительно, зафиксируем точку $\lambda \in Q$. Вследствие [30, теорема 2] множество $e_\lambda \mathbb{C}[z] = \{e_\lambda f \mid f \in \mathbb{C}[z]\}$, содержащееся в \mathcal{A}_Q , плотно в каждом пространстве $\mathcal{A}_{Q,n}$. При этом $\mathbb{C}[z]$ – множество всех многочленов над полем \mathbb{C} . Равенство $\text{Proj}^1 \mathcal{A}_{Q,\text{sp}} = 0$ влечет борнологичность, а значит, и ультраборнологичность \mathcal{A}_Q [28, теорема 3.4].

Так как $A(Q)$ – бочечное локально выпуклое пространство, то (iv) вытекает из леммы 2.3 (i) и критерия бочечности [31, гл. IV, 5.2]. \square

Лемма 2.3 (с учетом леммы 2.2) дает описание и сопряженного к пространству $A(Q + K)$ для любого выпуклого компакта K в \mathbb{C} . При этом следует заметить, что $(G_m + K)_{m \in \mathbb{N}}$ является фундаментальной последовательностью компактных подмножеств $\text{int}(Q + K)$.

Если (H, F) – дуальная пара (комплексных) векторных пространств относительно билинейной формы $\langle \cdot, \cdot \rangle$, то для множества $L \subset H$ символ L^0 обозначает поляр L в F , т. е.

$$L^0 := \{f \in F \mid |\langle x, f \rangle| \leq 1 \text{ для любого } x \in L\}.$$

Для векторного пространства H , абсолютно выпуклого поглощающего множества $U \subset H$ через p_U обозначим функционал Минковского (калибровочную функцию) множества U .

Символ $CC(Q)$ обозначает семейство всех выпуклых компактов $M \subset Q$. Докажем теперь результат об индуктивном описании пространства \mathcal{A}_Q , играющий существенную роль при доказательстве необходимого условия сюръективности T_μ .

Лемма 2.4. (i) Для любого ограниченного множества B в \mathcal{A}_Q существует $M \in CC(Q)$ такое, что B содержится и ограничено в \mathcal{A}_M .

(ii) Выполняется алгебраическое и топологическое равенство

$$\mathcal{A}_Q = \text{ind}_{M \in CC(Q)} \mathcal{A}_M,$$

т. е. $\mathcal{A}_Q = \bigcup_{M \in CC(Q)} \mathcal{A}_M$ и \mathcal{A}_Q является индуктивным пределом пространств Фреше \mathcal{A}_M , $M \in CC(Q)$, относительно отображений вложения \mathcal{A}_M в \mathcal{A}_Q .

Доказательство. (i): Будем рассматривать дуальную пару $(A(Q), \mathcal{A}_Q)$ относительно билинейной формы $\langle \cdot, \cdot \rangle$, как в лемме 2.3 (ii). Пусть B – ограниченное подмножество \mathcal{A}_Q . По замечанию 2 B равномерно непрерывно в \mathcal{A}_Q . Значит, существует замкнутая абсолютно выпуклая окрестность нуля U в $A(Q)$ такая,

что $B \subset U^0$. По [29, утверждение 1.9] индуктивная топология, которую мы ввели в $A(Q)$, совпадает с другой естественной топологией – проективной топологией pr в $(A(Q), pr) := \text{proj}_{M \in CC(Q)} A(M)$. Поэтому существуют $M \in CC(Q)$, абсолютно выпуклая окрестность нуля V в $A(M)$ такие, что $V \cap A(Q) \subset U$. Значит, на $A(Q)$ выполняется неравенство $p_U \leq p_{V \cap A(Q)}$. Поскольку $|\langle g, f \rangle| \leq p_U(g)$ для любых $g \in A(Q)$, $f \in U^0$, то

$$|\langle g, f \rangle| \leq p_{V \cap A(Q)}(g) = p_V(g), \quad g \in A(Q), f \in U^0.$$

Если взять $g := e_\lambda$, то из последнего неравенства получим, что для любого $f \in U^0$

$$|f(\lambda)| \leq p_V(e_\lambda), \quad \lambda \in \mathbb{C}. \quad (2.1)$$

Пусть $A^\infty(M + B(0, 1/n))$, $n \in \mathbb{N}$, – банахово пространство всех функций, аналитических и ограниченных в $M + B(0, 1/n)$ с обычной sup -нормой. Тогда $A(M) = \text{ind}_{n \rightarrow} A^\infty(M + B(0, 1/n))$. Поэтому для любого $n \in \mathbb{N}$ найдется постоянная C_n , для которой выполняется неравенство $p_V(g) \leq C_n \sup_{z \in M + B(0, 1/n)} |g(z)|$, $g \in A^\infty(M + B(0, 1/n))$. Значит, для любого $\lambda \in \mathbb{C}$

$$p_V(e_\lambda) \leq C_n \exp(H_M(\lambda) + |\lambda|/n). \quad (2.2)$$

Из (2.1), (2.2) следует, что для любого $n \in \mathbb{N}$

$$\sup_{f \in B} \sup_{\lambda \in \mathbb{C}} \frac{|f(\lambda)|}{\exp(H_M(\lambda) + |\lambda|/n)} < +\infty.$$

Следовательно, множество B содержится и ограничено в \mathcal{A}_M .

(ii): Так как любой компакт $M \in CC(Q)$ содержится в каждой области Q_n , $n \in \mathbb{N}$, то \mathcal{A}_M непрерывно вложено в \mathcal{A}_Q для любого $M \in CC(Q)$. Из утверждения (i) вытекает, что, наоборот, \mathcal{A}_Q вложено в $\bigcup_{M \in CC(Q)} \mathcal{A}_M$, а отображение

вложения \mathcal{A}_Q в $\text{ind}_{M \in CC(Q)} \mathcal{A}_M$ переводит всякое ограниченное в \mathcal{A}_Q множество в ограниченное в $\text{ind}_{M \in CC(Q)} \mathcal{A}_M$ множество. Так как \mathcal{A}_Q борнологично (замечание 2), то это вложение непрерывно [31, гл. 2, утверждение 8.3]. Значит, пространства \mathcal{A}_Q и $\text{ind}_{M \in CC(Q)} \mathcal{A}_M$ совпадают алгебраически и топологически. \square

2.3 Операторы свертки

Пусть K – выпуклый компакт в \mathbb{C} и $\mu \in A(K)'$. Согласно [32] оператор свертки

$$T_\mu(f)(z) = \mu_t(f(t + z))$$

линейно и непрерывно отображает каждое пространство $A(Q_n + K)$, $n \in \mathbb{N}$, в $A(Q_n)$. Значит, T_μ – линейное непрерывное отображение $A(Q + K)$ в $A(Q)$.

Пусть $\hat{\mu} = \mathcal{F}(\mu)$ – преобразование Лапласа μ .

Замечание 3. Если $A(Q+K)'$ и $A(Q)'$ отождествить с \mathcal{A}_{Q+K} и \mathcal{A}_Q соответственно (см. лемму 2.3), то сопряженным к оператору свертки $T_\mu : A(Q+K) \rightarrow A(Q)$ является оператор умножения $M_{\hat{\mu}} : \mathcal{A}_Q \rightarrow \mathcal{A}_{Q+K}$, $f \mapsto \hat{\mu}f$.

Приведем общий результат о существовании ЛНПО к оператору T_μ (см. [20, лемма 4.1]; при доказательстве импликации (iii) \Rightarrow (ii) существенно используется ультраборнологичность пространства \mathcal{A}_{Q+K} , имеющая место по замечанию 2).

Лемма 2.5. *Следующие утверждения равносильны:*

- (i) $T_\mu : A(Q+K) \rightarrow A(Q)$ имеет ЛНПО.
- (ii) Оператор $M_{\hat{\mu}} : \mathcal{A}_Q \rightarrow \mathcal{A}_{Q+K}$, $f \mapsto \hat{\mu}f$, имеет линейный непрерывный левый обратный.
- (iii) Подпространство $\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q$ замкнуто в \mathcal{A}_{Q+K} и фактор-отображение $q : \mathcal{A}_{Q+K} \rightarrow \mathcal{A}_{Q+K}/(\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q)$ имеет ЛНПО.

3 Условия существования линейного непрерывного правого обратного к оператору свертки

3.1 Условия сюръективности оператора свертки

Далее K – выпуклое компактное подмножество \mathbb{C} , $\mu \in A(K) \setminus \{0\}$.

Покажем, что для сюръективного оператора T_μ , как и в несмешанных случаях (когда Q открыто или компактно), справедлив соответствующий аналог теоремы деления.

Лемма 3.1. *Пусть оператор $T_\mu : A(Q+K) \rightarrow A(Q)$ сюръективен. Тогда*

$$\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q = (\hat{\mu} \cdot A(\mathbb{C})) \cap \mathcal{A}_{Q+K}.$$

Доказательство. Без ограничения общности $0 \in Q+K$. По теореме об открытом отображении [33, теорема 6.7.1] $T_\mu : A(Q+K) \rightarrow A(Q)$ открыто. Поэтому подпространство $\text{Im } M_{\hat{\mu}} = \hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q$ замкнуто в $\mathcal{A}_{Q+K} \simeq A(Q+K)'_b$. Кроме того, подпространство $(\hat{\mu} \cdot A(\mathbb{C})) \cap \mathcal{A}_{Q+K}$ также замкнуто в \mathcal{A}_{Q+K} . Пусть $CC_0(Q+K)$ – семейство всех выпуклых компактных подмножеств $Q+K$, содержащих 0. По лемме 2.4 $\mathcal{A}_{Q+K} = \text{ind}_{M \in CC_0(Q+K)} \mathcal{A}_M$. По [34, теорема 4.4] $\hat{\mu} \cdot \mathbb{C}[z]$ плотно в $(\hat{\mu} \cdot A(\mathbb{C})) \cap \mathcal{A}_M$ для любого $M \in CC_0(Q+K)$ ($\mathbb{C}[z]$ – множество всех многочленов над полем \mathbb{C}). Значит, $\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q \supset \hat{\mu} \cdot \mathbb{C}[z]$ плотно в $(\hat{\mu} \cdot A(\mathbb{C})) \cap \mathcal{A}_{Q+K}$. Таким образом, $\hat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q = (\hat{\mu} \cdot A(\mathbb{C})) \cap \mathcal{A}_{Q+K}$. \square

Ниже будем использовать следующие множества опорных направлений, соответствующих опорным точкам из $\gamma \subset \partial Q$:

$$S_\gamma := \{a \in S \mid \text{Re}(wa) = H_Q(a) \text{ для некоторого } w \in \gamma\}.$$

Докажем некоторые геометрические свойства Q .

Замечание 4. (i) Если $\gamma \subset \partial Q$ компактно, множество S_γ тоже компактно. В частности, S_ω компактно.

(ii) Для любой (относительной) окрестности γ множества ω в ∂Q множество S_γ является (относительной) окрестностью S_ω в S .

(iii) Для любого компакта $\sigma \subset S \setminus S_\omega$, любого $T \in CC(Q)$ существует выпуклый компакт T_0 в $\text{int } Q$ такой, что $H_T \leq H_{T_0}$ на σ .

(iv) Для любого компакта $\sigma \subset S \setminus S_\omega$ существует $s \in \mathbb{N}$, для которого $H_\omega < H_{G_s}$ на σ .

Доказательство. Утверждение (i) очевидно.

(ii): Предположим противное. Тогда найдутся последовательности $a_n \in S$ и $z_n \in \partial Q$, $n \in \mathbb{N}$, такие, что $\text{dist}(a_n, S_\omega) \rightarrow 0$ и $\text{Re}(z_n a_n) > H_\gamma(a_n)$. Без ограничения общности $a_n \rightarrow a$, где $a \in S_\omega$. Возьмем точку $z_0 \in \omega$, для которой $\text{Re}(z_0 a) = H_Q(a) = H_\omega(a)$. Тогда $H_Q(a) = H_\gamma(a)$. Заметим, что $z_n \notin \gamma$, $n \in \mathbb{N}$, а значит, найдется $\delta > 0$ такое, что $\text{dist}(z_n, \omega) \geq \delta$ для любого $n \in \mathbb{N}$. Следовательно, существует ограниченная последовательность точек $\tilde{z}_n \in \overline{Q}$, $n \in \mathbb{N}$, точек, расположенных на отрезках $[z_n, z_0]$ и вне множества $\omega + B(0, \delta)$. Пусть $\tilde{z}_n = (1 - \beta_n)z_n + \beta_n z_0$, $\beta_n \in [0, 1]$. Без ограничения общности $\beta_n \rightarrow \beta \in [0, 1]$ и $\tilde{z}_n \rightarrow v \in \overline{Q}$, причем $v \notin Q$. Так как $\text{Re}(\tilde{z}_n a_n) = (1 - \beta_n)\text{Re}(z_n a_n) + \beta_n \text{Re}(z_0 a_n) \geq (1 - \beta_n)H_\gamma(a_n) + \beta_n \text{Re}(z_0 a_n)$, то, переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получим: $\text{Re}(va) \geq (1 - \beta)H_\gamma(a) + \beta H_Q(a) = (1 - \beta)H_Q(a) + \beta H_Q(a) = H_Q(a)$. Отсюда следует, что v лежит на опорной прямой $\{z \in \mathbb{C} \mid \text{Re}(za) = H_Q(a)\}$ к \overline{Q} , содержащей также точку $z_0 \in \omega$. Получено противоречие с леммой 2.1 (iii).

(iii): Без ограничения общности $0 \in \text{int } Q$. Возьмем $R > 0$ такое большое, что T содержится в круге $B(0, R) := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < R\}$. Положим $Q_R := Q \cap B(0, R)$. Тогда $H_T < H_{Q_R}$ на σ . Действительно, возьмем $a \in \sigma$ и точку $z_0 \in T$ такую, что $H_T(a) = \text{Re}(z_0 a)$. Опорная к T прямая $p = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Re}(za) = H_T(a)\}$ пересекает $\text{int } Q$ (иначе $a \in S_\omega$). Следовательно, прямая p пересекает и $\text{int } Q_{Q_R}$, а значит, $H_T(a) = \text{Re}(z_0 a) < H_{Q_R}(a)$. Поскольку $0 \in \text{int } Q_R$, то существует $\alpha \in (0, 1)$ такое, что $H_T \leq \alpha H_{Q_R}$. Следовательно, в качестве компакта T_0 можно взять $T_0 := \alpha \overline{Q_R}$.

Утверждение (iv) следует из (iii), поскольку $\text{conv } \omega$ – выпуклый компакт в Q . \square

Замечание 5. Пусть Q неограниченно. Далее нам понадобится разделение Q на две части: одна из них ограничена и содержит ω , а другая неограниченна. Для этого введем следующую терминологию. Вещественную прямую l в \mathbb{C} назовем разделяющей Q , если ω содержится в одной открытой полуплоскости $\Pi(l)$ с границей l и пересечение этой полуплоскости с Q ограничено. Такие прямые существуют. Возьмем точку $z_0 \in \omega$. Существует $a \in S$ такое, что $H_Q(a) = \text{Re}(z_0 a)$ и

$$Q \subset \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Re}(za) \leq H_Q(a)\}.$$

Так как ω компактно, то найдется $\gamma \in \mathbb{R}$, для которого множество

$$\Omega := \{z \in Q \mid \gamma < \text{Re}(za) \leq H_Q(a)\}.$$

содержит ω и 0. Выпуклое множество Ω ограничено. Действительно, предположим, что найдутся $z_n \in \Omega$, $n \in \mathbb{N}$, такие, что $|z_n| \rightarrow \infty$ и $\text{dist}(z_n, \omega) \geq 1$. Пусть точки $w_n \in [z_0, z_n]$ выбраны так, что $\text{dist}(w_n, \omega) = 1$, $n \in \mathbb{N}$. Тогда $w_n \in Q$. Существует подпоследовательность $(w_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, сходящаяся к некоторой точке w_0 . Если α_n – наименьший угол между опорной (к \overline{Q}) прямой $l_0 := \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Re}(za) = H_Q(a)\}$ и отрезком $[z_0, z_n]$, то $\alpha_n \rightarrow 0$. Поэтому $w_0 \in l_0$ и $\text{dist}(w_0, \omega) \geq 1$. Кроме того, $w_0 \in \overline{Q}$. Следовательно, $w_0 \in (\partial Q) \setminus \omega$. Этого не может быть вследствие леммы 2.1 (iii).

Для всякой разделяющей Q прямой l положим $Q(l) := Q \cap \Pi(l)$.

Далее мы будем использовать субгармонические мажоранты, применяемые в теоремах деления. Конструкции подобного рода стали широко использоваться после работ Л. Эренпрайса (см., например, [35], [36]). При этом будут учитываться модификации, осуществленные Э. Моммом [37].

Для ограниченного множества $M \subset \mathbb{C}$, $b \in \mathbb{C}$, $r > 0$ через $h(M, b, r)(z)$ обозначим наибольшую субгармоническую функцию, равную опорной функции $H_M(z)$ множества M на $|z - b| \geq r$. Функция $h(M, b, r)(z)$ гармоническая в круге $|z - b| < r$ и непрерывная в $|z - b| \leq r$.

Замечание 6. (I) Пусть M – ограниченное подмножество \mathbb{C} .

(а) Опорная функция H_M удовлетворяет условию Липшица. Именно, для любых $z, w \in \mathbb{C}$

$$|H_M(z) - H_M(w)| \leq C|z - w|, \quad (3.1)$$

где $C := \max_{|t| \leq 1} |H_M(t)| < +\infty$.

Отметим ниже некоторые простые свойства функций $h(M, b, r)$.

(b) Функция $h(M, b, r)(b)$ непрерывна по $b \in \mathbb{C}$.

(c) Для $b \in \mathbb{C}$, $r > 0$ положим

$$\Delta(M, b, r) := \max_{|z-b| \leq r} (h(M, b, r)(z) - H_M(z));$$

$\Delta(M, b, 0) := 0$. Функция $\Delta(M, b, r)$ обладает следующими свойствами:

(i) $\Delta(M, b, r)$ положительно однородная (степени 1) относительно (b, r) , т. е. $\Delta(M, \alpha b, \alpha r) = \alpha \Delta(M, b, r)$ для любых $b \in \mathbb{C}$, $r \geq 0$, $\alpha \geq 0$.

(ii) Семейство функций $f_b(r) := \Delta(M, b, r)$, $b \in S$, равномерно непрерывно в точке $r = 0$.

(II) Если Q ограничено, то в точке $r = 0$ равномерно непрерывно семейство функций $f_{b,M}(r) := \Delta(M, b, r)$, $b \in S$, $M \in CC(Q)$.

Доказательство. Утверждение (b) следует из теоремы о среднем для гармонических функций и неравенства (3.1).

Свойство (с) (i) вытекает из положительной однородности (степени 1) функции H_M , а свойство (с) (ii) следует из неравенства (3.1).

Утверждение (II) следует из неравенства (3.1) и того, что для любого $M \in CC(Q)$ выполняется неравенство $\max_{|t| \leq 1} |H_M(t)| \leq \max_{|t| \leq 1} |H_Q(t)| < +\infty$. \square

Для множества $M \subset \mathbb{C}$ символом E_M обозначим множество всех $b \in S$ таких, что $H_M(b) < +\infty$, а N_M – множество всех $b \in S$, не имеющих открытой окрестности, в которой функция H_M гармонична. Положим

$$R_M := E_M \cap N_M.$$

Отметим, что N_M замкнуто.

Лемма 3.2. *Пусть множество Q ограничено. Тогда*

(i) $\inf_{b \in R_Q} (h(Q, b, r)(b) - H_Q(b)) > 0$ для любого $r > 0$.

(ii) Для любого $r > 0$ найдется компакт $M \in CC(Q)$ такой, что

$$\inf_{b \in R_Q} (h(M, b, r)(b) - H_Q(b)) > 0.$$

Доказательство. (i): Предположим, что для некоторого $r > 0$

$$\inf_{b \in R_Q} (h(Q, b, r)(b) - H_Q(b)) = 0.$$

Тогда найдется последовательность $b_j \in R_Q$, $j \in \mathbb{N}$, для которой

$$h(Q, b_j, r)(b_j) - H_Q(b_j) \rightarrow 0.$$

Без ограничения общности существуют $b \in S$ такое, что $b_j \rightarrow b$. При этом $b \in R_Q$. Вследствие непрерывности функции H_Q и функции $h(Q, a, r)(a)$ по $a \in S$ (см. замечание 4) выполняется равенство $h(Q, b, r)(b) = H_Q(b)$. По принципу максимума для субгармонических функций $H_Q = h(Q, b, r)$ в круге $|z - b| \leq r$. Это противоречит тому, что $b \in R_Q$.

(ii): Зафиксируем $r > 0$. По (i)

$$\alpha := \inf_{b \in R_Q} (h(Q, b, r)(b) - H_Q(b)) > 0.$$

Без ограничения общности можно считать, что $0 \in \text{int } Q$. Выберем $\varepsilon \in (0, 1)$ такое, что $\varepsilon < \alpha / (2 \max_{|z| \leq r+1} |H_Q(z)|)$ и возьмем $M := (1 - \varepsilon)\overline{Q}$. Тогда $M \in CC(Q)$

и

$$h(Q, b, r)(b) - h(M, b, r)(b) \leq \max_{|z| \leq r+1} |H_Q(z) - H_M(z)| < \frac{\alpha}{2}.$$

Поэтому для любого $b \in R_Q$

$$h(M, b, r)(b) - H_Q(b) \geq h(Q, b, r)(b) - \alpha/2 - H_Q(b) \geq \alpha/2.$$

\square

Приведем определение, идущее от Л. Эренпрайса [35] и К.А. Беренштейна, Б.А. Тейлора [38].

Определение 1. Пусть $\mu \in A(K)'$, A – замкнутое подмножество S . Функция $\hat{\mu}$ называется *медленно убывающей* на $\Gamma(A)$, если $\forall k \in \mathbb{N} \exists R > 0 : \forall z \in \Gamma(A), |z| \geq R, \exists w \in \mathbb{C}, |w - z| \leq |z|/k : |\hat{\mu}(w)| \geq \exp(H_K(w) - |w|/k)$.

Отметим, что медленное убывание $\hat{\mu}$ на $\Gamma(A)$ равносильно тому, что индикатор $h_{\hat{\mu}}(\theta)$ целой функции $\hat{\mu}$ экспоненциального типа равен $H_K(e^{i\theta})$, $\theta \in \mathbb{R}$, и $\hat{\mu}$ – функция вполне регулярного роста на $\Gamma(A)$ в смысле Левина-Пфлюгера [39].

Далее $V(\hat{\mu})$ – множество всех нулей функции $\hat{\mu}$. Если $V(\hat{\mu})$ бесконечно, то символ $A_{\hat{\mu}}$ обозначает множество всех предельных точек последовательности $(z/|z| \mid z \in V(\hat{\mu}))$. Для множества $B \subset \mathbb{C}$ введем конус, порожденный B : $\Gamma(B) := \{\lambda b \mid \lambda \geq 0, b \in B\}$.

Согласно [14, лемма 5; см. также утверждение 4 там же] медленное убывание $\hat{\mu}$ на $\Gamma(A_{\hat{\mu}})$ гарантирует "хорошие" оценки снизу для $|\hat{\mu}|$ на границе некоторой окрестности нулевого множества $\hat{\mu}$, состоящей из "небольших" компонент. Именно, справедлива

Лемма 3.3. [14] Пусть множество всех нулей $\hat{\mu}$ бесконечно и $\hat{\mu}$ медленно убывает на $\Gamma(A_{\hat{\mu}})$. Существует последовательность попарно непересекающихся ограниченных областей $(\Omega_j)_{j \in \mathbb{N}}$ таких, что любого $n \in \mathbb{N}$ найдется постоянная $C > 0$, для которой для любого $j \in \mathbb{N}$ выполняется следующее:

- (i) $|\hat{\mu}(z)| \geq \exp(H_K(z) - |z|/n - C), z \in \partial\Omega_j$.
- (ii) $\sup_{z, w \in \Omega_j} |z - w| \leq \frac{1}{n} \inf_{z \in \Omega_j} |z| + C$.
- (iii) $\sup_{z \in \Omega_j} H_K(z) \leq \inf_{z \in \Omega_j} (H_K(z) + |z|/n) + C$.

Кроме того,

- (iv) $V(\hat{\mu}) \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} \Omega_j$ и $\Omega_j \cap V(\hat{\mu}) \neq \emptyset$ для любого $j \in \mathbb{N}$.

Лемма 3.4. Пусть оператор $T_{\mu} : A(Q + K) \rightarrow A(Q)$ сюръективен. Тогда для любого компакта A в R_Q функция $\hat{\mu}$ медленно убывает на $\Gamma(A)$.

Доказательство. Далее пространства $A(Q)'_b$ и $A(Q + K)'_b$ отождествляются, по лемме 2.3, с A_Q и A_{Q+K} , соответственно. Поскольку оператор $T_{\mu} : A(Q + K) \rightarrow A(Q)$ сюръективен, то по теореме об открытом отображении [33, теорема 6.7.2] T_{μ} открыто. По [33, теорема 8.6.8] для любого равномерно непрерывного множества $B \subset A_{Q+K}$ его прообраз $M_{\hat{\mu}}^{-1}(B)$ – равномерно непрерывное подмножество A_Q . Заметим, что для любого $M \in CC(Q)$, вследствие рефлексивности

пространства $A(M)$, наборы ограниченных и равномерно непрерывных подмножеств A_M (если $A(M)'_b$ отождествить с A_M) одни и те же. Поэтому, учитывая замечание 2 (iv), получим, что справедливо следующее утверждение (BD):

Пусть $(f_j)_{j \in \mathbb{N}}$ – последовательность в A_Q такая, что существует $M \in CC(Q)$, для которого для любого $s \in \mathbb{N}$

$$\sup_{j \in \mathbb{N}} \sup_{z \in \mathbb{C}} \frac{|\hat{\mu}(z)| |f_j(z)|}{\exp(H_M(z) + H_K(z) + |z|/s)} < +\infty.$$

Тогда найдется компакт $T \in CC(Q)$ такой, что для любого $s \in \mathbb{N}$

$$\sup_{j \in \mathbb{N}} \sup_{z \in \mathbb{C}} \frac{|f_j(z)|}{\exp(H_T(z) + |z|/s)} < +\infty.$$

(I) Пусть Q ограничено. Тогда R_Q компактно. Докажем утверждение для $A := R_Q$. Предположим, что $\hat{\mu}$ не является медленно убывающей на $\Gamma(R_Q)$. Тогда найдутся $k \in \mathbb{N}$, последовательность $z_j \in \Gamma(R_Q)$, $j \in \mathbb{N}$, для которых $|z_j| \rightarrow \infty$, $|z_j| > k$ и для любого $j \in \mathbb{N}$

$$|\hat{\mu}(w)| < \exp(H_K(w) - |w|/k), \quad \text{если } |w - z_j| \leq \frac{|z_j|}{k}. \quad (3.2)$$

В силу замечания 6 (II) найдется $k_1 \geq 2k$ такое, что для любого компакта $M \in CC(Q)$

$$\Delta \left(M, z_j, \frac{|z_j|}{k_1} \right) = |z_j| \Delta \left(M, a_j, \frac{1}{k_1} \right) \leq \frac{|z_j|}{2k}, \quad j \in \mathbb{N}, \quad (3.3)$$

где $a_j := z_j/|z_j|$.

По лемме 3.2 (ii) существуют компакт $M \in CC(Q)$ и $k_2 \in \mathbb{N}$, для которых

$$h \left(M, a_j, \frac{1}{k_1} \right) (a_j) - H_Q(a_j) \geq \frac{1}{k_2}, \quad j \in \mathbb{N}. \quad (3.4)$$

Положим $h_j(z) := h(M, z_j, |z_j|/k_1)(z)$. По [40, теорема 4.4.4] найдется $C_1 > 0$ такое, что для любого $j \in \mathbb{N}$ существует функция $f_j \in A(\mathbb{C})$, для которой $f_j(z_j) := \exp(h_j(z_j))$ и

$$|f_j(z)| \leq C_1 \exp(\tilde{h}_j(z) + C_1 \log(1 + |z|)), \quad z \in \mathbb{C}.$$

Здесь $\tilde{h}_j(z) := \sup_{|t-z| \leq 1} h_j(t)$, $z \in \mathbb{C}$, $j \in \mathbb{N}$. Отсюда следует, что найдется постоянная C_2 такая, что для любых $z \in \mathbb{C}$, $j \in \mathbb{N}$

$$|f_j(z)| \leq C_2 \exp \left(H_M(z) + C_1 \log(1 + |z|) + \Delta \left(M, z_j, \frac{|z_j|}{k_1} \right) \right). \quad (3.5)$$

Поэтому, в частности, все функции f_j принадлежат A_Q .

В силу (3.2), (3.3), (3.5) и того, что $k_1 \geq 2k$, для $j \in \mathbb{N}$

$$|\widehat{\mu}(z)f_j(z)| \leq C_2 \exp(H_M(z) + C_1 \log(1 + |z|) + H_K(z)), \text{ если } |z - z_j| \leq \frac{|z_j|}{k_1}.$$

Поскольку $\mu \in A(K)'$, то [40, теорема 4.5.3] для любого $\varepsilon > 0$

$$\sup_{z \in \mathbb{C}} \frac{|\widehat{\mu}(z)|}{\exp(H_K(z) + \varepsilon|z|)} < +\infty.$$

Таким образом, для любого $s \in \mathbb{N}$

$$\sup_{j \in \mathbb{N}} \sup_{z \in \mathbb{C}} \frac{|\widehat{\mu}(z)f_j(z)|}{\exp(H_M(z) + H_K(z) + |z|/s)} < +\infty.$$

При этом для любого $j \in \mathbb{N}$, вследствие (3.4),

$$f_j(z_j) = \exp\left(|z_j|h\left(M, a_j, \frac{1}{k_1}\right)(a_j)\right) \geq \exp\left(H_Q(z_j) + \frac{|z_j|}{k_2}\right),$$

а значит, для $s_0 := 2k_2$

$$\sup_{z \in \mathbb{C}} \frac{|f_j(z)|}{\exp(H_Q(z) + |z|/s_0)} \geq \exp\left(\frac{|z_j|}{2k_2}\right), \quad j \in \mathbb{N}.$$

Отсюда следует, что для любого $T \in CC(Q)$

$$\sup_{z \in \mathbb{C}} \frac{|f_j(z)|}{\exp(H_T(z) + |z|/s_0)} \geq \exp\left(\frac{|z_j|}{2k_2}\right), \quad j \in \mathbb{N}.$$

Это противоречит утверждению (BD). Таким образом, $\widehat{\mu}$ медленно убывает на $\Gamma(R_Q)$.

(II) Пусть множество Q неограниченно и A – компакт в R_Q . Без ограничения общности $0 \in \text{int } Q$ и $0 \in K$. Зафиксируем разделяющую Q прямую l (см. замечание 5). Из леммы 2.1 вытекает, что $Q(l)$ имеет счетный базис окрестностей, состоящий из (ограниченных) выпуклых областей. Вследствие замечания 4 (ii) существует компактная окрестность V множества S_ω в S такая, что $H_{Q(l)} = H_Q$ на V . Если $\widehat{\mu}$ не является медленно убывающей на $\Gamma(V \cap A)$, то по части (I) существуют компакт $M \in CC(Q(l)) \subset CC(Q)$, точки $z_j \in \Gamma(V \cap A)$, $j \in \mathbb{N}$, последовательность функций $(f_j)_{j \in \mathbb{N}}$ из $H_{Q(l)}$, для которых для любого $s \in \mathbb{N}$

$$\sup_{j \in \mathbb{N}} \sup_{z \in \mathbb{C}} \frac{|\widehat{\mu}(z)||f_j(z)|}{\exp(H_M(z) + H_K(z) + |z|/s)} < +\infty,$$

но найдется $s_0 \in \mathbb{N}$ такое, что

$$\sup_{j \in \mathbb{N}} \frac{|f_j(z_j)|}{\exp(H_{Q(l)}(z_j) + |z_j|/s_0)} = +\infty.$$

Поскольку $H_{Q(l)}(z_j) = H_Q(z_j)$, $j \in \mathbb{N}$, то для любого $T \in CC(Q)$

$$\sup_{j \in \mathbb{N}} \sup_{z \in \mathbb{C}} \frac{|f_j(z)|}{\exp(H_T(z) + |z|/s_0)} = +\infty,$$

Значит, утверждение (BD) не выполняется.

Пусть $B := S \setminus (\text{int}_r V)$, где $\text{int}_r V$ – относительная внутренность V в S . Предположим, что $\hat{\mu}$ не является медленно убывающей на $A \cap B$. Тогда, согласно [3, теорема 1], [4, теорема 1; раздел 3, доказательство теоремы 1], найдутся выпуклый компакт M_0 в $\text{int } Q$, содержащий 0, целая функция f , последовательность $z_j \in \Gamma(A \cap B)$, $j \in \mathbb{N}$, такие, что для любого $s \in \mathbb{N}$

$$\sup_{z \in \mathbb{C}} \frac{|\hat{\mu}(z)| |f(z)|}{\exp(H_{M_0}(z) + H_K(z) + |z|/s)} < +\infty,$$

а для любого $T_0 \in CC(\text{int } Q)$ существует $\tilde{s} \in \mathbb{N}$, для которого

$$\sup_{j \in \mathbb{N}} \frac{|f(z_j)|}{\exp(H_{T_0}(z_j) + |z_j|/\tilde{s})} = +\infty.$$

При этом z_j можно выбрать так, что $\hat{\mu}(z_j) \neq 0$ для любого $j \in \mathbb{N}$. По [34, теорема 4.4] найдется последовательность многочленов $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ такая, что последовательность $(\hat{\mu} p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ сходится к $\hat{\mu} f$ в A_{M_0+K} и, как следствие, в каждой точке z_j . Отсюда и из замечания 4 (iii) следует, что для некоторой подпоследовательности $(p_{n_j})_{j \in \mathbb{N}}$ не выполняется условие (BD). Таким образом, $\hat{\mu}$ медленно убывает на $\Gamma(A \cap B)$ и на $\Gamma(A) \subset \Gamma(A \cap B) \cup \Gamma(A \cap V)$. □

3.2 Вспомогательные пространства векторнозначных последовательностей

Пусть множество нулей $\hat{\mu}$ бесконечно и некоторая последовательность попарно непересекающихся ограниченных областей $(\Omega_j)_{j \in \mathbb{N}}$ удовлетворяет условиям (i) – (iv) леммы 3.3. Следующая конструкция идет от Р. Майзе [41]. Через $A^\infty(\Omega_j)$ обозначим банахово пространство всех ограниченных аналитических в Ω_j функций; $I_j := \hat{\mu}|_{\Omega_j} \cdot A^\infty(\Omega_j)$ – замкнутый идеал в $A^\infty(\Omega_j)$, порожденный функцией $\hat{\mu}|_{\Omega_j}$. Положим $E_j := A^\infty(\Omega_j)/I_j$, $j \in \mathbb{N}$; в E_j вводится фактор-норма

$$\|f + I_j\|_j := \inf_{\xi \in f + I_j} \sup_{z \in \Omega_j} |\xi(z)|.$$

Размерность конечномерного пространства E_j равна числу нулей функции $\hat{\mu}$, содержащихся в Ω_j , с учетом их кратностей.

Введем далее весовые пространства последовательностей с элементами из E_j . Для любого $j \in \mathbb{N}$ выберем $\nu_j \in \Omega_j \cap V(\hat{\mu})$. Без ограничения общности

можно считать, что $|\nu_j| \leq |\nu_{j+1}|$ для любого $j \in \mathbb{N}$. Так как $\hat{\mu}$ – целая функция экспоненциального типа, то $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{\log j}{|\nu_j|} = 0$. Положим для $n, m \in \mathbb{N}$

$$\Lambda_m(Q_n, \hat{\mu}, \mathbb{E}) := \left\{ X = (x_j)_{j \in \mathbb{N}} \in \prod_{j \in \mathbb{N}} E_j \mid \|X\|_{nm} := \sup_{j \in \mathbb{N}} \frac{\|x_j\|_j}{\exp(H_{nm}(\nu_j))} < +\infty \right\};$$

$\Lambda_m(Q_n, \hat{\mu}, \mathbb{E})$ – банахово пространство с нормой $\|X\|_{nm}$. Пусть

$$\Lambda(Q_n, \hat{\mu}, \mathbb{E}) := \text{ind}_{m \rightarrow \infty} \Lambda_m(Q_n, \hat{\mu}, \mathbb{E}), \quad \Lambda(Q, \hat{\mu}, \mathbb{E}) := \text{proj}_{\leftarrow n} \Lambda(Q_n, \hat{\mu}, \mathbb{E}).$$

Отметим, что пространства $\Lambda(Q, \hat{\mu}, \mathbb{E})$ от выбора точек $\nu_j \in \Omega_j \cap V(\hat{\mu})$, $j \in \mathbb{N}$, не зависят.

Доказательства следующих ниже лемм 3.5 и 3.6 (для произвольного выпуклого компакта $K \subset \mathbb{C}$), по сути, такие же, как и доказательства лемм 3.1 и 3.3 в [20] для $K = \{0\}$. Доказательство леммы 3.5 сводится к проверке некоторого условия (P), равносильного ультраборнологичности пространства числовых последовательностей $\Lambda(B)$, задаваемого числовой матрицей B (при этом используется [28, теорема 4.2]). Эта матрица B получается из той, которая задает $\Lambda(Q, \hat{\mu}, \mathbb{E})$, повторением столбцов последней (число повторений равно размерности соответствующих пространств E_j). Топологическая изоморфность $\Lambda(Q, \hat{\mu}, \mathbb{E})$ и $\Lambda(B)$ вытекает (по доказательству [41, предложение 1.4]) из того, что $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{\log j}{|\nu_j|} = 0$, и "малости" диаметров компонент Ω_j по сравнению с их расстоянием до начала координат, т. е. из условия (iii) леммы 3.3.

Лемма 3.5. *Пусть множество нулей функции $\hat{\mu}$ бесконечно и существует последовательность областей $(\Omega_j)_{j \in \mathbb{N}}$, как в лемме 3.3. Пространство $\Lambda(Q, \hat{\mu}, \mathbb{E})$ ультраборнологично.*

Лемма 3.6. *Пусть множество нулей функции $\hat{\mu}$ бесконечно; оператор $T_\mu : A(Q + K) \rightarrow A(Q)$ сюръективен и существует последовательность областей $(\Omega_j)_{j \in \mathbb{N}}$, как в лемме 3.3. Тогда отображение*

$$\rho : A_{Q+K} / (\hat{\mu} \cdot A_Q) \rightarrow \Lambda(Q, \hat{\mu}, \mathbb{E}), \quad f + \hat{\mu} \cdot A_Q \mapsto (f|_{S_j} + I_j)_{j \in \mathbb{N}}$$

является линейным топологическим изоморфизмом "на".

Доказательство. Как установлено в [14, доказательство предложения 6], для любого $n \in \mathbb{N}$ точна короткая последовательность

$$0 \longrightarrow \mathcal{A}_{Q_n} \xrightarrow{M_{\hat{\mu}}} \mathcal{A}_{Q_n+K} \xrightarrow{\rho_{0,n}} \Lambda(Q_n + K, \hat{\mu}, \mathbb{E}) \longrightarrow 0,$$

для $\rho_{0,n}(f) := (f|_{\Omega_j} + E_j)_{j \in \mathbb{N}}$. Поскольку $\text{Proj}^1 \mathcal{A}_{Q,\text{sp}} = 0$ (замечание 2), то [28, теорема 5.1], отображение $\rho_0 : \mathcal{A}_{Q+K} \rightarrow \Lambda(Q + K, \hat{\mu}, \mathbb{E})$, $\rho_{0,n}(f) := (f|_{\Omega_j} + E_j)_{j \in \mathbb{N}}$,

сюръективно. Равенство $\widehat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q = (\widehat{\mu} \cdot A(\mathbb{C})) \cap \mathcal{A}_{Q+K}$ (лемма 3.1) влечет, что ядро оператора $\rho_0 : \mathcal{A}_{Q+K} \rightarrow \Lambda(Q+K, \widehat{\mu}, \mathbb{E})$ совпадает с $\widehat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q$. Поскольку пространство \mathcal{A}_Q , как счетный проективный предел (LB)-пространств, имеет сеть [42, лемма 24.28], а $\Lambda(Q, \widehat{\mu}, \mathbb{E})$ ультраборнологично (лемма 3.5), то по теореме об открытом отображении [42, теорема 24.30] $\rho : \mathcal{A}_{Q+K} / (\widehat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q) \rightarrow \Lambda(Q, \widehat{\mu}, \mathbb{E})$ – топологический изоморфизм "на". \square

Полученная в лемме 3.6 реализация факторпространства $\mathcal{A}_{Q+K} / (\widehat{\mu} \cdot \mathcal{A}_Q)$ в виде пространства векторзначных последовательностей является важным промежуточным звеном между общими и выражаемыми посредством субгармонических функций условиями наличия ЛНПО к T_μ .

3.3 Критерий наличия ЛНПО к оператору свертки в терминах существования специальных семейств субгармонических функций

Введем следующее условие существования специальных семейств субгармонических функций.

Определение 2. Пусть $A \subset S = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$. Будем говорить, что выполняется условие $SH(A, Q)$, если существует семейство субгармонических в \mathbb{C} функций u_t , $t \in \Gamma(A)$, таких, что $u_t(t) \geq 0$, $t \in \Gamma(A)$, и $\forall n \exists n' \forall m \exists m'$:

$$u_t(z) \leq H_{nm'}(z) - H_{n'm}(t), \quad z \in \mathbb{C}, \quad t \in \Gamma(A).$$

Для ограниченного множества Q условие $SH(A, Q)$ имеет более простой вид (см. § 4, замечание 7).

Вследствие [20, доказательство замечания 4.3] справедлива

Лемма 3.7. Пусть для множества $A \subset S$ выполняется условие $SH(A, Q)$. Тогда $A \subset R_Q$.

Теорема 1. Пусть множество нулей $\widehat{\mu}$ бесконечно и оператор $T_\mu : A(Q+K) \rightarrow A(Q)$ сюръективен. Следующие утверждения равносильны:

- (i) $T_\mu : A(Q+K) \rightarrow A(Q)$ имеет ЛНПО.
- (ii) Выполняется условие $SH(A_{\widehat{\mu}}, Q)$.

Доказательство. (i) \Rightarrow (ii): Используем идею представления оператора T_μ в виде произведения (композиции) операторов свертки, идущую от Ю.Ф. Коробейника [43].

Существует целая функция g типа 0 при порядке 1 такая, что $h := \widehat{\mu}/g \in A(\mathbb{C})$ и $A_{\widehat{\mu}} = A_g$. Тогда $T_\mu = T_{\mathcal{F}^{-1}(g)} T_{\mathcal{F}^{-1}(h)}$. Так как $T_\mu : A(Q+K) \rightarrow A(Q)$ имеет ЛНПО, то оператор $T_{\mathcal{F}^{-1}(g)} : A(Q) \rightarrow A(Q)$ также имеет ЛНПО. Поэтому утверждение этой леммы вытекает из соответствующего утверждения для оператора $T_{\mathcal{F}^{-1}(g)}$ [20, теорема 4.2, замечание 4.3].

(ii) \Rightarrow (i): Пусть выполняется условие $SH(A_{\hat{\mu}}, Q)$. По лемме 3.7 $A_{\hat{\mu}} \subset R_Q$. Вследствие леммы 3.4 функция $\hat{\mu}$ медленно убывает на $\Gamma(A_{\hat{\mu}})$. Тогда существует последовательность областей $(\Omega_j)_{j \in \mathbb{N}}$, как в лемме 3.3. В силу леммы 3.6 отображение

$$\rho : A_{Q+K}/(\hat{\mu} \cdot A_Q) \rightarrow \Lambda(Q, \hat{\mu}, \mathbb{E}), f + \hat{\mu} \cdot A_Q \mapsto (f|_{S_j} + I_j)_{j \in \mathbb{N}}$$

является топологическим изоморфизмом "на". Поступая, по сути, так же, как при доказательстве импликации (ii) \Rightarrow (i) в [20, теорема 4.2] получим, что фактор-отображение $q : A_{Q+K} \rightarrow A_{Q+K}/(\hat{\mu} \cdot A_Q)$ имеет ЛНПО. (Переход от "исключительного" множества кругов $(B_j)_{j \in \mathbb{N}}$ к "исключительному" множеству областей $(\Omega_j)_{j \in \mathbb{N}}$ не приводит к затруднениям.) По лемме 2.5 оператор $T_\mu : A(Q+K) \rightarrow A(Q)$ имеет ЛНПО. \square

Список литературы

- [1] В. П. Хавин. Пространства аналитических функций // Итоги науки. Сер. Математика. Мат. анализ. 1964, 1966. 76–164.
- [2] Ю. Ф. Коробейник. О счетной определимости множеств // Матем. заметки. 1996. Т. 59. № 3. 383–395.
- [3] О. В. Епифанов. К вопросу об эпиморфности оператора свертки в выпуклых областях // Матем. заметки. 1974. Т. 16. № 3. 415–422.
- [4] В. А. Ткаченко. Уравнения типа свертки в пространствах аналитических функционалов // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1977. Т. 41. № 2. 378–392.
- [5] О. В. Епифанов. Уравнение свертки в комплексной плоскости. Исследования по теории операторов // 1988. Уфа. 48–58.
- [6] И. М. Мальцев. Об условиях эпиморфности оператора свертки в комплексной области. I. Необходимые условия // Изв. вузов. Математика. 1997. № 7. 48–59.
- [7] И. М. Мальцев. Об условиях эпиморфности оператора свертки в комплексной области. I. Достаточные условия // Изв. вузов. Математика. 1997. № 11. 43–52.
- [8] Ю. Ф. Коробейник. О сюръективности оператора свертки в пространствах аналитических функций // Сиб. матем. ж. 1997. Т. 38. № 6. 1308–1318.
- [9] С. В. Знаменский, Е. А. Знаменская. Сюръективность оператора свертки с точечным носителем в пространстве функций, голоморфных на произвольном множестве в \mathbb{C} // ДАН. 2001. Т. 176. № 5. 590–592.

- [10] *R. Meise, B. A. Taylor, D. Vogt.* Characterization of the linear partial operators with constant coefficients that admit a continuous linear right inverse // Ann. Inst. Fourier (Grenoble). 1990. V. 40. 619–655.
- [11] *K. Schwerdtfeger.* Faltungsooperatoren auf Räumen holomorpher und beliebig oft differenzierbarer Funktionen // Thesis Düsseldorf. 1982.
- [12] *B. A. Taylor.* Linear extension operators for entire functions // Michigan Math. J. 1982. V. 29. 182–197.
- [13] *S. Momm.* Convex univalent functions and continuous linear right inverses // J. Funct. Anal. 1992. V. 103. 85–103.
- [14] *S. Momm.* Convolution equations on the analytic functions on convex domains in the plane // Bull. Sci. Math. 1994. V. 118. 259–270.
- [15] *M. Langenbruch.* Continuous linear right inverses for convolution operators in spaces of real analytic functions // Studia Math. 1994. V. 110. 65–82.
- [16] *С. Н. Мелихов, З. Момм.* О линейном непрерывном правом обратном для оператора свертки на пространствах ростков аналитических функций на выпуклых компактах в \mathbb{C} // Изв. вузов. Математика. 1997. № 5. 38–48.
- [17] *Ю. Ф. Коробейник.* О правом обратном для оператора свертки в пространствах ростков на связных множествах в \mathbb{C} // Матем. сб. 1996. Т. 187. № 1. 55–86.
- [18] *S. N. Melikhov, S. Momm.* Analytic solutions of convolution equations on convex sets with an obstacle in the boundary // Math. Scand. 2000. V. 86. 293–319.
- [19] *А. В. Абанин, Ле Хай Хой.* Линейный непрерывный правый обратный оператор для оператора свертки в пространствах голоморфных функций полиномиального роста // Изв. вузов. Математика. 2015. № 1. 3–13.
- [20] *У. В. Баркина, С. Н. Мелихов.* Об операторе решения для дифференциальных уравнений бесконечного порядка на выпуклых множествах // Владикавк. матем. журн. 2014. Т. 16. № 4. 27–40.
- [21] *R. Meise, B. A. Taylor.* Each non-zero convolution operator on the entire functions admits a continuous linear right inverse // Math. Z. 1988. V. 197. 139–152.
- [22] *S. Momm.* The boundary behavior of extremal plurisubharmonic functions // Acta Math. 1994. V. 172. 51–75.

- [23] *S. N. Melikhov, S. Momm.* Solution operators for convolution equations on the germs of analytic functions on compact convex sets of \mathbb{C}^N // *Studia Math.* 1995. V. 117. 79–99.
- [24] *R. Meise, S. Momm, B. A. Taylor.* Splitting of slowly decreasing ideals in weighted algebras of entire functions // *Complex Analysis II. Lecture Notes in Math.*, 1276. C. A. Berenstein 1987. Springer. 229–252.
- [25] *M. Langenbruch, S. Momm.* Complemented Submodules in Weighted Spaces of analytic Functions // *Math. Nachr.* 1992. V. 157. 263–276.
- [26] *В. П. Паламодов.* Функтор проективного предела в категории линейных топологических пространств // *Матем. сб.* 1968. Т. 75 (117). № 4. 567–603.
- [27] *В. П. Паламодов.* Гомологические методы в теории локально выпуклых пространств // *УМН.* 1971. Т. 26. № 1. 3–65.
- [28] *D. Vogt.* Topics on projective spectra of (LB)-spaces // *Advances in the theory of Fréchet spaces.* NATO ASI Series C, V. 287. Т. Terzioglu. 1987 Istanbul Kluwer, Dordrecht. 11–27.
- [29] *A. Martineau.* Sur la topologie des espaces de fonctions holomorphes // *Math. Ann.* 1966. V. 163. 62–88.
- [30] *B. A. Taylor.* On weighted polynomial approximation of entire functions Sur la topologie des espaces de fonctions holomorphes // *Рас. J. Math.* 1971. V. 29. 523–539.
- [31] *Х. Шефер.* Топологические векторные пространства. М. Мир. 1971.
- [32] *Ю. Ф. Коробейник.* О решениях некоторых функциональных уравнений в классах функций, аналитических в выпуклых областях // *Матем. сб.* 1968. Т. 75. № 2. 225–234.
- [33] *Р. Эдвардс.* Функциональный анализ. Теория и приложения. М. Мир. 1969.
- [34] *И. Ф. Красичков-Терновский.* Инвариантные подпространства аналитических функций. I. Спектральный синтез на выпуклых областях // *Матем. сборник.* 1972. Т. 88 (130). № 4. 459–489.
- [35] *L. Ehrenpreis.* Solution of some problems of division IV // *Amer. J. Math.* 1960. V. 82. 522–588.
- [36] *L. Ehrenpreis.* Fourier Analysis in Several Complex Variables. Interscience. New York. 1970.
- [37] *S. Momm.* A division problem in the space of entire functions of exponential type // *Ark. Mat.* 1994. V. 32. 213–236.

- [38] *C. A. Berenstein, B. A. Taylor*. New Look an Interpolation Theory for Entire Function of One Variable // *Adv. Math.* 1979. V. 33. 109–143.
- [39] *Б. Я. Левин*. Распределение корней целых функций. М. ГИТТЛ. 1956.
- [40] *Л. Хермандер*. Введение в теорию функций нескольких комплексных переменных. М. Мир. 1968.
- [41] *R. Meise*. Sequence space representations for (DFN)-algebras of entire functions modulo closed ideals // *J. Reine Angew. Math.* 1985. V. 363. 59–95.
- [42] *R. Meise, D. Vogt*. Introduction to Functional Analysis. Oxford University Press. New York. 1997.
- [43] *Ю. Ф. Коробейник, С. Н. Мелихов*. Линейный непрерывный правый обратный для оператора представления и приложения к операторам свертки // *Сиб. матем. ж.* 1993. Т. 34. № 1. 70–84.

С. Н. Мелихов

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону; Южный математический институт Владикавказского научного центра РАН, Владикавказ
E-mail: melih@math.rsu.ru

Л. В. Ханина

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
E-mail: khanina.lv@mail.ru