

# Разрезание на подобные прямоугольники многоугольников, составленных из равных прямоугольников.

Новиков Иван Викторович

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики,  
факультет математики, г. Москва

## Аннотация

Пусть многоугольник составлен из равных прямоугольников. Мы находим все квадратичные иррациональности  $r$ , при которых рассматриваемый многоугольник разрезается на подобные прямоугольники с отношением сторон  $r$ .

Мы рассматриваем следующую задачу: *какие многоугольники можно разрезать на прямоугольники, подобные данному?*

Поставленная задача сложна и вряд ли может быть в разумном смысле решена в общем виде. Однако интересны её частные случаи. Мы покажем, как существование разрезания многоугольника на равные прямоугольники помогает установить, разрезается ли многоугольник на подобные прямоугольники с данным отношением сторон. Под *многоугольником* мы понимаем замкнутую связную ограниченную часть плоскости, ограниченную одной или несколькими непересекающимися и несамопересекающимися замкнутыми ломаными. В частности, многоугольник может не быть односвязным. Обозначим  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}] = \{a + b\sqrt{p} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ .

**Теорема 1.** Пусть  $a, b, p \in \mathbb{Q}, p > 0, \sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$ . Пусть многоугольник, все стороны которого принадлежат  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ , разрезан на равные прямоугольники с отношением сторон  $y \in \mathbb{R}$ . Тогда многоугольник разрезается на подобные прямоугольники с отношением сторон  $a + b\sqrt{p}$  тогда и только тогда, когда прямоугольник с отношением сторон  $y$  разрезается на подобные прямоугольники с отношением сторон  $a + b\sqrt{p}$ .

**Следствие 1.** Пусть выполнены предположения теоремы 1. Тогда:

1) Если  $a - b\sqrt{p} > 0$ , то многоугольник можно разрезать на прямоугольники с отношением сторон  $a + b\sqrt{p}$  тогда и только тогда, когда

$$y \in \{e + f\sqrt{p} : e, f \in \mathbb{Q}, e > 0, \frac{|f|}{e} \leq \frac{|b|}{a}\};$$

2) Если  $a - b\sqrt{p} < 0$ , то многоугольник можно разрезать на прямоугольники с отношением сторон  $a + b\sqrt{p}$  тогда и только тогда, когда

$$y \in \{e + f\sqrt{p} : e, f \in \mathbb{Q}, f > 0, \frac{|e|}{f} \leq \frac{|a|}{b}\}.$$

В качестве ещё одного следствия рассмотрим разрезание "квадрата с дыркой" (рис. 1).




рис. 1

**Следствие 2.** Пусть  $a, b, p \in \mathbb{Q}$ ,  $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$ . Рассмотрим многоугольник между двумя гомотетичными концентрическими квадратами со сторонами  $u > v$ . Тогда:

1) Если  $a - b\sqrt{p} > 0$ , то данный многоугольник можно разрезать на прямоугольники с отношением сторон  $a + b\sqrt{p}$  тогда и только тогда, когда

$$\frac{u+v}{u-v} \in \{e + f\sqrt{p} : e, f \in \mathbb{Q}, e > 0, \frac{|f|}{e} \leq \frac{|b|}{a}\};$$

2) Если  $a - b\sqrt{p} < 0$ , то данный многоугольник можно разрезать на прямоугольники с отношением сторон  $a + b\sqrt{p}$  тогда и только тогда, когда

$$\frac{u+v}{u-v} \in \{e + f\sqrt{p} : e, f \in \mathbb{Q}, f > 0, \frac{|e|}{f} \leq \frac{|a|}{b}\}.$$

Рассмотрим кратко историю вопроса о разрезании прямоугольника на подобные прямоугольники. Более подробно об этом можно прочитать, например, в [1, 'Обзор известных результатов']. Одним из первых нетривиальных результатов был доказанный М. Деном в 1903 г. факт, что квадратами можно замостить прямоугольники только с рациональным отношением сторон [2]. В 2016 г. в [1] Ф. Шаров обобщил теорему Дена, найдя все прямоугольники, которые можно разрезать на прямоугольники с данными отношениями сторон из  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ . Благодаря теореме Шарова мы получим теорему 1, а также следствия 1 и 2. В статье [3] Фрайлинг, Лацкович и Ринн нашли алгебраический критерий возможности разрезания прямоугольника на подобные данному прямоугольники. Однако данный критерий не даёт алгоритма проверки возможности данного разрезания.

Зафиксируем число  $p \in \mathbb{Q}$  такое, что  $p > 0$ ,  $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$ . Будем называть многоугольник *хорошим*, если его стороны имеют вид  $\alpha + \beta\sqrt{p}$  для некоторых  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ . Начиная с этого момента будем предполагать, что стороны всех рассматриваемых многоугольников параллельны координатным осям, т.е. *вертикальны* и *горизонтальны*.

Мы используем следующие понятия, аналогичные введённым в [4], ср. с [3].

**Определение 1.** *Базисом* будем называть упорядоченный набор вещественных чисел, линейно независимый над полем  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ . Будем говорить, что число *записывается* в базисе  $(e_1, e_2, \dots, e_k)$ , если оно равно некоторой линейной комбинации чисел  $e_1, e_2, \dots, e_k$  с коэффициентами из  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ .

**Определение 2.** Пусть  $E = (e_1, e_2, \dots, e_k)$  — некоторый базис и  $z \in \mathbb{R}$ . Будем называть *z-площадью* в базисе  $E$  (или *площадью Гамеля*) прямоугольника

$$(a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ke_k) \times (b_1e_1 + b_2e_2 + \dots + b_ke_k),$$

число  $(a_1 + a_2z)(b_1 + b_2z)$ , где  $a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_k \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ .

**Лемма 1.** Если прямоугольник разрезан на прямоугольники со сторонами, которые записываются в базисе  $E$ , то *z-площадь* в базисе  $E$  разрезаемого прямоугольника равна сумме *z-площадей* в базисе  $E$  прямоугольников, на которые он разрезан.

Доказательство данного свойства  $z$ -площадей почти дословно повторяет доказательство леммы 8 из [1].

**Лемма 2.** (см. рис. 2). Для любого хорошего многоугольника  $M$  с углами, кратными  $90^\circ$ , найдутся такие хорошие прямоугольники  $R, R_1, \dots, R_n$ , что  $R$  разрезается на  $M, R_1, \dots, R_n$ .




рис. 2

*Доказательство.* Искомый прямоугольник  $R$  получается как пересечение продолжений самой высокой и низкой горизонтальных сторон многоугольника  $M$  с его самой левой и правой вертикальными сторонами. Для получения остальных искомым прямоугольников  $R_1, \dots, R_n$  продолжим каждую сторону многоугольника до пересечения с границей многоугольника  $M$  или прямоугольника  $R$ . Таким образом у нас получится хороший прямоугольник  $R$  вместе с разрезанием на хорошие прямоугольники  $R_1, \dots, R_n$  и исходный многоугольник  $M$ .  $\square$

**Лемма 3.** Если хороший многоугольник разрезан на равные прямоугольники, то эти равные прямоугольники являются хорошими.

*Доказательство.* Пусть имеется разрезание хорошего многоугольника на  $N$  равных прямоугольников  $c \times d$ . Пусть, от противного, одно из чисел  $c$  или  $d$  не принадлежит  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ . Площадь хорошего многоугольника  $Ncd \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ , следовательно, если  $d \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ , то и  $c \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ . Значит,  $c \notin \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$  и  $d \notin \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ . Рассмотрим базис

$$E = \begin{cases} (c, d, 1), & \text{если тройка } (c, d, 1) \text{ линейно независима над } \mathbb{Q}[\sqrt{p}]; \\ (1, c), & \text{если тройка } (c, d, 1) \text{ линейно зависима над } \mathbb{Q}[\sqrt{p}]. \end{cases} \quad (1)$$

В случае (2) пусть  $d = a_1 + a_2c$  для некоторых  $a_1, a_2 \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ . Тогда  $a_2 \neq 0$ , так как в противном случае  $d$  принадлежало бы множеству  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ .

По лемме 2 дополним многоугольник до хорошего прямоугольника  $R$ . Получим разрезание хорошего прямоугольника  $R$  на хорошие прямоугольники и прямоугольники  $c \times d$ . Тогда  $z$ -площадь в базисе  $E$  любого хорошего прямоугольника не зависит от  $z$ . Значит,  $z$ -площадь прямоугольника  $R$  не зависит от  $z$ . Сумма  $z$ -площадей прямоугольников, на которые он разрезан, равна  $Nz$  в случае (1) и  $C + Na_1z + Na_2z^2$ , где  $C$  — независящее от  $z$  число, в случае (2). По лемме 1 получаем, что  $z$ -площадь прямоугольника  $R$  зависит от  $z$ , так как  $a_2 \neq 0$  и  $N \neq 0$ . Противоречие.  $\square$

**Лемма 4.** Если хороший многоугольник разрезан на прямоугольники, отношения сторон которых принадлежат множеству  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ , то эти прямоугольники являются хорошими.

*Доказательство.* Пусть, от противного, в разрезании есть прямоугольник  $c \times kc$ , где  $k \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}], k > 0, c \notin \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ . Дополним набор  $(1, c)$  до базиса следующим образом. Рассмотрим множество всех сторон прямоугольников разрезания, и станем по очереди добавлять к нашему набору длины тех сторон, которые оставляют набор линейно независимым над  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ . В итоге получим некоторый базис  $E = (1, c, e_3, \dots, e_n)$ . Тогда  $z$ -площадь произвольного прямоугольника разрезания

$$(a_1 + a_2c + a_3e_3 + \dots + a_n e_n) \times b(a_1 + a_2c + a_3e_3 + \dots + a_n e_n),$$

где  $b \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}], b > 0$ , в базисе  $E$  равна  $ba_1^2 + 2ba_1a_2z + ba_2^2z^2$ . Коэффициент при  $z^2$  неотрицательный для любого прямоугольника разрезания, и положительный для прямоугольника  $c \times kc$ . Значит, сумма  $z$ -площадей всех прямоугольников разрезания имеет нетривиальную зависимость от  $z$ . По лемме 2 дополним многоугольник до хорошего прямоугольника. Тогда  $z$ -площадь полученного прямоугольника, а также добавленных прямоугольников, не зависит от  $z$ . Значит, по лемме 1 получаем противоречие.  $\square$

Нам понадобится ещё одно понятие из работы [1].

**Определение 3.** [1, определение 5]. Пусть  $A, B, C \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, p \in \mathbb{Q}$  и  $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$ . Тогда  $ABC$ -площадь прямоугольника  $(\alpha + \beta\sqrt{p}) \times (\gamma + \delta\sqrt{p})$  — это число

$$S := \alpha\gamma A + \alpha\delta B + \beta\gamma C + \beta\delta C.$$

**Пример 1.** Пусть  $p = 2$ ,  $A = -1$ ,  $B = 1$ ,  $C \in \mathbb{R}$ . Тогда  $ABC$ -площадь прямоугольника  $(\sqrt{2} + 1) \times 1$  равна 0, а  $ABC$ -площадь подобного ему прямоугольника  $(\sqrt{2} - 1) \times 1$  равна 2.

**Лемма 5.** [1, лемма 8]. Если прямоугольник разрезан на хорошие прямоугольники, то  $ABC$ -площадь разрезаемого прямоугольника равна сумме  $ABC$ -площадей прямоугольников, на которые он разрезан.

**Определение 4.** Пусть существует хотя бы одно разрезание данного хорошего многоугольника на хорошие прямоугольники. Тогда  $ABC$ -площадь многоугольника положим равной сумме  $ABC$ -площадей всех прямоугольников любого такого разрезания.

Докажем корректность определения  $ABC$ -площади многоугольника.

**Лемма 6.** Если многоугольник двумя способами разрезан на хорошие прямоугольники, то сумма  $ABC$ -площадей прямоугольников в обоих способах одна и та же.

*Доказательство.* По лемме 2 дополним многоугольник до хорошего прямоугольника. По лемме 5 для образовавшегося разрезания хорошего прямоугольника  $ABC$ -площадь равна сумме  $ABC$ -площадей добавленных хороших прямоугольников и  $ABC$ -площадей прямоугольников, на которые разрезан многоугольник. Значит, сумма  $ABC$ -площадей прямоугольников разрезания равна разности  $ABC$ -площадей прямоугольника и добавленных хороших прямоугольников, а для них  $ABC$ -площадь определена однозначно и не зависит от разрезания. Значит, и  $ABC$ -площадь многоугольника не зависит от разрезания.  $\square$

Сформулируем лемму, из которой мы выведем теорему 1.

**Лемма 7.** Пусть  $a, b, e, f, p \in \mathbb{Q}$ ,  $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$ ,  $e + f\sqrt{p} > 0$ ,  $a + b\sqrt{p} > 0$ . Предположим, что выполнено одно из двух условий:

- а)  $a - b\sqrt{p} > 0$ ,  $\frac{|f|}{e} > \frac{|b|}{a}$ ;
- б)  $a - b\sqrt{p} < 0$ ,  $\frac{|e|}{f} > \frac{|a|}{b}$ .

Положим в определении  $ABC$ -площади  $A = f$ ,  $B = -e$ ,  $C = \frac{2fa^2}{b^2} - pf$ . Тогда:

- 1)  $ABC$ -площадь прямоугольника со сторонами  $e + f\sqrt{p}$  и 1 равна нулю.
- 2)  $ABC$ -площадь всех прямоугольников с отношением сторон  $a + b\sqrt{p}$  и сторонами из  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$  отличны от нуля и имеют один и тот же знак.

*Доказательство теоремы 1, считая лемму 7 доказанной.* Докажем часть "только тогда". Рассмотрим два разбиения многоугольника: первое — на равные прямоугольники, второе — на подобные хорошие прямоугольники. Тогда согласно лемме 3 и лемме 4 стороны всех этих прямоугольников принадлежат множеству  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ . Без ограничения общности, стороны равных прямоугольников первого разрезания будем считать равными  $e + f\sqrt{p}$  и 1 (чего можно добиться с помощью подходящей гомотетии). Если числа  $a, b, p$  таковы, что оба условия а) и б) леммы 7 не выполнены, то по части "тогда" в теореме 1 из [1] мы получаем требуемое разрезание прямоугольника с отношением сторон  $y$  (прямое построение разрезания см. в [5, §1]). В противном случае по пункту 1) леммы 7  $ABC$ -площадь многоугольника равна нулю (как сумма  $ABC$ -площадей равных прямоугольников). Но по пункту 2) леммы 7 сумма  $ABC$ -площадей прямоугольников с отношениями сторон  $a + b\sqrt{p}$  всегда не ноль. Следовательно,  $ABC$ -площадь многоугольника не равна нулю. Противоречие.

Осталось доказать лемму 7. Она фактически доказана в [1, стр 209-211, см. 'Доказательство основной теоремы в случае  $n = 1$ .'], но в явном виде там не сформулирована. Приведём здесь её доказательство, по сути заимствованное из [1].

леммы 7. 1)  $ABC$ -площадь прямоугольника  $(e + f\sqrt{p}) \times 1$  равна

$$S = e \cdot 1 \cdot f + e \cdot 0 \cdot (-e) + f \cdot 1 \cdot (-e) + f \cdot 0 \cdot \left(\frac{2fa^2}{b^2} - pf\right) = 0.$$

2) Рассмотрим прямоугольник  $(\alpha + \beta\sqrt{p}) \times (\gamma + \delta\sqrt{p})$ , где

$$\frac{\gamma + \delta\sqrt{p}}{\alpha + \beta\sqrt{p}} = a + b\sqrt{p}.$$

Тогда  $\gamma + \delta\sqrt{p} = \alpha a + p\beta b + \sqrt{p}(\beta a + \alpha b)$ , и значит,  $\gamma = \alpha a + p\beta b$ ,  $\delta = \beta a + \alpha b$ . Поэтому  $ABC$ -площадь прямоугольника записывается в виде

$$\begin{aligned} S &= \alpha\gamma f - \beta\gamma e - \alpha\delta e + \beta\delta \left(\frac{2fa^2}{b^2} - pf\right) = \\ &= \alpha f(\alpha a + p\beta b) - \beta e(\alpha a + p\beta b) - \alpha e(\beta a + \alpha b) + \beta \left(\frac{2fa^2}{b^2} - pf\right) (\beta a + \alpha b) = \\ &= \alpha^2(fa - eb) + 2\alpha\beta \left(\frac{fa^2}{b} - ea\right) + \beta^2 \left(\frac{2fa^3}{b^2} - pfa - peb\right). \end{aligned}$$

Заметим, что при выполнении условия а) мы имеем  $a - b\sqrt{p} > 0$  и  $a + b\sqrt{p} > 0$ , значит  $a > 0$ . Так как в этом случае  $\frac{|f|}{e} > \frac{|b|}{a}$ , то  $e > 0$ . Имеем

$$\frac{|f|}{e} \neq \frac{|b|}{a} \Leftrightarrow \left|\frac{f}{e}\right| \neq \left|\frac{b}{a}\right| \Leftrightarrow |fa| \neq |be| \Rightarrow fa \neq be.$$

При выполнении условия б) аналогично получаем, что  $fa - eb \neq 0$ . Значит,  $fa - eb \neq 0$  и в случае а), и в случае б). Следовательно, выражение  $S/\beta^2$  — квадратный трёхчлен относительно  $\alpha/\beta$ . Покажем, что его дискриминант  $D$  отрицателен. Тем самым будет доказано, что при фиксированных числах  $a, b, e, f$  величина  $S$  либо всегда положительна, либо всегда отрицательна.

Действительно,

$$\begin{aligned} \frac{D}{4} &= \frac{f^2 a^4}{b^2} - \frac{2fea^3}{b} + e^2 a^2 - \frac{2f^2 a^4}{b^2} + pf^2 a^2 + pfaeb + \frac{2fea^3}{b} - pfaeb - pe^2 b^2 = \\ &= \frac{-f^2 a^4}{b^2} + e^2 a^2 + pf^2 a^2 - pe^2 b^2 = (a^2 - pb^2) \left(e^2 - \frac{f^2 a^2}{b^2}\right) < 0, \end{aligned}$$

так как при условии а) из формулировки леммы первая скобка положительна, а вторая отрицательна, а при условии б) — наоборот.

Таким образом, утверждение 2), а с ним и теорема 1, доказано.  $\square$

Докажем сформулированные выше следствия.

*Доказательство следствия 1.* Сразу следует из теоремы 1 и [1, Теорема 1].  $\square$

*Доказательство следствия 2.* Разрежем квадрат с дыркой на 4 равных прямоугольника  $\frac{u+v}{2} \times \frac{u-v}{2}$ , как на рис. 3. Положим  $u = 1$  без ограничения общности.

Если  $\frac{u+v}{u-v} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ , квадрат с дыркой является хорошим многоугольником, и по следствию 1 получаем следствие 2.




рис. 3

Если  $\frac{u+v}{u-v} \notin \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ , то следствие 1 неприменимо, так как многоугольник не хороший. Докажем, что в этом случае разрезания квадрата с дыркой на прямоугольники с отношением сторон  $a + b\sqrt{p}$  не существует. Пусть существует разрезание на прямоугольники с отношением сторон  $a + b\sqrt{p}$ . Добавляя к разрезанию квадрат  $v \times v$ , получим разрезание квадрата  $u \times u$ . По лемме 4 стороны всех прямоугольников разрезания (включая квадрат  $v \times v$ ) лежат в множестве  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ . Тогда  $v \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$  и  $\frac{u+v}{u-v} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ . Противоречие.  $\square$

Теорема 1 не даёт универсального метода решения задачи, сформулированной в начале статьи. Например, есть хороший многоугольник, который можно разрезать на подобные хорошие прямоугольники, но нельзя на равные. На рис. 4 показан такой многоугольник и его разрезание на подобные прямоугольники. Доказательство отсутствия разрезания на равные прямоугольники опустим.

В заключение сформулируем в виде задачи связанные с теоремой 1 открытые вопросы.

**Задача.** Остается ли теорема 1 справедливой, если в ней заменить " $a + b\sqrt{p}$ ":

1) На набор  $a_1 + b_1\sqrt{p}, \dots, a_n + b_n\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$  (которому должны принадлежать отношения сторон прямоугольников)?

2) На корень  $r$  многочлена степени 3 с целыми коэффициентами (а  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$  заменить на  $\mathbb{Q}[r]$ )?

3) На произвольное  $r \in \mathbb{R}$  (а  $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$  заменить на  $\mathbb{R}$ )?

Автор выражает благодарность М.Б. Скопенкову за постоянное внимание к данной работе.

## Литература

- [1] Ф.А. Шаров, Разрезания прямоугольника на прямоугольники с заданными отношениями сторон, Математическое просвещение, Третья серия, вып. 20, 2016, С.200-214.
- [2] Dehn M. Über die Zerlegung von Rechtecken in Rechtecke, Math. Ann. 1903.V. 57, № 3. P. 314–332
- [3] C.F. Freiling, M. Laczkovich, D. Rinne, Rectangling a rectangle, Discr. Comp. Geom, V. 17, № 2, 1997, P. 217–225.
- [4] Ф.А. Шаров,  $x$ -площадь, представлена к публикации, <https://arxiv.org/abs/1711.08503>, 2017.
- [5] П.П. Рябов, Дополнение к результатам Ф.А. Шарова, Математическое просвещение, третья серия, вып. 22, 2018, С. 158-163.




рис. 4