

# Modified series of integrable discrete equations on a square lattice with a non-standard symmetry structure

R.N. Garifullin<sup>ab</sup> and R.I. Yamilov<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Institute of Mathematics, Ufa Federal Research Centre RAS,  
112 Chernyshevsky Street, Ufa 450008, Russia

<sup>b</sup> Bashkir State University, 32 Zaki Validi Street, Ufa 450074, Russia

*E-mails: rustem@matem.anrb.ru, RvIYamilov@matem.anrb.ru*

**Abstract.** In a recent paper [TMP, **200**: 1 (2019), 966–984] by the authors, a series of integrable discrete autonomous equations on a square lattice with a non-standard structure of generalized symmetries is constructed. We build modified series by using discrete non-point transformations. We use both non-invertible linearizable transformations and non-point transformations invertible on solutions of the discrete equation.

As a result, we get several series of new examples of discrete equations along with their generalized symmetries and master symmetries. The generalized symmetries constructed give new integrable examples of five- and seven-point differential-difference equations together with their master symmetries. In the case of discrete equations, the method of constructing non-invertible linearizable transformations by using conservation laws is considered, apparently, for the first time.

**Keywords:** discrete equation, generalized symmetry, master symmetry, differential-difference equation, non-invertible transformation.

# Модифицированные серии интегрируемых дискретных уравнений на квадратной решетке с нестандартной симметричной структурой

Р.Н. Гарифуллин<sup>ab</sup>, Р.И. Ямилов<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Институт математики с ВЦ УФИЦ РАН,  
450008, г. Уфа, ул. Чернышевского, 112, Россия

<sup>b</sup> Башкирский государственный университет,  
450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32, Россия

*E-mails:* rustem@matem.anrb.ru, RvIYamilov@matem.anrb.ru

## Аннотация

В недавней работе авторов [ТМФ, 200:1 (2019), 50–71] построена серия интегрируемых дискретных автономных уравнений на квадратной решетке с нестандартной структурой высших симметрий. Мы строим модифицированные серии, используя дискретные неточечные преобразования. Мы используем как необратимые линеаризуемые преобразования, так и неточечные преобразования, обратимые на решениях дискретного уравнения.

В результате мы получаем серии новых примеров дискретных уравнений вместе с их высшими симметриями и мастер-симметриями. Построенные высшие симметрии дают новые интегрируемые примеры пяти- и семиточечных дифференциально-разностных уравнений вместе с их мастер-симметриями. В случае дискретных уравнений, метод построения необратимых линеаризуемых преобразований при помощи законов сохранения рассматривается, по-видимому, впервые.

**Ключевые слова:** дискретное уравнение, высшая симметрия, мастер-симметрия, дифференциально-разностное уравнение, необратимое преобразование.

## 1 Введение

В работе [6] представлена бесконечная серия дискретных уравнений вида

$$(u_{n,m+1} + 1)(u_{n,m} - 1) = \beta_N(u_{n+1,m+1} - 1)(u_{n+1,m} + 1), \quad (1)$$

где  $n, m \in \mathbb{Z}$  – дискретные независимые переменные,  $u_{n,m}$  – неизвестная функция двух дискретных переменных. Уравнения серии нумеруются натуральным числом  $N$ , а коэффициенты  $\beta_N$  являются корнями из единицы:  $\beta_N^N = 1$ ,  $N \geq 1$ .

Чтобы разделять уравнения с разными  $N$ , мы рассматриваем примитивные корни из единицы. Ясно, что  $\beta_1 = 1$ . При  $N > 1$  примитивные корни определяются следующим образом:

$$\beta_N^N = 1, \quad \beta_N^j \neq 1, \quad 1 \leq j < N. \quad (2)$$

В частности,

$$\beta_1 = 1, \quad \beta_2 = -1, \quad \beta_3 = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \beta_4 = \pm i, \quad (3)$$

т.е. в двух последних случаях имеется два примитивных корня, соответствующих знакам  $+$  и  $-$ . Для любого  $N > 2$  существует как минимум два примитивных корня:  $\beta_N = \exp(\pm 2i\pi/N)$ . Таким образом, мы рассматриваем серию уравнений вида (1), в которых коэффициенты  $\beta_N$  являются примитивными корнями  $N$ -ой степени из единицы.

Уравнения серии (1) являются интегрируемыми в том смысле, что они имеют бесконечные иерархии высших симметрий и законов сохранения так же, как и  $L - A$  пары. Среди этих симметрий и законов сохранения можно выделить бесконечные иерархии автономных.

Аналогичные серии неавтономных дискретных уравнений рассматривались в [4]. Серии дискретных уравнений, интегрируемых по Дарбу, и уравнений типа Бюргерса изучались в [5, 7].

При помощи неточечных преобразований мы будем получать в этой статье новые серии дискретных уравнений вместе с высшими симметриями. Для простоты мы ограничимся несколькими простейшими высшими симметриями в каждом из направлений.

Как показано в работе [6], высшие симметрии первого и второго порядка в  $m$ -направлении для любого уравнения серии (1) имеют вид:

$$\partial_{t_1} u_{n,m} = \beta_N^n (u_{n,m}^2 - 1)(u_{n,m+1} - u_{n,m-1}), \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \partial_{t_2} u_{n,m} = & \beta_N^{2n} (u_{n,m}^2 - 1) [(u_{n,m+1}^2 - 1)(u_{n,m+2} + u_{n,m}) \\ & - (u_{n,m-1}^2 - 1)(u_{n,m} + u_{n,m-2}) - 4(u_{n,m+1} - u_{n,m-1})]. \end{aligned} \quad (5)$$

В каждом порядке имеется аналогичная высшая симметрия в  $m$ -направлении. Структура этих симметрий такова, что уравнение (1) с номером  $N$  обладает автономными высшими симметриями порядков  $kN$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .

В  $n$ -направлении структура высших симметрий нестандартна. Вид и порядок простейшей симметрии в этом направлении зависит от числа  $N$ . Простейшая высшая симметрия уравнения серии (1) с  $N = 1$  имеет первый порядок:

$$\partial_{\theta_1} u_{n,m} = (u_{n,m}^2 - 1) \left( \frac{a_{n+1}}{u_{n+1,m} + u_{n,m}} - \frac{a_n}{u_{n,m} + u_{n-1,m}} \right), \quad (6)$$

где  $a_n = b + cn$ , а  $b, c$  – произвольные постоянные.

При  $N = 2$  простейшая высшая симметрия имеет второй порядок:

$$\partial_{\theta_2} u_{n,m} = (u_{n,m}^2 - 1)(T_n - 1) \left( \frac{a_{n+1}(u_{n+1,m} + u_{n,m})}{U_{n,m}} + \frac{a_n(u_{n-1,m} + u_{n-2,m})}{U_{n-1,m}} \right), \quad (7)$$

$$U_{n,m} = (u_{n+1,m} + u_{n,m})(u_{n,m} + u_{n-1,m}) - 2(u_{n,m}^2 - 1).$$

Здесь функция  $a_n$  имеет вид  $a_n = b_n + cn$ , где  $c$  – константа и  $b_n \equiv b_{n+2}$  – произвольная двухпериодическая функция от  $n$ . Ее можно представить в виде  $b_n = b^{(1)} + b^{(2)}(-1)^n$  с двумя произвольными постоянными  $b^{(1)}$ ,  $b^{(2)}$ . Оператор сдвига вдоль направления  $n$  обозначен здесь и далее через  $T_n$ :  $T_n h_{n,m} = h_{n+1,m}$ .

Простейшая высшая симметрия уравнения (1) с  $N = 3$  имеет третий порядок:

$$\begin{aligned} \partial_{\theta_3} u_{n,m} = & (u_{n,m}^2 - 1)(T_n - 1) \left( \frac{a_{n+2}V_{n,m}}{U_{n,m}} + \frac{a_n W_{n,m}}{U_{n-2,m}} + (T_n + 1) \frac{a_{n+1}Z_{n,m}}{U_{n-1,m}} \right), \\ V_{n,m} = & \beta_3^2 (u_{n+1,m}^2 - 1) + u_{n+1,m}(u_{n+2,m} - u_{n-1,m}) - u_{n+2,m}u_{n-1,m} + 1, \\ W_{n,m} = & \beta_3 (u_{n-2,m}^2 - 1) + u_{n-2,m}(u_{n-1,m} + u_{n-3,m}) + u_{n-1,m}u_{n-3,m} + 1, \\ Z_{n,m} = & (u_{n+1,m} + u_{n,m})(u_{n-1,m} + u_{n-2,m}), \\ U_{n,m} = & \beta_3^2 (u_{n+1,m}^2 - 1)(u_{n,m} + u_{n-1,m}) + \beta_3 (u_{n,m}^2 - 1)(u_{n+2,m} + u_{n+1,m}) \\ & + (u_{n+1,m}u_{n,m} + 1)(u_{n+2,m} + u_{n-1,m}) + (u_{n+1,m} + u_{n,m})(u_{n+2,m}u_{n-1,m} + 1). \end{aligned} \quad (8)$$

Здесь  $\beta_3$  – любой из двух примитивных корней из единицы, показанных в (3). Функция  $a_n$  задается формулой  $a_n = b_n + cn$ , где  $c$  – константа, а  $b_n \equiv b_{n+3}$  – произвольная трехпериодическая функция. Она может быть представлена в виде  $b_n = b^{(1)} + b^{(2)}\beta_3^n + b^{(3)}\beta_3^{2n}$ , где  $b^{(1)}, b^{(2)}, b^{(3)}$  – произвольные постоянные.

Каждая из приведенных выше формул (6)-(8) содержит автономную симметрию, соответствующую  $a_n \equiv 1$ . Случай  $a_n = n$  играет роль мастер-симметрии для соответствующего дискретного уравнения (1). Формулы (6)-(8) при любом фиксированном  $m$  определяют интегрируемые дифференциально-разностные уравнения при  $c = 0$  и их мастер-симметрии при  $a_n = n$ .

При помощи неточечных преобразований мы получаем в этой работе из формул (6)-(8) новые примеры автономных пяти- и семиточечных дифференциально-разностных уравнений вместе с их мастер-симметриями.

Неточечные преобразования, которые мы используем для построения модифицированных серий и высших симметрий делятся на два типа. К первому типу относятся дискретные необратимые линеаризуемые преобразования, введенные в работе [8], которые строятся при помощи специальных законов сохранения. В случае дискретных уравнений, используемый здесь метод построения линеаризуемых преобразований при помощи законов сохранения является, по-видимому, новым.

Ко второму типу относятся неточечные преобразования, обратимые на решениях дискретного уравнения [14, 16]. В случае высших симметрий и соответствующих им дифференциально-разностных уравнений такие преобразования приводят к необратимым преобразованиям типа Миуры или сложно-линеаризуемым преобразованиям.

В секции 2 мы рассматриваем дискретные необратимые линеаризуемые преобразования. Сначала мы излагаем процедуру построения таких преобразований при помощи специальных законов сохранения и схему построения модифицированных дискретных уравнений и соответствующих высших симметрий. Затем, в результате применения этого метода мы получаем четыре модифицированные серии дискретных уравнений вместе с простейшими высшими симметриями. В секции 3 мы используем неточечные преобразования, обратимые на решениях дискретного уравнения. Это позволяет нам построить еще две модификации вместе с высшими симметриями и мастер-симметриями.

## 2 Линеаризуемые преобразования

Следуя работе [8], где обсуждаются дифференциально-разностные уравнения, мы вводим здесь понятие линеаризуемого преобразования. Мы будем рассматривать в этой секции преобразования первого порядка, которые линеаризуются при помощи точечных преобразований. Такое преобразование в  $n$ -направлении может быть записано в виде:

$$U_{n,m} = F_{n,m}[(T_n - 1)G_{n,m}(V_{n,m})], \quad (9)$$

где  $F'_{n,m}(x) \neq 0$  и  $G'_{n,m}(x) \neq 0$  для любых  $n, m$ . Используя очевидные неавтономные точечные замены  $U_{n,m}$  и  $V_{n,m}$ , мы можем привести такое преобразование к виду:

$$\hat{U}_{n,m} = (T_n - 1)\hat{V}_{n,m},$$

который представляет собой простейшее линейное преобразование.

Композиции таких преобразований также называются линеаризуемыми [8]. В случае, когда композиция состоит из преобразований разных направлений, мы получаем сложно-линеаризуемое преобразование, см. пример (65) в секции 3.1. Заметим, что преобразования типа Миуры к линеаризуемым не относятся [8]. Пример такого преобразования представлен в секции 3.2, см. (75).

В  $m$ -направлении, линеаризуемые преобразования первого порядка, рассматриваемые в этой секции, имеют аналогичный вид:

$$U_{n,m} = F_{n,m}[(T_m - 1)G_{n,m}(V_{n,m})],$$

где через  $T_m$  обозначен оператор сдвига вдоль направления  $m$ :  $T_m h_{n,m} = h_{n,m+1}$ .

## 2.1 Построение простейших линеаризуемых преобразований

Предположим, что уравнение (1) имеет закон сохранения вида:

$$(T_m - 1)p_{n,m}(u_{n,m}) = (T_n - 1)q_{n,m}(u_{n,m+1}, u_{n,m}), \quad (10)$$

где  $p'_{n,m}(x) \neq 0$  для любых  $n, m$ , т.е. функция  $p_{n,m}(x)$  обратима при всех  $n, m$ . Можно ввести новую неизвестную функцию  $v_{n,m}$ :

$$p_{n,m}(u_{n,m}) = (T_n - 1)r_{n,m}(v_{n,m}), \quad (11)$$

где  $r'_{n,m}(x) \neq 0$  для любых  $n, m$ . Это соотношение дает явную формулу для  $u_{n,m}$ :

$$u_{n,m} = p_{n,m}^{-1}[(T_n - 1)r_{n,m}(v_{n,m})]. \quad (12)$$

Подставляя в (10) функцию (12) и интегрируя по дискретной переменной  $n$ , т.е. применяя обратный оператор  $(T_n - 1)^{-1}$ , мы получаем дискретное уравнение для неизвестной функции  $v_{n,m}$ :

$$(T_m - 1)r_{n,m}(v_{n,m}) = q_{n,m}(p_{n,m+1}^{-1}[(T_n - 1)r_{n,m+1}(v_{n,m+1})]), p_{n,m}^{-1}[(T_n - 1)r_{n,m}(v_{n,m})]). \quad (13)$$

Дискретное уравнение (13) преобразуется линеаризуемой заменой (12) в уравнение (1).

Выбор функции  $r_{n,m}$  в замене (11) соответствует неавтономному точечному преобразованию неизвестной функции  $v_{n,m}$ . Из-за интегрирования по  $n$ , в соотношении (13) должна была возникнуть функция интегрирования  $\omega_m$ . Она убирается за счет выбора  $r_{n,m}$ . Кроме того мы выбираем функцию  $r_{n,m}$  так, чтобы упростить замену (12) и уравнение (13).

Высшие симметрии дискретного уравнения (13) в  $n$ -направлении находятся из (11), см. [8]. Как показывает, например, метод диагонализации  $L - A$ -пар [12], функция  $p_{n,m}(u_{n,m})$  оказывается плотностью закона сохранения не только дискретного уравнения (1), но и ее высших симметрий (6–8) с  $c = 0$ . В силу таких высших симметрий мы имеем

$$D_{\theta_j} p_{n,m}(u_{n,m}) = (T_n - 1)h_{n,m}^{(j)}(u_{n+j-1,m}, u_{n+j-2,m}, \dots, u_{n-j,m}), \quad j = 1, 2, 3. \quad (14)$$

Дифференцируя (11) по  $\theta_j$  и интегрируя по  $n$ , мы находим

$$r'_{n,m}(v_{n,m})D_{\theta_j} v_{n,m} = h_{n,m}^{(j)} + \tilde{\omega}_m^{(j)}, \quad (15)$$

где все функции вида  $u_{n+k,m}$  заменяются функциями  $v_{n+k,m}$  в силу (12). Используя условие совместности дискретного уравнения (13) и уравнения (15), мы уточняем функцию интегрирования  $\tilde{\omega}_m^{(j)}$ .

Для мастер-симметрий (6–8) с  $a_n = n$  мы переписываем функцию  $D_{\theta_j} p_{n,m}(u_{n,m})$  в терминах  $v_{n+k,m}$  при помощи (12) и на примерах получаем представление вида:

$$D_{\theta_j} p_{n,m}(u_{n,m}) = (T_n - 1)\tilde{h}_{n,m}^{(j)}(v_{n+j,m}, v_{n+j-1,m}, \dots, v_{n-j,m}). \quad (16)$$

Это представление позволяет найти новую мастер-симметрию так же, как в случае (14).

Для получения высших симметрий дискретного уравнения (13) в  $m$ -направлении, мы запишем (13) в виде:

$$(T_m - 1)r_{n,m}(v_{n,m}) = q_{n,m}(u_{n,m+1}, u_{n,m}). \quad (17)$$

Дифференцируя по  $t_j$ ,  $j = 1, 2$ , в силу (4,5), мы получаем:

$$(T_m - 1)D_{t_j}r_{n,m}(v_{n,m}) = s_{n,m}^{(j)}(u_{n,m+j+1}, u_{n,m+j}, \dots, u_{n,m-j}). \quad (18)$$

Избавляясь в правой части этого соотношения от функций  $u_{n,m+k}$  при помощи (12), получаем зависимость от  $v_{n,m+k}, v_{n+1,m+k}$ . Используя дискретное уравнение (13), приводим это соотношение к виду:

$$(T_m - 1)[r'_{n,m}(v_{n,m})D_{t_j}v_{n,m}] = \tilde{s}_{n,m}^{(j)}(v_{n+1,m}, v_{n,m+j+1}, v_{n,m+j}, \dots, v_{n,m-j}). \quad (19)$$

В рассматриваемых ниже примерах получается, что зависимость функции  $\tilde{s}_{n,m}^{(j)}$  от  $v_{n+1,m}$  исчезает и эта функция принадлежит образу оператора  $T_m - 1$ . Интегрируя по  $m$  соотношение (19), получаем дифференциально-разностное уравнение для  $v_{n,m}$  с функцией интегрирования  $\hat{\omega}_n^{(j)}$ . Для этого уравнения проверяем не только совместность с дискретным уравнением (13), но и замену (12). При этом уточняется функция  $\hat{\omega}_n^{(j)}$ .

В случае закона сохранения, симметричного (10), который имеет вид:

$$(T_n - 1)p_{n,m}(u_{n,m}) = (T_m - 1)q_{n,m}(u_{n+1,m}, u_{n,m}), \quad (20)$$

где  $p'_{n,m}(x) \neq 0$  для любых  $n, m$ , используется приведенная выше схема с точностью до перестановки  $n \leftrightarrow m$ .

## 2.2 Первая модификация

Все дискретные уравнения серии (1) имеют закон сохранения вида (10):

$$(T_m - 1)(\beta_N^n u_{n,m}) = (T_n - 1) \left[ -\frac{1}{2}\beta_N^n (u_{n,m+1} - 1)(u_{n,m} + 1) \right]. \quad (21)$$

Делаем замену переменных  $\beta_N^n u_{n,m} = (T_n - 1)(\beta_N^n v_{n,m})$ , которая записывается в виде (12) следующим образом:

$$u_{n,m} = \beta_N v_{n+1,m} - v_{n,m}. \quad (22)$$

При помощи (13) мы получаем дискретное уравнение для  $v_{n,m}$ :

$$(\beta_N v_{n+1,m+1} - v_{n,m+1} - 1)(\beta_N v_{n+1,m} - v_{n,m} + 1) + 2(v_{n,m+1} - v_{n,m}) = 0. \quad (23)$$

Выпишем для уравнения (23) четыре высшие симметрии, которые сводятся к (4–7) преобразованием (22). В  $m$ -направлении мы имеем следующие симметрии для любого  $N$ :

$$\partial_{t_1} v_{n,m} = -2\beta_N^n (v_{n,m+1} - v_{n,m})(v_{n,m} - v_{n,m-1}), \quad (24)$$

$$\partial_{t_2} v_{n,m} = 4\beta_N^{2n} (v_{n,m+2} - v_{n,m-2})(v_{n,m+1} - v_{n,m})(v_{n,m} - v_{n,m-1}), \quad (25)$$

соответствующие (4) и (5). Связь (17), которая используется для построения этих высших симметрий, имеет такую форму:

$$2(v_{n,m} - v_{n,m+1}) = (u_{n,m+1} - 1)(u_{n,m} + 1). \quad (26)$$

В  $n$ -направлении при  $N = 1$ ,  $\beta_N = 1$  получаем симметрию первого порядка, соответствующую (6):

$$\partial_{\theta_1} v_{n,m} = -a_n \frac{(v_{n+1,m} - v_{n,m})(v_{n,m} - v_{n-1,m}) + 1}{v_{n+1,m} - v_{n-1,m}} + cv_{n,m}, \quad (27)$$

где  $a_n = b + cn$  как в (6). При  $N = 2$ ,  $\beta_N = -1$  высшая симметрия второго порядка, соответствующая (7), имеет вид:

$$\begin{aligned} \partial_{\theta_2} v_{n,m} = & [(v_{n+1,m} + v_{n,m})^2 - 1] \left( a_{n+1} \frac{v_{n+2,m} + v_{n,m} + 2v_{n-1,m}}{V_{n,m}} \right. \\ & \left. - a_n \frac{v_{n,m} + 2v_{n-1,m} + v_{n-2,m}}{V_{n-1,m}} \right) \\ & + (b_n - b_{n+1})(v_{n+1,m} + v_{n,m}) + c(v_{n,m} - v_{n+1,m}), \\ V_{n,m} = & (v_{n+2,m} + v_{n,m})(v_{n+1,m} + v_{n-1,m}) + 2(v_{n+2,m}v_{n,m} + v_{n+1,m}v_{n-1,m} + 1), \end{aligned} \quad (28)$$

где  $a_n = b_n + cn$  как в (7).

Уточняя функции интегрирования  $\tilde{\omega}_m^{(j)}, \hat{\omega}_n^{(j)}$ , возникающие при построении этих высших симметрий, мы во всех случаях приходим к добавке вида  $\nu\beta_N^{-n}$  с произвольным постоянным коэффициентом  $\nu$ , которую мы опускаем. Это сделано по следующей причине: дискретное уравнение (13) очевидным образом инвариантно относительно однопараметрической группы преобразований  $v_{n,m} \rightarrow v_{n,m} + \tau\beta_N^{-n}$ , соответствующей точечной симметрии  $\partial_\tau v_{n,m} = \beta_N^{-n}$ . Эта точечная симметрия объясняет наличие вышеупомянутой добавки в высших симметриях.

Заметим, что при  $N = 2$  автономное дискретное уравнение (23) имеет в обоих направлениях автономные высшие симметрии второго порядка. Симметрия (25) становится автономной, т.к.  $\beta_2 = -1$ , а среди симметрий (28) имеется автономный частный случай с  $b_n \equiv 1, c = 0$ .

### 2.3 О новизне примеров, построенных в этой работе

Дискретное уравнение (23) с  $N = 1$ , т.е.  $\beta_N = 1$ , совпадает с уравнением [11, (T4), Table 1, p. 17] с точностью до замены переменных  $v_{n,m} = -2u_{m,n} + m$ . Остальные уравнения серии (23) являются, по-видимому, новыми. То же самое верно для остальных модифицированных серий дискретных уравнений. Все уравнения серий являются новыми за исключением случая  $N = 1$  в некоторых из них.

При каждом фиксированном  $n$ , высшие симметрии в  $m$ -направлении (24) и (25) представляют собой одну из известных модификаций уравнения Вольтерры и ее высшую симметрию. Полная классификация интегрируемых уравнений типа Вольтерры была проведена в [15], см. подробности в обзоре [19]. Симметрия (24) соответствует частному случаю уравнения (V6) из списка уравнений типа Вольтерры на страницах R596–R597 [19]. Все остальные высшие симметрии в  $m$ -направлении, выписанные ниже, соответствуют дифференциально-разностным уравнениям аналогичной природы, причем, все трехточечные примеры принадлежат тому же списку из [19].

При каждом фиксированном  $m$ , высшая симметрия в  $n$ -направлении (27) определяет интегрируемое дифференциально-разностное уравнение при  $b = 1, c = 0$  и его мастер-симметрию при  $b = 0, c = 1$ . Это дифференциально-разностное уравнение является частным случаем уравнения (V4) с  $\nu = 0$  из [19]. Для всех уравнений вида (V4) с  $\nu = 0$  в работе [3] построены мастер-симметрии с явной зависимостью от своего времени; смотри более подробное изложение в [10, Section 4.3]. В частности, в нашем случае мастер-симметрия имеет вид:

$$\partial_\tau v_n = -\frac{n}{\tau+1} \frac{(v_{n+1} - v_n)(v_n - v_{n-1}) + (\tau+1)^2}{v_{n+1} - v_{n-1}}, \quad (29)$$

где мы для краткости опустили индекс  $m$ . В отличие от (29), мастер-симметрия, полученная из (27), не имеет зависимости от своего времени и позволяет строить высшие симметрии не только для дифференциально-разностного уравнения, но и для дискретного уравнения (23) с  $N = 1$ . Кроме того, она возникает естественным образом при построении высших симметрий дискретного уравнения.<sup>1</sup>

В других примерах, высшие симметрии в  $n$ -направлении, соответствующие  $N = 1$  в дискретном уравнении, в частном случае  $b = 1, c = 0$  определяют известные дифференциально-разностные уравнения типа Вольтерры из [19]. Мастер-симметрии, соответствующие случаю  $b = 0, c = 1$ , также большей частью известны.

При фиксированном  $m$  высшая симметрия (28) определяет интегрируемое пяти-точечное автономное дифференциально-разностное уравнение при  $b_n \equiv 1, c = 0$ , его неавтономную симметрию при  $b_n = (-1)^n, c = 0$  и мастер-симметрию при  $b_n \equiv 0, c = 1$ . Уравнение и мастер-симметрия являются, по-видимому, новыми.

Остальные высшие симметрии в  $n$ -направлении, представленные ниже и соответствующие случаям  $N = 2$  и  $N = 3$  в дискретных уравнениях, порождают примеры пяти- и семиточечных дифференциально-разностных уравнений. Условие  $b_n \equiv 1, c = 0$  выделяет среди них автономные интегрируемые случаи. Для каждого из них мы автоматически получаем одну или две неавтономные симметрии и мастер-симметрию. Все примеры такого рода, включая неавтономные уравнения и мастер-симметрии, являются по-видимому новыми, за исключением двух отмеченных ниже пятиточечных автономных уравнений.

## 2.4 Вторая модификация

Все дискретные уравнения серии (1) имеют закон сохранения вида:

$$(T_m - 1) \log \frac{u_{n,m} + 1}{u_{n,m} - 1} = (T_n - 1) \log (\beta_N^n (u_{n,m+1} - 1)(u_{n,m} + 1)). \quad (30)$$

Для упрощения нового дискретного уравнения (13), выберем функцию  $r_{n,m}$  в соотношении (11) следующим образом:  $r_{n,m} = \log w_{n,m} + m \log 4$ , где  $w_{n,m}$  – новая неизвестная функция.

Тогда из (11) получаем:

$$\frac{u_{n,m} + 1}{u_{n,m} - 1} = \frac{w_{n+1,m}}{w_{n,m}}, \quad (31)$$

т.е. в явном виде мы имеем преобразование

$$u_{n,m} = \frac{w_{n+1,m} + w_{n,m}}{w_{n+1,m} - w_{n,m}}. \quad (32)$$

Дискретное уравнение (13) на  $w_{n,m}$  можно записать следующим образом:

$$(w_{n+1,m+1} - w_{n,m+1})(w_{n+1,m} - w_{n,m}) = \beta_N^n w_{n+1,m} w_{n,m}. \quad (33)$$

Мы получили серию модифицированных дискретных уравнений с одним неавтономным коэффициентом  $\beta_N^n$ . Первое уравнение этой серии, соответствующее  $N = 1$ , в переменной  $u_{n,m} = (-1)^n w_{m,n}$  совпадает с (Т6) из [11].

Связь (17), которая используется для построения высших симметрий в  $m$ -направлении, имеет вид:

$$4 \frac{w_{n,m+1}}{w_{n,m}} = \beta_N^n (u_{n,m+1} - 1)(u_{n,m} + 1). \quad (34)$$

---

<sup>1</sup>Не вдаваясь в подробности, отметим, что имеется связь между этими мастер-симметриями, т.е. пример, полученный из (27), существенно новым не является.



Обе симметрии в этом направлении оказываются автономными:

$$\frac{1}{4}\partial_{t_1} w_{n,m} = w_{n,m+1} + \frac{w_{n,m}^2}{w_{n,m-1}}, \quad (35)$$

$$\frac{1}{16}\partial_{t_2} w_{n,m} = w_{n,m+2} + \frac{w_{n,m+1}^2}{w_{n,m}} + \frac{2w_{n,m+1}w_{n,m}}{w_{n,m-1}} + \frac{w_{n,m}^3}{w_{n,m-1}^2} + \frac{w_{n,m}^2}{w_{n,m-2}}. \quad (36)$$

В  $n$ -направлении при  $N = 1$ ,  $\beta_N = 1$  получаем симметрию первого порядка, соответствующую (6):

$$\partial_{\theta_1} w_{n,m} = -a_n \frac{(w_{n+1,m} - w_{n,m})(w_{n,m} - w_{n-1,m})}{w_{n+1,m} - w_{n-1,m}} + ctw_{n,m}, \quad (37)$$

где  $a_n = b + cn$  как в (6). Автономный частный случай  $b = 1$ ,  $c = 0$  этой симметрии является инвариантным относительно дробно-линейных преобразований  $w_{n,m}$  (или Мёбиус-инвариантным). Это – ни что иное, как хорошо известная шварцциан-версия цепочки Вольтерры.

Удобно ввести обозначения из [1, Section 4]:

$$Y_{n,m} = \frac{(w_{n+1,m} - w_{n,m})(w_{n,m} - w_{n-1,m})}{w_{n+1,m} - w_{n-1,m}}, \quad (38)$$

$$X_{n,m} = \frac{(w_{n+1,m} - w_{n,m})(w_{n-1,m} - w_{n-2,m})}{(w_{n+1,m} - w_{n-1,m})(w_{n,m} - w_{n-2,m})}.$$

Тогда уравнение (37) легко записывается в терминах  $Y_{n,m}$ . При  $N = 2$ ,  $\beta_N = -1$  высшая симметрия второго порядка, соответствующая (7), имеет вид:

$$\partial_{\theta_2} w_{n,m} = Y_{n,m} \left( \frac{a_{n+1}}{2X_{n+1,m} - 1} + \frac{a_n}{2X_{n,m} - 1} \right) + 2ctw_{n,m}, \quad (39)$$

где  $a_n = b_n + cn$  как в (7). Очевидно, что при  $c = 0$  она является Мёбиус-инвариантной относительно  $w_{n,m}$  как и (37). Фиксируя переменную  $m$ , мы видим, что с точностью до растяжения  $\theta_2$ , автономный случай  $b_n \equiv 1$ ,  $c = 0$  совпадает с известным уравнением [1, (32)]. Для этого уравнения здесь найдены неавтономная симметрия (39) с  $b_n = (-1)^n$ ,  $c = 0$  и мастер-симметрия, соответствующая  $b_n \equiv 0$ ,  $c = 1$ . Кроме того, дискретное уравнение (33) с  $N = 2$ , совместное с симметрией (39), задает для этого известного уравнения автопреобразование Бэклунда, см. подробности в [10, Section 4.1].

При  $N = 3$  высшая симметрия третьего порядка, соответствующая (8), имеет вид:

$$\partial_{\theta_3} w_{n,m} = Y_{n,m} \left( \frac{a_{n+2}(W_{n+2,m} + \beta_3)}{\beta_3 W_{n+1,m} - W_{n+2,m}} + \frac{a_{n+1}(\beta_3 - 1)}{\beta_3 W_{n,m} - W_{n+1,m}} - \frac{a_n(\beta_3 W_{n-1,m} + 1)}{\beta_3 W_{n-1,m} - W_{n,m}} \right) + 3ctw_{n,m}, \quad (40)$$

$$W_{n,m} = 3X_{n,m} - 1,$$

где  $X_{n,m}, Y_{n,m}$  – функции, определенные в (38), а  $\beta_3$  и  $a_n = b_n + cn$  определяются как в уравнении (8). Очевидно, что при фиксированном  $m$  и  $c = 0$  уравнение (40) является Мёбиус-инвариантным. Оно содержит три коммутирующих частных случая, выделенных условиями  $b_n \equiv 1$ ,  $b_n = \beta_3^n$  и  $b_n = \beta_3^{2n}$ . Первый из них является новым автономным семиточечным Мёбиус-инвариантным интегрируемым уравнением. Случай  $b_n \equiv 0$ ,  $c = 1$  задает мастер-симметрию для всех трех уравнений. Уравнение (33) с  $N = 3$  задает для них автопреобразование Бэклунда.

## 2.5 Третья модификация

Здесь мы стартуем с уравнений (33), которые при любом  $N$  имеют закон сохранения

$$(T_n - 1) [(-1)^{n+m} \log w_{n,m}] = (T_m - 1) \left[ (-1)^{n+m} \log \left( \beta_N^{-n/2} (w_{n,m} - w_{n+1,m}) \right) \right]. \quad (41)$$

Этот закон сохранения имеет вид (20) и формула, симметричная (11), такова:

$$(-1)^{n+m} \log w_{n,m} = (T_m - 1) [(-1)^{n+m+1} \log z_{n,m}]. \quad (42)$$

Она приводит к простому линейаризуемому преобразованию

$$w_{n,m} = z_{n,m+1} z_{n,m}, \quad (43)$$

которое позволяет получить следующее дискретное уравнение:

$$z_{n,m+1} z_{n,m} - z_{n+1,m+1} z_{n+1,m} = \beta_N^{n/2} z_{n+1,m} z_{n,m}. \quad (44)$$

Соотношение для построения высших симметрий в  $n$ -направлении имеет вид:

$$\beta_N^{n/2} z_{n,m} z_{n+1,m} = w_{n,m} - w_{n+1,m}. \quad (45)$$

Недостатком уравнения (44) является наличие полуцелых степеней числа  $\beta_N$ , что неудобно для исследований. Используя неавтономное точечное преобразование  $z_{n,m}^{new} = \beta_N^{\frac{n(n-1)}{4}} z_{n,m}$ , мы приводим его к виду, аналогичному (33):

$$z_{n,m+1} z_{n,m} - \beta_N^{-n} z_{n+1,m+1} z_{n+1,m} = z_{n+1,m} z_{n,m}. \quad (46)$$

Это дискретное уравнение при  $\beta_N = 1$  не является новым, так как после преобразования  $u_{n,m} = i^{n-m} z_{m,n}$  оно совпадает с (T7),  $c_2 = 0$ , из [11].

Соотношения (43) и (45), необходимые для построения высших симметрий, переписываются так:

$$w_{n,m} = \beta_N^{-\frac{n(n-1)}{2}} z_{n,m+1} z_{n,m}, \quad \beta_N^{-\frac{n(n-1)}{2}} z_{n,m} z_{n+1,m} = w_{n,m} - w_{n+1,m}. \quad (47)$$

Заметим, что в них также нет полуцелых степеней  $\beta_N$ , так как число  $\frac{n(n-1)}{2}$  всегда целое.

Две высшие симметрии дискретного уравнения (46) в  $m$ -направлении независимо от номера  $N$  имеют вид:

$$\frac{1}{4} \partial_{t_1} z_{n,m} = \frac{z_{n,m+1} z_{n,m}}{z_{n,m-1}}, \quad (48)$$

$$\frac{1}{16} \partial_{t_2} z_{n,m} = \frac{z_{n,m+2} z_{n,m+1}}{z_{n,m-1}} + \frac{z_{n,m+1}^2 z_{n,m}}{z_{n,m-1}^2} + \frac{z_{n,m+1} z_{n,m}^2}{z_{n,m-1} z_{n,m-2}}. \quad (49)$$

При  $N = 1$ ,  $\beta_N = 1$  получаем из (37) высшую симметрию первого порядка в  $n$ -направлении:

$$2\partial_{\theta_1} z_{n,m} = -a_n z_{n,m} \frac{z_{n+1,m} - z_{n-1,m}}{z_{n+1,m} + z_{n-1,m}} + c z_{n,m} \left( m - \frac{1}{2} \right), \quad (50)$$

где  $a_n = b + cn$  как в (6). После неавтономного растяжения  $z_{n,m}^{new} = i^n z_{n,m}$ , это уравнение при любом фиксированном  $m$  совпадает с известным уравнением из [19], мастер-симметрия которого также известна [3, 10].

При  $N = 2$ ,  $\beta_N = -1$  высшая симметрия в  $n$ -направлении второго порядка, полученная из (39), имеет вид:

$$\partial_{\theta_2} z_{n,m} = z_{n,m} \left( \frac{a_n}{1 + (-1)^n \frac{z_{n+1,m} z_{n-2,m} - (-1)^n z_{n,m}}{z_{n-1,m} z_{n-2,m} + (-1)^n z_{n,m}}} - \frac{a_{n+1}}{1 + (-1)^n \frac{z_{n-1,m} z_{n+2,m} - (-1)^n z_{n,m}}{z_{n+1,m} z_{n+2,m} + (-1)^n z_{n,m}}} + cm + \frac{b_{n+1} - b_n}{2} \right), \quad (51)$$

где  $a_n = b_n + cn$  как в (7). Чтобы избавиться от коэффициента  $(-1)^n$ , мы используем неавтономное точечное преобразование  $z_{n,m}^{new} = i^{-\frac{(n-1)^2}{2} - \frac{1}{4}} z_{n,m}$  и получаем:

$$\partial_{\theta_2} z_{n,m} = z_{n,m} \left( \frac{a_n}{1 - \frac{z_{n+1,m} z_{n-2,m} - z_{n,m}}{z_{n-1,m} z_{n-2,m} + z_{n,m}}} - \frac{a_{n+1}}{1 - \frac{z_{n-1,m} z_{n+2,m} - z_{n,m}}{z_{n+1,m} z_{n+2,m} + z_{n,m}}} + cm + \frac{b_{n+1} - b_n}{2} \right). \quad (52)$$

Так как здесь  $c$  – постоянная, а  $b_n$  – произвольная двухпериодическая функция, то при каждом фиксированном  $m$  мы имеем три случая: автономное дифференциально-разностное уравнение при  $a_n \equiv 1$ , его симметрию при  $a_n = (-1)^n$  и их общую мастер-симметрию при  $a_n = n$ .

В этом случае второе соотношение из (47) превращается в

$$z_{n,m} z_{n+1,m} = w_{n,m} - w_{n+1,m}, \quad (53)$$

и при фиксированном  $m$  оно связывает дифференциально-разностные уравнения (39) и (52). При  $a_n \equiv 1$  уравнение (52) становится автономным и оно связано автономным преобразованием (53) с известным автономным уравнением (39) с  $a_n \equiv 1$ . Преобразование (53) является линеаризуемым, но неявным в обоих направлениях [8].

## 2.6 Четвертая модификация

Правую и левую часть соотношения (26) можно обозначить через  $y_{n,m}$ , введя таким образом новую неизвестную функцию. Как следует из (4) и (24), она удовлетворяет уравнению

$$\partial_{t_1} y_{n,m} = \beta_N^n y_{n,m} (y_{n,m+1} - y_{n,m-1}), \quad (54)$$

которое является уравнением Вольтерры при любом фиксированном  $n$ . Это естественно, так как одно из заданных здесь преобразований

$$y_{n,m} = (u_{n,m+1} - 1)(u_{n,m} + 1) \quad (55)$$

есть ни что иное, как известное преобразование модифицированного уравнения Вольтерры в уравнение Вольтерры. Другое преобразование

$$y_{n,m} = 2(v_{n,m} - v_{n,m+1}),$$

связывающее (24) с (54), известно так же, как и (55), см. например обзор [19]. Обозначая в соотношении (34) правую и левую часть через  $\beta_N^n y_{n,m}$ , мы снова получаем связи между (35) и (4) с тем же самым уравнением (54).

Подобного результата можно ожидать от соотношения (53). Здесь мы покажем, что преобразование

$$y_{n,m} = w_{n,m} - w_{n+1,m}, \quad (56)$$

полученное из (53), позволяет вывести из дискретного уравнения (33) еще одну модификацию вместе с высшими симметриями. Заметим, что в отличие от (22,32,43) преобразование (56) имеет другое направление в том смысле, что позволяет выразить явным образом новую неизвестную функцию  $y_{n,m}$  через старую  $w_{n,m}$ .

Преобразование (56) позволяет без труда переписывать высшие симметрии в  $n$ -направлении. Симметрии (37) и (39) принимают вид:

$$\partial_{\theta_1} y_{n,m} = y_{n,m}^2 \left( \frac{a_{n+1}}{y_{n+1,m} + y_{n,m}} - \frac{a_n}{y_{n,m} + y_{n-1,m}} \right) + c(m-1)y_{n,m}, \quad (57)$$

$$\begin{aligned} \partial_{\theta_2} y_{n,m} = & -y_{n,m}^2 \left( \frac{a_{n+2}(y_{n+2,m} - y_{n+1,m})}{\Upsilon_{n+1,m}} + \frac{a_{n+1}(y_{n+1,m} - y_{n-1,m})}{\Upsilon_{n,m}} \right. \\ & \left. + \frac{a_n(y_{n-1,m} - y_{n-2,m})}{\Upsilon_{n-1,m}} \right) + 2c(m-1)y_{n,m}, \end{aligned} \quad (58)$$

$$\Upsilon_{n,m} = (y_{n+1,m} + y_{n,m})(y_{n,m} + y_{n-1,m}) - 2y_{n+1,m}y_{n-1,m},$$

где функции  $a_n$  – такие же, как в (6) и (7). При желании можно переписать и высшую симметрию (40).

Новое дискретное уравнение для функции  $y_{n,m}$  и его высшие симметрии в  $m$ -направлении будут содержать квадратные корни. Однако, нам важен тот факт, что это преобразование (56) позволяет их построить.

Перепишем дискретное уравнение (33) при помощи преобразования (56) в виде квадратного уравнения для неизвестной функции  $w_{n,m}$ :

$$y_{n,m+1}y_{n,m} = \beta_N^n (w_{n,m} - y_{n,m})w_{n,m}. \quad (59)$$

Обозначим

$$\Theta_{n,m} = 1 + 4\beta_N^{-n} \frac{y_{n,m+1}}{y_{n,m}}, \quad (60)$$

тогда решение (59) запишется в виде

$$w_{n,m} = \frac{y_{n,m}}{2} \left( 1 + \sqrt{\Theta_{n,m}} \right), \quad (61)$$

где  $\sqrt{\Theta_{n,m}}$  – любая из ветвей функции квадратного корня. Применяя к соотношению (61) оператор  $1 - T_n$ , получаем новое дискретное уравнение

$$y_{n+1,m} \left( 1 + \sqrt{\Theta_{n+1,m}} \right) + y_{n,m} \left( 1 - \sqrt{\Theta_{n,m}} \right) = 0. \quad (62)$$

Для нахождения простейшей высшей симметрии в  $m$ -направлении, продифференцируем преобразование (56) по  $t_1$  в силу симметрии (35). Затем в правой части полученного выражения исключим функции  $w_{n+1,m+1}$ ,  $w_{n+1,m}$ ,  $w_{n+1,m-1}$  в силу преобразования (56), а потом  $w_{n,m}$ ,  $w_{n,m-1}$  – в силу (61). Получим высшую симметрию

$$\partial_{t_1} y_{n,m} = 2\beta_N^n y_{n,m} \left( \sqrt{\Theta_{n,m}} \sqrt{\Theta_{n,m-1}} - 1 \right). \quad (63)$$

Точечное преобразование  $y_{n,m} = \exp \hat{y}_{n,m}$  позволяет получить в терминах  $\hat{y}_{n,m}$  симметрию, которая при каждом фиксированном  $n$  имеет вид известного уравнения [19, Page R596, (V6)].

### 3 Преобразования, обратимые на решениях дискретного уравнения

В этой секции мы строим для дискретных уравнений неточечные преобразования, обратимые на решениях этих дискретных уравнений. Для высших симметрий дискретных уравнений такие преобразования порождают преобразования типа Миуры

или сложно-линеаризуемые преобразования [8]. При этом мы используем метод, разработанный в [14, 16] для дискретных и полудискретных уравнений. Другая версия того же метода, предназначенная для построения преобразований типа Миуры, представлена в [17, 18].

В результате мы получаем еще две модификации серии (1) дискретных уравнений вместе с их высшими симметриями.

### 3.1 Первая модификация

Перепишем дискретное уравнение (1) в виде:

$$\frac{u_{n,m} - 1}{u_{n+1,m} + 1} = \beta_N \frac{u_{n+1,m+1} - 1}{u_{n,m+1} + 1}. \quad (64)$$

Это представление позволяет ввести новую неизвестную функцию  $v_{n,m}$  следующим образом:

$$v_{n,m+1} = \frac{u_{n,m} - 1}{u_{n+1,m} + 1}, \quad v_{n,m} = \beta_N \frac{u_{n+1,m} - 1}{u_{n,m} + 1}. \quad (65)$$

Полученные выражения можно разрешить относительно старых неизвестных  $u_{n,m}$ ,  $u_{n+1,m}$ :

$$u_{n,m} = \frac{v_{n,m+1}v_{n,m} + 2\beta_N v_{n,m+1} + \beta_N}{\beta_N - v_{n,m+1}v_{n,m}}, \quad u_{n+1,m} = \frac{v_{n,m+1}v_{n,m} + 2v_{n,m} + \beta_N}{\beta_N - v_{n,m+1}v_{n,m}}. \quad (66)$$

Записывая последние выражения в одной точке  $u_{n+1,m}$ , получаем новое дискретное уравнение. Оно существенно упрощается, если его переписать в терминах  $(u_{n+1,m} - 1)/(u_{n+1,m} + 1)$ :

$$\frac{v_{n,m}(v_{n,m+1} + 1)}{v_{n,m} + \beta_N} = \frac{v_{n+1,m+1}(v_{n+1,m} + \beta_N)}{\beta_N(v_{n+1,m+1} + 1)}.$$

Еще одна эквивалентная форма записи имеет вид:

$$(v_{n+1,m} + \beta_N)(1 + \beta_N v_{n,m}^{-1}) = \beta_N(v_{n,m+1} + 1)(1 + v_{n+1,m+1}^{-1}). \quad (67)$$

Мы видим, что модифицированное уравнение (67) получается из (1) при помощи преобразования (65), которое обратимо на решениях дискретного уравнения (1). Обратное преобразование имеет вид (66). Заметим, что при  $\beta_N = 1$  ничего нового не получается, так как точечное преобразование

$$\hat{v}_{n,m} = \frac{1 - v_{n,m}}{1 + v_{n,m}} \quad (68)$$

приводит к дискретному уравнению, которое после замены переменных  $n \leftrightarrow m$  становится уравнением (1) с  $\beta_N = 1$ .

Обратимое преобразование (65) позволяет переписывать регулярным образом высшие симметрии [16]. Так из симметрий (4) и (5) уравнения (1) мы получаем две простейшие высшие симметрии в  $m$ -направлении для нового дискретного уравнения (67):

$$\partial_{t_1} v_{n,m} = 4\beta_N^{n+1} v_{n,m}(v_{n,m} + 1)(v_{n,m} + \beta_N) \frac{v_{n,m+1} - v_{n,m-1}}{V_{n,m+1}V_{n,m}}, \quad (69)$$

$$V_{n,m} = v_{n,m}v_{n,m-1} - \beta_N,$$

$$\begin{aligned} \partial_{t_2} v_{n,m} = & 16\beta_N^{2n+2}(v_{n,m} + 1)(v_{n,m} + \beta_N) \left[ -\frac{v_{n,m}(v_{n,m+1} + 1)(v_{n,m+1} + \beta_N)}{V_{n,m+2}V_{n,m+1}^2} \right. \\ & + \frac{v_{n,m}(v_{n,m-1} + 1)(v_{n,m-1} + \beta_N)}{V_{n,m}^2V_{n,m-1}} - \frac{v_{n,m+1} + v_{n,m} + \beta_N + 1}{V_{n,m+1}^2} \\ & \left. + \frac{v_{n,m} + v_{n,m-1} + \beta_N + 1}{V_{n,m}^2} + \frac{\beta_N(v_{n,m} + 1)(v_{n,m} + \beta_N)(v_{n,m+1} - v_{n,m-1})}{V_{n,m+1}^2V_{n,m}^2} \right]. \quad (70) \end{aligned}$$

Отметим, что точечное преобразование  $v_{n,m}^{new} = \frac{\sqrt{\beta_N - v_{n,m}}}{\sqrt{\beta_N + v_{n,m}}}$  переводит симметрию (69) в известное уравнение вида [19, (V2)] при любом фиксированном  $n$ .

Перейдем к симметриям в  $n$ -направлении и рассмотрим сначала случай  $N = 1$ . Высшая симметрия, полученная из (6) и затем переписанная в терминах  $\hat{v}_{n,m}$  из (68), принимает при любом фиксированном  $m$  вид модифицированного уравнения Вольтерры с известной мастер-симметрией [20]:

$$4\partial_{\theta_1}\hat{v}_{n,m} = (\hat{v}_{n,m}^2 - 1)(a_{n+2}\hat{v}_{n+1,m} - a_n\hat{v}_{n-1,m}), \quad a_n = b + cn. \quad (71)$$

Простейшая высшая симметрия при  $N = 2$ , полученная из (7), имеет вид:

$$\begin{aligned} \partial_{\theta_2}v_{n,m} &= v_{n,m}(1 - T_n^2) \left( a_{n+1} \frac{v_{n,m} - 1}{\hat{V}_{n,m}} - a_n \frac{v_{n-2,m} + 1}{\hat{V}_{n-1,m}} \right) - 2cv_{n,m}, \\ \hat{V}_{n,m} &= v_{n,m}v_{n-1,m} - v_{n,m} + v_{n-1,m} + 1, \end{aligned} \quad (72)$$

где  $a_n$  определяется как в (7). Для каждого фиксированного  $m$ , она порождает при  $a_n \equiv 1$  пятиточечный аналог модифицированного уравнения Вольтерры. С другой стороны, этот случай  $a_n \equiv 1$  является новым примером автономного дифференциально-разностного уравнения с неавтономной симметрией  $a_n = (-1)^n$  и мастер-симметрией  $a_n = n$ .

Каждое из преобразований (65) преобразует высшую симметрию (7) в (72) напрямую, поскольку они полностью определены на прямой  $n$  так же, как и симметрии. В этом их отличие от преобразований (66), которые связывают те же симметрии только на решениях дискретного уравнения (67). В отличие от преобразований, рассмотренных в секции 2, преобразования (65) линейризуются более сложным образом. Например, первое из них является композицией преобразований:

$$v_{n,m+1} = \frac{y_{n+1,m}}{y_{n,m}}, \quad y_{n,m} = z_{n,m} - z_{n-1,m}, \quad u_{n,m} = \frac{z_{n-1,m} + z_{n,m}}{z_{n-1,m} - z_{n,m}}. \quad (73)$$

Они являются линейризуемыми, т.к. с точностью до сдвига  $T_n$  легко записываются в виде (9).

Теми же самыми сложно-линеаризуемыми преобразованиями (65) высшая симметрия (8) связана с

$$\begin{aligned} \partial_{\theta_3}v_{n,m} &= v_{n,m}(T_n^2 - 1) \left[ a_{n+2}\beta_3 \frac{v_{n+1,m}v_{n,m} + \beta_3v_{n+1,m} + v_{n,m} + \beta_3^2}{\tilde{V}_{n,m}} \right. \\ &\quad \left. + a_{n+1}\beta_3^2 \frac{(v_{n,m} + \beta_3)(v_{n-2,m} + 1)}{\tilde{V}_{n-1,m}} \right. \\ &\quad \left. + a_n \frac{v_{n-2,m}v_{n-3,m} + \beta_3v_{n-2,m} + v_{n-3,m} + 1}{\tilde{V}_{n-2,m}} \right] - 3cv_{n,m}, \\ \tilde{V}_{n,m} &= (v_{n+1,m} + 1)(v_{n,m} + \beta_3^2)(v_{n-1,m} + \beta_3) + (\beta_3 + 2)(v_{n-1,m} - v_{n+1,m}), \end{aligned} \quad (74)$$

где коэффициенты  $a_n, c, \beta_3$  – такие же, как в (8). Здесь при каждом фиксированном  $m$  содержится один автономный семиточечный аналог модифицированного уравнения Вольтерры, две его неавтономные коммутирующие симметрии и одна мастер-симметрия.

Так же как (23), уравнение (67) является автономной модификацией автономного дискретного уравнения (1). Как и в случае (1) можно показать, что оно является примером автономного дискретного уравнения с двумя иерархиями автономных высших симметрий. Например, при  $N = 2$  и  $\beta_N = -1$ , простейшими автономными высшими симметриями являются (70) и (72) с  $a_n \equiv 1$ , которые оказываются пятиточечными.

## 3.2 Вторая модификация

Обозначим правую и левую часть дискретного уравнения (67) через  $3\beta_N/w_{n,m+1}$  и из этих двух равенств получаем формулы:

$$w_{n,m} = \frac{3v_{n+1,m}}{(v_{n+1,m} + 1)(v_{n,m} + 1)}, \quad w_{n,m+1} = \frac{3\beta_N v_{n,m}}{(v_{n+1,m} + \beta_N)(v_{n,m} + \beta_N)}. \quad (75)$$

Они определяют преобразование  $v_{n,m}, v_{n+1,m}$  в  $w_{n,m}, w_{n,m+1}$ , обратимое на решениях дискретного уравнения (67). Как и в случае (65), мы можем построить в терминах  $w_{n,m}$  новое дискретное уравнение и его высшие симметрии по обоим направлениям. Однако, обратное преобразование содержит квадратные корни, поэтому дискретное уравнение и симметрии в  $m$ -направлении также будут содержать квадратные корни. Формулы (75) обеспечивают явные рациональные преобразования для симметрий в  $n$ -направлении, которые также оказываются рациональными. Мы выпишем в основном такие симметрии, а соответствующее дискретное уравнение покажем только в одном важном случае.

В отличие от (65) мы имеем здесь не линеаризуемые преобразования, а преобразования типа Миуры. Действительно, в терминах  $\hat{v}_{n,m}$  из (68) и

$$\check{v}_{n,m} = \frac{\beta_N - v_{n,m}}{\beta_N + v_{n,m}}, \quad (76)$$

мы имеем

$$w_{n,m} = -\frac{3}{4}(\hat{v}_{n+1,m} - 1)(\hat{v}_{n,m} + 1), \quad w_{n,m+1} = -\frac{3}{4}(\check{v}_{n+1,m} + 1)(\check{v}_{n,m} - 1). \quad (77)$$

Это известные дискретные преобразования Миуры, связывающие уравнение Вольтерры и его известную модификацию, и они получены здесь при помощи точечных преобразований функции  $v_{n,m}$ .

В случае  $N = 1$ ,  $\beta_N = 1$ , используя первое из преобразований (77), мы получаем из симметрии (71), записанной в терминах  $\hat{v}_{n,m}$ , следующую высшую симметрию в  $n$ -направлении:

$$-3\partial_{\theta_1} w_{n,m} = w_{n,m}(a_{n+3}w_{n+1,m} - a_n w_{n-1,m} + c w_{n,m} - 3c), \quad a_n = b + cn. \quad (78)$$

Способ переписывания дифференциально-разностных уравнений при помощи таких преобразований объясняется в [9, Appendix A.2]. При любом фиксированном  $m$ , симметрия (78) представляет собой уравнение Вольтерры с его известной мастер-симметрией [13].

Если  $N = 2$ , т.е.  $\beta_N = -1$ , то мы получаем из симметрии (72) при помощи первого из преобразований (75) следующую высшую симметрию:

$$\partial_{\theta_2} w_{n,m} = w_{n,m}(T_n + 1) \left[ \frac{a_{n+3}w_{n,m}}{2w_{n+1,m} - 3} - \frac{a_n w_{n-1,m}}{2w_{n-2,m} - 3} + \frac{1}{2}(T_n - 1) \left( a_n - \frac{3a_{n+1}}{2w_{n-1,m} - 3} \right) \right], \quad (79)$$

где коэффициент  $a_n$  определяется как в (7).

Мы можем получить известное уравнение в терминах

$$\tilde{w}_{n,m} = -\frac{3}{2w_{n,m} - 3}. \quad (80)$$

Симметрия (79) записывается следующим образом:

$$\begin{aligned} -2\partial_{\theta_2} \tilde{w}_{n,m} = (\tilde{w}_{n,m} - 1) & \left[ a_{n+4} \frac{\tilde{w}_{n+2,m}(\tilde{w}_{n+1,m} - 1)\tilde{w}_{n,m}}{\tilde{w}_{n+1,m}} - a_n \frac{\tilde{w}_{n,m}(\tilde{w}_{n-1,m} - 1)\tilde{w}_{n-2,m}}{\tilde{w}_{n-1,m}} \right. \\ & \left. - a_{n+3}\tilde{w}_{n+1,m} + a_{n+1}\tilde{w}_{n-1,m} + (a_n - a_{n+2})\tilde{w}_{n,m} \right]. \end{aligned} \quad (81)$$

В частном случае  $a_n \equiv 1$ , при любом фиксированном  $m$ , она является пятиточечным аналогом уравнения Вольтерры. Это уравнение ранее было найдено в [1]; уравнение [1, (39)] совпадает с нашим с точностью до растяжения  $\theta_2$  и  $\tilde{w}_{n,m}$ ). В статье [2] отмечено, что оно играет ключевую роль для специального класса дифференциально-разностных уравнений.

Формула (81) с тем же фиксированным  $m$  дает для этого уравнения неавтономную симметрию при  $a_n = (-1)^n$  и мастер-симметрию при  $a_n = n$ . Кроме того, мы можем выписать для этого известного уравнения соответствующее дискретное уравнение, задающее автопреобразование Бэклунда:

$$\begin{aligned} & \frac{\tilde{w}_{n+1,m+1} - 1}{\tilde{w}_{n+1,m+1}(\tilde{w}_{n+1,m} + 1)} (\Theta_{n+1,m} - \tilde{w}_{n+1,m+1} + \tilde{w}_{n+1,m} + 2) \\ & + \frac{\tilde{w}_{n+1,m} - 1}{\tilde{w}_{n+1,m}(\tilde{w}_{n,m+1} - 1)} (\Theta_{n,m} + \tilde{w}_{n,m+1} - \tilde{w}_{n,m} - 2) = 4, \\ & \Theta_{n,m} = \sqrt{4\tilde{w}_{n,m+1}\tilde{w}_{n,m} + (\tilde{w}_{n,m+1} + \tilde{w}_{n,m} + 2)^2}. \end{aligned} \quad (82)$$

При  $N = 3$  мы можем построить семиточечный аналог уравнения Вольтерры. Используя первое из преобразований (75), мы получаем из (74) высшую симметрию

$$\begin{aligned} 3\partial_{\theta_3} w_{n,m} &= w_{n,m}(1 + T_n) [A_{n,m} + (1 - T_n)(w_{n-1,m}B_{n,m})], \\ A_{n,m} &= a_{n+4} \frac{\beta_3 w_{n+1,m} w_{n,m}}{W_{n+2,m}} - a_{n+2} \frac{(\beta_3 + 1) w_{n,m} w_{n-1,m}}{W_{n,m}} \\ & + a_n \frac{w_{n-1,m} w_{n-2,m}}{W_{n-2,m}} - 3c \left( w_{n,m} - \frac{3}{2} \right), \\ B_{n,m} &= a_{n+2} \frac{2\beta_3 + 1}{W_{n,m}} - a_{n+1} \frac{\beta_3 + 2}{W_{n-1,m}} + a_n, \\ W_{n,m} &= \beta_3 w_{n-1,m} - w_{n,m} + 1 - \beta_3, \end{aligned} \quad (83)$$

где коэффициенты  $a_n, c, \beta_3$  определяются как в (8). Если зафиксировать  $m$ , то мы получаем из симметрии (83) вышеуказанный аналог при  $a_n \equiv 1$ , его неавтономные коммутирующие симметрии при  $a_n = \beta_3^n$  и  $a_n = \beta_3^{2n}$ , а также мастер-симметрию при  $a_n = n$ .

## Список литературы

- [1] В.Э. Адлер, *Интегрируемые Мёбиус-инвариантные эволюционные цепочки второго порядка*, Функц. анализ и его прил. **50:4** (2016) 13–25.
- [2] В.Э. Адлер, *Интегрируемые семиточечные дискретные уравнения и эволюционные цепочки второго порядка*, Теор. и мат. физ. **195:1** (2018) 27–43.
- [3] В.Э. Адлер, А.Б. Шабат, Р.И. Ямилов, *Симметричный подход к проблеме интегрируемости*, Теор. и мат. физ. **125:3** (2000) 355–424.
- [4] R.N. Garifullin, I.T. Habibullin and R.I. Yamilov, *Peculiar symmetry structure of some known discrete nonautonomous equations*, J. Phys. A: Math. Theor. **48** (2015) 235201 (27pp).
- [5] R.N. Garifullin and R.I. Yamilov, *Examples of Darboux integrable discrete equations possessing first integrals of an arbitrarily high minimal order*, Уфимский математический журнал **4:3** (2012) 177–183.
- [6] Р.Н. Гарифуллин, Р. И. Ямилов, *Необычная серия автономных дискретных интегрируемых уравнений на квадратной решетке*, Теор. и мат. физ. **200:1** (2019) 50–71.



- [7] R.N. Garifullin and R.I. Yamilov, *On series of Darboux integrable discrete equations on square lattice*, Уфимский математический журнал **11**:3 (2019) 100–109.
- [8] R.N. Garifullin, R.I. Yamilov and D. Levi, *Non-invertible transformations of differential-difference equations*, J. Phys. A: Math. Theor. **49** (2016) 37LT01 (12pp).
- [9] R.N. Garifullin, R.I. Yamilov and D. Levi, *Classification of five-point differential-difference equations*, J. Phys. A: Math. Theor. **50** (2017) 125201 (27pp).
- [10] D. Levi, M. Petrera, C. Scimiterna and R. Yamilov, *On Miura transformations and Volterra-type equations associated with the Adler-Bobenko-Suris equations*, SIGMA **4** (2008) 077, 14 pages.
- [11] D. Levi and R.I. Yamilov, *Generalized symmetry integrability test for discrete equations on the square lattice*, J. Phys. A: Math. Theor. **44** (2011) 145207 (22pp).
- [12] A.V. Mikhailov, *Formal diagonalisation of Lax–Darboux schemes*, Модел. и анализ информ. систем **22**:6 (2015) 795–817.
- [13] W. Oevel, H. Zhang and B. Fuchssteiner, *Mastersymmetries and multi-Hamiltonian formulations for some integrable lattice systems*, Prog. Theor. Phys. **81**:2 (1989) 294–308.
- [14] S. Ya. Startsev, *On non-point invertible transformations of difference and differential-difference equations*, SIGMA **6** (2010) 092, 14 pp.
- [15] Р.И. Ямилов, *О классификации дискретных эволюционных уравнений*, Успехи мат. наук **38**:6 (1983) 155–156.
- [16] Р.И. Ямилов, *Обратимые замены переменных, порожденные преобразованиями Беклунда*, Теор. и мат. физ. **85**:3 (1990) 368–375.
- [17] R.I. Yamilov, *On the construction of Miura type transformations by others of this kind*, Phys. Lett. A **173** (1993) 53–57.
- [18] R.I. Yamilov, *Construction scheme for discrete Miura transformations*, J. Phys. A: Math. Gen. **27** (1994) 6839–6851.
- [19] R. Yamilov, *Symmetries as integrability criteria for differential difference equations*, J. Phys. A: Math. Gen. **39** (2006) R541–R623.
- [20] H. Zhang, G. Tu, W. Oevel and B. Fuchssteiner, *Symmetries, conserved quantities and hierarchies for some lattice systems with soliton structure*, J. Math. Phys. **32**:7 (1991) 1908–1918.