

UDC 517.51

Estimates for the entropy numbers of the Nikol'skii–Besov classes of periodic functions of many variables in the space of quasi-continuous functions

Оцінки ентропійних чисел класів Нікольського–Бесова періодичних функцій багатьох змінних у просторі квазінеперервних функцій

A. S. Romanyuk, S. Ya. Yanchenko

Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, Kyiv

А. С. Романюк, С. Я. Янченко

Інститут математики НАН України, Київ

Анотація

We obtained exact-order estimates for the entropy numbers of the Nikol'skii–Besov classes $B_{p,\theta}^r$ of periodic functions of many variables in the metric of the space of quasi-continuous functions.

Отримано порядкові оцінки ентропійних чисел класів Нікольського–Бесова $B_{p,\theta}^r$ періодичних функцій багатьох змінних у метриці простору квазінеперервних функцій.

1. Вступ. У роботі продовжено вивчення асимптотичних характеристик класів Нікольського–Бесова $B_{p,\theta}^r$ з домінуючою мішаною похідною періодичних функцій багатьох змінних [26], [27], [28]. Знайдено оцінки для ентропійних чисел згаданих класів у метриці QC -простору квазінеперервних функцій. Показано, що у деяких випадках ці оцінки є точними за порядком. Даний простір функцій є близьким за своїми властивостями до простору L_∞ , а знаходження оцінок такої характеристики, як ентропійні числа, в його метриці дає змогу одержати нові результати — досі не встановлені у рівномірній метриці.

2. Означення класів функцій та апроксимативних характеристик. Нехай \mathbb{R}^d , $d \geq 1$, — евклідів простір з елементами $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ і $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + \dots + x_dy_d$. Через $L_p(\pi_d)$, $\pi_d = \prod_{j=1}^d [0, 2\pi]$, $1 \leq p \leq \infty$, позначимо простір функцій $f(\mathbf{x})$, які є 2π -періодичні за кожною змінною зі скінченною нормою:

$$\|f\|_p := \|f\|_{L_p(\pi_d)} = \left((2\pi)^{-d} \int_{\pi_d} |f(\mathbf{x})|^p d\mathbf{x} \right)^{1/p} < \infty, \quad 1 \leq p < \infty,$$

$$\|f\|_\infty := \|f\|_{L_\infty(\pi_d)} = \operatorname{ess\,sup}_{\mathbf{x} \in \pi_d} |f(\mathbf{x})|.$$

У подальших міркуваннях будемо розглядати тільки ті функції $f \in L_p(\pi_d)$, для яких виконана умова

$$\int_0^{2\pi} f(\mathbf{x}) dx_j = 0, j = \overline{1, d},$$

і множину таких функцій будемо позначати $L_p^0(\pi_d)$.

Для функції $f \in L_p^0(\pi_d)$, $1 \leq p \leq \infty$, розглянемо різницю першого порядку по j -ій змінній з кроком $h \in \mathbb{R}$:

$$\Delta_{h,j} f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j + h, x_{j+1}, \dots, x_d) - f(\mathbf{x})$$

і, відповідно, l -го порядку, $l \in \mathbb{N}$,

$$\Delta_{h,j}^l f(\mathbf{x}) = \overbrace{\Delta_{h,j} \dots \Delta_{h,j}}^l f(\mathbf{x}).$$

Далі, якщо $\mathbf{k} = (k_1, \dots, k_d)$, $k_j \in \mathbb{N}$, $j = \overline{1, d}$, то мішана різниця порядку \mathbf{k} з векторним кроком $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_d)$, $h_j \in \mathbb{R}$, $j = \overline{1, d}$, визначається рівністю

$$\Delta_{\mathbf{h}}^{\mathbf{k}} f(\mathbf{x}) = \Delta_{h_1,1}^{k_1} \Delta_{h_2,2}^{k_2} \dots \Delta_{h_d,d}^{k_d} f(\mathbf{x}).$$

Нехай задані вектор $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_d)$, $r_j > 0$, $j = \overline{1, d}$, і параметри $1 \leq p, \theta \leq \infty$. Тоді простори $B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}(\pi_d)$ можна означити таким чином:

$$B_{p,\theta}^{\mathbf{r}} := B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}(\pi_d) = \left\{ f \in L_p^0(\pi^d) : \|f\|_{B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}} < \infty \right\},$$

і норма задається рівностями

$$\|f\|_{B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}} = \left(\int_{\pi_d} \|\Delta_{\mathbf{h}}^{\mathbf{k}} f\|_p^\theta \prod_{j=1}^d \frac{dh_j}{h_j^{1+r_j\theta}} \right)^{1/\theta}$$

якщо $1 \leq \theta < \infty$ та

$$\|f\|_{H_p^{\mathbf{r}}} \equiv \|f\|_{B_{p,\infty}^{\mathbf{r}}} = \sup_{\mathbf{h}} \|\Delta_{\mathbf{h}}^{\mathbf{k}} f\|_p \prod_{j=1}^d h_j^{-r_j}.$$

Також вважаємо, що для векторів $\mathbf{k} = (k_1, \dots, k_d)$ і $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_d)$ виконана умова $k_j > r_j$, $j = \overline{1, d}$.

У такій формі означення просторів $B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}$ було дане у роботах В. М. Темлякова [30] і С. М. Нікольського та П. І. Лізоркіна [17] відповідно для $H_p^{\mathbf{r}}$ і $B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}$. Вони належать шкалі просторів мішаної гладкості, що введені С. М. Нікольським [20] і Т. І. Амановим [1]. Окрім того, вони є узагальненням відомих ізотропних просторів Б'єсова [5], а для випадку $\theta = \infty$ — Нікольського [19].

Під класом $B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}$ будемо розуміти множину функцій $f \in L_p^0(\pi^d)$ для яких $\|f\|_{B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}} \leq 1$ і при цьому збережемо для класів $B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}$ ті ж самі позначення, що і для просторів $B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}$.

При проведенні подальших міркувань нам буде зручно користуватися означенням норми функцій з класів $B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}$ в децю іншій формі, а саме опосередковано через, так зване, декомпозиційне представлення елементів цих просторів. Уперше декомпозиційне представлення функцій з класів Нікольського–Бесова та відповідне йому нормування з'явилося у роботах В. М. Темлякова [30, Роз. 2, п. 1] і С. М. Нікольського та П. І. Лізоркіна [17] і, як з'ясувалося пізніше, відігравало ключову роль у дослідженнях, які пов'язані з апроксимацією класів функцій.

Для векторів $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_d)$, $s_j \in \mathbb{Z}_+$, $\mathbf{k} = (k_1, \dots, k_d)$, $k_j \in \mathbb{Z}$, $j = \overline{1, d}$, покладемо

$$\rho(\mathbf{s}) = \left\{ \mathbf{k} = (k_1, \dots, k_d) : [2^{s_j-1}] \leq |k_j| < 2^{s_j}, j = \overline{1, d} \right\}$$

і для $f \in L_p^0(\pi_d)$ позначимо

$$\delta_{\mathbf{s}}(f) := \delta_{\mathbf{s}}(f, \mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{k} \in \rho(\mathbf{s})} \widehat{f}(\mathbf{k}) e^{i(\mathbf{k}, \mathbf{x})},$$

де $\widehat{f}(\mathbf{k}) = \int_{\pi_d} f(\mathbf{t}) e^{-i(\mathbf{k}, \mathbf{t})} d\mathbf{t}$ – коефіцієнти Фур'є функції f .

Тоді класи $B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}$, $1 < p < \infty$, $1 \leq \theta \leq \infty$, $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_d)$, $r_j > 0$, $j = \overline{1, d}$, можна означити наступним чином [17]:

$$B_{p,\theta}^{\mathbf{r}} := \left\{ f \in L_p^0(\pi_d) : \|f\|_{B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}} \leq 1 \right\},$$

де

$$\|f\|_{B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}} \asymp \left(\sum_{\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_+^d} 2^{(\mathbf{s}, \mathbf{r})\theta} \|\delta_{\mathbf{s}}(f)\|_p^\theta \right)^{\frac{1}{\theta}}$$

при $1 \leq \theta < \infty$ і

$$\|f\|_{B_{p,\infty}^{\mathbf{r}}} \equiv \|f\|_{H_p^{\mathbf{r}}} \asymp \sup_{\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_+^d} 2^{(\mathbf{s}, \mathbf{r})} \|\delta_{\mathbf{s}}(f)\|_p.$$

Тут і надалі по тексту для додатних величин a і b вживається запис $a \asymp b$, який означає, що існують такі додатні сталі C_1 та C_2 , які не залежать від одного істотного параметра у величинах a і b , що $C_1 a \leq b$ (у цьому випадку пишемо $a \ll b$) і $C_2 a \geq b$ (у цьому випадку пишемо $a \gg b$). Всі сталі C_i , $i = 1, 2, \dots$, які зустрічаються у роботі, можуть залежати лише від тих параметрів, що входять в означення класу, метрики, в якій оцінюється похибка наближення, та розмірності простору \mathbb{R}^d . У деяких випадках цю залежність будемо вказувати у явному вигляді.

Зазначимо, що видозмінивши “блоки” $\delta_{\mathbf{s}}(f)$, наведене означення класів $B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}$ можна поширити і на крайні значення $p = 1$ і $p = \infty$ (див., наприклад, [17, зауваження 2.1].

Нехай $V_l(t)$, $t \in \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{N}$, позначає ядро Валле–Пуссена вигляду

$$V_l(t) = 1 + 2 \sum_{k=1}^l \cos kt + 2 \sum_{k=l+1}^{2l-1} \left(1 - \frac{k-l}{l} \right) \cos kt.$$

Поставимо у відповідність кожному вектору $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_d)$, $s_j \in \mathbb{Z}_+$, $j = \overline{1, d}$, поліном

$$A_{\mathbf{s}}(\mathbf{x}) = \prod_{j=1}^d (V_{2^{s_j}}(x_j) - V_{2^{s_j-1}}(x_j))$$

і для $f \in L_p^0(\pi_d)$, $1 \leq p \leq \infty$, покладемо

$$A_{\mathbf{s}}(f) := A_{\mathbf{s}}(f, \mathbf{x}) = (f * A_{\mathbf{s}})(\mathbf{x}),$$

де “ $*$ ” означає операцію згортки. Тоді, при $1 \leq p \leq \infty$, $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_d)$, $r_j > 0$, $j = \overline{1, d}$, класи $B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}$ можна означити таким чином:

$$B_{p,\theta}^{\mathbf{r}} = \left\{ f : \|f\|_{B_{p,\theta}^{\mathbf{r}}} \asymp \left(\sum_{\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_+^d} 2^{(\mathbf{s}, \mathbf{r})\theta} \|A_{\mathbf{s}}(f)\|_p^\theta \right)^{\frac{1}{\theta}} \leq 1, 1 \leq \theta < \infty \right\},$$

$$B_{p,\infty}^{\mathbf{r}} = \left\{ f : \|f\|_{B_{p,\infty}^{\mathbf{r}}} \asymp \sup_{\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_+^d} 2^{(\mathbf{s}, \mathbf{r})} \|A_{\mathbf{s}}(f)\|_p \leq 1 \right\}.$$

З дослідженням різних апроксимативних характеристик класів Нікольського та Нікольського–Бесова періодичних функцій можна ознайомитися у монографіях [7], [25], [30], [31], де наведена детальна бібліографія.

Тепер означимо асимптотичні характеристики, які будемо досліджувати.

Нехай \mathcal{X} банахів простір і $B_{\mathcal{X}}(\mathbf{y}, r) = \{x \in \mathcal{X} : \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq r\}$ — куля радіуса r з центром у точці \mathbf{y} .

Для компактної множини $A \subset \mathcal{X}$ і $\varepsilon > 0$ позначимо

$$N_{\varepsilon}(A, \mathcal{X}) = \min \left\{ n : \exists \mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^n \in \mathcal{X} : A \subseteq \bigcup_{j=1}^n B_{\mathcal{X}}(\mathbf{y}^j, \varepsilon) \right\}.$$

Тоді величина

$$H_{\varepsilon}(A, \mathcal{X}) = \log N_{\varepsilon}(A, \mathcal{X})$$

називається ε -ентропією множини A відносно банахового простору \mathcal{X} [15] (тут і далі під записом \log будемо розуміти \log_2).

З ε -ентропією множини A тісно пов’язано поняття її ентропійних чисел $\varepsilon_k(A, \mathcal{X})$ (див., наприклад, [9]):

$$\varepsilon_k(A, \mathcal{X}) = \inf \left\{ \varepsilon : \exists \mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^{2^k} \in \mathcal{X} : A \subseteq \bigcup_{j=1}^{2^k} B_{\mathcal{X}}(\mathbf{y}^j, \varepsilon) \right\}.$$

Безпосередньо з означень величин $H_{\varepsilon}(A, \mathcal{X})$ і $\varepsilon_k(A, \mathcal{X})$ можемо записати: якщо $H_{\varepsilon}(A, \mathcal{X}) \leq k$, то $\varepsilon_k(A, \mathcal{X}) \leq \varepsilon$ і навпаки — з оцінки $\varepsilon_k(A, \mathcal{X}) \leq \varepsilon$ отримуємо $H_{\varepsilon}(A, \mathcal{X}) \leq k$, а саме, якщо $k < H_{\varepsilon}(A, \mathcal{X}) \leq k + 1$, то $\varepsilon_{k+1}(A, \mathcal{X}) \leq \varepsilon \leq \varepsilon_k(A, \mathcal{X})$. Ці співвідношення дають можливість із оцінок для ентропійних чисел деякої множини A отримувати відповідні оцінки її ε -ентропії.

Дослідження ε -ентропії і близьких до неї асимптотичних характеристик (ε -ємність, ентропійні числа і т.п.) мають багату історію. Зокрема, ентропійні числа для класів функцій однієї та багатьох змінних Соболєва $W_{p,\alpha}^r$, Нікольського H_p^r , Нікольського–Бесова $B_{p,\theta}^r$ та їх аналогів досліджувалися у роботах [2], [3], [4], [6], [8], [11], [12], [13], [14], [16], [21], [22], [26], [27], [28], [29], [32], [33], [34], [36], [37], [38], [40], [42]. З більш детальною бібліографією можна ознайомитися у монографіях [7], [39], [41].

Означимо простір у метриці якого будемо оцінювати ентропійні числа.

Нехай μ — нормована міра Лебега на одиничному колі. Для функції $f \in L_1(d\mu)$ з рядом Фур'є

$$f \sim \sum_{s=0}^{\infty} \delta_s(f, x),$$

$$\delta_0(f, x) = \int_0^{2\pi} f d\mu, \quad \delta_s(f, x) = \sum_{2^{s-1} \leq |k| < 2^s} \widehat{f}(k) e^{ikx}, \quad s = 1, 2, \dots,$$

розглянемо величину

$$\|f\|_{QC} \equiv \int_0^1 \left\| \sum_{s=0}^{\infty} r_s(\omega) \delta_s(f, x) \right\|_{L_\infty(d\mu)} d\omega, \quad (1)$$

де $\{r_s(\omega)\}_{s=0}^\infty$ — система Радемахера (див., [10, Гл. 2, § 1]). Тоді простором квазінеперервних функцій (позначення QC) будемо називати замикання множини тригонометричних поліномів за нормою (1).

Простір квазінеперервних функцій у багатовимірному випадку ($d \geq 2$) означимо таким чином:

$$\|f\|_{QC} \equiv \left\| \|f(\cdot, \mathbf{x}^1)\|_{QC} \right\|_\infty, \quad (2)$$

де для $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d) \in \pi_d$ покладаємо $\mathbf{x}^1 = (x_2, \dots, x_d) \in \pi_{d-1}$, тобто в (2) береться QC -норма по змінній x_1 і sup-норма по інших змінних.

Зазначимо, що простір квазінеперервних функцій QC введено в роботі [12] (див. також [13]), де наведено деякі його властивості, зокрема, при $d = 1$ для $f \in QC$ справедливе співвідношення

$$\|f\|_{QC} \leq \sum_s \|\delta_s(f)\|_\infty.$$

З дослідженнями властивостей, а також із застосуваннями QC -норми можна ознайомитися у роботах [23], [24].

Якщо \mathfrak{M} — деяка скінченна множина, то через $|\mathfrak{M}|$ будемо позначати кількість її елементів.

3. Основні результати. У подальших міркування будемо вважати, що вектор \mathbf{r} , який входить в означення класів $B_{p,\theta}^r$ має вигляд $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_1) \in \mathbb{R}_+^d$.

Теорема 1. *Нехай $1 < p \leq \infty$, $1 \leq \theta < \infty$, $r_1 > \max\left\{\frac{1}{p}, \frac{1}{2}\right\}$. Тоді при $d \geq 2$ справедлива оцінка*

$$\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, QC) \ll M^{-r_1} (\log^{d-1} M)^{r_1 + (\frac{1}{p} - \frac{1}{\theta})_+} \sqrt{\log M}, \quad (3)$$

$\partial e p^* = \min\{p, 2\}$, $a_+ = \max\{a, 0\}$.

Доведення. Розглянемо спочатку випадок $1 < p \leq 2$, $p < \theta < \infty$.

Для $n \in \mathbb{N}$ покладемо

$$Q_n = \bigcup_{(\mathbf{s}, 1) \leq n} \rho(\mathbf{s}), \Delta Q_n = Q_n \setminus Q_{n-1} \text{ i } \mathfrak{N}_n = \{\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_d), (\mathbf{s}, 1) = n\}.$$

Зазначимо, що $|\Delta Q_n| \asymp 2^n n^{d-1}$.

Для подальших міркувань нам знадобляться такі допоміжні твердження.

Лема А (див., наприклад, [31]). *Нехай $f \in L_p^0(\pi_d)$, $1 < p < \infty$. Тоді*

$$\left\| \sum_{\mathbf{s}} \delta_{\mathbf{s}}(f) \right\|_p \ll \left(\sum_{\mathbf{s}} \|\delta_{\mathbf{s}}(f)\|_p^{p^*} \right)^{\frac{1}{p^*}},$$

$\partial e p^* = \min\{p, 2\}$.

Лема Б [30, с. 11]. *Справедливе співвідношення*

$$\sum_{(\mathbf{s}, 1) \geq l} 2^{-\alpha(\mathbf{s}, 1)} \asymp 2^{-\alpha l} l^{d-1}, \quad \alpha > 0.$$

Отже, згідно з лемою А для $f \in B_{p, \theta}^r$ будемо мати

$$\left\| \sum_{\mathbf{s} \in \mathfrak{N}_n} \delta_{\mathbf{s}}(f) \right\|_p \ll \left(\sum_{\mathbf{s} \in \mathfrak{N}_n} \|\delta_{\mathbf{s}}(f)\|_p^p \right)^{\frac{1}{p}} = \mathfrak{I}_1. \quad (4)$$

Далі, скориставшись нерівністю Гельдера з показником θ/p і лемою Б, одержимо

$$\begin{aligned} \mathfrak{I}_1 &\leq \left(\sum_{\mathbf{s} \in \mathfrak{N}_n} 2^{(\mathbf{s}, \mathbf{r})} \|\delta_{\mathbf{s}}(f)\|_p^\theta \right)^{\frac{1}{\theta}} \left(\sum_{\mathbf{s} \in \mathfrak{N}_n} 2^{-(\mathbf{s}, \mathbf{r}) \frac{\theta p}{\theta - p}} \right)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{\theta}} \ll \\ &\ll \|f\|_{B_{p, \theta}^r} \left(\sum_{\mathbf{s} \in \mathfrak{N}_n} 2^{-(\mathbf{s}, \mathbf{r}) \frac{\theta p}{\theta - p}} \right)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{\theta}} \leq \\ &\leq \left(\sum_{\mathbf{s} \in \mathfrak{N}_n} 2^{-r_1(\mathbf{s}, 1) \frac{\theta p}{\theta - p}} \right)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{\theta}} \asymp 2^{-nr_1} n^{(d-1)(\frac{1}{p} - \frac{1}{\theta})}. \end{aligned} \quad (5)$$

Аналогічно у випадку $1 < p \leq 2$ і $\theta = p$ можемо записати

$$\begin{aligned} \mathfrak{I}_1 &\ll 2^{-nr_1} \left(\sum_{\mathbf{s} \in \mathfrak{N}_n} 2^{(\mathbf{s}, \mathbf{r})} \|\delta_{\mathbf{s}}(f)\|_p^p \right)^{\frac{1}{p}} \ll \\ &\ll 2^{-nr_1} \|f\|_{B_{p, p}^r} \ll 2^{-nr_1}. \end{aligned} \quad (6)$$

Таким чином, при $1 < p \leq 2$, $p \leq \theta < \infty$, згідно з (4)–(6) маємо

$$\left\| \sum_{s \in \mathfrak{N}_n} \delta_s(f) \right\|_p \ll 2^{-nr_1} n^{(d-1)\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{\theta}\right)}. \quad (7)$$

Далі, нехай задано достатньо велике число M . Підберемо $m \in \mathbb{N}$ так, щоб виконувалися нерівності

$$|\Delta Q_{m-1}| < M \leq |\Delta Q_m|.$$

Тоді, оскільки

$$|\Delta Q_{m-1}| \asymp |\Delta Q_m| \asymp 2^m m^{d-1},$$

то $M \asymp 2^m m^{d-1}$.

Тепер покладемо $\beta = \frac{1}{2} \min \left\{ \left(r_1 - \frac{1}{p} \right), 1 \right\}$ і

$$\overline{M}_n = \begin{cases} C(\beta) M 2^{-\frac{1}{2}(m-n)}, & n < m, \\ C(\beta) M 2^{-\beta(n-m)}, & n \geq m, \end{cases}$$

де числа $C(\beta) > 0$ підібрано таким чином, що

$$\sum_{n=1}^{\infty} \overline{M}_n \leq M.$$

Зауважимо, що такі числа $C(\beta) > 0$ існують, оскільки

$$M \sum_{n=0}^{m-1} 2^{-\frac{1}{2}(m-n)} + M \sum_{n=m}^{\infty} 2^{-\beta(n-m)} \ll M.$$

Нехай $M_n = [\overline{M}_n]$, де $[a]$ — ціла частина числа a . Тоді $M_n = 0$, якщо $C(\beta) M 2^{-\beta(n-m)} < 1$, тобто при $n > m_1 = m + \beta^{-1} \log C(\beta) M$.

Позначимо

$$S_{\Delta Q_n}(B_{p,\theta}^r) := \left\{ g : g(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{k} \in \Delta Q_n} \widehat{f}(\mathbf{k}) e^{i(\mathbf{k}, \mathbf{x})}, f \in B_{p,\theta}^r \right\}$$

і

$$\|S_{\Delta Q_n}(B_{p,\theta}^r)\|_{QC} := \sup_{g \in S_{\Delta Q_n}(B_{p,\theta}^r)} \|g\|_{QC}.$$

Отже, згідно з позначеннями для ентропійних чисел $\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, QC)$, можемо записати

$$\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, QC) \leq \sum_{n \leq m_1} \varepsilon_{M_n}(S_{\Delta Q_n}(B_{p,\theta}^r), QC) + \sum_{n > m_1} \|S_{\Delta Q_n}(B_{p,\theta}^r)\|_{QC} = I_1 + I_2. \quad (8)$$

Оцінимо спочатку доданок I_2 , скориставшись відомим твердженням.

Для будь-якої множини $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ через $\mathcal{T}(\Lambda)$ будемо позначати множину тригонометричних поліномів t вигляду

$$t(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{k} \in \Lambda} c_{\mathbf{k}} e^{i(\mathbf{k}, \mathbf{x})}, \mathbf{x} \in \pi_d.$$

У випадку, коли множина Λ симетрична відносно початку координат ($\Lambda = -\Lambda$), покладемо

$$\mathcal{T}_r(\Lambda) = \{t \in \mathcal{T}(\Lambda) : c_{\mathbf{k}} = \bar{c}_{-\mathbf{k}}, \mathbf{k} \in \Lambda\}.$$

Теорема А [30, Роз. 1, теорема 2.1]. *Нехай $f \in \mathcal{T}(Q_n)$. Тоді при $1 \leq p < \infty$ справедлива нерівність*

$$\|f\|_\infty \ll 2^{\frac{n}{p}} n^{(d-1)(1-\frac{1}{p})} \|f\|_p. \quad (9)$$

Зауважимо, що оцінка (9) залишається вірною і в тому випадку, коли $f \in \mathcal{T}(\Delta Q_n)$.

Оцінимо спочатку $\|g\|_{QC}$. Згідно з означенням та властивостями QC -норми і оцінками (7) та (9) маємо

$$\begin{aligned} \|g\|_{QC} &= \|\|g(\cdot, \mathbf{x}^1)\|_{QC}\|_\infty \ll \\ &\ll \left\| \sum_{\mathbf{s} \in \mathfrak{N}_n} \delta_{\mathbf{s}}(f) \right\|_\infty \ll 2^{\frac{n}{p}} n^{(d-1)(1-\frac{1}{p})} \left\| \sum_{\mathbf{s} \in \mathfrak{N}_n} \delta_{\mathbf{s}}(f) \right\|_p \ll \\ &\ll 2^{\frac{n}{p}} n^{(d-1)(1-\frac{1}{p})} 2^{-nr_1} n^{(d-1)(\frac{1}{p}-\frac{1}{\theta})} = 2^{-n(r_1-\frac{1}{p})} n^{(d-1)(1-\frac{1}{\theta})}. \end{aligned}$$

Отже, для кожного доданку в I_2 можемо записати

$$\|S_{\Delta Q_n}(B_{p,\theta}^r)\|_{QC} \ll 2^{-n(r_1-\frac{1}{p})} n^{(d-1)(1-\frac{1}{\theta})}.$$

Далі, провівши підсумовування по $n > m_1$ і врахувавши значення m_1 , одержимо

$$I_2 \ll \sum_{n>m_1} 2^{-n(r_1-\frac{1}{p})} n^{(d-1)(1-\frac{1}{\theta})} \ll 2^{-m_1(r_1-\frac{1}{p})} m_1^{(d-1)(1-\frac{1}{\theta})} = \mathfrak{J}_2. \quad (10)$$

Для продовження оцінки величини \mathfrak{J}_2 розглянемо два випадки.

Нехай $r_1 - \frac{1}{p} > 1$. Тоді $\beta = \frac{1}{2}$ і відповідно $m_1 = m + \log(C(\beta)M)^2$. Таким чином будемо мати

$$\begin{aligned} \mathfrak{J}_2 &= 2^{-m(r_1-\frac{1}{p})} (C(\beta)M)^{-2(r_1-\frac{1}{p})} (m + \log(C(\beta)M)^2)^{(d-1)(1-\frac{1}{\theta})} \asymp \\ &\asymp 2^{-m(r_1-\frac{1}{p})} 2^{-2(r_1-\frac{1}{p})m} m^{-2(d-1)(r_1-\frac{1}{p})} m^{(d-1)(1-\frac{1}{\theta})} \ll \\ &\ll 2^{-mr_1} m^{(d-1)(\frac{1}{p}-\frac{1}{\theta})}. \end{aligned} \quad (11)$$

Нехай тепер $0 < r_1 - \frac{1}{p} \leq 1$. Тоді $\beta = \frac{1}{2}(r_1 - \frac{1}{p})$, $m_1 = m + \log(C(\beta)M)^{\frac{2p}{r_1p-1}}$ і величина \mathfrak{J}_2 оцінюється у такий спосіб

$$\begin{aligned} \mathfrak{J}_2 &= 2^{-m(r_1-\frac{1}{p})} (C(\beta)M)^{-\frac{2p}{r_1p-1}(r_1-\frac{1}{p})} (m + \log(C(\beta)M)^{\frac{2p}{r_1p-1}})^{(d-1)(1-\frac{1}{\theta})} \asymp \\ &\asymp 2^{-m(r_1-\frac{1}{p})} 2^{-2m} m^{-2(d-1)m^{(d-1)(1-\frac{1}{\theta})}} \ll 2^{-mr_1} m^{(d-1)(\frac{1}{p}-\frac{1}{\theta})}. \end{aligned} \quad (12)$$

Таким чином, згідно з (10)–(12) отримуємо таке співвідношення

$$I_2 \ll 2^{-mr_1} m^{(d-1)(\frac{1}{p}-\frac{1}{\theta})}. \quad (13)$$

Для оцінки величини I_1 нам знадобиться допоміжне твердження.

Нехай $\mathcal{T}(\Delta Q_n)_q$ позначає однічну L_q -кулю у просторі поліномів $\mathcal{T}(\Delta Q_n)$. Крім того покладемо

$$\gamma(q, a, b) = \begin{cases} \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{q}} [\ln(1 + \frac{b}{a})]^{\frac{1}{q}-\frac{1}{2}}, & a \leq b, \\ e^{-\frac{a}{b}}, & a > b. \end{cases}$$

Лема В [13]. Для $1 < q \leq 2$ має місце оцінка

$$\varepsilon_M(\mathcal{T}(\Delta Q_n)_q, QC) \ll n^{\frac{1}{2}} \gamma(q, M, \mathcal{K}|\Delta Q_n|).$$

($\mathcal{K} = \mathcal{K}(d)$; інші константи у цій нерівності також не залежать ні від M , ні від n). Отже, представимо величину I_1 у вигляді

$$I_1 = \sum_{n \leq m} \varepsilon_{M_n}(S_{\Delta Q_n}(B_{p,\theta}^r), QC) + \sum_{m < n \leq m_1} \varepsilon_{M_n}(S_{\Delta Q_n}(B_{p,\theta}^r), QC). \quad (14)$$

Далі, згідно з (7) і лемою В знаходимо

$$\sum_{n \leq m} \varepsilon_{M_n}(S_{\Delta Q_n}(B_{p,\theta}^r), QC) \ll \sum_{n \leq m} 2^{-nr_1} n^{(d-1)\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{\theta}\right)} n^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{M_n}{\mathcal{K}|\Delta Q_n|}} \ll 2^{-mr_1} m^{(d-1)\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{\theta}\right)} m^{\frac{1}{2}}. \quad (15)$$

Аналогічно при $n < m \leq m_1$ одержимо

$$\begin{aligned} & \sum_{m < n \leq m_1} \varepsilon_{M_n}(S_{\Delta Q_n}(B_{p,\theta}^r), QC) \ll \\ & \ll \sum_{m < n \leq m_1} 2^{-nr_1} n^{(d-1)\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{\theta}\right)} n^{\frac{1}{2}} \left(\frac{|\Delta Q_n|}{M_n}\right)^{\frac{1}{p}} \left[\ln\left(1 + \frac{|\Delta Q_n|}{M_n}\right)\right]^{\frac{1}{p}-\frac{1}{2}} \ll \\ & \ll 2^{-mr_1} m^{(d-1)\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{\theta}\right)} m^{\frac{1}{2}}. \end{aligned} \quad (16)$$

Отже, згідно з (14)–(16) для оцінки величини I_1 можемо записати:

$$I_1 \ll 2^{-mr_1} m^{(d-1)\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{\theta}\right)} m^{\frac{1}{2}}. \quad (17)$$

Тепер, об'єднавши оцінки (8), (13) і (17) та беручи до уваги, що $M \asymp 2^m m^{d-1}$, для випадку $1 < p \leq 2, p \leq \theta < \infty$ одержимо

$$\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, QC) \ll M^{-r_1} (\log^{d-1} M)^{r_1 + \frac{1}{p} - \frac{1}{\theta}} \sqrt{\log M}. \quad (18)$$

Далі, скориставшись оцінкою (18) одержимо оцінки величини $\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, QC)$ у випадках, що залишилися нерозглянутими.

Нехай $1 < p \leq 2, 1 \leq \theta < p$. Тоді врахувавши, що $B_{p,\theta}^r \subset B_{p,p}^r$, згідно з (18) маємо

$$\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, QC) \ll \varepsilon_M(B_{p,p}^r, QC) \ll M^{-r_1} (\log^{d-1} M)^{r_1} \sqrt{\log M}. \quad (19)$$

Нехай $2 < p \leq \infty, 2 < \theta < \infty$. Тоді $B_{p,\theta}^r \subset B_{2,\theta}^r$ і тому, скориставшись (18), можемо записати

$$\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, QC) \ll \varepsilon_M(B_{2,\theta}^r, QC) \ll M^{-r_1} (\log^{d-1} M)^{r_1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{\theta}} \sqrt{\log M}. \quad (20)$$

Нехай $2 < p \leq \infty$, $1 \leq \theta \leq 2$. Тоді $B_{p,\theta}^r \subset B_{p,2}^r \subset B_{2,2}^r$ і згідно з (18) при $\theta = p = 2$ одержимо

$$\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, QC) \ll \varepsilon_M(B_{2,2}^r, QC) \ll M^{-r_1} (\log^{d-1} M)^{r_1} \sqrt{\log M}. \quad (21)$$

Об'єднавши (18)–(21) приходимо до шуканої оцінки.

Теорему 1 доведено.

У наступному твердженні встановимо оцінку знизу величини $\varepsilon_M(B_{\infty,\theta}^r, QC)$.

Теорема 2. *Нехай $r_1 > 0$, $1 \leq \theta < \infty$. Тоді при $d \geq 2$ справедлива оцінка*

$$\varepsilon_M(B_{\infty,\theta}^r, QC) \gg M^{-r_1} (\log^{d-1} M)^{r_1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{\theta}} \sqrt{\log M}. \quad (22)$$

Доведення. Нехай $N_\varepsilon(F, \mathcal{X})$ — мінімальна кількість замкнутих куль радіуса $\varepsilon > 0$ простору \mathcal{X} необхідних для компактного покриття множини F , а $M_\varepsilon(F, \mathcal{X})$ — максимальна кількість таких точок $x_i \in F$, що $\|x_i - x_j\|_{\mathcal{X}} > \varepsilon$, $i \neq j$. Тоді справедливі нерівності (див., наприклад, [15])

$$N_\varepsilon(F, \mathcal{X}) \leq M_\varepsilon(F, \mathcal{X}) \leq N_{\frac{\varepsilon}{2}}(F, \mathcal{X}). \quad (23)$$

Далі для парних n і $d \geq 2$ позначимо

$$Y_n^d = \left\{ \mathbf{s}: \mathbf{s} = (2l_1, \dots, 2l_d), l_1 + \dots + l_d = \frac{n}{2}, \mathbf{l} \in \mathbb{Z}_+^d \right\},$$

$$\mathcal{D}_n = \bigcup_{\mathbf{s} \in Y_n^d} \rho(\mathbf{s})$$

і $\mathcal{T}_r(\mathcal{D}_n)$ — простір дійсних тригонометричних поліномів $t \in \mathcal{T}(\mathcal{D}_n)$. При цьому зауважимо, що для кількості елементів множини \mathcal{D}_n справедливе співвідношення $|\mathcal{D}_n| \asymp 2^n n^{d-1}$.

У [13] (див., також, [33]) для кожного n побудовано набір функцій $\{f_i^n\}_1^{A_n}$, $f_i^n \in \mathcal{T}_r(\mathcal{D}_n)$ з властивостями:

- 1) $\|\delta_{\mathbf{s}}(f_i^n)\|_\infty \leq 1$, $\mathbf{s} \in Y_n^d$;
- 2) $\|f_i^n - f_j^n\|_{QC} \geq C(d) n^{\frac{d}{2}}$, $i \neq j$;
- 3) $A_n \geq 2^{\frac{|\mathcal{D}_n|}{2}}$.

Покажемо, що кожна функція з множини

$$F_n = \left\{ C(r, \theta) 2^{-nr_1} n^{-\frac{d-1}{\theta}} f_i^n \right\}_{i=1}^{A_n}$$

з деякою константою $C(r, \theta)$ належить класу $B_{\infty,\theta}^r$, $1 \leq \theta < \infty$.

Маємо

$$\|f_i^n\|_{B_{\infty,\theta}^r} \asymp \sum_{\mathbf{s} \in \mathcal{D}_n} 2^{(\mathbf{s}, \mathbf{r})\theta} \|A_{\mathbf{s}}(f_i^n)\|_\infty^\theta =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\sum_{s \in \mathcal{D}_n} 2^{(s,r)\theta} \left\| A_s * \sum_{\|s-s'\| \leq 1} \delta_{s'}(f_i^n) \right\|_\infty^\theta \right)^{\frac{1}{\theta}} \leq \\
&\leq \left(\sum_{s \in \mathcal{D}_n} 2^{(s,r)\theta} \|A_s\|_1^\theta \left\| \sum_{\|s-s'\| \leq 1} \delta_{s'}(f_i^n) \right\|_\infty^\theta \right)^{\frac{1}{\theta}} \ll \\
&\ll \left(\sum_{s \in \mathcal{D}_n} 2^{(s,r)\theta} \left(\sum_{\|s-s'\| \leq 1} \|\delta_{s'}(f_i^n)\|_\infty \right)^\theta \right)^{\frac{1}{\theta}} \ll 2^{nr_1} n^{\frac{d-1}{\theta}}
\end{aligned}$$

Отже, $F_n \subset B_{\infty,\theta}^r$.

Тепер, беручи до уваги (23) і скориставшись властивістю 2) для функцій з (24) можемо записати

$$\begin{aligned}
\varepsilon_M(B_{\infty,\theta}^r, QC) &\gg \varepsilon_M(F_n, QC) \gg \\
&\gg 2^{-nr_1} n^{-\frac{d-1}{\theta}} n^{\frac{d}{2}} = 2^{-nr_1} n^{(d-1)(\frac{1}{2}-\frac{1}{\theta})} n^{\frac{1}{2}} \asymp M^{-r_1} (\log^{d-1} M)^{r_1+\frac{1}{2}-\frac{1}{\theta}} \sqrt{\log M}
\end{aligned}$$

Оцінку (22) встановлено. Теорему 2 доведено.

З результатів теорем 1 та 2 легко одержати таке твердження.

Теорема 3. *Нехай $2 \leq p \leq \infty$, $2 \leq \theta < \infty$, $r_1 > \frac{1}{2}$. Тоді при $d \geq 2$ справедлива оцінка*

$$\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, QC) \asymp M^{-r_1} (\log^{d-1} M)^{r_1+\frac{1}{2}-\frac{1}{\theta}} \sqrt{\log M}. \quad (25)$$

Доведення. Оскільки для $1 \leq p < \infty$ має місце вкладення $B_{\infty,\theta}^r \subset B_{p,\theta}^r$, то скориставшись оцінкою (22), зокрема, і для $2 \leq p \leq \infty$, $2 \leq \theta < \infty$, $r_1 > \frac{1}{2}$, маємо

$$\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, QC) \gg \varepsilon_M(B_{\infty,\theta}^r, QC) \gg M^{-r_1} (\log^{d-1} M)^{r_1+\frac{1}{2}-\frac{1}{\theta}} \sqrt{\log M}. \quad (26)$$

Співставивши (26) з оцінкою (3) з теореми 1, одержуємо оцінку (25).

Теорему 3 доведено.

На завершення роботи зробимо декілька коментарів.

Одержані у теоремі 3 точні за порядком оцінки ентропійних чисел класів Нікольського–Бесова $B_{p,\theta}^r$ у просторі QC доповнюють відповідні результати для класів Соболєва $W_{p,\alpha}^r$ та Нікольського H_p^r , $1 < p \leq \infty$, встановлені Б. С. Кашиним і В. М. Темляковим [13].

Стосовно оцінок ентропійних чисел класів Нікольського–Бесова $B_{p,\theta}^r$ у просторі L_∞ зазначимо, що у роботі [26] встановлено їхні точні за порядком оцінки, але лише у двовимірному випадку $d = 2$. Для зручності порівняння цих оцінок з результатом теореми 3 наведемо відповідне твердження.

Теорема Б [26]. *Нехай $d = 2$, $2 \leq p \leq \infty$, $\mathbf{r} = (r_1, r_1)$, $r_1 > \frac{1}{2}$. Тоді для $2 \leq \theta < \infty$ справедлива оцінка*

$$\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, L_\infty) \asymp M^{-r_1} (\log M)^{r_1+1-\frac{1}{\theta}}. \quad (27)$$

Зауважимо, що у випадку $p = \infty$ дана оцінка справедлива при $r_1 > 0$.

Отже, співставивши (27) з результатом теореми 3 при $d = 2$ бачимо, що справедливе співвідношення:

$$\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, QC) \asymp \varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, L_\infty) \asymp M^{-r_1} (\log M)^{r_1+1-\frac{1}{\theta}},$$

$$2 \leq p \leq \infty, \quad r_1 > \frac{1}{2}, \quad 2 \leq \theta < \infty.$$

Однак питання про порядок величини $\varepsilon_M(B_{p,\theta}^r, L_\infty)$, $1 \leq \theta \leq \infty$, $1 \leq p \leq \infty$ у випадку $d > 2$ залишається відкритим.

Література

- [1] Amanov T. I. Representation and imbedding theorems for function spaces $S_{p,\theta}^{(r)}B(\mathbb{R}_n)$ and $S_{p,\theta}^{(r)*}B$, ($0 \leq x_j \leq 2\pi$; $j = 1, \dots, n$). Tr. Mat. Inst. Steklova 1965, **77**, 5–34. (in Russian)
- [2] Belinskii E. S. Approximation of functions of several variables by trigonometric polynomials with given number of harmonics, and estimates of e -entropy. Anal. Math. 1989, **15**, 67–74.
- [3] Belinskii E. S. Asymptotic characteristics of classes of functions with conditions on a mixed derivative (mixed difference). In: Studies on the Theory of Functions of Many Real Variables, Yaroslavl' Univ., Yaroslavl', 1990, 22–37. (in Russian)
- [4] Belinskii E. S. Estimates of entropy numbers and Gaussian measures for classes of functions with bounded mixed derivative. J. Approx. Theory, 1998, **93**, 114–127.
- [5] Besov O. V. Investigation of one family of functional spaces in connection with the embedding and continuation theorems. Tr. Mat. Inst. Akad. Nauk SSSR, 1961, **60**, 42–81. (in Russian)
- [6] Dung D. Non-linear approximations using sets of finite cardinality or finite pseudo-dimension. J. Complexity, 2001, **17**, No. 2, 467–492.
- [7] Dũng D., Temlyakov V. N., and Ullrich T. Hyperbolic Cross Approximation. Birkhäuser, Basel, 2018.
- [8] Dunker T., Linde W., Kühn T. and Lifshits M. Metric entropy of integration operator and small ball probabilities for the Brownian sheet, J. Approx. Theory, 1999, **101**, 63–77.
- [9] Höllig K. Diameters of classes of smooth functions. Quant. Approxim. — New York.: Acad. Press. 1980, 163–176.
- [10] Kashin B. S. and Saakyan A. A. Orthogonal Series, Nauka, Moscow, 1984 (in Russian); English translated: Amer. Math. Soc. Transl., vol. 75, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1989.

- [11] *Kashin B. S. and Temlyakov V. N.* Estimate of approximate characteristics for classes of functions with bounded mixed derivative. Mat. Zametki, 1995, **58**, No. 6, 922–925 (in Russian); English translated in Math. Notes, 1995, **58**, No. 6, 1340–1342. <https://doi.org/10.1007/BF02304894>
- [12] *Kashin B. S., Temlyakov V. N.* On a certain norm and related applications. Mat. Zametki, 1998, **64**, No. 4, 637–640 (in Russian); English translated in Math. Notes, 1999, **64**, No. 4, 551–554. <https://doi.org/10.1007/BF02314638>
- [13] *Kashin B. S., Temlyakov V. N.* On a norm and approximation characteristics of classes of functions of several variables. Metric theory of functions and related problems in analysis, 69–99, Izd. Nauchno-Issled. Aktuarno-Finans. Tsentr (AFTs), Moscow, 1999. (in Russian)
- [14] *Kashin B. S. and Temlyakov V. N.* On the best m -term approximations and the entropy of sets in the space L_1 . Mat. Zametki, 1994, **56**, No. 5, 57–86 (in Russian); English translated in Math. Notes, 1994, **56**, No. 5-6, 1137–1157. <https://doi.org/10.1007/BF02274662>
- [15] *Kolmogorov A. N. and Tikhomirov V. M.* ε -entropy and ε -capacity of sets in functional spaces. Usp. Mat. Nauk, 1959, **14**, No. 2, 3–86. (in Russian)
- [16] *Mayer S., Ullrich T.* Entropy Numbers of Finite Dimensional Mixed-Norm Balls and Function Space Embeddings with Small Mixed Smoothness. Constr. Approx. (2020). <https://doi.org/10.1007/s00365-020-09510-5>
- [17] *Lizorkin P. I., Nikol'skii S. M.* Function spaces of mixed smoothness from the decomposition point of view. Proc. Steklov Inst. Math., 1990, **187**, 163–184; translated from Tr. Mat. Inst. Steklova 1989, **187**, 143–161 (in Russian).
- [18] *Nikol'skii S. M.* Approximation of Functions of Many Variables and Imbedding Theorems. Nauka, Moscow, 1969. (in Russian)
- [19] *Nikol'skii S. M.* Inequalities for entire functions of finite power and their application to the theory of differentiable functions of many variables. Tr. Mat. Inst. Akad. Nauk SSSR, 1951, **38**, 244–278. (in Russian)
- [20] *Nikol'skii S. M.* Functions with dominant mixed derivative, satisfying a multiple Hölder condition. Sibirsk. Mat. Zh., 1963, **4** (6), 1342–1364. (in Russian)
- [21] *Pozhars'ka K. V.* Entropy Numbers of the Nikol'skii–Besov-type Classes of Periodic Functions of many Variables, J. Math. Sci., 2019, **241**, 64–76. <https://doi.org/10.1007/s10958-019-04407-6>; translated from Ukrains'kii Matematichnyi Visnyk, 2018, **15**, No. 3, 383–398 (in Ukrainian).
- [22] *Pozhars'ka K. V.* Estimates for the entropy numbers of the classes $B_{p,\theta}^\Omega$ of periodic multivariable functions in the uniform metric, Ukr. Math. J., 2019, **70**, No. 9, 1439–1455. <https://doi.org/10.1007/s11253-019-01578-y>; translated from Ukr. Mat. Zh., 2018, **70**, No. 9, 1249–1263 (in Ukrainian).

- [23] Radomskii A. O. On nonequivalence of the C - and QC -norms in the space of trigonometric polynomials, Sb. Math., 2016, **207**(12), 1729–1742; translated from Sbornik: Mathematics, 2016, **207** (12), 110–123. doi:10.1070/sm8707
- [24] Radomskii A. O. Some properties of the space of quasi-continuous functions, UMN, 2018, **73**:6(444), 191–192 (in Russian); English translated in Russ. Math. Surv., 2018, **73**, 1119–1121. <https://doi.org/10.4213/rm9851>
- [25] Romanyuk A. S. Approximating Characteristics of the Classes of Periodic Functions of Many Variables, Proc. of the Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv (2012), 352. (in Russian)
- [26] Romanyuk A. S. Entropy numbers and widths for the Nikol'skii–Besov classes of functions of many variables in the space L_∞ . Anal. Math., 2019, **45**, No. 1, 133–151. <https://doi.org/10.1007/s10476-018-0611-4>
- [27] Romanyuk A. S. Entropy numbers and widths for the classes $B_{p,\theta}^r$ of periodic functions of many variables, Ukr. Mat. Zh., 2016, **68**, No. 10, 1403–1417 (in Russian); English translated in Ukr. Math. J., 2017, **68**, No. 10, 1620–1636. <https://doi.org/10.1007/s11253-017-1315-9>
- [28] Romanyuk A. S. Estimates of the entropy numbers and Kolmogorov widths for the Nikol'skii–Besov classes of periodic functions of many variables, Ukr. Mat. Zh., 2015, **67**, No. 11, 1540–1556 (in Russian); English translated in Ukr. Math. J., 2016, **67**, No. 11, 1739–1757. <https://doi.org/10.1007/s11253-016-1186-5>
- [29] Romanyuk A. S. and Romanyuk V. S. Approximation characteristics of the classes of periodic functions of many variables in the space $B_{\infty,1}$. Ukr. Mat. Zh., 2019, **71**, No. 2, 271–282 (in Russian); English translated in Ukr. Math. J., 2019, **71**, No. 2, 308–321. <https://doi.org/10.1007/s11253-019-01646-3>
- [30] Temlyakov V. N. Approximation of functions with bounded mixed derivative. Proc. Steklov Inst. Math. 1989, **178**, 1–121; translated from Tr. Mat. Inst. Steklova 1986, **178**, 1–112 (in Russian).
- [31] Temlyakov V. N. Approximation of periodic functions. — New York: Nova Sci. Publ. Inc., 1993. — 419 p.
- [32] Temlyakov V. N. An inequality for the entropy numbers and its application. J. Approx. Theory, 2013, **173**, 110–121.
- [33] Temlyakov V. N. An inequality for trigonometric polynomials and its application for estimating the entropy numbers. J. Complexity, 1995, **11**, 293–307.
- [34] Temlyakov V. N. An inequality for trigonometric polynomials and its application for estimating the Kolmogorov widths. East J. Approx., 1996, **2**, 89–98.
- [35] Temlyakov V. N. Estimates for the asymptotic characteristics of classes of functions with bounded mixed derivative or difference. Trudy Mat. Inst. Akad. Nauk SSSR, 1989, **189**, 138–168. (in Russian)

- [36] *Temlyakov V. N.* On the estimates of the e -entropy and widths of the classes of functions with bounded mixed derivative or difference. Dokl. AN SSSR, 1988, **301**, No. 2, 288–291. (in Russian)
- [37] *Temlyakov V. N.* On the entropy numbers of the mixed smoothness function classes. J. Approx. Theory, 2017, **217**, 26–56.
- [38] *Temlyakov V. N.* On two problems in the multivariate approximation. East J. Approx., 1998, **4**, 505–514.
- [39] *Temlyakov V. N.* Multivariate approximation, V. 32 of Cambridge Monographs on Applied and Computation Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
- [40] *Temlyakov V., Ullrich T.* Approximation of functions with small mixed smoothness in the uniform norm. arXiv:2012.11983, 2020.
- [41] *Trigub R. M., Belinsky E. S.* Fourier Analysis and Approximation of Functions. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004.
- [42] *Vybiral J.* Function spaces with dominating mixed smoothness, Dissertationes Math., **436** (2006), 73 pp.

Contact information: Department of the Theory of Functions, Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine, 3, Tereshenkovska st., 01024, Kyiv, Ukraine.

E-mail: romanyuk@imath.kiev.ua
yan.sergiy@gmail.com