

Классификация полудискретных уравнений гиперболического типа. Случай симметрий третьего порядка.

Р.Н. Гарифуллин.^{*†}

6 июля 2023 г.

Аннотация. В работе проводится квалификация полудискретных уравнений гиперболического типа. Исследуется класс уравнений вида

$$\frac{du_{n+1}}{dx} = f\left(\frac{du_n}{dx}, u_{n+1}, u_n\right),$$

здесь неизвестная функция $u_n(x)$ зависит от одной дискретной n и одной непрерывной x переменных. Квалификации основывается на требовании существования высших симметрий в дискретном и непрерывной направлениях. Рассматривается случай когда симметрии имеют порядок 3 в обоих направлениях. В результате получен список уравнений с требуемыми условиями.

Ключевые слова: интегрируемость, высшая симметрия, классификация, полудискретное уравнение, гиперболический тип.

В этой работе исследуются полудискретные уравнения гиперболического типа

$$u_{n+1,x} = f(u_{n,x}, u_{n+1}, u_n, x), \quad (0.1)$$

^{*}Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-11-00006, <https://rscf.ru/project/21-11-00006/>.

[†]Институт математики с вычислительным центром Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Уфа, Россия.

где неизвестная функция $u_n(x)$ зависит от одной дискретной n и одной непрерывной x переменных. Здесь и ниже используется обозначение

$$u_{k,x} = \frac{du_k}{dx}, \quad u_{k,xx} = \frac{d^2u_k}{dx^2}, \quad u_{k,xxx} = \frac{d^3u_k}{dx^3}.$$

Наиболее известным представителем этого класса является одевающая цепочка, подробное исследование которой проведено в статье А.П. Велсова и А.Б. Шабата [1]

$$u_{n+1,x} + u_{n,x} = u_{n+1}^2 - u_n^2, \quad (0.2)$$

которая возникла как преобразование Бэклунда для модифицированного уравнения Кортевега де Вриза:

$$u_{n,t} = u_{n,xxx} - 6u_n^2u_{n,x}. \quad (0.3)$$

С другой стороны уравнение (0.3) можно рассматривать как высшую симметрию уравнения (0.2). По дискретному направлению высшая симметрия уравнения (0.2) имеет вид

$$u_{n,\tau} = \frac{1}{u_{n+1} + u_n} - \frac{1}{u_n + u_{n-1}} \quad (0.4)$$

и является известным дифференциально-разностным уравнением [2, 3]. В статье Р.И. Ямилова [4] был приведен ряд примеров троек уравнений типа (0.2)-(0.4).

В недавней работе [5] был предложен метод построения высших симметрий уравнений вида (0.1). Было показано, что высшая симметрия в непрерывном направлении является эволюционным уравнением вида:

$$u_t = \frac{d^N u_n}{dt^N} + F \left(x, u_n, \frac{du_n}{dt}, \dots, \frac{d^{N-1}u_n}{dt^{N-1}} \right). \quad (0.5)$$

Такие уравнения называются уравнениями с постоянной сепарантой [6]. С другой стороны полудискретного уравнения вида (0.1) совместное с уравнением вида (0.5) можно рассматривать как автопреобразование Бэклунда. Поэтому уравнения (0.5) сами по себе также являются интегрируемыми уравнениями. Список таких уравнений порядков 3 и 5 был приведен в обзоре [6], в нем также подробно изложена история вопроса. Уравнения вида (0.5) при $N = 3$ были проклассифицированы в работе [7].

В этой работе мы будем рассматривать уравнения S -интегрируемые¹ уравнения третьего порядка и для них искать полудискретные уравнения вида (0.1). Список таких уравнений третьего порядка имеет вид:

$$u_t = u_{xxx} - 3uu_x, \quad (0.6)$$

$$u_t = u_{xxx} - 6u^2u_x, \quad (0.7)$$

$$u_t = u_{xxx} + 6u_x^2, \quad (0.8)$$

$$u_t = u_{xxx} - \frac{1}{2}u_x^3 - \frac{2}{3}(b_1e^{2u} + b_2e^{-2u})u_x, \quad (0.9)$$

$$u_t = u_{xxx} - \frac{3u_xu_{xx}^2}{2(u_x^2 + 1)} + b_1(u_x^2 + 1)^{3/2} + b_2u_x^3, \quad (0.10)$$

$$u_t = u_{xxx} - \frac{3}{2}\frac{u_{xx}^2}{u_x} + \frac{Q(u)}{u_x}, \quad (0.11)$$

$$u_t = u_{xxx} - \frac{3((Q(u) + u_x^2)_x)^2}{8u_x(Q(u) + u_x^2)} + \frac{1}{2}Q''(u)u_x, \quad (0.12)$$

$$u_t = u_{xxx} - \frac{3u_{xx}^2}{2u_x}, \quad (0.13)$$

$$u_t = u_{xxx} - \frac{3u_{xx}^2}{4u_x} + b_1u_x^{3/2} - 3b_2^2u_x^2, \quad b_1 \neq 0 \text{ или } b_2 \neq 0, \quad (0.14)$$

Здесь $Q = b_0 + b_1u + b_2u^2 + b_3u^3 + b_4u^4$ — произвольный многочлен, b_i — произвольные постоянные.

Приведенный список уравнений отличается от списка работы [6] переобозначением констант и уравнениями (0.11) и (0.12), которые приведены в точно эквивалентном виде без использования функции Вейерштрасса.

Известно, что при дробно-линейных преобразованиях

$$u = \frac{z_1\tilde{u} + z_2}{z_3\tilde{u} + z_4} \quad (0.15)$$

многочлен Q меняется по закону

$$\tilde{Q}(\tilde{u}) = Q\left(\frac{z_1\tilde{u} + z_2}{z_3\tilde{u} + z_4}\right) (z_3\tilde{u} + z_4)^4 (z_1z_4 - z_2z_3)^{-2}.$$

¹Терминология принадлежит F. Calogero

В зависимости от структуры кратных корней многочлен Q может быть приведен преобразованием (0.15) и растяжениями x и t к одной из следующих канонических форм: $Q(x) = x(x-1)(x-k)$, $Q(x) = x(x-1)$, $Q(x) = x^2$, $Q(x) = x$, $Q(x) = 1$ и $Q(x) = 0$.

Использование C -интегрируемых уравнений приводит только к Дарбу интегрируемым или линейным уравнениям гиперболического типа, которые представляют меньший интерес.

Высшие симметрии в дискретном направлении являются уравнениями типа Вольтерры:

$$u_{n,\tau} = G(u_{n-1}, u_n, u_{n+1}). \quad (0.16)$$

Полный список интегрируемых уравнений такого типа получен в работе [3], более подробное изложение в обзоре [2].

В работе ищутся только автономные по дискретной переменной n уравнения вида (0.1) и соответственно используются только автономные высшие симметрии (0.6–0.14). Это, с одной стороны, является упрощением задачи, но, с другой стороны, не известно неавтономных уравнений вида (0.1) совместных с дискретной высшей симметрией (возможно неавтономной) вида (0.16). Отметим, что полученные ответы содержат дополнительные произвольные константы, вместо этих констант можно брать функции зависящие от n , при этом останется совместность с непрерывными высшими симметриями.

В полностью дискретном случае, существуют автономные уравнения, у которых одна из высших симметрий имеет порядок 3 и является неавтономной, а высшая симметрия в другом направлении имеет больший порядок, см. [8–10]. Подобные уравнения в этой работе не исследуются. Вопрос об их существовании остается открытым.

1 Метод исследования.

Из требования совместности уравнений (0.1) и (0.5) получаем определяющее уравнение

$$V_{n+1,x} = \frac{\partial f}{\partial u_{n,x}} V_{n,x} + \frac{\partial f}{\partial u_{n+1}} V_{n+1} + \frac{\partial f}{\partial u_n} V_n, \quad (1.1)$$

где через V_n обозначена правая часть уравнения (0.5). Здесь используются обозначения:

$$V_{n,x} = \frac{d}{dx} V_n, \quad V_{n+1,x} = \frac{d}{dx} V_{n+1}$$

Если функция f , определяющая правую часть уравнения (0.1) известна, то из уравнения (1.1) можно находить правую часть высшей симметрии (0.5). Эта процедура подробно описана в работе [5]. Здесь же наоборот известна высшая симметрия, а само полудискретное уравнение не задано. Поэтому на функцию f получается сложное нелинейное уравнение. Однако уравнение содержит дополнительные переменные, от которых не зависит функция f . Наличие этих переменных позволяет получать более простые дифференциальные следствия и определить неизвестную функцию f .

2 Результаты классификации.

В данной секции приводятся найденные полудискретные уравнения и их высшие симметрии в дискретном направлении. Они сгруппированы по виду высшей симметрии в x направлении. Верно следующее утверждение:

Теорема 1 *Если невырожденное нелинейное автономное уравнение (0.1) допускает непрерывную высшую симметрию в виде одного из уравнений (0.6–0.14), то оно имеет вид (S1) – (S13). Все уравнения списка (S1) – (S13) обладают дискретными высшими симметриями вида (0.16).*

Схема доказательства. Правые части уравнений (0.6–0.14) брались в качестве функции V_n в определяющем уравнении (1.1). Для каждого из этих уравнений находились все возможные функции f – правые части уравнений (0.1). Для полученных уравнений вида (0.1) находились дискретные симметрии. Ниже приводится список найденных полудискретных уравнений (для них используется специальная нумерация вида (S...), и их дискретные высшие симметрии. Разные уравнения списка (0.6–0.14) разделяются с использованием символа ★.

★ Для уравнения (0.6) полудискретное уравнение имеет вид:

$$u_{n+1,x} + u_{n,x} = \sqrt{u_{n+1} + u_n + 2a(u_{n+1} - u_n)} \quad (S1)$$

$$u_{n,\tau} = \frac{\sqrt{u_{n+1} + u_n + 2a} - \sqrt{u_n + u_{n-1} + 2a}}{\sqrt{u_{n+1} + u_n + 2a} + \sqrt{u_n + u_{n-1} + 2a}} \quad (2.1)$$

Уравнение (2.1) это уравнение (V9) при $P(y^2) = 1$ списка из [2, p.R596].

★ Для уравнения (0.7) уравнение вида (0.1) и симметрия в дискретном направлении записываются имеют из следующих видов:

$$u_{n+1,x} + u_{n,x} = \sqrt{(u_{n+1} + u_n)^2 + 2a}(u_{n+1} - u_n) \quad (S2)$$

$$u_{n,\tau} = \frac{R(u_{n+1}, u_n, u_{n-1}) - R(u_{n+1}, u_n, u_{n+1})^{1/2} R(u_{n-1}, u_n, u_{n-1})^{1/2}}{a(u_{n+1} - u_{n-1})}, \quad (2.2)$$

$$R(u, v, w) = (u + v)(v + w) + 2a,$$

Уравнение (2.2) это (V4) при $\nu = -1$.

$$u_{n+1,x} - u_{n,x} = \sqrt{(u_{n+1} - u_n)^2 + 2a}(u_{n+1} + u_n) \quad (S3)$$

$$u_{n,\tau} = \frac{R(u_{n+1}, u_n, u_{n-1}) - R(u_{n+1}, u_n, u_{n+1})^{1/2} R(u_{n-1}, u_n, u_{n-1})^{1/2}}{u_{n+1} - u_{n-1}}, \quad (2.3)$$

$$R(u, v, w) = (u - v)(w - v) + 2a,$$

Уравнения (S2) и (S3), а также уравнения (2.2) и (2.3) связаны неавтономной точечной заменой $\tilde{u}_n = (-1)^n u_n$.

Замечание. Одевающая цепочка (0.2) и ее высшая симметрия (0.4) получаются из (S2) и (2.2) в пределе $a \rightarrow 0$. Подобный предел в уравнении (S3) приводит к уравнению интегрируемому по Дарбу

$$u_{n+1,x} - u_{n,x} = u_{n+1}^2 - u_n^2.$$

★ Для уравнения (0.8) получаем:

$$u_{n+1,x} + u_{n,x} = -(u_{n+1} - u_n)^2 + a(u_{n+1} - u_n) + a_1 \quad (S4)$$

$$u_{n,\tau} = \frac{1}{u_{n+1} - u_{n-1} + a} + c, \quad (2.4)$$

Уравнение (2.4) это (V4) при $\nu = 0$, $R(u, v, w) = 1$, c отвечает за точечную симметрию, константу a можно сделать равной нулю за счет неавтономного преобразования $\tilde{u}_n = u_n + an/2$.

★ Для уравнения (0.9) имеются 2 случая в зависимости от параметров:

1. В случае $b_1 \neq 0$ или $b_2 \neq 0$ получаем две пары уравнений:

$$u_{n+1,x} = -u_{n,x} + (e^{-u_{n+1}} \pm e^{-u_n}) \sqrt{b_1 e^{2u_{n+1}+2u_n} \pm 2ae^{u_{n+1}+u_n} + b_2}, \quad (\text{S5})$$

$$u_{n,\tau} = e^{-u_n} \frac{R(e^{u_{n+1}}, e^{u_n}, e^{u_{n-1}}) - R_1(e^{u_{n+1}}, e^{u_n})^{1/2} R_1(e^{u_{n-1}}, e^{u_n})^{1/2}}{e^{u_{n+1}} - e^{u_{n-1}}}, \quad (2.5)$$

$$R(u, v, w) = b_1 v^2 u w \pm av(u+w) + b_2, \quad R_1(v, u) = R(v, u, w).$$

Уравнения с разными знаками связаны заменой $\tilde{u}_n = u_n + In\pi$, $\tilde{x} = (-1)^{n+1}x$ (здесь и ниже I – мнимая единица, т.е. $I^2 = -1$), которая в уравнение (0.9) меняет $\tilde{t} = (-1)^{n+1}t$.

$$u_{n+1,x} = u_{n,x} + (b_1^{1/2} \pm b_2^{1/2} e^{-u_{n+1}-u_n}) \sqrt{e^{2u_{n+1}} \pm 2ae^{u_{n+1}+u_n} + e^{2u_n}}, \quad (\text{S6})$$

$$u_{n,\tau} = e^{-u_n} \frac{R(e^{u_{n+1}}, e^{u_n}, e^{u_{n-1}}) - R_1(e^{u_{n+1}}, e^{u_n})^{1/2} R_1(e^{u_{n-1}}, e^{u_n})^{1/2}}{e^{u_{n+1}} - e^{u_{n-1}}}, \quad (2.6)$$

$$R(u, v, w) = v^2 \pm a(u+w) + uw, \quad R_1(v, u) = R(v, u, w).$$

Уравнения с разными знаками связаны преобразованием $\tilde{u}_n = u_n + In\pi$, которая не изменяет уравнение (0.9).

2. При $b_1 = b_2 = 0$ допускается еще одно дополнительное уравнение:

$$u_{n+1,x} = \pm u_{n,x} + a_1 e^{(\pm u_n + u_{n+1})/2} + a_2 e^{-(\pm u_n + u_{n+1})/2}, \quad (\text{S7})$$

$$u_{n,\tau} = \frac{e^{u_{n+1}/2} - e^{u_{n-1}/2}}{e^{u_{n+1}/2} + e^{u_{n-1}/2}} \quad (2.7)$$

Уравнения с разными знаками связаны заменой $\tilde{u}_n = (-1)^n u_n$, $a_1 \leftrightarrow a_2$.

★ Для уравнения (0.10) полудискретное гиперболическое уравнение имеет вид:

$$\operatorname{arcsinh} u_{n+1,x} - a \operatorname{arcsinh} u_{n,x} = g(u_{n+1} + bu_n), \quad (\text{S8})$$

где параметры a, b и функция $g(x)$ определяются из условий:

$$\begin{aligned} a &= \pm 1, \quad b = \pm 1, \quad b_1(a+1) = 0, \\ g(x) &= \ln(ab) + \ln \frac{(y(x) + b_1 + c)^2 + 2c(b_2 - b_1)}{(y(x) + b_1 - c)^2 + 2c(b_2 + b_1)}, \\ y' &= \frac{((y + b_1)^2 + c(c + 2b_2) - 2cy)((y + b_1)^2 + c(c + 2b_2) + 2cy)}{8c^{3/2}y}. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Высшая симметрия в дискретном направлении имеет вид:

$$u_{n,\tau} = h_1 + \frac{h_2(1-b) - 2ah_1(1+b)}{2y(u_{n+1} + bu_n)y^b(u_n + bu_{n-1}) - a(b+1) - a(1-b)(b_1^2 + 4b_2c + c^2)}. \quad (2.9)$$

Она в зависимости от a, b имеет представления:

1) При $a = 1, b = 1$ имеем $b_1 = 0$ и получаем уравнение (V9) так как уравнение на $y(x)$ имеет только четные степени неизвестной функции:

$$u_{n,\tau} = h_1 \frac{y(u_{n+1} + u_n) - y(u_n + u_{n-1})}{y(u_{n+1} + u_n) + y(u_n + u_{n-1})} \quad (2.10)$$

2) При $a = -1, b = 1$ получаем уравнение (V10):

$$u_{n,\tau} = h_1 \frac{y(u_{n+1} + u_n) + y(u_n + u_{n-1})}{y(u_{n+1} + u_n) - y(u_n + u_{n-1})} \quad (2.11)$$

3) При $a = \pm 1, b = -1$ и получаем уравнение (V11):

$$\begin{aligned} u_{n,\tau} &= h_1 + \frac{ah_2}{2(b_1^2 + 2b_2c + c^2)} \frac{(y_1(u_{n+1} - u_n) + 1)(y_1(u_n - u_{n-1}) + 1)}{y_1(u_{n+1} - u_n) + y_1(u_n - u_{n-1})}, \\ y &= \frac{y_1 - 1}{y_1 + 1} \sqrt{-a(b_1^2 + 2b_2c + c^2)}, \\ y_1' &= (a + 1) \frac{c(y_1^2 + 1)^2 + 8b_2y_1^2}{8c^{1/2}(1 - y_1^2)} \\ &+ (a - 1) \frac{b_1^2(y_1^4 + 1) + b_1(y_1^4 - 1)\sqrt{b_1^2 + 2b_2c + c^2} + cb_2(y_1^2 + 1)^2 + 2c^2y_1^2}{4c^{3/2}(1 - y_1^2)}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

★ Для уравнения Кричивера-Новикова (0.11) получаем полудискретное уравнение

$$\begin{aligned} u_{n+1,x}u_{n,x} &= a_1u_{n+1}^2u_n^2 + a_2u_{n+1}u_n(u_{n+1} + u_n) \\ &+ a_3(u_{n+1}^2 + u_n^2) + a_5u_{n+1}u_n \\ &+ a_6(u_{n+1} + u_n) + a_9, \end{aligned} \quad (S9)$$

коэффициенты уравнений связаны формулами

$$\begin{aligned} b_4 &= -6a_1a_3 + 3a_2^2/2, & b_3 &= -6a_1a_6 - 6a_2a_3 + 3a_2a_5, \\ b_2 &= -6a_2a_9 - 3a_2a_6 - 6a_3^2 + 3a_5^2/2, \\ b_1 &= -6a_2a_9 - 6a_3a_6 + 3a_5a_6, & b_0 &= -6a_3a_9 + 3a_6^2/2. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Уравнение (S9) найдено в работе [11]. Его высшая симметрия в n направлении является известной дискретизацией уравнения Кричевера-Новикова [2]:

$$u_{n,\tau} = \frac{R(u_{n+1}, u_n, u_{n-1})}{u_{n+1} - u_{n-1}}, \quad R(u, v, w) = 2uw(a_1v^2 + a_2v + a_3) + (u + w)(a_2v^2 + a_5v + a_6) + 2a_3v^2 + 2a_6v + 2a_9. \quad (2.14)$$

★ Для уравнения (0.12) есть разные подслучаи в зависимости от функции $Q(x)$. При $Q(x) = 0$ уравнение (0.12) совпадает с уравнением (0.13), которое описано ниже. При $Q(x) \neq 0$ все полудискретные уравнения записываются в виде:

$$\operatorname{arcsinh} \frac{u_{n+1,x}}{\sqrt{Q(u_{n+1})}} - a \operatorname{arcsinh} \frac{u_{n,x}}{\sqrt{Q(u_n)}} = \operatorname{arccosh} \frac{aA(u_{n+1}, u_n)}{\sqrt{Q(u_{n+1})}\sqrt{Q(u_n)}}, \quad a = \pm 1. \quad (S10)$$

Почти все дискретные симметрии имеют представление:

$$u_{n,\tau} = \frac{R(u_{n-1}, u_n, u_{n+1}) + \nu R(u_{n-1}, u_n, u_{n-1})^{1/2} R(u_{n+1}, u_n, u_{n+1})^{1/2}}{u_{n+1} - u_{n-1}} \quad (2.15)$$

Для таких представлений функции A и R являются полиномиальными. Выпишем их для пяти канонических форм полинома $Q(x)$:

1. При $Q(x) = x(x-1)(x-k)$ есть 4 разных ответа:

$$\begin{aligned} A(u, v) &= b(u-v)^2 - uv/2(u+v+2k+2) - k/2(u+v), \\ &\quad \nu = a, \\ R(v, u, w) &= (u+2b)^2vw + (-2bu^2 - (4b^2 - 4bk - 4b + k)u - 2kb)(v+w) + (2bu - k)^2; \end{aligned} \quad (2.16)$$

$$\begin{aligned} A(u, v) &= b(k(u+v-1) - uv)^2 - k/2(u^2 + v^2 - u - v) \\ &\quad + uv/2(u+v-2), \\ &\quad \nu = -a, \\ R(v, u, w) &= (2bu + 2bk - 1)^2vw + (-2b(2bk - 1)u^2 + (4b^2k^2 + 4b^2k - 4b - 1)u - 2bk(2bk - 1))(v+w) \\ &\quad + (2bku - 2bk - u)^2; \end{aligned} \quad (2.17)$$

$$\begin{aligned}
A(u, v) &= b(uv - k)^2 + uv/2(u + v - 2) + k/2(u + v - 2uv), \\
&\quad \nu = -a, \\
R(v, u, w) &= (2bu + 1)^2vw + (2bu^2 - (4b^2k + 4bk + 4b + 1)u \\
&\quad + 2bk)(v + w) + (2bk + u)^2;
\end{aligned} \tag{2.18}$$

$$\begin{aligned}
A(u, v) &= b(uv - u - v + k)^2 + u^2/2(v - 1) + v^2/2(u - 1) \\
&\quad + k/2(u + v - 2uv), \\
&\quad \nu = -a, \\
R(v, u, w) &= (2bu - 2b + 1)^2vw + (-2b(2b - 1)u^2 \\
&\quad + (4b^2k + 4b^2 - 4b - 1)u - 2bk(2b - 1))(v + w) \\
&\quad + (2bk - 2bu + u)^2;
\end{aligned} \tag{2.19}$$

2. При $Q(x) = x(x-1)$ есть 3 разных ответа. Два из них S -интегрируемые

$$\begin{aligned}
A(u, v) &= (u - v)^2b - uv + 1, \quad \nu = a, \\
R(v, u, w) &= b^2vw - bu(b + 1)(v + w) + b^2u^2 + 2b + 1;
\end{aligned} \tag{2.20}$$

$$\begin{aligned}
A(u, v) &= (u + v)^2b - uv - 1, \quad \nu = -a \\
R(v, u, w) &= b^2vw + bu(b - 1)(v + w) + b^2u^2 - 2b + 1.
\end{aligned} \tag{2.21}$$

И одно Дарбу интегрируемое уравнение при

$$A(u, v) = b + uv, \tag{2.22}$$

с интегралами

$$\begin{aligned}
W_1 &= \frac{(z_1 + \sqrt{z_1^2 - (u_n^2 - 1)(b^2 - 1)})(z_2 + \sqrt{z_2^2 - (u_n^2 - 1)(b^2 - 1)})^a}{(u_n^2 - 1)^{(a+1)/2}}, \\
z_1 &= bu_n + u_{n-1}, \quad z_2 = bu_n + u_{n+1}, \\
W_2 &= a^n \frac{u_{n,xx} + u_n}{\sqrt{u_{n,x}^2 + u_n^2 - 1}}
\end{aligned} \tag{2.23}$$

3. При $Q(x) = x^2$ есть 2 разных ответа:

$$\begin{aligned}
A(u, v) &= b(cuv + 1)^2 + uv, \quad \nu = -a \\
R(v, u, w) &= bc^2u^2vw + u(bc + 1)(v + w) + b;
\end{aligned} \tag{2.24}$$

$$\begin{aligned}
A(u, v) &= b(cv + u)^2 - uv, \\
R(v, u, w) &= bc(vw + u^2) + u(bc - 1)(v + w); \\
u_\tau &= \frac{R(u_{n-1}/c, u_n, cu_{n+1}) - aR(u_{n-1}/c, u_n, u_{n-1}/c)^{1/2}R(cu_{n+1}, u_n, cu_{n+1})^{1/2}}{c^2u_{n+1} - u_{n-1}}
\end{aligned} \tag{2.25}$$

С помощью неавтономной замены $u_n = c^{-n}v_n$ можно добиться значения $c = 1$.

4. При $Q(x) = x$ есть 2 разных ответа:

$$\begin{aligned}
A(u, v) &= b(u - v)^2/2 - u/2 - v/2, \\
R(v, u, w) &= b^2vw - b(bu + 1)(v + w) + (bu - 1)^2;
\end{aligned} \tag{2.26}$$

и интегрируемое по Дарбу уравнение при

$$A(u, v) = b/2 + u/2 + v/2. \tag{2.27}$$

Его интегралы имеют вид

$$\begin{aligned}
W_1 &= \frac{\left(z_1 + \sqrt{z_1^2 + 8bu_n}\right) \left(z_2 + \sqrt{z_2^2 + 8bu_n}\right)^a}{u_n^{(a+1)/2}}, \\
z_1 &= 2b - u_n + u_{n-1}, \quad z_2 = 2b - u_n + u_{n+1} \\
W_2 &= a^n \frac{2u_{n,xx} + 1}{\sqrt{u_{n,x}^2 + u_n}}
\end{aligned} \tag{2.28}$$

5. При $Q(x) = 1$ есть 2 разных ответа:

$$\begin{aligned}
A(u, v) &= b(u + v + c)^2 + 1, \\
R(v, u, w) &= b(v + u + c)(w + u + c) + 2;
\end{aligned} \tag{2.29}$$

$$\begin{aligned}
A(u, v) &= b(u - v - c)^2 - 1, \\
u_\tau &= \frac{2 + b(c + u_{n-1} - u_n)(c + u_n - u_{n+1})}{u_{n+1} - u_{n-1} - 2c} \\
&\quad + \frac{a(2 - b(c + u_{n-1} - u_n)^2)^{1/2}(2 - b(c + u_n - u_{n+1}))^{1/2}}{u_{n+1} - u_{n-1} - 2c}.
\end{aligned} \tag{2.30}$$

С помощью неавтономной замены $u_n = v_n + cn$ можно добиться значения $c = 0$.

★ Уравнения (0.13) можно рассматривать как частный случай уравнения (0.12), поэтому ответ содержится в формуле (9):

$$u_{n+1,x}u_{n,x} = (au_{n+1}u_n + bu_{n+1} + cu_n + d)^2, \quad (\text{S11})$$

$$u_{n,\tau} = \frac{h_1(au_{n+1}u_n + bu_{n+1} + cu_n + d)(au_nu_{n-1} + bu_n + cu_{n-1} + d)}{a(b-c)u_{n+1}u_{n-1} + (b^2 - ad)u_{n+1} - (c^2 - ad)u_{n-1} + d(b-c)} + h_2(au_n^2 + (b+c)u_n + d) \quad (\text{2.31})$$

Эти уравнения в переменной

$$v_n = \frac{2au_n - A + b + c}{2au_n + A + b + c} \left(\frac{A + b - c}{A - b + c} \right)^n, \quad A = \sqrt{(b+c)^2 - 4ad}$$

имеют наиболее простой вид:

$$\begin{aligned} v_{n+1,x}v_{n,x} &= (v_{n+1} + v_n)^2(bc - ad), \\ v_{n,\tau} &= h_1 \frac{(v_{n+1} + v_n)(v_n + v_{n-1})}{v_{n+1} - v_{n-1}} + h_2Av_n \end{aligned} \quad (\text{2.32})$$

А также Дарбу интегрируемые уравнения:

$$u_{n+1,x} = u_{n,x}A(u_{n+1,0}, u_{n,0}), \quad A_y(z, y) + A(z, y)A_z(z, y) = 0 \quad (\text{S12})$$

$$W_1 = A(u_{n+1}, u_n), \quad \frac{d}{dx}W_1 = 0, \quad (\text{2.33})$$

$$W_2 = u_{n,xx}/u_{n,x}, \quad TW_2 = W_2.$$

$$\begin{aligned} u_{n+1,x} &= \frac{u_{n,x}}{(A(u_{n+1,0}, u_{n,0})u_{n,0} + g(A(u_{n+1,0}, u_{n,0})))^2}, \\ A_y(z, y) + \frac{A_z(z, y)}{(A(z, y)z + g(A(z, y)))^2} &= 0, \end{aligned} \quad (\text{2.34})$$

$$\begin{aligned} W_1 &= A(u_{n+1}, u_n), \quad \frac{d}{dx}W_1 = 0, \\ W_2 &= 2\frac{u_{n,xxx}}{u_{n,x}} - 3\frac{u_{n,xx}^2}{u_{n,x}^2}, \quad TW_2 = W_2. \end{aligned} \quad (\text{2.35})$$

Такие уравнения были найдены в работе [12].

★ Для уравнения (0.14) ответы существуют лишь при $b_1 = 0$ и имеют вид

$$\sqrt{u_{n+1,x}} \pm \sqrt{u_{n,x}} = \pm b_2 \sqrt{(u_n - u_{n+1} + a)^2 - b} \quad (\text{S13})$$

$$u_{n,\tau} = h_1 \frac{R(u_{n-1}, u_n, u_{n+1}) - \sqrt{R_1(u_{n-1}, u_n)} \sqrt{R_1(u_{n+1}, u_n)}}{u_{n+1} - u_{n-1} - 2a} + h_2, \quad (2.36)$$

$$R(v, u, w) = (u - v - a)(u - w + a) - b, \quad R_1(v, u) = R(v, u, v).$$

Константу a можно убрать неавтономным преобразованием $\tilde{u}_n = u_n + an$

3 Обсуждение результатов.

Ряд примеров полученных в предыдущем параграфе можно представить в одной из следующих форм:

$$\frac{d}{dx} \psi(u_{n+1}, u_n) = \varphi(u_{n+1}, u_n) \quad (3.1)$$

или

$$\Psi(u_{n+1,x}, u_{n+1}) = \Phi(u_{n,x}, u_n). \quad (3.2)$$

Например, в виде (3.1) можно записать уравнения (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7), а в виде (3.2) уравнения (S2,S3) при $a = 0$, (S6,S7) при $a = \pm\sqrt{c_1 c_2}$ и $a = \pm 1$ соответственно, уравнения вида (S10) также можно представить в таком виде при специальном выборе параметров (когда функция $R(v, u, v)$ является полным квадратом). Некоторые из уравнений допускают оба представления.

Для уравнений вида (3.1) и (3.2) можно ввести замены переменных обратимые на решениях. Так, для уравнения (3.1) можно обозначить

$$v_n = \psi(u_{n+1}, u_n),$$

тогда в силу (3.1) имеем

$$v_{n,x} = \varphi(u_{n+1}, u_n).$$

В случаях, когда существует обратная замена

$$u_n = \tilde{\psi}(v_{n,x}, v_n), \quad u_{n+1} = \tilde{\varphi}(v_{n,x}, v_n),$$

на новую функцию v_n получаем полудискретное уравнение вида (3.2):

$$\tilde{\psi}(v_{n+1,x}, v_{n+1}) = \tilde{\varphi}(v_{n,x}, v_n).$$

Видно, что аналогичным образом можно строить замены от уравнений вида (3.2) к уравнениям вида (3.1). Замены такого вида рассматривались ранее в [4, 13, 14]. При таких заменах высшие симметрии также пересчитываются [4]. Поэтому часть из перечисленных уравнений содержится в работе [4], в частности, уравнения вида (S10) в случаях, когда функция $R(v, u, v)$ является полным квадратом. Остальные уравнения кроме (S9) скорее всего являются новыми. В частности, уравнения (S8), (S10), (S13) в ситуациях общего положения.

Автор статьи выражает благодарность анонимному рецензенту доктору за критические замечания и ценные советы.

Список литературы

- [1] А.П. Веселов, А.Б. Шабат, *Одевающая цепочка и спектральная теория оператора Шрёдингера*, Функц. анализ и его прил., **27**:2, 1–21 (1993).
- [2] R. Yamilov, *Symmetries as integrability criteria for differential difference equations*. Journal of Physics A: Mathematical and General, **39**(45), R541 (2006).
- [3] Р.И. Ямилов, *О классификации дискретных эволюционных уравнений*, Успехи мат. наук **38**:6, 155–156 (1983).
- [4] Р.И. Ямилов, *Обратимые замены переменных, порожденные преобразованиями Беклунда*, Теор. и мат. физ. **85**:3, 368–375 (1990).
- [5] R.N.Garifullin and I.T.Habibullin *Generalized symmetries and integrability conditions for hyperbolic type semi-discrete equations*, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, **54**:20, 205201, 19 pp (2021).
- [6] А.Г. Мешков, В.В. Соколов, *Интегрируемые эволюционные уравнения с постоянной сепарантой*, Уфимск. матем. журн., **4**:3, 104–154 (2012). [Engl. trans.: Ufa Math. Journal **4**:3. 104–152 (2012).]
- [7] С. И. Свинолулов, В. В. Соколов, *Об эволюционных уравнениях с нетривиальными законами сохранения*, Функц. анализ и его прил., **16**:4 (1982), 86–87; Funct. Anal. Appl., **16**:4 (1982), 317–319

- [8] R.N. Garifullin and R.I. Yamilov, *Generalized symmetry classification of discrete equations of a class depending on twelve parameters*, J. Phys. A: Math. Theor. **45** (2012) 345205 (23pp).
- [9] Р. Н. Гарифуллин, А. В. Михайлов, Р. И. Ямилов, *Дискретное уравнение на квадратной решетке с нестандартной структурой высших симметрий*, ТМФ, **180**:1 (2014), 17–34.
- [10] Р. Н. Гарифуллин, Р. И. Ямилов, *Необычная серия автономных дискретных интегрируемых уравнений на квадратной решетке*, ТМФ, **200**:1 (2019), 50–71.
- [11] V. E. Adler, *Bäcklund transformation for the Krichever-Novikov equation*, International Mathematics Research Notices, **1998**:1, 1-4 (1998).
- [12] С. Я. Старцев, *Интегрируемые по Дарбу дифференциально-разностные уравнения, допускающие интеграл первого порядка*, Уфимск. матем. журн., **4**:3 (2012), 161-176
- [13] R.I. Yamilov, *On the construction of Miura type transformations by others of this kind*, Phys. Lett. A **173** (1993) 53–57.
- [14] S.Ya. Startsev, *Non-Point Invertible Transformations and Integrability of Partial Difference Equations*, SIGMA, **10** (2014), 066, 13 pages.