

---

# PLATITUDE DES TISSUS DUAUX DE CERTAINS PRÉ-FEUILLETAGES CONVEXES DU PLAN PROJECTIF COMPLEXE

par

Samir BEDROUNI

---

**Abstract.** — A holomorphic pre-foliation  $\mathcal{F} = C \boxtimes \mathcal{F}$  on  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  is the data of a reduced complex projective curve  $C$  of  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  and a holomorphic foliation  $\mathcal{F}$  on  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ . When the foliation  $\mathcal{F}$  is convex and the curve  $C$  is invariant by  $\mathcal{F}$ , we speak of convex pre-foliation. In a previous paper, we showed that if a foliation  $\mathcal{F}$  on  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  is reduced convex or homogeneous convex and if  $C$  is an invariant line of  $\mathcal{F}$ , then the dual web of the convex pre-foliation  $C \boxtimes \mathcal{F}$  is flat. In this paper, we propose to extend this result to the case of a curve  $C$  consisting of several invariant lines.  
*2010 Mathematics Subject Classification.* — 14C21, 32S65, 53A60.

**Résumé.** — Un pré-feuilletage holomorphe  $\mathcal{F} = C \boxtimes \mathcal{F}$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  est la donnée d'une courbe projective complexe réduite  $C$  de  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  et d'un feuilletage holomorphe  $\mathcal{F}$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ . Lorsque le feuilletage  $\mathcal{F}$  est convexe et que la courbe  $C$  est invariante par  $\mathcal{F}$ , on parle de pré-feuilletage convexe. Dans un article précédent, nous avons montré que si un feuilletage  $\mathcal{F}$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  est convexe réduit ou homogène convexe et si  $C$  est une droite invariante de  $\mathcal{F}$ , alors le tissu dual du pré-feuilletage convexe  $C \boxtimes \mathcal{F}$  est plat. Nous nous proposons ici d'étendre ce résultat au cas d'une courbe  $C$  composée de plusieurs droites invariantes. *Classification mathématique par sujets (2010).* — 14C21, 32S65, 53A60.

## 1. Introduction

Cet article poursuit l'étude, commencée dans [3], de la platitude des tissus duaux des pré-feuilletages du plan projectif complexe. Pour les définitions et notations concernant les feuilletages et les tissus de  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ , nous renvoyons à [2, Sections 1 et 2].

**1.1. Pré-feuilletages convexes du plan projectif complexe.** — Commençons par rappeler la définition d'un pré-feuilletage sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ .

**Définition 1 ([3]).** — Soient  $0 \leq k \leq d$  des entiers. Un *pré-feuilletage holomorphe*  $\mathcal{F}$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  de *co-degré*  $k$  et de *degré*  $d$ , ou simplement de *type*  $(k, d)$ , est la donnée d'une courbe projective complexe réduite  $C \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  de degré  $k$  et d'un feuilletage holomorphe  $\mathcal{F}$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  de degré  $d - k$ . On note  $\mathcal{F} = C \boxtimes \mathcal{F}$ . On dit que  $\mathcal{F}$  (resp.  $C$ ) est le *feuilletage associé* (resp. la *courbe associée*) à  $\mathcal{F}$ .

---

**Mots clefs.** — pré-feuilletage, pré-feuilletage convexe, pré-feuilletage homogène, tissu, tissu dual, platitude.

Les pré-feuilletages de type  $(0, d)$  sont précisément les feuilletages de degré  $d$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ .

Rappelons (voir [4]) qu'un feilletage holomorphe sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  est dit *convexe* si ses feuilles qui ne sont pas des droites n'ont pas de points d'inflexion. Notons (voir [5]) que si  $\mathcal{F}$  est un feilletage de degré  $d \geq 1$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ , alors  $\mathcal{F}$  ne peut avoir plus de  $3d$  droites invariantes (distinctes). En outre, si cette borne est atteinte, alors  $\mathcal{F}$  est nécessairement convexe; dans ce cas  $\mathcal{F}$  est dit *convexe réduit*.

Dans cet article, nous nous intéressons à une classe particulière de pré-feuilletages, à savoir :

**Définition 2** ([3]). — Soit  $\mathcal{F} = C \boxtimes \mathcal{F}$  un pré-feilletage sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ . On dit que  $\mathcal{F}$  est *convexe* (resp. *convexe réduit*) si le feilletage  $\mathcal{F}$  est convexe (resp. convexe réduit) et si de plus la courbe  $C$  est invariante par  $\mathcal{F}$ .

Il s'agit d'une extension naturelle des notions de convexité et de convexité réduite des feuilletages.

**1.2. Tissus.** — Un  $d$ -tissu (régulier)  $\mathcal{W}$  de  $(\mathbb{C}^2, 0)$  est la donnée d'une famille  $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_d\}$  de feuilletages holomorphes réguliers de  $(\mathbb{C}^2, 0)$  deux à deux transverses en l'origine. On note  $\mathcal{W} = \mathcal{F}_1 \boxtimes \dots \boxtimes \mathcal{F}_d$ .

Un  $d$ -tissu (global) sur une surface complexe  $M$  est donné dans une carte locale  $(x, y)$  par une équation différentielle implicite  $F(x, y, y') = 0$ , où  $F(x, y, p) = \sum_{i=0}^d a_i(x, y)p^{d-i}$  est un polynôme (réduit) en  $p$  de degré  $d$ , à coefficients  $a_i$  analytiques, avec  $a_0$  non identiquement nul. Au voisinage de tout point  $z_0 = (x_0, y_0)$  tel que  $a_0(x_0, y_0)\Delta(x_0, y_0) \neq 0$ , où  $\Delta(x, y)$  est le  $p$ -discriminant de  $F$ , les courbes intégrales de cette équation définissent un  $d$ -tissu régulier de  $(\mathbb{C}^2, z_0)$ .

En vertu de [4], à tout pré-feilletage  $\mathcal{F} = C \boxtimes \mathcal{F}$  de degré  $d \geq 1$  et de co-degré  $k < d$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  on peut associer un  $d$ -tissu de degré 1 sur le plan projectif dual  $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$ , appelé *transformée de LEGENDRE* (ou tissu dual) de  $\mathcal{F}$  et noté  $\text{Leg}\mathcal{F}$ ; si  $\mathcal{F}$  est donné dans une carte affine  $(x, y)$  de  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  par une 1-forme  $\omega = f(x, y)(A(x, y)dx + B(x, y)dy)$ , où  $f, A, B \in \mathbb{C}[x, y]$ ,  $\text{pgcd}(A, B) = 1$ , alors, dans la carte affine  $(p, q)$  de  $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$  correspondant à la droite  $\{y = px - q\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ ,  $\text{Leg}\mathcal{F}$  est donné par l'équation différentielle implicite

$$\check{F}(p, q, x) := f(x, px - q)(A(x, px - q) + pB(x, px - q)) = 0, \quad \text{avec} \quad x = \frac{dq}{dp}.$$

Lorsque  $k \geq 1$ ,  $\text{Leg}\mathcal{F}$  se décompose en  $\text{Leg}\mathcal{F} = \text{Leg}C \boxtimes \text{Leg}\mathcal{F}$  où  $\text{Leg}C$  est le  $k$ -tissu algébrique de  $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$  défini par l'équation  $f(x, px - q) = 0$  et  $\text{Leg}\mathcal{F}$  est le  $(d - k)$ -tissu irréductible de degré 1 de  $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$  décrit par  $A(x, px - q) + pB(x, px - q) = 0$ .

**1.3. Courbure et platitude.** — Rappelons brièvement la définition de la courbure d'un  $d$ -tissu avec  $d \geq 3$ . Supposons d'abord que  $d = 3$  et considérons le cas d'un germe de 3-tissu  $\mathcal{W}$  de  $(\mathbb{C}^2, 0)$  complètement décomposable,  $\mathcal{W} = \mathcal{F}_1 \boxtimes \mathcal{F}_2 \boxtimes \mathcal{F}_3$ . Pour  $i = 1, 2, 3$ , soit  $\omega_i$  une 1-forme à singularité isolée en 0 définissant le feilletage  $\mathcal{F}_i$ . Sans perdre de généralité, on peut supposer que les 1-formes  $\omega_i$  vérifient  $\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = 0$ . On montre qu'il existe une 1-forme méromorphe  $\eta(\mathcal{W})$ , bien définie à l'addition près d'une 1-forme fermée logarithmique  $\frac{dg}{g}$  avec  $g \in \mathcal{O}^*(\mathbb{C}^2, 0)$ , telle que  $d\omega_i = \eta(\mathcal{W}) \wedge \omega_i$  pour  $i = 1, 2, 3$ . On définit alors la courbure de  $\mathcal{W}$  comme étant la 2-forme  $K(\mathcal{W}) = d\eta(\mathcal{W})$ .

Si maintenant  $\mathcal{W}$  est un  $d$ -tissu complètement décomposable,  $\mathcal{W} = \mathcal{F}_1 \boxtimes \dots \boxtimes \mathcal{F}_d$  avec  $d > 3$ , on définit la courbure  $K(\mathcal{W})$  de  $\mathcal{W}$  comme étant la somme des courbures des sous-3-tissus de  $\mathcal{W}$ .

On peut vérifier que  $K(\mathcal{W})$  est une 2-forme méromorphe à pôles le long du discriminant  $\Delta(\mathcal{W})$  de  $\mathcal{W}$ , canoniquement associée à  $\mathcal{W}$ .

Si enfin  $\mathcal{W}$  est un  $d$ -tissu sur une surface complexe  $M$  (non forcément complètement décomposable), alors on peut le transformer en un  $d$ -tissu complètement décomposable au moyen d'un revêtement galoisien ramifié. L'invariance de la courbure de ce nouveau tissu par l'action du groupe de GALOIS permet de la redescendre en une 2-forme  $K(\mathcal{W})$  méromorphe globale sur  $M$ , à pôles le long du discriminant de  $\mathcal{W}$ , voir [4].

Un tissu de courbure nulle est dit plat. Lorsque  $M = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  la platitude d'un tissu  $\mathcal{W}$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  se caractérise par l'holomorphie de sa courbure  $K(\mathcal{W})$  le long des points génériques de  $\Delta(\mathcal{W})$ .

**1.4. Résultats.** — Dans [3, Théorème E] nous avons montré que le tissu dual d'un pré-feuilletage  $\mathcal{F} = C \boxtimes \mathcal{F}$  convexe réduit sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  de co-degré 1 (i.e. dont la courbe  $C$  est une droite invariante de  $\mathcal{F}$ ) est plat. Le théorème suivant, démontré au §2, étend ce résultat au cas de plusieurs droites invariantes.

**Théorème 1.** — Soit  $\mathcal{F} = C \boxtimes \mathcal{F}$  un pré-feuilletage convexe réduit sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ , dont la courbe associée  $C$  est formée de droites invariantes de  $\mathcal{F}$ . Alors le tissu  $\text{Leg}\mathcal{F}$  est plat.

Suivant [3, Définition B], un pré-feuilletage sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  est dit homogène s'il existe une carte affine  $(x, y)$  de  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  dans laquelle il est invariant sous l'action du groupe des homothéties complexes  $(x, y) \mapsto \lambda(x, y)$ ,  $\lambda \in \mathbb{C}^*$ . Un pré-feuilletage homogène  $\mathcal{H}$  de type  $(k, d)$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  est alors de la forme  $\mathcal{H} = C \boxtimes \mathcal{H}$ , où  $\mathcal{H}$  est un feuilletage homogène de degré  $d - k$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  et où la courbe  $C$  est constituée soit de  $k$  droites passant par l'origine  $O$ , soit de la droite  $L_{\infty}$  et de  $(k - 1)$  droites passant par  $O$ . Le Corollaire D de [3] affirme que si  $\mathcal{H}$  est convexe de co-degré  $k = 1$ , alors le  $d$ -tissu  $\text{Leg}\mathcal{H}$  est plat. Le théorème suivant, prouvé au §3, généralise ce résultat au cas d'un pré-feuilletage homogène convexe quelconque.

**Théorème 2.** — Le tissu dual d'un pré-feuilletage homogène convexe sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  est plat.

## 2. Preuve du Théorème 1

La démonstration de ce théorème nécessite quelques résultats intermédiaires.

**Lemme 2.1.** — Soient  $\mathcal{W} = \mathcal{F}_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \mathcal{F}_n$  un  $n$ -tissu complètement décomposable et  $\mathcal{W}'$  un autre tissu. Alors

$$K(\mathcal{W} \boxtimes \mathcal{W}') = K(\mathcal{W}) - (n - 2) \sum_{i=1}^n K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{W}') + \sum_{1 \leq i < j \leq n} K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{W}') + \binom{n-1}{2} K(\mathcal{W}').$$

*Démonstration.* — Si  $\mathcal{W}'$  est un  $d$ -tissu, alors on peut écrire localement  $\mathcal{W}' = \mathcal{F}'_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \mathcal{F}'_d$  et on a

$$K(\mathcal{W} \boxtimes \mathcal{W}') = K(\mathcal{W}) + \sum_{k=1}^d \sum_{1 \leq i < j \leq n} K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{F}'_k) + \sum_{i=1}^n \sum_{1 \leq k < k' \leq d} K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}'_k \boxtimes \mathcal{F}'_{k'}) + K(\mathcal{W}').$$

Par ailleurs, on a

$$K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{W}') = K(\mathcal{W}') + \sum_{1 \leq k < k' \leq d} K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}'_k \boxtimes \mathcal{F}'_{k'})$$

et

$$\begin{aligned} K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{W}') &= K(\mathcal{W}') + \sum_{k=1}^d K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{F}'_k) + \sum_{1 \leq k < k' \leq d} K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}'_k \boxtimes \mathcal{F}'_{k'}) + \sum_{1 \leq k < k' \leq d} K(\mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{F}'_k \boxtimes \mathcal{F}'_{k'}) \\ &= K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{W}') + K(\mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{W}') - K(\mathcal{W}') + \sum_{k=1}^d K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{F}'_k), \end{aligned}$$

d'où

$$\sum_{i=1}^n \sum_{1 \leq k < k' \leq d} K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}'_k \boxtimes \mathcal{F}'_{k'}) = -nK(\mathcal{W}') + \sum_{i=1}^n K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{W}')$$

et

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^d \sum_{1 \leq i < j \leq n} K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{F}'_k) &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{W}') - \sum_{i=1}^n (n-i) K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{W}') - \sum_{j=1}^n (j-1) K(\mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{W}') + \binom{n}{2} K(\mathcal{W}') \\ &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{W}') - (n-1) \sum_{i=1}^n K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{W}') + \binom{n}{2} K(\mathcal{W}'). \end{aligned}$$

Par suite,

$$K(\mathcal{W} \boxtimes \mathcal{W}') = K(\mathcal{W}) + \sum_{1 \leq i < j \leq n} K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{F}_j \boxtimes \mathcal{W}') - (n-2) \sum_{i=1}^n K(\mathcal{F}_i \boxtimes \mathcal{W}') + \left( \binom{n}{2} - n + 1 \right) K(\mathcal{W}'),$$

d'où l'énoncé.  $\square$

**Proposition 2.2.** — Soient  $d \geq 3$  un entier et  $\mathcal{F}$  un feuilletage convexe réduit de degré  $d-2$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ . Si  $\ell_1$  et  $\ell_2$  sont des droites  $\mathcal{F}$ -invariantes distinctes, alors le  $d$ -tissu  $\mathcal{W}_d = \text{Leg} \ell_1 \boxtimes \text{Leg} \ell_2 \boxtimes \text{Leg} \mathcal{F}$  est plat.

Pour démontrer cette proposition, nous avons besoin du lemme suivant.

**Lemme 2.3.** — Soit  $\mathcal{W}_3 = \mathcal{F}_1 \boxtimes \mathcal{F}_2 \boxtimes \mathcal{F}_3$  un germe de 3-tissu de  $(\mathbb{C}^2, 0)$ . On suppose que  $\mathcal{F}_1$  et  $\mathcal{F}_2$  sont des germes de feuilletages radiaux et que  $D := \text{Tang}(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2)$  est invariante par  $\mathcal{F}_3$ . Alors la courbure de  $\mathcal{W}_3$  a au plus des pôles simples le long de  $D$ .

*Démonstration.* — Choisissons un système de coordonnées  $(x, y)$  dans lequel  $D = \{y = 0\}$  et  $\mathcal{F}_1$ , resp.  $\mathcal{F}_2$ , resp.  $\mathcal{F}_3$ , est défini par

$$\omega_1 = dy, \quad \text{resp. } \omega_2 = xdy - ydx, \quad \text{resp. } \omega_3 = dy - y^n h(x, y) dx,$$

avec  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $h(x, 0) \neq 0$ . Un calcul direct utilisant [2, formule (1.1)] montre que la courbure de  $\mathcal{W}_3$  s'écrit sous la forme  $K(\mathcal{W}_3) = d\eta(\mathcal{W}_3)$ , où

$$\eta(\mathcal{W}_3) = \eta_0 + \frac{1}{y} \left( n + 1 - \frac{h(x, y) + x \partial_x h(x, y)}{h(x, y)(xy^{n-1} h(x, y) - 1)} \right) dy,$$

où  $\eta_0$  est une 1-forme holomorphe le long de  $D = \{y = 0\}$ , d'où le lemme.  $\square$

*Démonstration de la Proposition 2.2.* — Comme  $\text{Leg} \ell_1$  et  $\text{Leg} \ell_2$  sont des feuilletages radiaux centrés en les points duaux des droites  $\ell_1$  et  $\ell_2$  respectivement,  $\text{Tang}(\text{Leg} \ell_1, \text{Leg} \ell_2)$  est réduit à la droite duale du point  $s_0 = \ell_1 \cap \ell_2$ , qui est un point singulier de  $\mathcal{F}$  car c'est l'intersection de deux droites  $\mathcal{F}$ -invariantes. Pour  $i = 1, 2$ , posons  $\Sigma_{\mathcal{F}}^{\ell_i} := \text{Sing} \mathcal{F} \cap \ell_i$  et désignons par  $\check{\Sigma}_{\mathcal{F}}^{\ell_i}$  l'ensemble des droites duales des points de  $\Sigma_{\mathcal{F}}^{\ell_i}$ ; nous avons  $\Sigma_{\mathcal{F}}^{\ell_1} \cap \Sigma_{\mathcal{F}}^{\ell_2} = \{s_0\}$ , et en vertu de [3, Lemme 2.1],  $\text{Tang}(\text{Leg} \ell_i, \text{Leg} \mathcal{F}) = \check{\Sigma}_{\mathcal{F}}^{\ell_i}$ . Par ailleurs, comme  $\mathcal{F}$  est convexe réduit, toutes ses singularités sont non-dégénérées ([2, Lemme 6.8]); d'après [1, Lemme 2.2]  $\Delta(\text{Leg} \mathcal{F}) = \check{\Sigma}_{\mathcal{F}}^{\text{rad}}$ , où  $\check{\Sigma}_{\mathcal{F}}^{\text{rad}}$  désigne l'ensemble des droites duales des singularités radiales de  $\mathcal{F}$ . Il en résulte que

$$\Delta(\mathcal{W}_d) = \check{\Sigma}_{\mathcal{F}}^{\text{rad}} \cup \check{\Sigma}_{\mathcal{F}}^{\ell_1} \cup \check{\Sigma}_{\mathcal{F}}^{\ell_2}.$$

Fixons  $s \in \Sigma_{\mathcal{F}}^{\text{rad}} \cup \Sigma_{\mathcal{F}}^{\ell_1} \cup \Sigma_{\mathcal{F}}^{\ell_2}$ ; nous allons décrire le  $d$ -tissu  $\mathcal{W}_d$  près de la droite  $\check{s}$  duale de  $s$ . Notons  $v = \tau(\mathcal{F}, s)$  l'ordre de tangence de  $\mathcal{F}$  avec une droite générique passant par  $s$ ; alors  $s \in \Sigma_{\mathcal{F}}^{\text{rad}}$  si et seulement si  $v \geq 2$ , voir [2, §1.3]. En vertu de la Proposition 3.3 de [4] (cf. preuve de [3, Théorème E]), localement près de  $\check{s}$ , le  $(d-2)$ -tissu  $\text{Leg} \mathcal{F}$  peut se décomposer en  $\text{Leg} \mathcal{F} = \mathcal{W}'_v \boxtimes \mathcal{W}'_{d-v-2}$ , où  $\mathcal{W}'_v$  est un  $v$ -tissu irréductible laissant  $\check{s}$  invariante et dont la multiplicité du discriminant  $\Delta(\mathcal{W}'_v)$  le long de  $\check{s}$  est minimale, égale à  $v-1$ , et où  $\mathcal{W}'_{d-v-2}$  est un  $(d-v-2)$ -tissu régulier et transverse à  $\check{s}$ . Ainsi, près de la droite  $\check{s}$ , nous avons la décomposition

$$(2.1) \quad \mathcal{W}_d = \text{Leg} \ell_1 \boxtimes \text{Leg} \ell_2 \boxtimes \mathcal{W}'_v \boxtimes \mathcal{W}'_{d-v-2}.$$

Nous allons maintenant étudier l'holomorphie de la courbure de  $\mathcal{W}_d$  le long de  $\check{s}$ . Il y a trois cas à considérer :

1. Cas où  $s \notin \ell_1 \cup \ell_2$ ; alors  $s \in \Sigma_{\mathcal{F}}^{\text{rad}}$ . Dans ce cas, pour  $i = 1, 2$ ,  $\text{Leg}\ell_i$  est transverse à  $\check{s}$  et  $\check{s} \not\subset \check{\Sigma}_{\mathcal{F}}^{\ell_i} = \text{Tang}(\text{Leg}\ell_i, \text{Leg}\mathcal{F})$ ; donc  $\mathcal{W}_{d-v} := \text{Leg}\ell_1 \boxtimes \text{Leg}\ell_2 \boxtimes \mathcal{W}_{d-v-2}$  est régulier et transverse à  $\check{s}$ . Par suite, la courbure de  $\mathcal{W}_d = \mathcal{W}'_v \boxtimes \mathcal{W}_{d-v}$  est holomorphe sur  $\check{s}$  par application de [4, Proposition 2.6].
2. Cas où  $s \in \ell_i \setminus \ell_j$  avec  $\{i, j\} = \{1, 2\}$ . Alors  $\check{s}$  est invariante par  $\text{Leg}\ell_i$  et  $\text{Leg}\ell_j$  est transverse à  $\check{s}$ ; de plus  $\check{s} \not\subset \check{\Sigma}_{\mathcal{F}}^{\ell_j} = \text{Tang}(\text{Leg}\ell_j, \text{Leg}\mathcal{F})$ . Ainsi  $\mathcal{W}_d = \text{Leg}\ell_i \boxtimes \mathcal{W}'_v \boxtimes \mathcal{W}_{d-v-1}$ , où  $\mathcal{W}_{d-v-1} := \text{Leg}\ell_j \boxtimes \mathcal{W}_{d-v-2}$  est régulier et transverse à  $\check{s}$ . En appliquant [4, Théorème 1] si  $v = 1$  et [3, Proposition 3.9] si  $v \geq 2$ , nous en déduisons que  $K(\mathcal{W}_d)$  est holomorphe le long de  $\check{s}$ .
3. Cas où  $s = s_0 := \ell_1 \cap \ell_2$ . Alors  $\check{s}$  est invariante par  $\text{Leg}\ell_1$  et  $\text{Leg}\ell_2$ . Nous distinguons deux sous-cas suivant que le point singulier  $s$  est radial ou non, *i.e.* suivant que  $v = 1$  ou  $v \geq 2$ .
  - Si  $v \geq 2$  alors la courbure de  $\mathcal{W}_d$  est holomorphe sur  $\check{s}$  par application de [3, Remarque 3.10].
  - Supposons  $v = 1$ . Alors  $\mathcal{W}_d = \text{Leg}\ell_1 \boxtimes \text{Leg}\ell_2 \boxtimes \mathcal{W}_1 \boxtimes \mathcal{W}_{d-3}$ ; d'après le Lemme 2.1, nous avons

$$K(\mathcal{W}_d) = K(\text{Leg}\ell_1 \boxtimes \text{Leg}\ell_2 \boxtimes \mathcal{W}_1) + K(\text{Leg}\ell_1 \boxtimes \text{Leg}\ell_2 \boxtimes \mathcal{W}_{d-3}) - K(\mathcal{W}_1 \boxtimes \mathcal{W}_{d-3}) + K(\mathcal{W}_{d-3}) \\ + \sum_{i=1}^2 K(\text{Leg}\ell_i \boxtimes \mathcal{W}_1 \boxtimes \mathcal{W}_{d-3}) - \sum_{i=1}^2 K(\text{Leg}\ell_i \boxtimes \mathcal{W}_{d-3}).$$

Les tissus  $\mathcal{W}_{d-3}$ ,  $\mathcal{W}_1 \boxtimes \mathcal{W}_{d-3}$  et  $\text{Leg}\ell_i \boxtimes \mathcal{W}_{d-3}$  sont réguliers près de  $\check{s}$  et donc leurs courbures sont holomorphes sur  $\check{s}$ . Les courbures des tissus  $\text{Leg}\ell_1 \boxtimes \text{Leg}\ell_2 \boxtimes \mathcal{W}_{d-3}$  et  $\text{Leg}\ell_i \boxtimes \mathcal{W}_1 \boxtimes \mathcal{W}_{d-3}$  sont holomorphes le long de  $\check{s}$  par application de [4, Théorème 1]. Enfin, par le Lemme 2.3,  $K(\text{Leg}\ell_1 \boxtimes \text{Leg}\ell_2 \boxtimes \mathcal{W}_1)$  a au plus des pôles simples le long de  $\check{s}$ . Nous en déduisons qu'il en est de même pour  $K(\mathcal{W}_d)$ .

Il s'en suit que la 2-forme  $K(\mathcal{W}_d)$  est holomorphe sur  $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2 \setminus \{\check{s}_0\}$  et qu'elle a au plus des pôles simples le long de  $\check{s}_0$ . Comme le diviseur canonique de  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  est de degré  $-3$ , nous en concluons que  $K(\mathcal{W}_d)$  est identiquement nulle.  $\square$

*Démonstration du Théorème 1.* — Supposons que la courbe  $C$  soit composée de  $n \geq 1$  droites  $\mathcal{F}$ -invariantes distinctes  $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ . Comme  $\mathcal{F}$  est par hypothèse convexe réduit, le tissu  $\text{Leg}\mathcal{F}$ , resp.  $\text{Leg}\ell_i \boxtimes \text{Leg}\mathcal{F}$ , resp.  $\text{Leg}\ell_i \boxtimes \text{Leg}\ell_j \boxtimes \text{Leg}\mathcal{F}$  avec  $i \neq j$ , est plat en vertu de [4, Théorème 2], resp. [3, Théorème E], resp. la Proposition 2.2. Le Théorème 1 s'obtient alors immédiatement en appliquant le Lemme 2.1 avec  $\mathcal{W} = \text{Leg}C = \text{Leg}\ell_1 \boxtimes \text{Leg}\ell_2 \boxtimes \dots \boxtimes \text{Leg}\ell_n$  et  $\mathcal{W}' = \text{Leg}\mathcal{F}$ .  $\square$

### 3. Preuve du Théorème 2

La démonstration du Théorème 2 utilise le Lemme 2.1 et les deux propositions suivantes.

**Proposition 3.1.** — Soient  $d \geq 3$  un entier,  $\mathcal{H}$  un feuilletage homogène convexe de degré  $d - 2$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  et  $\ell$  une droite  $\mathcal{H}$ -invariante passant par l'origine. Alors le  $d$ -tissu  $\mathcal{W}_d = \text{Leg}L_{\infty} \boxtimes \text{Leg}\ell \boxtimes \text{Leg}\mathcal{H}$  est plat.

*Démonstration.* — Nous avons  $\mathcal{W}_d = \text{Leg}L_{\infty} \boxtimes \text{Leg}\mathcal{H}$ , où  $\mathcal{H} := \ell \boxtimes \mathcal{H}$ . Si le pré-feuilletage homogène  $\mathcal{H}$  est défini par la 1-forme

$$\omega = (ax + by)(A(x, y)dx + B(x, y)dy), \quad A, B \in \mathbb{C}[x, y]_{d-2}, \quad \text{pgcd}(A, B) = 1,$$

alors, dans la carte affine  $(p, q)$  de  $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$  associée à la droite  $\{y = px - q\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ , le tissu  $\text{Leg}\mathcal{H}$  est décrit par la forme symétrique

$$\check{\omega} = \left( adq + b(pdq - qdp) \right) \left( A(dq, pdq - qdp) + pB(dq, pdq - qdp) \right).$$

Par ailleurs, le feuilletage radial  $\text{Leg}L_{\infty}$  est défini par la 1-forme  $\check{\omega}_0 = dp$ ; il est aussi donné par le champ de vecteurs  $X := q \frac{\partial}{\partial q}$  qui est une symétrie du tissu  $\text{Leg}\mathcal{H}$  au sens où son flot  $\phi_t = (p, e^t q)$  préserve  $\text{Leg}\mathcal{H}$ . Comme de plus  $X$  est transverse à  $\text{Leg}\mathcal{H}$ , [3, Théorème 3.4] entraîne que  $K(\mathcal{W}_d) = K(\text{Leg}\mathcal{H})$ . Or, d'après [3, Corollaire D],  $K(\text{Leg}\mathcal{H}) \equiv 0$ , d'où le résultat.  $\square$

**Proposition 3.2.** — Soient  $d \geq 3$  un entier et  $\mathcal{H}$  un feuilletage homogène convexe de degré  $d - 2$  sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ . Si  $\ell_1$  et  $\ell_2$  sont des droites  $\mathcal{H}$ -invariantes passant par l'origine, alors le  $d$ -tissu  $\mathcal{W}_d = \text{Leg}\ell_1 \boxtimes \text{Leg}\ell_2 \boxtimes \text{Leg}\mathcal{H}$  est plat.

*Démonstration.* — Pour  $i = 1, 2$ , posons  $s_i := L_{\infty} \cap \ell_i \in \text{Sing}\mathcal{H}$  et notons  $\check{s}_i$  (resp.  $\check{O}$ ) la droite duale du point  $s_i$  (resp. de l'origine  $O$ ); nous avons  $\text{Tang}(\text{Leg}\ell_1, \text{Leg}\ell_2) = \check{O}$  et, en vertu de [3, Section 2],  $\text{Tang}(\text{Leg}\ell_i, \text{Leg}\mathcal{H}) = \check{O} \cup \check{s}_i$ . En outre, la convexité de  $\mathcal{H}$  implique, d'après [2, Lemme 3.2], que  $\Delta(\text{Leg}\mathcal{H}) = \check{\Sigma}_{\mathcal{H}}^{\text{rad}} \cup \check{O}$ , où  $\check{\Sigma}_{\mathcal{H}}^{\text{rad}}$  désigne l'ensemble des droites duales des singularités radiales de  $\mathcal{H}$ . Nous en déduisons que

$$\Delta(\mathcal{W}_d) = \check{\Sigma}_{\mathcal{H}}^{\text{rad}} \cup \check{O} \cup \check{s}_1 \cup \check{s}_2.$$

Soit  $s \in \check{\Sigma}_{\mathcal{H}}^{\text{rad}} \cup \{s_1, s_2\}$ . Notons  $v - 1$  l'ordre de radialité de  $s$ ; en vertu de [4, Proposition 3.3], au voisinage d'un point générique de la droite  $\check{s}$  duale de  $s$ , nous pouvons décomposer le tissu  $\text{Leg}\mathcal{H}$  sous la forme  $\text{Leg}\mathcal{H} = \mathcal{W}_v \boxtimes \mathcal{W}_{d-v-2}$ , où les tissus  $\mathcal{W}_v$  et  $\mathcal{W}_{d-v-2}$  sont comme dans la démonstration de la Proposition 2.2. Ainsi  $\mathcal{W}_d$  admet une décomposition de la forme (2.1).

Maintenant, nous allons montrer que pour tout  $s \in \check{\Sigma}_{\mathcal{H}}^{\text{rad}} \cup \{s_1, s_2\}$ , la courbure de  $\mathcal{W}_d$  est holomorphe le long de  $\check{s}$ . Nous distinguons deux cas :

1. Cas où  $s \in \{s_1, s_2\}$ . Si  $\{i, j\} = \{1, 2\}$  et  $s = s_i$ , alors  $\check{s}$  est invariante par  $\text{Leg}\ell_i$ . De plus, comme  $s \notin \ell_j$  et  $\check{s} \not\subset \text{Tang}(\text{Leg}\ell_j, \text{Leg}\mathcal{H})$ , le tissu  $\mathcal{W}_{d-v-1} := \text{Leg}\ell_j \boxtimes \mathcal{W}_{d-v-2}$  est régulier et transverse à  $\check{s}$ , et nous avons  $\mathcal{W}_d = \text{Leg}\ell_i \boxtimes \mathcal{W}_v \boxtimes \mathcal{W}_{d-v-1}$ . En appliquant [4, Théorème 1] si  $v = 1$  et [3, Proposition 3.9] si  $v \geq 2$ , il vient que  $K(\mathcal{W}_d)$  est holomorphe sur  $\check{s}$ .
2. Cas où  $s \notin \{s_1, s_2\}$ ; alors  $s \in \check{\Sigma}_{\mathcal{H}}^{\text{rad}}$ . Puisque  $\check{\Sigma}_{\mathcal{H}}^{\text{rad}} \subset \text{Sing}\mathcal{H} \cap L_{\infty}$ ,  $s \notin \ell_1 \cup \ell_2$  et donc pour  $i = 1, 2$ ,  $\text{Leg}\ell_i$  est transverse à  $\check{s}$ ; comme en outre  $\check{s} \not\subset \text{Tang}(\text{Leg}\ell_i, \text{Leg}\mathcal{H})$ , le tissu  $\mathcal{W}_{d-v} := \text{Leg}\ell_1 \boxtimes \text{Leg}\ell_2 \boxtimes \mathcal{W}_{d-v-2}$  est régulier et transverse à  $\check{s}$ . Par conséquent, la courbure de  $\mathcal{W}_d = \mathcal{W}_v \boxtimes \mathcal{W}_{d-v}$  est holomorphe le long de  $\check{s}$  par application de [4, Proposition 2.6].

Il en résulte que la courbure  $K(\mathcal{W}_d)$  est holomorphe sur  $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2 \setminus \check{O}$ , ce qui entraîne, d'après [1, Lemme 3.1] (cf. [3, Lemme 3.8]), que  $K(\mathcal{W}_d) \equiv 0$ .  $\square$

*Démonstration du Théorème 2.* — Soit  $\mathcal{H} = C \boxtimes \mathcal{H}$  un pré-feuilletage homogène convexe sur  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ . Si  $C$  est formée de  $n \geq 1$  droites  $\mathcal{H}$ -invariantes distinctes  $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ , alors ou bien toutes les droites  $\ell_i$  passent par l'origine  $O$ , ou bien une des droites  $\ell_i$  est la droite  $L_{\infty}$  et les  $(n - 1)$  droites restantes passent par  $O$ . Comme  $\mathcal{H}$  est convexe par hypothèse, le tissu  $\text{Leg}\mathcal{H}$ , resp.  $\text{Leg}\ell_i \boxtimes \text{Leg}\mathcal{H}$ , resp.  $\text{Leg}\ell_i \boxtimes \text{Leg}\ell_j \boxtimes \text{Leg}\mathcal{H}$  avec  $i \neq j$ , est plat en vertu de [2, Corollaire 3.4], resp. [3, Corollaire D], resp. Propositions 3.1 et 3.2. La platitude de  $\text{Leg}\mathcal{H}$  s'en déduit aussitôt en appliquant le Lemme 2.1 avec  $\mathcal{W} = \text{Leg}\ell_1 \boxtimes \text{Leg}\ell_2 \boxtimes \dots \boxtimes \text{Leg}\ell_n$  et  $\mathcal{W}' = \text{Leg}\mathcal{H}$ .  $\square$

### Références

- [1] A. Beltrán, M. Falla Luza, and D. Marín. Flat 3-webs of degree one on the projective plane. *Ann. Fac. Sci. Toulouse Math. (6)*, 23(4) :779–796, 2014.
- [2] S. Bedrouni and D. Marín. Tissus plats et feuilletages homogènes sur le plan projectif complexe. *Bull. Soc. Math. France*, 146(3) :479–516, 2018.
- [3] S. Bedrouni. Pre-foliations of co-degree one on  $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$  with a flat Legendre transform, [arxiv:2309.12837](https://arxiv.org/abs/2309.12837), 2023.
- [4] D. Marín and J. V. Pereira. Rigid flat webs on the projective plane. *Asian J. Math.* 17(1) :163–191, 2013.
- [5] J. V. Pereira. Vector fields, invariant varieties and linear systems. *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)*, 51(5) :1385–1405, 2001.

---

10 mai 2024

SAMIR BEDROUNI, Faculté de Mathématiques, USTHB, BP 32, El-Alia, 16111 Bab-Ezzouar, Alger, Algérie  
E-mail : sbedrouni@usthb.dz