

УДК 512.554.5

## О коммутативных изотопах йордановой алгебры симметрической билинейной невырожденной формы на двумерном векторном пространстве

В. И. Глизбург, С. В. Пчелинцев

### Аннотация

Ненулевой элемент  $x$  алгебры называется *ниль-элементом индекса 2*, если  $x^2 = 0$ . Назовем *ниль-рангом алгебры* максимальное число линейно независимых ниль-элементов индекса 2, содержащихся в ней. В [3] изучались простые коммутативные 3-мерные алгебры ниль-ранга 3. Известно [3], что всякая такая алгебра изотопна циклотомичной алгебре  $C_3$ . В работе изучаются простые унитарные коммутативные 3-мерные алгебры над алгебраически замкнутым полем характеристики не 2. Доказано, что всякая простая унитарная коммутативная 3-мерная алгебра ниль-ранга 2 изотопна йордановой алгебре симметрической билинейной невырожденной формы на 2-мерном векторном пространстве.

Библиография: 13 наименований

Ключевые слова: изотоп, стандартный изотоп, 3-мерная алгебра, коммутативная алгебра, простая алгебра, ниль-ранг.

Bibliography: 13 titles.

Keywords: isotope, standard isotope, 3-dimensional algebra, commutative algebra, simple algebra, nil-rank.

## Введение

Алгебра называется *простой*, если она имеет ненулевое умножение и не содержит собственных идеалов. Хорошо известно (и легко доказывается индукцией по размерности), что *в любой конечно-мерной алгебре  $A$  существует композиционный ряд*

$$A = A_0 \triangleright A_1 \triangleright A_2 \triangleright \dots \triangleright A_k = 0,$$

где  $A_{i+1} \triangleleft A_i$  (идеал) и фактор-алгебры  $A_i/A_{i+1}$ ,  $i = \overline{0, k-1}$  либо простые алгебры, либо 1-мерные алгебры с нулевым умножением.

Классификация простых конечно-мерных алгебр является важнейшей задачей структурной теории.

В 1942 г. Алберт [1] ввел понятие изотопа.

Алгебра называется *изотопно-простой*, если всякий ее изотоп является простой алгеброй. Простая алгебра с единицей является изотопно-простой.

Интерес к изучению изотопно-простых алгебр связан с теоремой Брака о композиционном ряде [2]: *всякая конечно-мерная алгебра  $A$  обладает изотопом  $B$ , в котором существует композиционный ряд*

$$B = B_0 \triangleright B_1 \triangleright B_2 \triangleright \dots \triangleright B_k = 0,$$

где  $B_{i+1} \triangleleft B_i$  и фактор-алгебры  $B_i/B_{i+1}$ ,  $i = \overline{0, k-1}$  либо изотопно-просты, либо 1-мерные алгебры с нулевым умножением.

В той же работе [2] Брак доказал, что над алгебраичеки замкнутым полем не существует 2-мерных изотопно-простых алгебр. Известно [3], что каждая простая 3-мерная антикоммутативная алгебра изотопна алгебре Ли  $sl_2$  бесследных матриц 2-го порядка.

Ненулевой элемент  $x$  алгебры называется *ниль-элементом индекса 2*, если  $x^2 = 0$ . Назовем *ниль-рангом алгебры* максимальное число ее линейно независимых ниль-элементов индекса 2. В [3] изучались простые коммутативные 3-мерные алгебры с ниль-базисом (или алгебры ниль-ранга 3). Известно [3], что всякая простая коммутативная 3-мерная алгебра с ниль-базисом изотопна циклотомичной (cyclotomic) алгебре  $C_3$ .

В работе [3] приведен достаточно полный перечень статей, относящихся к изучению изотопов. Значительное число статей посвящено изучению изотопов, связанных с автоморфизмами коммутативных ассоциативных алгебр (см. обзор [4]).

В статьях [5]–[8] изучались изотопы альтернативных,  $(-1,1)$  и йордановых алгебр и тождества изотопов. В [5] было показано, что среди изотопов йордановой алгебры симметрической билинейной невырожденной формы на бесконечно-мерном векторном пространстве встречаются как простые алгебры, так и алгебры, содержащие идеалы с нулевым умножением.

Всюду ниже, термин «алгебра» означает линейную алгебру над полем. Если не оговорено противное, то алгебра предполагается унитарной коммутативной.

В данной работе изучаются простые 3-мерные алгебры. Основным результатом данной статьи является классификация (с точностью до изотопии) простых 3-мерных алгебр ниль-ранга 2. Более точно, доказано, что

*всякая простая 3-мерная унитарная коммутативная алгебра ниль-ранга 2 над алгебраичеки замкнутым полем характеристики, отличной от 2, изотопна йордановой алгебре  $J_2$  симметрической билинейной невырожденной формы на 2-мерном векторном пространстве.*

Доказано также, что всякая простая коммутативная 3-мерная (необязательно унитарная) алгебра с ниль-базисом изотопна унитарной коммутативной алгебре вида

$$C(\rho) = \langle 1, x, y | x^2 = y^2 = 0, xy = yx = \rho(1 + x + y) \rangle \text{ при } \rho = -2,$$

где до вертикальной черты записан базис алгебры, 1 – нейтральный элемент по умножению, а после черты указаны произведения базисных элементов.

В связи с изучением алгебр с ниль-базисом введены, так называемые, простые сильно вырожденные алгебры. Указаны примеры таких алгебр. Доказано, что каждая такая алгебра не является изотопно-простой. В частности, показано, что существуют простые алгебры с нетривиальным идемпотентом, не являющиеся изотопно-простыми.

# 1 Изотопы Алберта

Напомним, что линейные алгебры  $(A, \cdot)$  и  $(B, \circ)$  над основным полем  $F$  называются *изотопными*, если существует тройка  $\Lambda = (\varphi, \psi, \xi)$  линейных изоморфизмов  $A \rightarrow B$ , удовлетворяющих условию  $x^\varphi \circ y^\psi = (x \cdot y)^\xi$  для любых  $x, y \in A$ . При этом тройка изоморфизмов  $\Lambda$  называется *изотопией*.

Тройка  $(\xi, \xi, \xi)$  является изотопией тогда и только тогда, когда  $\xi : A \rightarrow B$  является изоморфизмом.

Пусть  $f, g : A \rightarrow A$  — обратимые линейные операторы на алгебре  $(A, \cdot)$ . Определим алгебру  $A^* = A^{(f, g)}$  на том же линейном пространстве  $A$  относительно нового умножения  $x * y = x^f y^g$  для любых  $x, y \in A$ . Алгебра  $A^*$  называется *главным изотопом* алгебры  $A$ .

Известно (см., [1], [7]), что *две алгебры изотопны тогда и только тогда, когда одна из них изоморфна главному изотопу другой*. В частности, если алгебры  $A$  и  $B$  унитарны и изотопны, то главный изотоп  $B^*$  также унитарен.

Далее, отношение изотопии является отношением эквивалентности, причем более широким, чем отношение изоморфизма.

**Определение 1.** Элемент  $a$  алгебры  $A$  называется  *$R$ -обратимым*, если оператор  $R_a : x \mapsto xa$  правого умножения на элемент  $a$  обратим.

Заметим, что обратный оператор  $R_a^{-1}$ , вообще говоря, не является оператором правого умножения (см. замечание 3).

Всюду ниже, если не оговорено противное, основное поле  $F$  предполагается алгебраически замкнутым характеристики не 2. Через  $F^\times$  обозначается множество ненулевых скаляров поля  $F$ .

**Лемма 1.** Пусть  $A$  — произвольная алгебра,  $\sigma, \tau \in F^\times$  и  $1 = 1_A$  — тождественное отображение алгебры  $A$  на себя. Тогда изотоп  $A^* = A^{(\sigma^1, \tau^1)}$  и исходная алгебра  $A$  изоморфны. В частности, одномерная алгебра и любой её главный изотоп изоморфны.

*Доказательство.* Пусть  $\omega = (\sigma\tau)^{-1}$ . Проверим, что отображение

$$\xi : A \rightarrow A^*, \quad a^\xi = \omega a,$$

является изоморфизмом алгебр  $A$  и  $A^*$ . Поскольку гомотетия  $\xi$  является линейным изоморфизмом, то достаточно проверить, что она является мультипликативным гомоморфизмом. Имеем:

$$(ab)^\xi = \omega ab, \quad a^\xi * b^\xi = (\omega a) * (\omega b) = \omega^2 \sigma \tau ab = \omega ab,$$

что и доказывает первую часть леммы.

Пусть  $\dim_F(A) = 1$ . Тогда любой линейный оператор на  $A$  является *скалярным*, т.е. имеет вид  $\sigma 1$ , где  $\sigma \in F$ . Умножение в алгебре является нулевым тогда и только тогда, когда оно нулевое в любом ее изотопе. Значит, справедливо и второе утверждение леммы.  $\square$

**Теорема Алберта.** Если изотоп  $A^* = A^{(\varphi, \psi)}$  унитарен, то существуют элементы  $g, h \in A$  такие, что  $\varphi R_g = \psi L_h = 1_A$ , где  $L_h$  — оператор левого умножения на элемент  $h$ .

**Замечание 1.** Всякая одномерная алгебра над алгебраически замкнутым полем  $F$  либо имеет нулевое умножение, либо изоморфна полю  $F$ .

**Замечание 2.** Если изотоп  $A^{(\varphi, \psi)}$  коммутативен, то для любых  $\sigma, \tau \in F^\times$  изотоп  $A^{(\sigma\varphi, \tau\psi)}$  также коммутативен.

## 2 Йорданова алгебра $J_2$ симметрической билинейной невырожденной формы

**Определение 2.** Коммутативная алгебра  $J$  называется *йордановой*, если в ней выполнено тождество

$$(x^2, y, x) = 0,$$

где  $(u, v, w) = (uv)w - u(vw)$  — ассоциатор элементов  $u, v, w$ .

В теории йордановых алгебр важную роль играет простая алгебра  $J_n$  симметрической билинейной невырожденной формы, определенной на  $n$ -мерном векторном пространстве (см. [9], [10]). Напомним её определение.

Пусть  $V_n$  —  $n$ -мерное векторное пространство над полем  $F$ , снабженное симметричной билинейной формой  $f(x, y)$ . Построим векторное пространство  $J_n = F1 \oplus V_n$ , которое является прямой суммой пространства  $V_n$  и одномерного пространства  $F1$  с базисом 1. Определим произведение в  $J_n$ :

$$(\alpha 1 + x)(\beta 1 + y) = (\alpha\beta + f(x, y))1 + (\alpha y + \beta x)$$

для  $x, y \in V_n, \alpha, \beta \in F$ . Если форма  $f$  невырождена, то в пространстве  $V$  можно выбрать ортонормированный базис. Если  $n$  четно, то в пространстве  $V_n$  можно выбрать симплектический базис.

В частности, в  $V_2$  можно выбрать симплектический базис  $(x, y)$ , т.е.

$$f(x, x) = f(y, y) = 0, \quad f(x, y) = 1$$

(см. [11], [12]). Значит, алгебра  $J_2$  может быть задана в виде

$$J_2 = \langle 1, x, y \mid x^2 = y^2 = 0, xy = 1 \rangle.$$

Базис  $E = (1, x, y)$  алгебры  $J_2$  назовем *каноническим*.

Элемент  $a = \lambda 1 + \alpha x + \beta y$  будем записывать в виде  $a = (\lambda, \alpha, \beta)_E$ ; если ясно в каком базисе задано представление, то буква  $E$  будет опускаться.

**Лемма 2.** Если элемент  $a = (\lambda, \alpha, \beta)$  является  $R$ -обратимым в  $J_2$ , то  $\lambda \neq 0$ . Далее, элемент  $a = (1, \alpha, \beta)$  является  $R$ -обратимым тогда и только тогда, когда  $\Delta_a := \det R_a = 1 - 2\alpha\beta \neq 0$ .

*Доказательство.* Поскольку  $x(\alpha x + \beta y) = \beta xy = \beta 1$  и  $y(\alpha x + \beta y) = \alpha xy = \alpha 1$ , то элемент  $(0, \alpha, \beta) = \alpha x + \beta y$  не является  $R$ -обратимым. Далее, если  $a = (1, \alpha, \beta)$ , то имеем

$$\begin{cases} 1 \cdot a = 1 \cdot (1 + \alpha x + \beta y) = 1 + \alpha x + \beta y, \\ x \cdot a = x \cdot (1 + \alpha x + \beta y) = x + \beta 1, \\ y \cdot a = y \cdot (1 + \alpha x + \beta y) = y + \alpha 1, \end{cases}$$

т.е. матрица оператора  $R_a$  в базисе  $(1, x, y)$  имеет вид  $R_a = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ \beta & 1 & 0 \\ \alpha & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ;

далее мы не будем различать в обозначениях оператор  $R_a$  и его матрицу, если ясно относительно какого базиса она записана. Оператор  $R_a$  обратим тогда и только тогда, когда  $\det R_a \neq 0$ ;  $\det R_a = 1 - 2\alpha\beta$ . Лемма доказана.  $\square$

**Замечание 3.** Всякий ниль-элемент индекса 2 алгебры  $J_2$  содержится в множестве  $Fx \cup Fy$ , в частности, ниль-ранг алгебры  $J_2$  равен 2. В самом деле, если  $a$  — ниль-элемент индекса 2, то  $aR_a = a^2 = 0$ , т.е. оператор  $R_a$  вырожден и  $a = (0, \alpha, \beta)$ . Тогда имеем:

$$0 = a^2 = (\alpha x + \beta y)^2 = 2\alpha\beta 1,$$

откуда вытекает, что  $\alpha = 0$  или  $\beta = 0$ , т.е.  $a \in Fx \cup Fy$ .

### 3 Неунитальная изотопно-простая алгебра $C_2$ ниль-ранга 2

Рассмотрим коммутативную алгебру  $C_2$  и отметим некоторые ее свойства; эта алгебра имеет *канонический базис*  $(a, b, c)$  и следующее умножение

$$C_2 = \langle a, b, c \mid a^2 = b, ab = a, ac = c, b^2 = c^2 = 0, bc = b \rangle.$$

**Лемма 3.** *Алгебра  $C_2$  не имеет единицы 1.*

*Доказательство.* В самом деле, пусть  $1 = \alpha a + \beta b + \gamma c$  — единица в  $C_2$  для некоторых скаляров  $\alpha, \beta, \gamma \in F$ . Тогда

$$a = a \cdot 1 = a(\alpha a + \beta b + \gamma c) = \alpha a^2 + \beta ab + \gamma ac = \alpha b + \beta a + \gamma c.$$

Отсюда  $\alpha = 0, \beta = 1, \gamma = 0$ , т.е.  $1 = b$  и  $b = bc = 1c = c$ , — противоречие.  $\square$

**Лемма 4.** *Всякий ниль-элемент алгебры  $C_2$  содержится в множестве  $Fb \cup Fc$ , значит, ниль-ранг алгебры  $C_2$  равен 2.*

*Доказательство.* В самом деле, пусть  $u = \alpha a + \beta b + \gamma c$  — ниль-элемент. Тогда

$$0 = (\alpha a + \beta b + \gamma c)^2 = \alpha^2 b + 2\alpha\beta a + 2\alpha\gamma c + 2\beta\gamma b =$$

$$2\alpha\beta a + (\alpha^2 + 2\beta\gamma)b + 2\alpha\gamma c,$$

откуда  $\alpha\beta = 0, \alpha\gamma = 0, \alpha^2 + 2\beta\gamma = 0$ . Если  $\alpha \neq 0$ , то  $\beta = 0, \alpha^2 = 0$ , – противоречие. Значит,  $\alpha = 0$  и  $u = \beta b + \gamma c$ . Поскольку  $\beta\gamma = 0$ , то  $u \in Fb \cup Fc$ , что и требовалось.  $\square$

**Лемма 5.** В алгебре  $C_2$  с каноническим базисом  $(a, b, c)$  верно:

$$R_a = e_{12} + e_{21} + e_{33}; \quad R_a^2 = I = e_{11} + e_{22} + e_{33},$$

где  $e_{ij}$  – матричные единицы и оператор умножения отождествляется с его матрицей в каноническом базисе.

Указанная лемма немедленно вытекает из определения алгебры  $C_2$ .

**Лемма 6.** Алгебра  $C := C_2$  изотопна йордановой алгебре  $J_2$  симметрической билинейной невырожденной формы на 2-мерном векторном пространстве. В частности, алгебра  $C$  изотопно-проста.

*Доказательство.* Рассмотрим алгебру  $A = C^{(\varphi, \varphi)}$ ,  $\varphi = R_a$ ; ее таблица умножения:

$$a * a = a^2 a^2 = b^2 = 0, \quad b * b = (ba)^2 = a^2 = b, \quad c * c = (ca)^2 = c^2 = 0,$$

$$a * b = a^2(ba) = ba = a, \quad b * c = (ba)(ca) = ac = c, \quad a * c = a^2(ca) = bc = b,$$

т.е.  $A = \langle a, b, c \mid a^2 = 0, b^2 = b, c^2 = 0, ab = a, ac = b, bc = c \rangle$  и после переобозначений  $x := a, 1 := b, y := c$  получаем алгебру  $J_2$ .

Поскольку алгебра  $J_2$  унитарна и проста, то она изотопно-проста, в частности, такой же является и алгебра  $C$ . Лемма доказана.  $\square$

## 4 Простые унитарные 3-мерные коммутативные алгебры ниль-ранга 2

Обозначим через  $C(\alpha, \beta, \gamma)$  унитарную коммутативную алгебру вида

$$C(\alpha, \beta, \gamma) = \langle 1, x, y \mid x^2 = y^2 = 0, xy = \alpha 1 + \beta x + \gamma y \rangle,$$

где  $\alpha, \beta, \gamma \in F$ ; базис  $(1, x, y)$  назовем каноническим.

**Лемма 7.** Пусть  $C$  – унитарная коммутативная алгебра,  $x, y$  – ее линейно независимые ниль-элементы индекса 2,  $V = \langle x, y \rangle$  – подпространство, порожденное элементами  $x, y$ . Тогда  $1 \notin V$ , т.е.  $(1, x, y)$  – базис алгебры  $C$ . Следовательно, алгебра  $C$  совпадает с алгеброй  $C(\alpha, \beta, \gamma)$  при подходящих скалярах  $\alpha, \beta, \gamma$ .

*Доказательство.* В самом деле, если  $1 = \alpha x + \beta y$ , то  $x = \beta xy$  и  $y = \alpha xy$ . Значит, элементы  $x, y$  линейно зависимы, – противоречие.  $\square$

**Лемма 8.** Если алгебра  $C(\alpha, \beta, \gamma)$  является простой, то  $\alpha \neq 0$ .

*Доказательство.* Если  $\alpha = 0$ , то  $V = \langle x, y \rangle$  – собственный идеал.  $\square$

Заметим, что алгебра  $C(1, 0, 0)$  является йордановой алгеброй симметрической билинейной невырожденной формы  $J_2$ .

Положим  $C(\alpha) := C(\alpha, \alpha, \alpha)$ .

**Лемма 9.** *Простая алгебра  $C(\alpha, \beta, \gamma)$  изоморфна одной из алгебр:*

$$C(\alpha), \alpha \neq 0, \text{ либо } C(1, 1, 0), \text{ либо } C(1, 0, 0).$$

*Доказательство.* Представим в виде последовательности пунктов.

1<sup>0</sup>. Докажем, что алгебра  $C(\alpha, \beta, \gamma)$  при  $\alpha\beta\gamma \neq 0$  изоморфна алгебре  $C(\rho)$ , где  $\rho = \alpha^{-1}\beta\gamma$ .

Заменим базис в  $V = \langle x, y \rangle$ :  $x' = \lambda x, y' = \mu y$ . Тогда

$$x'y' = (\lambda x)(\mu y) = \lambda\mu(\alpha 1 + \beta\lambda^{-1}x' + \gamma\mu^{-1}y') = \alpha\lambda\mu 1 + \beta\mu x' + \gamma\lambda y'.$$

Если  $\beta\gamma \neq 0$ , то полагая  $\lambda = \alpha^{-1}\beta, \mu = \alpha^{-1}\gamma$ , получаем

$$\alpha\lambda\mu = \alpha\alpha^{-1}\beta\alpha^{-1}\gamma = \alpha^{-1}\beta\gamma, \quad \beta\mu = \beta\alpha^{-1}\gamma = \alpha^{-1}\beta\gamma,$$

$$\gamma\lambda = \gamma\alpha^{-1}\beta = \alpha^{-1}\beta\gamma.$$

Это означает, что алгебра  $C(\alpha, \beta, \gamma)$  при  $\alpha\beta\gamma \neq 0$  изоморфна алгебре  $C(\rho)$ , где  $\rho = \alpha^{-1}\beta\gamma$ .

2<sup>0</sup>. Алгебры  $C(\alpha, \beta, \gamma)$  и  $C(\alpha, \gamma, \beta)$  изоморфны, поскольку перестановка  $(x, y)$  индуцирует изоморфизм указанных алгебр.

3<sup>0</sup>. Алгебры  $C(\alpha, \beta, 0)$ ,  $\alpha\beta \neq 0$  и  $C(1, 1, 0)$  изоморфны.

Положим  $x' = \alpha^{-1}\beta x, y' = \beta^{-1}y$ ;  $x', y'$  являются ниль-элементами индекса 2 и

$$x'y' = \alpha^{-1}\beta x \cdot \beta^{-1}y = \alpha^{-1}xy = \alpha^{-1}(\alpha 1 + \beta x) = 1 + \alpha^{-1}\beta x = 1 + x',$$

т.е. алгебры  $C(\alpha, \beta, 0)$ ,  $\alpha\beta \neq 0$ , и  $C(1, 1, 0)$  изоморфны.

4<sup>0</sup>. Алгебры  $C(\omega^2, 0, 0)$ ,  $\omega \neq 0$  и  $C(1, 0, 0)$  изоморфны, поскольку элементы  $x' = \omega^{-1}x, y' = \omega^{-1}y$  являются ниль-элементами индекса 2 в алгебре  $C(\omega^2, 0, 0)$ ,  $\omega \neq 0$  и выполнены равенства:  $x'y' = (\omega^{-1}x)(\omega^{-1}y) = \omega^{-2}xy = \omega^{-2}\omega^2 1 = 1$ . В силу алгебраической замкнутости поля  $F$  простые алгебры  $C(\alpha, 0, 0)$  и  $C(1, 0, 0)$  изоморфны.  $\square$

**Лемма 10.** *Ниль-ранг простой алгебры  $C(\alpha)$  равен 2, если  $\alpha \neq -2$ . Ниль-ранг алгебры  $C(-2)$  равен 3, т.е. указанная алгебра имеет ниль-базис.*

*Доказательство.* Допустим, что элемент  $a = 1 + \lambda x + \mu y$  является ниль-элементом индекса 2 в алгебре  $C(\alpha)$ . Тогда

$$0 = a^2 = (1 + \lambda x + \mu y)^2 = 1 + 2\lambda x + 2\mu y + 2\alpha\lambda\mu(1 + x + y).$$

После приведения подобных членов получаем систему уравнений

$$\begin{cases} 1 : 1 + 2\alpha\lambda\mu = 0, \\ x : 2\lambda + 2\alpha\lambda\mu = 0, \\ y : 2\mu + 2\alpha\lambda\mu = 0, \end{cases}$$

решением которой является набор  $\lambda = \mu = \frac{1}{2}, \alpha = -2$ . Если же  $\alpha \neq -2$ , то указанная система решений не имеет.  $\square$

Следуя [3], напомним

**Определение 3.** Изотоп  $C^{(\varphi, \psi)}$  называется *стандартным*, если операторы  $\varphi$  и  $\psi$  пропорциональны.

**Лемма 11.** Произвольная алгебра  $C$  и её стандартный изотоп  $C^*$  имеют одинаковые ниль-ранги.

*Доказательство.* В силу леммы 1 можно считать, что стандартный изотоп имеет вид  $C^* = C^{(\varphi, \varphi)}$ . Далее, если  $e_1, \dots, e_k$  линейно независимые ниль-элементы индекса 2 в алгебре  $C$ , то  $e_1^{\varphi^{-1}}, \dots, e_k^{\varphi^{-1}}$  линейно независимые ниль-элементы индекса 2 в изотопе  $C^*$ . Значит, при стандартной изотопии ниль-ранг не уменьшается. Поскольку понятие стандартной изотопии симметрично, то ниль-ранги алгебр  $C$  и  $C^*$  равны.  $\square$

**Лемма 12.** Алгебры  $C(1, 1, 0)$  и  $C(1, 0, 0)$  изотопны, но не изоморфны.

*Доказательство.* Заметим, что вторая алгебра  $C(1, 0, 0) = J_2$  йорданова, а первая нет. В самом деле, предположив, что алгебра  $C(1, 1, 0)$  йорданова, имеем:

$$2(xy, x, y) = -(y^2, x, x) = 0,$$

поскольку  $y^2 = 0$ . Однако, в алгебре  $C(1, 1, 0)$  выполнены равенства:

$$(xy, x, y) = (1 + x, x, y) = (x, x, y) = -x(xy) = -x(1 + x) = -x \neq 0.$$

Значит, указанные алгебры неизоморфны.

Пусть  $C := J_2$  и  $(1, x, y)$  — её канонический базис. Вычислим оператор правого умножения  $R_c$  для  $c := 1 + x$ :

$$1c = 1 + x, \quad xc = x(1 + x) = x, \quad yc = y(1 + x) = 1 + y,$$

$$R_c = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Положим } \varphi = R_c^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим изотоп  $C^* = C^{(\varphi, \varphi)}$ , считая  $u * v = u^\varphi v^\varphi$ , и в нем элементы:

$$c := 1 + x, \quad a := x, \quad b := 1 + y, \quad e := c^2 = (1 + x)^2 = 1 + 2x.$$

Тогда

$$\begin{aligned} a^\varphi = x^\varphi &= (0, 1, 0) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (0, 1, 0) = x, \\ b^\varphi = (1 + y)^\varphi &= (1, 0, 1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (0, 0, 1) = y, \\ e^\varphi = (1 + 2x)^\varphi &= (1, 2, 0) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (1, 1, 0) = 1 + x = c. \end{aligned}$$

Заметим, что  $1 = e - 2x = e - 2a$ . Покажем, что  $e$  — единица изотопы, поскольку для любого элемента  $v$ :

$$e * v = e^\varphi v^\varphi = (c^2 R_c^{-1})(v R_c^{-1}) = c(v R_c^{-1}) = (v R_c^{-1}) R_c = v.$$

Далее,

$$\begin{aligned} a * a &= (a^\varphi)^2 = x^2 = 0, & b * b &= (b^\varphi)^2 = y^2 = 0, \\ a * b &= a^\varphi b^\varphi = xy = 1 = e - 2a. \end{aligned}$$

Полагая  $a' = -2a, b' = -\frac{1}{2}b$ , получаем  $a' * b' = a * b = e - 2a = e + a'$ . Тем самым доказано, что  $(e, a', b')$  — канонический базис алгебры  $C(1, 1, 0)$ , т.е. алгебры  $C^* = C^{(\varphi, \varphi)}$  и  $C(1, 1, 0)$  изоморфны. Отсюда вытекает, что  $C = J_2$  и  $C(1, 1, 0)$  изотопны.  $\square$

**Замечание 4.** Проверим, что оператор  $R_{1+x}^{-1}$  в алгебре  $J_2$  не представим в виде  $R_a$  ни для какого элемента  $a \in C$ . Заметим, что в лемме 12 показано  $R_{1+x}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Если  $a = \alpha 1 + \beta x + \gamma y$ , где  $\alpha, \beta, \gamma \in F$ , то справедливы равенства

$$x(1+x) = x(\alpha 1 + \beta x + \gamma y) = \alpha x + \gamma 1 = \gamma 1 + \alpha x,$$

$$y(1+x) = y(\alpha 1 + \beta x + \gamma y) = \alpha y + \beta 1 = \beta 1 + \alpha y.$$

Допустим, что  $R_{1+x}^{-1} = R_a$ . Тогда  $x = \alpha 1 + \beta x + \gamma y, 1 - x = \gamma 1 + \alpha x$ . Отсюда имеем из первого уравнения  $\alpha = 0$ , а из второго:  $\alpha = -1$ , что невозможно.

**Лемма 13.** Алгебры  $B := C(\rho), \rho \neq 0; -2$  и  $C := J_2$  изотопны.

*Доказательство.* Пусть  $(1, x, y)$  — канонический базис алгебры  $C = J_2$ . Пусть  $c := 1 + \gamma x + y, \gamma \neq 0; \frac{1}{2}$ . Тогда в алгебре  $C = J_2$  имеем:

$$1c = 1 + \gamma x + y, \quad xc = 1 + x, \quad yc = \gamma 1 + y,$$

$$R_c = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ \gamma & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det R_c = 1 - 2\gamma \neq 0.$$

Положим  $\varphi = R_c^{-1} = \delta \begin{pmatrix} 1 & -\gamma & -1 \\ -1 & 1-\gamma & 1 \\ -\gamma & \gamma^2 & 1-\gamma \end{pmatrix}$ , где  $\delta := (1-2\gamma)^{-1}$ .

Рассмотрим изотоп  $C^* = C^{(\varphi, \varphi)}$ , считая  $u * v = u^\varphi v^\varphi$ , и в нем элементы:

$$e := c^2, \quad x' := xc = 1 + x, \quad y' := yc = \gamma 1 + y.$$

Элемент  $e$  является единицей в изотопе и имеет представление:

$$\begin{aligned} e := c^2 &= (1 + \gamma x + y)^2 = 1 + 2\gamma + 2\gamma x + 2y = \\ &= 1 + 2\gamma + 2\gamma(x' - 1) + 2(y' - \gamma 1) = (1 - 2\gamma)1 + 2\gamma x' + 2y'. \end{aligned}$$

Тогда

$$1 = \delta(e - 2\gamma x' - 2y').$$

Далее,  $x'^\varphi = x$ ,  $y'^\varphi = y$ , и

$$\begin{aligned} x' * x' &= (x'^\varphi)^2 = x^2 = 0, \quad y' * y' = (y'^\varphi)^2 = y^2 = 0, \\ x' * y' &= x'^\varphi y'^\varphi = xy = 1 = \delta(e - 2\gamma x' - 2y'). \end{aligned}$$

Следовательно, алгебра  $C^*$  изоморфна алгебре  $C(\delta, -2\gamma\delta, -2\delta)$ . В силу леммы 9, п. 1<sup>0</sup>, верно  $C(\alpha, \beta, \gamma) \cong C(\alpha^{-1}\beta\gamma)$ , значит,  $C(\delta, -2\gamma\delta, -2\delta) \cong C(4\gamma\delta)$ . Докажем, что для любого  $\rho \neq -2$  можно подобрать  $\gamma$  так, что  $4\gamma\delta = \rho$ . Равенство  $4\gamma(1-2\gamma)^{-1} = \rho$  верно при  $\gamma = \frac{\rho}{2\rho+4}$ . Лемма доказана.  $\square$

**Замечание 5.** Первое ограничение в лемме  $\rho \neq 0$  связано с простотой алгебры, а второе  $\rho \neq -2$  — с ниль-рангом алгебры.

Тем самым доказана

**Теорема 1.** *Простая унитарная коммутативная 3-мерная алгебра ниль-ранга 2 над алгебраически замкнутым полем  $F$  характеристики, отличной от 2, изотопна йордановой алгебре  $J_2$  симметрической билинейной невырожденной формы на 2-мерном векторном пространстве.*

Остается открытым следующий вопрос. Верно ли, что всякая изотопно-простая 3-мерная коммутативная алгебра ниль-ранга 2 без единицы является изотопом алгебры  $J_2$ ? Определенную надежду на положительный ответ дает алгебра  $C_2$ , введенная в п. 3.

## 5 Циклотомичная алгебра $C_3$

Обозначим через  $C_3$  циклотомичную алгебру:

$$C_3 = \langle x, y, z | x^2 = y^2 = z^2 = 0, xy = yx = z, yz = zy = x, zx = xz = y \rangle,$$

которая напоминает 3-мерную алгебру Ли  $V_3$  относительно векторного произведения. Хорошо известно, что алгебры Ли  $V_3$  и  $sl_2$  над алгебраически

замкнутым полем изоморфны (см., например, [13]). В [3], теорема 5, доказано, что всякая простая коммутативная 3-мерная алгебра с ниль-базисом стандартно-изотопна алгебре  $C_3$ . В [3] доказано, что алгебра  $C_3$  не унитарна, но она обладает стандартным унитарным изотопом. Более того, справедлива

**Теорема 2.** *Всякая простая коммутативная алгебра с ниль-базисом над алгебраически замкнутым полем  $F$  характеристики, отличной от 2, обладает стандартным изотопом изоморфным алгебре  $C(-2)$ .*

*Доказательство.* Пусть  $C := C_3$ . Рассмотрим в алгебре  $C$  элемент  $c := x + y + z$  и вычислим его квадрат:

$$e := c^2 = (x + y + z)^2 = 2c.$$

Далее,  $xc = x(x + y + z) = xy + xz = y + z$ , значит,

$$R_c = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ и } \varphi = R_c^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Поскольку  $(1, 1, 0) \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = (0, 0, 1)$ , то  $(x + y)^\varphi = z$ . Значит, в силу симметрии справедливы равенства:

$$(x + y)^\varphi = z, \quad (y + z)^\varphi = x, \quad (z + x)^\varphi = y.$$

Таким образом, в изотопе  $C^* = C^{(\varphi, \varphi)}$ , где  $u * v = u^\varphi v^\varphi$ , имеется ниль-базис  $x' = y + z$ ,  $y' = z + x$ ,  $z' = x + y$ , причем  $e = x' + y' + z'$  — единица в  $C^*$ . Имеем:

$$x * y' = x'^\varphi y'^\varphi = xy = z.$$

Полагая  $a := -2x' = -2y - 2z$ ,  $b := -2y' = -2z - 2x$ , заметим, что

$$e + a + b = 2x + 2y + 2z - 2y - 2z - 2z - 2x = -2z.$$

Тогда  $a * b = (-2x') * (-2y') = 4x' * y' = 4z = (-2)(e + a + b)$ . Значит, алгебра  $C^*$  изоморфна алгебре  $C(-2)$ . Отсюда в силу [3] получаем требуемое.  $\square$

## 6 Сильно вырожденные алгебры

**Определение 4.** Пусть  $n \geq 2$ . Простая  $(n + 1)$ -мерная алгебра называется *сильно вырожденной*, если она содержит  $n$ -мерную подалгебру с нулевым умножением. Ниль-ранг такой алгебры равен  $n$ . В самом деле, если он равен  $n + 1$ , то квадрат алгебры имеет размерность  $\leq n$ , что невозможно в силу простоты сильно вырожденной алгебры.

Пусть  $n \geq 2$ . Пусть  $G_n$  — коммутативная алгебра с базисом  $(x_1, \dots, x_n, e)$ , в которой  $V = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$  — подалгебра с нулевым умножением и

$$x_1 e = e + x_2, x_i e = x_i + x_{i+1} \quad (2 \leq i \leq n-1), x_n e = x_n + x_1, e^2 = e.$$

**Предложение 6.1.** *Алгебра  $G_n$  является простой.*

*Доказательство.* Пусть  $0 \neq I \triangleleft G_n$ ,  $0 \neq a := \alpha e + \sum_i \beta_i x_i \in I$ . Знак сравнения  $\equiv$  в этом доказательстве будем понимать по модулю  $I$ .

1<sup>0</sup>. Докажем, что  $\alpha = 0$ . Допустим, от противного, что  $\alpha \neq 0$ . Тогда можно считать, что  $\alpha = 1$ . Для любого  $2 \leq i \leq n-1$  имеем

$$0 \equiv a x_1 = e x_1 = e + x_2, \quad 0 \equiv (e + x_2) x_i = x_i + x_{i+1}.$$

Далее,  $0 \equiv (e + x_2) x_n = x_n + x_1$  и  $0 \equiv (e + x_2) e = e + x_2 + x_3 \equiv x_3$ . Значит, для любого  $1 \leq i \leq n$  верно  $x_i \equiv 0$ , но тогда  $e \equiv 0$  и  $I = G_n$ , — противоречие.

Тем самым доказано, что  $0 \neq a = \sum_i \beta_i x_i \equiv 0$ .

2<sup>0</sup>. Докажем, что  $\beta_1 = 0$ . Если  $\beta_1 \neq 0$ , то  $a' = x_1 + \sum_{i \geq 2} \beta_i x_i \equiv 0$ . Значит,  $0 \equiv a' e = e + v$ , где  $v \in V$ , что противоречит п. 1<sup>0</sup>.

Следовательно,  $0 \neq a = \sum_{i \geq 2} \beta_i x_i \equiv 0$ . Выберем наибольший индекс  $k$  такой, что  $\beta_k \neq 0$ .

3<sup>0</sup>. Докажем, что  $k < n$ . Если  $k = n$ , то  $0 \neq a'' = \sum_{i \geq 2} \beta_i x_i + x_n \equiv 0$ . Тогда  $0 \equiv a'' e = x_1 + \sum_{i \geq 2} \gamma_i x_i$ , что противоречит п. 2<sup>0</sup>.

4<sup>0</sup>. Итак, для выбранного индекса  $k < n$  верно  $b := \sum_{i \geq 2}^{k-1} \beta_i x_i + x_k \equiv 0$ . Значит,  $0 \equiv b e := \sum_{i \geq 2}^{k-1} \gamma_i x_i + x_k + x_{k+1}$ , что противоречит максимальности индекса  $k$ .  $\square$

Алгебра  $G_n$  не является изотопно-простой; более того, справедлив более общий факт.

**Предложение 6.2.** *Не существует изотопно-простых сильно вырожденных коммутативных алгебр.*

*Доказательство.* Пусть  $A = \langle x_1, \dots, x_n, t \rangle$  — изотопно-простая сильно вырожденная коммутативная алгебра (унитальность не предполагается);  $V = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$  — её подалгебра с нулевым умножением.

В силу простоты алгебры  $A$  верно  $A^2 = A$ , значит,  $A = \langle x_1 t, \dots, x_n t, t^2 \rangle$ . Отсюда вытекает невырожденность оператора  $R_t$ .

Рассмотрим изотоп  $C = A^* = A^{(\varphi, \varphi)}$ ,  $\varphi = R_t^{-1}$ , относительно операции  $u * v = a^\varphi b^\varphi$ . Положим  $z_i = x_i^\varphi^{-1}$ ,  $n = \overline{1, n}$ . Тогда  $z_i * z_j = z_i^\varphi z_j^\varphi = x_i x_j = 0$ , значит,  $Z := V^{\varphi^{-1}} = \langle z_1, \dots, z_n \rangle$  —  $n$ -мерная подалгебра с нулевым умножением в изотопе  $C$ . Далее, для любого  $a \in A$  имеем:

$$a * (t^2) = (a^\varphi) \cdot (t^2)^\varphi = (a R_t^{-1}) ((t^2) R_t^{-1}) = (a R_t^{-1}) t = a,$$

значит,  $C$  — унитальная алгебра с единицей  $1 := t^2$ . Поскольку  $1 \notin Z$ , то  $C = Z + F1$  и  $Z$  — собственный идеал в простой алгебре  $C$ . Полученное противоречие завершает доказательство.  $\square$

Хорошо известно [1], что простая конечно-мерная алгебра с единицей изотопно-проста. Для алгебр с идемпотентом этот результат не верен как показывают предложения 6.1 и 6.2.

## Список литературы

- [1] A. A. Albert, Non-associative algebras. I. Fundamental concepts and isotopy, *Ann. of Math. (2)*, 43:4 (1942), 685–707.
- [2] R. H. Bruck, Some results in the theory of linear non-associative algebras, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 56 (1944), 141–199.
- [3] A. A. Krylov, S. V. Pchelintsev, The isotopically simple algebras with a nil-basis, *Comm. Algebra*, 48:4 (2020), 1697–1712.
- [4] V. G. Tkachev, Inner isotopes associated with automorphisms of commutative associative algebras, *Communications in Mathematics* 32 (2024), no. 2, 153–184 DOI: <https://doi.org/10.46298/cm.12223>
- [5] V. I. Glizburg, S. V. Pchelintsev, Isotopes of simple algebras of arbitrary dimension, *Asian-Eur. J. Math.*, 2020, 2050108, 19 pp.
- [6] Л. Р. Борисова, В. И. Глизбург, С. В. Пчелинцев, Односторонние изотопы конечно-мерных алгебр, *ФПМ*, 2021, 23(4), стр. 3–16; англ. пер.: L. R. Borisova, V. I. Glizburg, and S. V. Pchelintsev, One-sided isotopes of finite-dimensional algebras, *Journal of Mathematical Sciences*, Vol. 269, No. 4, January, 2023, pp. 443–452.
- [7] С. В. Пчелинцев, Изотопы альтернативных алгебр характеристики, отличной от 3, *Изв. РАН. Сер. Матем.*, 84:5 (2020), 197 - 210; англ. пер.: S.V. Pchelintsev, Isotopes of alternative algebras of characteristic different from 3, *Izvestiya: Mathematics* 84:5 (2020), 1002–1015.
- [8] С. В. Пчелинцев, Центральные изотопы  $(-1,1)$ -алгебр, *Сиб. Матем. журн.*, 62:4 (2021), 830 - 844; англ. пер.: S.V. Pchelintsev, Central isotopes of  $(-1,1)$ -algebras, *Siberian Mathematical Journal*, 2021, Vol. 62, No. 4, pp. 678–690.
- [9] N. Jacobson, *Structure and Representations of Jordan Algebras*, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. XXXIX, American Mathematical Society, Providence, RI, 1968.
- [10] K.A. Zhevlakov, A.M. Slinko, I.P. Shestakov, A.I. Shirshov, *Rings that are Nearly Associative*, Nauka, Moscow, 1978; English translation: Academic Press, NY, 1982.
- [11] А.И.Мальцев, *Основы линейной алгебры*, М.: Наука, 2005.
- [12] E. Artin, *Geometric Algebra*, Courier Dover Publications, 2016.

[13] N. Jacobson, Lie Algebras, vol. 10, Courier Corporation, 1979.

Глизбург Вита Иммануиловна,  
Московский городской педагогический университет,  
e-mail: glizburg@mail.ru

Пчелинцев Сергей Валентинович,  
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва,  
e-mail: pchelinzev@mail.ru