

Théorie de Toda sur réseau et espaces homogènes
quantiques

C.Grunspan

Résumé

La théorie de Toda continue pour \widehat{sl}_2 est la considération de deux opérateurs de Vertex $V_{\pm}(z) = {}^o\exp(\pm\beta\varphi(z))_o$ sur des modules de Fock, où $\varphi(z)$ est un champ libre. Ces opérateurs vérifient pour $|z| = 1$ et $q = \exp(i\pi\beta^2)$ des relations de q -commutation remarquables. En outre, leurs modes zéro, $V_{\pm} = \oint V_{\pm}(z)dz$ satisfont les relations de Serre quantiques ([1]). Ceci conduit à l'étude du système sur réseau correspondant dont la limite classique a été traitée dans [2]. Succinctement, on considère des opérateurs x_i et y_i soumis à des lois de q -commutation. Les sommes $\Sigma^+ = \sum x_i$ et $\Sigma^- = \sum y_i$ sont les analogues discrets de V_+ et V_- . Sur l'algèbre engendrée par les variables x_i et y_i , on a une action de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$, où $\widehat{\mathfrak{b}}_-$ est la sous-algèbre de Borel négative de \widehat{sl}_2 . On obtient ainsi une structure de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -algèbre-module. Un des problèmes qui se pose, est de caractériser cette algèbre-module en termes de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$, ou, du moins de caractériser au moyen du groupe quantique $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ uniquement, une sous $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -algèbre-module de $\mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}, 1 \leq i \leq n]_q$ qui soit intègre et qui possède le même corps de fractions que $\mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}, 1 \leq i \leq n]_q$. A isomorphisme près, nous obtiendrons cette sous-algèbre module comme un espace homogène quantique sur \widehat{B}_- . Les résultats démontrés généralisent ceux de [2].

Abstract

The continuous Toda theory for \widehat{sl}_2 is the consideration of two vertex operators $V_{\pm}(z) = {}^o\exp(\pm\beta\varphi(z))_o$ on Fock modules where $\varphi(z)$ is a free field. These operators satisfy for $|z| = 1$ and $q = \exp(i\pi\beta^2)$ some remarkable q -commutations relations. Furthermore, their zero modes, $V_{\pm} = \oint V_{\pm}(z)dz$ satisfy the quantum Serre relations ([1]). This leads to the study of the corresponding system on lattice whose classical limit has been treated in [2]. Briefly, we consider some operators x_i and y_i which obey to some laws of q -commutations. The sums $\Sigma^+ = \sum x_i$ and $\Sigma^- = \sum y_i$ are the discrete analogous of V_+ and V_- . On the algebra spanned by these variables, we have an action of $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$, where $\widehat{\mathfrak{b}}_-$ is the negative sub-Borel algebra of \widehat{sl}_2 . Thus we get a structure of $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -module-algebra. One of the problems we have, is to understand this module-algebra in terms of $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$, or, at least, to characterize by means of the quantum group $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ only, a sub $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -module-algebra of $\mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}, 1 \leq i \leq n]_q$ which possesses the same fraction field as $\mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}, 1 \leq i \leq n]_q$. We shall obtain this sub-module-algebra as a quantum homogeneous space over \widehat{B}_- . The results proved below generalize [2].

Classification AMS : 35Q53, 81R50.

Mots clés

Théorie de Toda sur réseau, morphismes de Poisson, feuilletage symplectique, cellule de Schubert quantique, espace homogène quantique, produit tensoriel tordu.

Key words

Toda theory on lattice, Poisson morphisms, symplectic foliation, quantum Schubert cell, quantum homogeneous space, twisted tensorial product.

0 Introduction

Une version quantique du système sur réseau de sinus-Gordon a été introduite pour la première fois par Izergin et Korepin ([3] et [4]). Ce système a depuis été étudié et développé par de nombreux auteurs. Voir par exemple [5], [6], [7] et [8]. Au niveau classique, B. Enriquez et B. Feigin ont montré une bijection entre l'espace des phases du système sur réseau et le groupe de Lie-Poisson $\widehat{\text{SL}}_2$. Nous nous proposons dans cet article de généraliser ces résultats, et d'établir une bijection entre l'espace des phases quantique du système sur réseau et un espace homogène quantique pour le groupe quantique $U_q(\widehat{\text{sl}}_2)$ que nous caractériserons entièrement dans le cas où q n'est pas une racine de l'unité.

1 Le système sur réseau

1.1 Définition de $A_q^{(n)}$.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ un entier fixé, et q une indéterminée. On s'intéresse à l'algèbre $A_q^{(n)}$ engendrée sur $\mathbb{C}[q, q^{-1}]$ par les $x_i^{\pm 1}$ et $y_i^{\pm 1}$, $1 \leq i \leq n$ soumis aux relations : $x_i x_j = q x_j x_i$, $y_i y_j = q y_j y_i$, $x_i y_j = q^{-1} y_j x_i$, $y_i x_j = q^{-1} x_j y_i$ pour $i < j$, et $x_i y_i = q^{-1} y_i x_i$.

En utilisant par exemple des extensions de Ore ([9]), on montre que $A_q^{(n)}$ est un anneau intègre (non commutatif) qui possède un corps de fractions, et que c'est un $\mathbb{C}[q, q^{-1}]$ module libre dont une base est donnée par la famille $\prod_1^n x_i^{a_i} y_i^{b_i}$, avec $\forall i, (a_i, b_i) \in \mathbb{Z}^2$.

Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, soit $\mathbb{C}[x_i, x_i^{-1}]$ (resp. $\mathbb{C}[y_i, y_i^{-1}]$) l'algèbre engendrée sur $\mathbb{C}[q, q^{-1}]$ par x_i (resp. y_i) et son inverse, que l'on rend graduée par $\partial^o x_i = 1$ (resp. $\partial^o y_i = -1$). Alors, en notant :

$$\mathbb{C}[x_1, x_1^{-1}] \bar{\otimes} \mathbb{C}[y_1, y_1^{-1}] \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} \mathbb{C}[x_n, x_n^{-1}] \bar{\otimes} \mathbb{C}[y_n, y_n^{-1}]$$

le produit tensoriel q^{-1} tordu (ordonné) de ces algèbres graduées, on montre que l'application :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{C}[x_1, x_1^{-1}] \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} \mathbb{C}[y_n, y_n^{-1}] & \longrightarrow & A_q^{(n)} \\ u_1 \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} v_n & \longmapsto & u_1 \dots v_n \end{array} \quad (1.1)$$

est un isomorphisme d'algèbres (voir appendice).

L'algèbre $A_q^{(n)}$ est graduée en posant

$$\partial^o x_i = -\partial^o y_i = 1. \quad (1.2)$$

L'isomorphisme f ci-dessus est gradué.

On posera pour a et b homogènes,

$$[a, b]_q = ab - q^{(\partial^o a)(\partial^o b)}ba. \quad (1.3)$$

On note également $\Sigma^+ = \sum x_i$ et $\Sigma^- = \sum y_i$.

1.2 L'algèbre $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-) \subset U_q(\widehat{\mathfrak{sl}}_2)$.

Soit $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ l'algèbre de Hopf engendrée sur $\mathbb{C}[q, q^{-1}]$ par e_\pm, k, k^{-1} et les relations : $kk^{-1} = k^{-1}k = 1$, $ke_\pm k^{-1} = q^{\pm 1}e_\pm$, ainsi que les relations de Serre quantique entre e_\pm et e_\mp :

$$e_\pm^3 e_\mp - (q + 1 + q^{-1})(e_\pm^2 e_\mp e_\pm - e_\pm e_\mp e_\pm^2) - e_\mp e_\pm^3 = 0$$

La comultiplication sur $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ est donnée par :

$$\Delta e_\pm = k^{\pm 1} \otimes e_\pm + e_\pm \otimes 1, \text{ et } \Delta k^{\pm 1} = k^{\pm 1} \otimes k^{\pm 1}.$$

Nous n'utiliserons pas l'antipode dans cet article.

On dispose d'une graduation sur $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ définie par :

$$\partial^o e_\pm = \pm 1 \quad \text{et} \quad \partial^o k^{\pm 1} = 0.$$

1.3 L'algèbre $U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-) \subset U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$.

Par définition, $U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)$ est la sous-algèbre de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ engendrée par e_\pm .

En notant par $U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-) \bar{\otimes} U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)$ le produit tensoriel q^{-1} tordu de $U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)$ par lui même (voir appendice), on dispose d'une comultiplication tordue sur $U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)$ qui est un morphisme d'algèbres :

$$\begin{aligned} \bar{\Delta} : \quad U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-) &\longrightarrow U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-) \bar{\otimes} U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-) \\ e_\pm &\longmapsto 1 \bar{\otimes} e_\pm + e_\pm \bar{\otimes} 1 \end{aligned} \quad (1.4)$$

On peut montrer que l'existence de $\bar{\Delta}$ équivaut aux relations de Serre quantique.

1.4 Action de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ sur $A_q^{(n)}$.

Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, on dispose de deux morphismes d'algèbres graduées :

$$\begin{aligned} \varphi_i : \quad U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-) &\longrightarrow \mathbb{C}[x_i, x_i^{-1}] \\ e_+ &\longmapsto x_i \\ e_- &\longmapsto 0 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \psi_i : \quad U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-) &\longrightarrow \mathbb{C}[y_i, y_i^{-1}] \\ e_+ &\longmapsto 0 \\ e_- &\longmapsto y_i \end{aligned}$$

Donc, en composant avec $\bar{\Delta}^{(2n-1)}$ et en utilisant l'isomorphisme f de (1.1), on obtient un morphisme d'algèbres graduées :

$$\begin{aligned} \varphi : U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-) &\longrightarrow A_q^{(n)} \\ e_{\pm} &\longmapsto \Sigma^{\pm} \end{aligned} \quad (1.5)$$

Par suite, les opérateurs Σ^{\pm} satisfont les relations de Serre quantique. Donc, les relations de Serre quantique étant homogènes en e_+ et e_- , on peut définir pour $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$, deux actions σ_{λ} et τ_{μ} de $U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)$ sur $A_q^{(n)}$ par :

$$\forall P \in A_q^{(n)} \text{ homogène, } \quad \sigma_{\lambda}(e_{\pm}).P = \lambda \Sigma^{\pm} P,$$

et :

$$\forall P \in A_q^{(n)} \text{ homogène, } \quad \tau_{\mu}(e_{\pm}).P = \mu q^{\pm \partial^o P} P \Sigma^{\pm}.$$

On remarque que :

$$\forall (x, y) \in U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)^2 \text{ homogènes, } \quad \sigma_{\lambda}(x) \circ \tau_{\mu}(y) = q^{-\partial^o x \partial^o y} \tau_{\mu}(y) \circ \sigma_{\lambda}(x).$$

Par suite, on peut définir une action $\sigma_{\lambda} \bar{\otimes} \tau_{\mu}$ de $U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-) \bar{\otimes} U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)$ sur $A_q^{(n)}$, par :

$$\forall (x, y) \in U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)^2, \quad (\sigma_{\lambda} \bar{\otimes} \tau_{\mu})(x \bar{\otimes} y) = \tau_{\mu}(y) \circ \sigma_{\lambda}(x).$$

En composant avec $\bar{\Delta}$ qui est un morphisme d'algèbres, on obtient une action $f_{\lambda, \mu}$ de $U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)$ sur $A_q^{(n)}$. En prenant $\lambda = -\mu = 1$, cette action est donnée par :

$$\forall P \in A_q^{(n)} \text{ homogène, } \quad f_{1, -1}(e_{\pm}).P = [\Sigma^{\pm}, P]_q.$$

On peut étendre $f_{\lambda, \mu}$ en une action de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ sur $A_q^{(n)}$ par :

$$\forall P \in A_q^{(n)} \text{ homogène, } \quad k.P = q^{\partial^o P} P$$

Il est facile de voir que l'on obtient ainsi une structure de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -algèbre module sur $A_q^{(n)}$. Le calcul montre que pour $i \in \{1, \dots, n\}$, $f_{1, -1}(e_{\pm}).x_i$ tout comme $f_{1, -1}(e_{\pm}).y_i$ est une somme de termes tous divisibles par $q - 1$. Par suite, en posant pour $P \in A_q^{(n)}$ homogène :

$$k.P = q^{\partial^o P} P \quad (1.6)$$

$$e_{\pm}.P = \frac{1}{q-1} [\Sigma^{\pm}, P]_q, \quad (1.7)$$

on obtient encore une action de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ sur $A_q^{(n)}$. Cette action est graduée pour ∂^o , et munit $A_q^{(n)}$ d'une structure de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -algèbre module. Dans toute la suite, nous allons nous intéresser à décrire cette structure.

1.5 Définitions élémentaires des q nombres et factorielles quantiques.

On définit successivement :

– pour $n \in \mathbb{N}$, $[n] = \frac{q^n - 1}{q - 1} = \sum_{k=0}^{n-1} q^k \in \mathbb{Z}[q, q^{-1}]$;

– pour $n \in \mathbb{N}$, $[n]! = \prod_{k=1}^n [k]$;

– pour $(n, p) \in \mathbb{Z}^2$,

$$\begin{bmatrix} n \\ p \end{bmatrix} = \begin{cases} 0, & \text{si } p < 0 \text{ ou si } p > \text{Max}(0, n); \\ 1, & \text{si } p = 0; \\ \frac{[n]!}{[p]![n-p]!}, & \text{si } 0 < p \leq n; \end{cases}$$

– pour des entiers N, a_1, \dots, a_N ,

$$F_q(a_1, \dots, a_N) = \prod_{i=1}^{N-1} \begin{bmatrix} a_i + a_{i+1} - 1 \\ a_{i+1} \end{bmatrix}.$$

1.6 Définition des u_i et de $U_q^{(n)}$.

Pour $i \in \mathbb{N}$, soit u_i l'élément de $A_q^{(n)}$ défini par :

$$u_i = \sum_{\substack{\alpha_1, \dots, \alpha_{2n-1} \\ \alpha_1 + \dots + \alpha_{2n-1} = i-1}} F_q(\alpha_{2n-1}, \dots, \alpha_1) (x_1 y_1)^{-\alpha_1} \dots (x_n y_n)^{-\alpha_{2n-1}} y_n^{-1} \quad (1.8)$$

Cette définition a bien un sens car s'il existe $i \in \{1, \dots, N\}$ tel que $\alpha_i < 0$, alors $F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_N) = 0$.

On note $U_q^{(n)}$ la sous-algèbre de $A_q^{(n)}$ engendrée par les u_i pour $i \in \{1, \dots, 2n\}$.

Nous verrons que les éléments $\prod_{i=1}^{2n} u_i^{\alpha_i}$, $\alpha_i \in \mathbb{N}$ forment une base de $U_q^{(n)}$.

1.7 Définition de $\mathcal{A}_q \simeq \mathbb{C}[\widehat{N}_+]_q$.

Soient $k = \mathbb{C}[q^{\frac{1}{4}}, q^{-\frac{1}{4}}]$,

$$H = \begin{pmatrix} q^{-\frac{1}{4}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q^{\frac{1}{4}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q^{\frac{1}{4}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q^{-\frac{1}{4}} \end{pmatrix} \in M_4(k) \simeq M_2(k)^{\otimes 2}, \quad (1.9)$$

$$R(\lambda, \mu) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\lambda - \mu}{q^{-\frac{1}{2}}\lambda - q^{\frac{1}{2}}\mu} & \frac{(q^{-\frac{1}{2}} - q^{\frac{1}{2}})\mu}{q^{-\frac{1}{2}}\lambda - q^{\frac{1}{2}}\mu} & 0 \\ 0 & \frac{(q^{-\frac{1}{2}} - q^{\frac{1}{2}})\lambda}{q^{-\frac{1}{2}}\lambda - q^{\frac{1}{2}}\mu} & \frac{\lambda - \mu}{q^{-\frac{1}{2}}\lambda - q^{\frac{1}{2}}\mu} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_4(k) \simeq M_2(k)^{\otimes 2}, \quad (1.10)$$

et \mathcal{A} l'algèbre libre sur $\mathbb{C}[q, q^{-1}]$ engendrée par les $a_{i,j}^{(r)}$ pour $i, j \in \{1, 2\}$ et $r \in \mathbb{N}$.

On pose :

$$\begin{aligned} a_{i,j}(\lambda) &= \sum_{r=0}^{+\infty} a_{i,j}^{(r)} \lambda^r, \\ \mathcal{L}(\lambda) &= [a_{i,j}(\lambda)], \\ \mathcal{L}^1(\lambda) &= \mathcal{L}(\lambda) \otimes Id, \\ \text{et } \mathcal{L}^2(\mu) &= Id \otimes \mathcal{L}(\mu). \end{aligned}$$

Par définition, \mathcal{A}_q est l'algèbre quotient de \mathcal{A} par l'idéal engendré par les relations :

$$a_{2,1}^{(0)} = 0, a_{1,1}^{(0)} = a_{2,2}^{(0)} = 1, \quad (1.11)$$

ainsi que

$$R(\lambda, \mu) \mathcal{L}^1(\lambda) H \mathcal{L}^2(\mu) = \mathcal{L}^2(\mu) H \mathcal{L}^1(\lambda) R(\lambda, \mu), \quad (1.12)$$

et

$$a_{1,1}(q\lambda) [a_{2,2}(\lambda) - a_{2,1}(\lambda) a_{1,1}(\lambda)^{-1} a_{1,2}(\lambda)] = 1. \quad (1.13)$$

Le calcul montre que ces relations sont à coefficients dans $\mathbb{C}[q, q^{-1}]$. Donc, ceci a bien un sens. La dernière relation est celle du déterminant quantique.

On montre que l'on peut définir une graduation sur \mathcal{A}_q par $\partial^o a_{i,j}^{(r)} = i - j$.

Il suffit pour cela de considérer l'opérateur $\lambda \frac{\partial}{\partial \lambda}$.

On peut également définir une comultiplication tordue sur \mathcal{A}_q par :

$$\begin{aligned} \bar{\Delta} : \mathcal{A}_q &\longrightarrow \mathcal{A}_q \bar{\otimes} \mathcal{A}_q \\ \mathcal{L}(\lambda) &\longmapsto \mathcal{L}(\lambda) \bar{\otimes} \mathcal{L}(\lambda) \end{aligned}$$

Pour une démonstration de ce fait, voir l'appendice.

L'algèbre \mathcal{A}_q est isomorphe à $U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)$ par l'isomorphisme gradué :

$$\begin{aligned} U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-) &\longrightarrow \mathcal{A}_q \\ e_+ &\longmapsto a_{2,1}^{(1)} \\ e_- &\longmapsto a_{1,2}^{(0)}. \end{aligned} \quad (1.14)$$

Cet isomorphisme respecte les comultiplications tordues.

1.8 Définition de $\mathcal{A}_q^{(n)}$.

On définit tout d'abord l'algèbre $\bar{\mathcal{A}}_q^{(n)}$ comme étant le quotient de \mathcal{A}_q par l'idéal engendré par les éléments : $a_{1,1}^{(r-1)}, a_{1,2}^{(r-1)}, a_{2,1}^{(r)}, a_{2,2}^{(r)}$ pour $r > n$.

L'algèbre $\mathcal{A}_q^{(n)}$ est l'algèbre engendrée par générateurs :

$$a_{i,j}^{(k)}, 0 \leq k \leq n, a_{1,1}^{(n-1)'}, a_{1,2}^{(n-1)'}, a_{2,1}^{(n)'}, a_{2,2}^{(n)'},$$

et relations :

$$\begin{aligned} a_{2,1}^{(0)} &= a_{1,1}^{(n)} = a_{1,2}^{(n)} = 0, \\ a_{1,1}^{(0)} &= a_{2,2}^{(0)} = 1, \end{aligned}$$

$$(1.12) \text{ et } (1.13) \text{ avec } \mathcal{L}(\lambda) = [a_{i,j}(\lambda)] \text{ et } a_{i,j}(\lambda) = \sum_{k=0}^n a_{i,j}^{(k)} \lambda^k,$$

$$\begin{aligned} a_{1,1}^{(n-1)} a_{1,1}^{(n-1)'} &= a_{1,1}^{(n-1)'} a_{1,1}^{(n-1)} = 1, \\ a_{1,2}^{(n-1)} a_{1,2}^{(n-1)'} &= a_{1,2}^{(n-1)'} a_{1,2}^{(n-1)} = 1, \\ a_{2,1}^{(n)} a_{2,1}^{(n)'} &= a_{2,1}^{(n)'} a_{2,1}^{(n)} = 1, \\ a_{2,2}^{(n)} a_{2,2}^{(n)'} &= a_{2,2}^{(n)'} a_{2,2}^{(n)} = 1. \end{aligned}$$

L'algèbre $\mathcal{A}_q^{(n)}$ est trop grosse pour que l'on puisse espérer obtenir une cellule de Schubert quantique. Il faudrait imposer en plus les relations entre les $a_{i,j}^{(k)}$, et $a_{1,1}^{(n-1)'}, a_{1,2}^{(n-1)'}, a_{2,1}^{(n)'}, a_{2,2}^{(n)'}$. Bien que ce ne soit pas notre sujet d'étude, nous reviendrons sur ce point à la fin de notre article en énonçant une conjecture.

Quoiqu'il en soit, l'algèbre $\mathcal{A}_q^{(n)}$ définie ci-dessus contient la sous-algèbre $\mathcal{U}_q^{(n)}$ définie ci-dessous, et c'est cette dernière algèbre qui va nous intéresser.

Notons que l'on a une flèche naturelle :

$$\bar{\mathcal{A}}_q^{(n)} \longrightarrow \mathcal{A}_q^{(n)},$$

et que si C est une algèbre et

$$f : \bar{\mathcal{A}}_q^{(n)} \longrightarrow C$$

est un morphisme tel que $f(a_{1,1}^{(n-1)}), \dots, f(a_{2,2}^{(n)})$ soient inversibles, alors, il existe :

$$g : \mathcal{A}_q^{(n)} \longrightarrow C,$$

un morphisme rendant commutatif le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} \bar{\mathcal{A}}_q^{(n)} & \longrightarrow & \mathcal{A}_q^{(n)} \\ f \searrow & & \swarrow g \\ & C & \end{array}$$

1.9 Définition de $\mathcal{U}_q^{(n)}$.

Par définition, $\mathcal{U}_q^{(n)}$ est la sous-algèbre de $\mathcal{A}_q^{(n)}$ engendrée par les $2n$ premiers coefficients de $a_{2,2}(\lambda)^{-1}a_{2,1}(\lambda)$ développé en puissances de λ^{-1} . Ceci a bien un sens car $a_{2,2}(\lambda)$ est un polynôme en λ de degré n dont le coefficient dominant $a_{2,2}^{(n)}$ est inversible.

Nous verrons que $\mathcal{U}_q^{(n)}$ est isomorphe à $U_q^{(n)}$ et s'identifie à un espace homogène quantique dont on exprimera la limite classique.

2 Le théorème principal

Nous allons montrer le théorème suivant :

Théorème 2.1

T1. Les u_i , $i \geq 1$ peuvent s'obtenir comme développement de la fraction continue quantique suivante :

$$\left(1 + \left(1 + \left(1 + \dots \left(1 + (\lambda x_1 y_1)^{-1}\right)^{-1} (\lambda y_1 x_2)^{-1}\right)^{-1} \dots \right. \right. \\ \left. \left. \dots (\lambda y_{n-1} x_n)^{-1}\right)^{-1} (\lambda x_n y_n)^{-1}\right)^{-1} y_n^{-1} \quad (2.1)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k u_{k+1} \lambda^{-k}$$

T2. La sous-algèbre $U_q^{(n)}$ engendré par les u_i pour $i \in \{1, \dots, 2n\}$ est une sous $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -algèbre-module de $A_q^{(n)}$ qui possède le même corps de fractions que $A_q^{(n)}$. Elle est isomorphe à l'algèbre définie par générateurs : t_i , $1 \leq i \leq 2n$, et relations :

$$\forall i < j, \quad q[t_i, t_j] = (q-1) \sum_{k=i}^{j-1} t_k t_{i+j-k}$$

T3. La sous-algèbre $\mathcal{U}_q^{(n)}$ de $\mathcal{A}_q^{(n)}$ s'identifie à un espace homogène quantique et est isomorphe à $U_q^{(n)}$.

T4. Spécialisons q en un nombre complexe non nul, non racine de l'unité, et adjoignons à $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ une racine carrée de k , de sorte que $A_q^{(n)}$ reste une $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -algèbre-module, en posant, en plus de (1.6) et (1.7) :

$$k^{\frac{1}{2}}.P = q^{\frac{1}{2}\partial^o} P,$$

pour P homogène. Alors, il existe $I_q^{(n)}$ un idéal de Hopf à droite gradué de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$, et un couplage de Hopf gradué non dégénéré :

$$U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)/I_q^{(n)} \times U_q^{(n)} \longrightarrow \mathbb{C}$$

qui induisent un monomorphisme d'algèbres :

$$U_q^{(n)} \hookrightarrow \left(U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)/I_q^{(n)} \right)^*$$

tel que $\left(U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)/I_q^{(n)} \right)^*$ soit la complétion formelle de $U_q^{(n)}$. Autrement dit, $U_q^{(n)}$ est un module coinduit :

$$U_q^{(n)} \simeq (\mathbb{C} \otimes_{I_q^{(n)}} U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-))^*$$

où \mathbb{C} est muni d'une structure de $I_q^{(n)}$ -module à droite triviale.

T5. En termes de nouvelles réalisations de Drinfeld ([10]), $I_q^{(n)}$ est l'idéal à droite engendré par : $h[0]-1, h[-k], k > 0; e[-l], l \geq 1; f[-m], m \geq 2n$.

3 Plan de la démonstration

La démonstration se fera en sept étapes, É1,...,É7.

É1. Etude du cas classique.

Celle-ci nous conduira naturellement à considérer les limites classiques des u_i définis ci-dessus.

É2. Démonstration de T1.

É3. Calcul de l'action de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ sur les $u_i, 1 \leq i \leq 2n$.

En vu de montrer que $U_q^{(n)}$ est un $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -module, nous calculons directement l'action de e_{\pm} sur les $u_i, 1 \leq i \leq 2n$.

É4. Construction d'un morphisme d'algèbres de $\mathcal{A}_q^{(n)}$ dans $A_q^{(n)}$.

Nous construisons d'abord un morphisme de \mathcal{A}_q dans $A_q^{(n)}$. Ce morphisme n'est rien d'autre que l'application φ de (1.5) lue de manière groupique grâce à l'isomorphisme (1.14).

É5. Relations de commutations entre les $u_i, 1 \leq i \leq 2n$.

Celles-ci sont obtenues grâce aux relations de commutation dans $\mathcal{U}_q^{(n)}$ via le morphisme précédent et le plongement de $\mathcal{U}_q^{(n)}$ dans $\mathcal{A}_q^{(n)}$.

É6. Démonstration de T2 et de T3.

On montre qu'une base de $U_q^{(n)}$ est donnée par la famille $\prod_{i=1}^{2n} u_i^{\alpha_i}$ pour $\alpha_i \in \mathbb{N}$.

É7. Calcul de $I_q^{(n)}$ et fin de la démonstration.

L'algèbre $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ étant isomorphe à $\mathbb{C}[\widehat{B}_+]_q$, on cherche $I_q^{(n)}$ dans $\mathbb{C}[\widehat{B}_+]_q$. Nous y parvenons après avoir mis en évidence le fait que l'action de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ dans $A_q^{(n)}$ est bi-graduée, et examiné l'action des $a_{i,j}^{(k)}$ dans $U_q^{(n)}$.

É1 Le cas classique (voir également [2])

Nous rappelons le procédé utilisé dans [2] pour obtenir une sous-algèbre de $\mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}]$ ayant le même corps des fractions que $\mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}]$, stable par l'action de $\widehat{\mathfrak{b}}_-$ et facilement exprimable en termes de $U\widehat{\mathfrak{b}}_-$.

É1.1

Soit λ une indéterminée, et $\widehat{G} = SL_2(\mathbb{C}((\lambda^{-1})))$. On pose :

$$e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{aligned} \widehat{\mathfrak{g}} &= sl_2 \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}((\lambda^{-1})); \\ \widehat{\mathfrak{b}}_- &= (e \otimes \lambda^{-1} \mathbb{C}[[\lambda^{-1}]]) \oplus (f \otimes \mathbb{C}[[\lambda^{-1}]]) \oplus (h \otimes \mathbb{C}[[\lambda^{-1}]]); \\ \widehat{\mathfrak{n}}_+ &= (e \otimes \mathbb{C}[\lambda]) \oplus (f \otimes \lambda \mathbb{C}[\lambda]) \oplus (h \otimes \lambda \mathbb{C}[\lambda]); \\ \widehat{B}_- &= \exp(\widehat{\mathfrak{b}}_-) \text{ et } \widehat{N}_+ = \exp(\widehat{\mathfrak{n}}_+). \end{aligned}$$

On a :

$$\widehat{\mathfrak{g}} = \widehat{\mathfrak{b}}_- \oplus \widehat{\mathfrak{n}}_+. \quad (\text{É1.1})$$

Soit P_0 le bichamp de Poisson défini sur \widehat{G} par $P_0 = r^g - r^d$ où r est la r -matrice trigonométrique standard :

$$r = \frac{1}{2} \frac{\lambda + \mu}{\lambda - \mu} h \otimes h + \frac{2}{\lambda - \mu} (\lambda e \otimes f + \mu f \otimes e).$$

Soit P_1 le bichamp défini par $P_1 = h^g \otimes h^d - h^d \otimes h^g$. Le crochet de Lie $[h^g, h^d]$ est nul. Par suite, le crochet de Schouten $[P_1, P_1] = 0$. De même, le fait que r soit ad_h -invariant entraîne que le crochet de Schouten $[P_0, P_1] = 0$. D'où une structure de Poisson sur \widehat{G} donnée par $P = -\frac{1}{2}P_0 + \frac{1}{4}P_1$.

Le sous-groupe \widehat{B}_- est une sous-variété de Poisson pour la structure définie par P_0 comme pour celle définie par P . Le sous-groupe \widehat{N}_+ n'est pas une sous-variété de Poisson pour la structure définie par P_0 . Par contre, il l'est pour celle définie par P . Dans la suite, lorsque nous parlerons de

structure de Poisson sur \widehat{G} (ou sur l'une de ses sous-variétés), il s'agira toujours de la structure définie par P .

En généralisant un résultat de DeConcini, Kac et Procesi [11] qui découle lui même d'un théorème de Semenov-Tian-Shansky [12], on montre que les feuilles symplectiques de \widehat{N}_+ sont les $\widehat{B}_- w \widehat{B}_- \cap \widehat{N}_+$ où $w \in W, W$ désignant le groupe de Weyl de \widehat{G} .

Notons $w_n = \begin{pmatrix} \lambda^{-n} & 0 \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix}, S = \widehat{B}_- \cap w_n^{-1} \widehat{B}_- w_n, \mathcal{U}^{(n)} = S \backslash \widehat{B}_-$ l'ensemble de ses classes à gauche dans \widehat{B}_- , et

$$\begin{aligned} \pi : \widehat{B}_- w_n \widehat{B}_- &\longrightarrow \widehat{B}_- \backslash \widehat{B}_- w_n \widehat{B}_- \xrightarrow{\sim} S \backslash \widehat{B}_- = \mathcal{U}^{(n)} \\ a w_n b &\longmapsto \text{cl}(a w_n b) \longmapsto \text{cl}(b) \end{aligned}$$

Posons également $\mathcal{A}^{(n)} = \widehat{B}_- w_n \widehat{B}_- \cap \widehat{N}_+$. On vérifie que $\mathcal{A}^{(n)}$ est l'ensemble des matrices

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{C}[\lambda])$$

telles que

$$a(0) = d(0) = 1, c(0) = 0, \quad (\text{É1.2})$$

et

$$\begin{aligned} \partial^o a &= \partial^o b = n - 1; \\ \partial^o c &= \partial^o d = n. \end{aligned} \quad (\text{É1.3})$$

On montre facilement que la restriction π' de π à $\mathcal{A}^{(n)}$ est injective, et que

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & \lambda^{-1} b \\ \lambda^{-2n} c & d \end{pmatrix}, a, b, c, d \in \mathbb{C}[[\lambda^{-1}]] \right\}.$$

D'où l'on voit que $\mathcal{U}^{(n)}$ s'identifie à $\mathbb{C}_{2n-1}[\lambda^{-1}] = \mathbb{C}[[\lambda^{-1}]]/\lambda^{-2n}\mathbb{C}[[\lambda^{-1}]]$ en associant à $\rho \in \mathbb{C}_{2n-1}[\lambda^{-1}]$ la classe de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{U}^{(n)}$.

Dans cette identification, l'application π' n'est autre que :

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longrightarrow \text{cl}\left(\frac{c}{d}\right) \pmod{\lambda^{-2n}} \quad (\text{É1.4})$$

Le sous-groupe S étant une sous-variété de Poisson de \widehat{B}_- , on peut munir l'espace homogène $\mathcal{U}^{(n)} = S \backslash \widehat{B}_-$ d'une structure de Poisson telle que π et π' soient de Poisson.

L'action d'habillage de $\widehat{\mathfrak{b}}_-$ sur \widehat{N}_+ est définie par :

$$\forall x \in \widehat{\mathfrak{b}}_- \forall n \in \widehat{N}_+, X_x(n) = (n x n^{-1})_{+n},$$

en notant par y_+ la projection de $y \in \widehat{\mathfrak{g}}$ sur $\widehat{\mathfrak{n}}_+$ parallèlement à $\widehat{\mathfrak{b}}_-$, suivant la décomposition (É1.1).

Par π' , la restriction de cette action d'habillage de $\widehat{\mathfrak{b}}_-$ sur la feuille symplectique $\mathcal{A}^{(n)} = \widehat{B}_- w_n \widehat{B}_- \cap \widehat{N}_+$ de \widehat{N}_+ se retrouve en l'action par translation à droite de $\widehat{\mathfrak{b}}_-$ sur $\widehat{B}_- \setminus \widehat{B}_- w_n \widehat{B}_- \simeq S \setminus \widehat{B}_- = \mathcal{U}^{(n)}$.

Soit \mathfrak{s} l'algèbre de Lie de S , et $I_{\text{cl}}^{(n)}$ l'idéal à droite de $U\widehat{\mathfrak{b}}_-$ engendré par \mathfrak{s} . Tous les éléments de $\widehat{\mathfrak{b}}_-$ étant primitifs dans $U\widehat{\mathfrak{b}}_-$ muni de sa structure d'algèbre de Hopf naturelle, $I_{\text{cl}}^{(n)}$ est un idéal de Hopf. De plus, d'après la forme de S , on a

$$I_{\text{cl}}^{(n)} = \langle h - 1, h \otimes \lambda^{-k}, k > 0; e \otimes \lambda^{-l}, l \geq 1; f \otimes \lambda^{-m}, m \geq 2n \rangle. \quad (\text{É1.5})$$

Si X est un champ de vecteur engendré par translation à droite d'un élément de \mathfrak{s} , alors clairement :

$$\forall f \in \mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}], \quad \text{ev}_S(X.f) = 0,$$

en posant $\text{ev}_S(g) = g(S)$ pour $g \in \mathbb{C}[S \setminus \widehat{B}_-]$. De plus, on a un couplage non-dégénéré :

$$\begin{aligned} U\widehat{\mathfrak{b}}_- / I_{\text{cl}}^{(n)} \times \mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}] &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (\bar{x}, P) &\longmapsto \text{ev}_S(x.P) \end{aligned} \quad (\text{É1.6})$$

avec un plongement d'algèbres :

$$\mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}] \hookrightarrow \left(U\widehat{\mathfrak{b}}_- / I_{\text{cl}}^{(n)} \right)^*$$

tel que $\left(U\widehat{\mathfrak{b}}_- / I_{\text{cl}}^{(n)} \right)^*$ soit la complétion formelle de $\mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}]$.

É1.2

On munit \mathbb{C}^{2n} d'une structure de Poisson par la limite pour $q \rightarrow 1$ du q -crochet $[\cdot, \cdot]_q$ et nous ne nous intéresserons qu'à cette structure.

Explicitement, si x_i et y_i désignent les fonctions coordonnées ($1 \leq i \leq n$), on a : $\{x_i, x_j\} = x_i x_j$, $\{y_i, y_j\} = y_i y_j$, $\{x_i, y_j\} = -x_i y_j$, $\{y_i, x_j\} = -y_i x_j$ pour $i < j$, et $\{x_i, y_i\} = -x_i y_i$.

La structure de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -algèbre-module sur A_n se traduit en une action par champ de vecteurs de $\widehat{\mathfrak{b}}_-$ sur \mathbb{C}^{2n} . Pour tout $P \in \mathbb{C}[x_i, y_i, 1 \leq i \leq n]$ homogène ($\partial^o x_i = -\partial^o y_i = 1$), on a :

$$k.P = \frac{1}{2}(\partial^o P)P \text{ et } e_{\pm}.P = \{\Sigma^{\pm}, P\}$$

É1.3

Soit maintenant φ_{cl} l'application suivante :

$$\begin{aligned} \varphi_{\text{cl}} : \quad \mathbb{C}^{2n} &\longrightarrow \widehat{N}_+ \subset \widehat{G} \\ (x_1, \dots, y_n) &\longmapsto \prod_{i=1}^n \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda x_i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y_i \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On montre que φ_{cl} est un morphisme de Poisson. Or, \mathbb{C}^{*2n} est une feuille symplectique de \mathbb{C}^{2n} . Donc, d'après ce qui précède,

$$\exists w \in W, \phi(\mathbb{C}^{*2n}) \subset \widehat{B}_- w \widehat{B}_- \cap \widehat{N}_+.$$

En regardant précisément l'image de \mathbb{C}^{*2n} par l'application φ_{cl} , on voit que nécessairement $w = w_n$.

Par ailleurs, en notant φ_{cl}^* le comorphisme associé à φ_{cl} , on a avec des notations évidentes, $\varphi_{\text{cl}}^*(a_{2,1}^{(1)}) = \Sigma^+$ et $\varphi_{\text{cl}}^*(a_{1,2}^{(0)}) = \Sigma^-$. Après calculs, il en résulte que l'action de $\widehat{\mathfrak{b}}_-$ sur \mathbb{C}^{*2n} par champs de vecteurs se retrouve en l'action d'habillage de $\widehat{\mathfrak{b}}_-$ sur \widehat{N}_+ .

On est dans la situation suivante où toutes les flèches sont des morphismes de Poisson, et leurs comorphismes des morphismes de $U\widehat{\mathfrak{b}}_-$ -modules :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^{*2n} & \xrightarrow{\varphi_{\text{cl}}} & \mathcal{A}^{(n)} \\ \pi' \circ \varphi_{\text{cl}} \searrow & & \swarrow \pi' \\ & \mathcal{U}^{(n)} & \end{array} \quad (\text{É1.7})$$

Grace à l'identification entre $\mathcal{U}^{(n)}$ et $\mathbb{C}_{2n-1}[\lambda^{-1}]$, notons $\alpha_i \in \mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}]$ la fonction coordonnée qui donne le coefficient devant λ^{-i+1} . Alors,

$$\mathbb{C}[\alpha_1, \dots, \alpha_{2n}] = \mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}],$$

et, d'après (É1.4), l'application $(\pi' \circ \varphi_{\text{cl}})^*$ n'est autre que :

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}] &\longrightarrow \mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}] \\ \alpha_i &\longmapsto u_{i,\text{cl}} = \text{coeff devant } \lambda^{-i+1} \text{ de } \varphi_{\text{cl}}^* \begin{pmatrix} a_{2,1}(\lambda) \\ a_{2,2}(\lambda) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (\text{É1.8})$$

Notons $U^{(n)}$ la sous-algèbre de $\mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}]$ engendrée par les $u_{i,\text{cl}}$. C'est un $U\widehat{\mathfrak{b}}_-$ -sous-module de $\mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}]$.

Le calcul montre que

$$\frac{a_{2,1}}{a_{2,2}}(\varphi_{\text{cl}}(x_1, \dots, y_n)) = \frac{1}{1 + \frac{(\lambda x_n y_n)^{-1}}{1 + \frac{(\lambda y_{n-1} x_n)^{-1}}{\dots \frac{(\lambda y_1 x_2)^{-1}}{1 + (\lambda x_1 y_1)^{-1}}}}} y_n^{-1}. \quad (\text{É1.9})$$

Proposition É1.1 Soient $t_i, 1 \leq i \leq n$ des variables commutatives. Alors, dans $\mathbb{C}[[t_i, 1 \leq i \leq n]]$, on a :

$$\frac{1}{1 - \frac{t_1}{1 - \frac{t_2}{1 - \frac{t_{n-1}}{1 - t_n}}}}} = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) t_1^{\alpha_1} \dots t_n^{\alpha_n}$$

avec par définition, $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \prod_{i=1}^{n-1} \binom{\alpha_i + \alpha_{i+1} - 1}{\alpha_{i+1}}$.

Démonstration. Par récurrence sur n à partir de la formule :

$$\left(\frac{1}{1+X} \right)^n = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \binom{n+p-1}{p} X^p$$

vraie dans $\mathbb{C}[[X]]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. □

Il en résulte que pour $i \in \{1, \dots, 2n\}$,

$$u_{i,\text{cl}} = \sum_{\substack{\alpha_1, \dots, \alpha_{2n-1} \\ \alpha_1 + \dots + \alpha_{2n-1} = i-1}} F(\alpha_{2n-1}, \dots, \alpha_1) (x_1 y_1)^{-\alpha_1} \dots (x_n y_n)^{-\alpha_{2n-1}} y_n^{-1}. \quad (\text{É1.10})$$

De plus, en définissant par la même formule $u_{i,\text{cl}}$ pour $i > 2n$, on a :

$$\frac{a_{2,1}}{a_{2,2}} (\varphi_{\text{cl}}(x_1, \dots, y_n)) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k u_{k+1,\text{cl}} \lambda^{-k}. \quad (\text{É1.11})$$

On constate que pour $k \in \{1, \dots, \mathbb{E}(\frac{n-1}{2})\}$,

$$u_{2k} \in \mathbb{C}[x_{n-k+1}^{-1}, y_{n-k+1}^{-1}, \dots, y_n^{-1}] \text{ et } u_{2k+1} \in \mathbb{C}[y_{n-k}^{-1}, x_{n-k+1}^{-1}, \dots, y_n^{-1}].$$

En particulier, on voit que $(\pi' \circ \varphi_{\text{cl}})^*$ est injective et birationnelle. Donc $U^{(n)}$ possède le même corps des fractions que $\mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}]$ et est un $U\widehat{\mathfrak{b}}_-$ -module isomorphe à $\mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}]$.

De plus, $(\pi' \circ \varphi_{\text{cl}})^*$ injective entraîne que $\pi' \circ \varphi_{\text{cl}}$ est dense. Or π' est injective. Donc, φ_{cl} et π' sont denses. Par suite, en termes d'algèbres de fonctions, le diagramme (É1.7) peut se réécrire en le diagramme commutatif suivant où toutes les flèches sont injectives :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}] & \xrightarrow{\pi'^*} & \mathbb{C}[\mathcal{A}^{(n)}] \\ (\pi' \circ \varphi_{\text{cl}})^* \searrow & & \swarrow \varphi_{\text{cl}}^* \\ & \mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}] & \end{array} \quad (\text{É1.12})$$

L'image de $\mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}]$ est $U^{(n)}$. On peut caractériser explicitement les algèbres de Poisson $\mathbb{C}[\mathcal{A}^{(n)}]$ et $\mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}]$:

- Pour $\mathbb{C}[\mathcal{A}^{(n)}]$, on définit tout d'abord l'algèbre (commutative) sur \mathbb{C} donnée par générateurs :

$$a_{1,1}^{(0)}, \dots, a_{1,1}^{(n-1)}, a_{1,2}^{(0)}, \dots, a_{1,2}^{(n-1)}, a_{2,1}^{(0)}, \dots, a_{2,1}^{(n)}, a_{2,2}^{(0)}, \dots, a_{2,2}^{(n)},$$

et relations :

$$\begin{aligned} \forall i, i', j, j', k, k', a_{i,j}^{(k)} a_{i',j'}^{(k')} &= a_{i',j'}^{(k')} a_{i,j}^{(k)} \\ a_{1,1}^{(0)} - 1 &= a_{2,2}^{(0)} - 1 = a_{2,1}^{(0)} = 0 \\ a_{1,1}(\lambda) a_{2,2}(\lambda) - a_{2,1}(\lambda) a_{1,2}(\lambda) &= 1, \end{aligned}$$

avec

$$\forall i, j, a_{i,j}(\lambda) = \sum_k a_{i,j}^{(k)} \lambda^k.$$

L'algèbre $\mathbb{C}[\mathcal{A}^{(n)}]$ s'obtient alors en localisant suivant la partie multiplicative engendrée par $a_{1,1}^{(n-1)}, a_{1,2}^{(n-1)}, a_{2,1}^{(n)}, a_{2,2}^{(n)}$. Ceci est dû au fait que dans $\mathcal{A}^{(n)}$, les degrés sont fixés géaux à $n-1$ ou n .

Par ailleurs, après calculs, on vérifie que les crochets de Poisson entre les $a_{i,j}^{(k)}$ sont donnés par les formules suivantes :

$$\begin{aligned} \forall i, j, \{a_{i,j}(\lambda), a_{i,j}(\mu)\} &= 0 \\ (\lambda - \mu) \{a_{1,1}(\lambda), a_{1,2}(\mu)\} &= \lambda a_{1,1}(\lambda) a_{1,2}(\mu) - \lambda a_{1,1}(\mu) a_{1,2}(\lambda) \\ (\lambda - \mu) \{a_{1,1}(\lambda), a_{2,1}(\mu)\} &= -\lambda a_{1,1}(\lambda) a_{2,1}(\mu) + \mu a_{1,1}(\mu) a_{2,1}(\lambda) \\ (\lambda - \mu) \{a_{1,1}(\lambda), a_{2,2}(\mu)\} &= -\lambda a_{1,2}(\lambda) a_{2,1}(\mu) + \mu a_{1,2}(\mu) a_{2,1}(\lambda) \\ (\lambda - \mu) \{a_{1,2}(\lambda), a_{2,1}(\mu)\} &= -\mu a_{1,1}(\lambda) a_{2,2}(\mu) + \mu a_{1,1}(\mu) a_{2,2}(\lambda) \\ (\lambda - \mu) \{a_{1,2}(\lambda), a_{2,2}(\mu)\} &= -\mu a_{1,2}(\lambda) a_{2,2}(\mu) + \mu a_{1,2}(\mu) a_{2,2}(\lambda) \\ (\lambda - \mu) \{a_{2,1}(\lambda), a_{2,2}(\mu)\} &= \mu a_{2,1}(\lambda) a_{2,2}(\mu) - \lambda a_{2,1}(\mu) a_{2,2}(\lambda). \end{aligned} \quad (\acute{E}1.13)$$

- L'algèbre $\mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}]$ des fonctions sur l'espace homogène $\mathcal{U}^{(n)}$ s'identifie par l'application injective $(\pi')^*$ à la sous-algèbre de $\mathbb{C}[\mathcal{A}^{(n)}]$ engendrée par les $2n$ premiers coefficients du développement en λ^{-1} de $v(\lambda^{-1}) := \frac{a_{2,1}(\lambda)}{a_{2,2}(\lambda)}$. Ces coefficients sont les images des α_i définis plus haut. Ils sont algébriquement indépendants, et on a $\mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}] = \mathbb{C}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ (en identifiant les α_i avec leurs images).

En exploitant l'égalité (É1.13) et la propriété de Leibnitz du crochet de Poisson, on obtient la relation :

$$(\lambda - \mu) \{v(\lambda^{-1}), v(\mu^{-1})\} = (\mu v(\lambda^{-1}) - \lambda v(\mu^{-1})) (v(\lambda^{-1}) - v(\mu^{-1})), \quad (\acute{E}1.14)$$

ce qui donne après développement :

$$\forall i < j, \{\alpha_i, \alpha_j\} = \sum_{k=i}^{j-1} \alpha_k \alpha_{i+j-k}. \quad (\acute{E}1.15)$$

Ces formules décrivent l'algèbre de Poisson $\mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}]$.

Revenons au diagramme (É1.12). La fonction $(\pi' \circ \varphi_{\text{cl}})^*$ envoie $\text{ev}_S \in \mathbb{C}[\mathcal{U}^{(n)}]$ sur la fonction $\text{ev} \in \mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}]$ qui à tout polynôme $P \in \mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}]$ associe son terme constant. Donc, d'après (É1.6), on obtient le couplage non-dégénérée suivant :

$$\begin{aligned} U\widehat{\mathfrak{b}}_{-/I_{\text{cl}}^{(n)}} \times U^{(n)} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (\bar{x}, P) &\longmapsto \text{ev}(x.P) \end{aligned} \quad (\acute{E}1.16)$$

avec un plongement d'algèbres :

$$U^{(n)} \hookrightarrow \left(U\widehat{\mathfrak{b}}_{-/I_{\text{cl}}^{(n)}} \right)^*$$

tel que $\left(U\widehat{\mathfrak{b}}_{-/I_{\text{cl}}^{(n)}} \right)^*$ soit la complétion formelle de $U^{(n)}$. Autrement dit, $U^{(n)}$ est le module coinduit :

$$U^{(n)} \simeq (\mathbb{C} \otimes_{I_{\text{cl}}^{(n)}} U\widehat{\mathfrak{b}}_{-})^* \quad (\acute{E}1.17)$$

Ceci clôture le cas classique. Passons au cas quantique.

É2 Démonstration de T2

Elle découle de la proposition suivante qui est une généralisation de la proposition É1.1 :

Proposition É2.1 *Soit q une indéterminée, et $A_n = \mathbb{C}[q, q^{-1}]$. Alors, dans $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}/I_n$, où I_n est l'idéal engendré par les éléments $t_i t_{i+1} - q t_{i+1} t_i$ pour $i \in \{1, \dots, n\}$ et les $t_i t_j - t_j t_i$ pour $|i - j| \geq 2$, on a :*

$$\begin{aligned} &\left(1 - \left(1 - \left(1 - \dots \left(1 - t_n \right)^{-1} t_{n-1} \right)^{-1} \dots t_2 \right)^{-1} t_1 \right)^{-1} \\ &= \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) t_n^{\alpha_n} \dots t_1^{\alpha_1}. \end{aligned}$$

Démonstration. Pour la définition de $A_n = A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}/I_n$, voir l'appendice.

Dans le cas classique où $q = 1$, on retrouve la proposition É1.1.

Démontrons la propriété par récurrence sur n .

- Si $n = 1$, le résultat est clair.
- Supposons la propriété vraie au rang n . Notons pour tout k , v_k la valuation sur A_k correspondant à la graduation telle que $\forall i, \partial^i t_i = 1$, et F_k la fraction en question. Clairement, l'application :

$$\iota_n : \begin{array}{ccc} A_{n-1} & \longrightarrow & A_{n+1} \\ t_i & \longmapsto & t_{i+1} \end{array}$$

est un plongement d'algèbres valuées. Par conséquent, l'hypothèse de récurrence montre que :

$$v_{n+1}(\iota_n(F_n)) = v_n(F_n) \geq 0.$$

D'où :

$$v_{n+1}(\iota_n(F_n)t_1) \geq 1.$$

D'après l'appendice, il s'ensuit que $1 - \iota_n(F_n)t_1$ est inversible dans A_{n+1} , ce qui prouve l'existence de F_{n+1} .

Posons :

$$v_1 = t_1, \dots, v_{n-1} = t_{n-1}, v_n = (1 - t_{n+1})^{-1}t_n.$$

Alors,

$$\forall i, j, \quad |i - j| \geq 2 \implies v_i v_j = v_j v_i.$$

De plus,

$$\begin{aligned} v_{n-1}v_n &= t_{n-1}(1 - t_{n+1})^{-1}v_n \\ &= (1 - t_{n+1})^{-1}t_{n-1}t_n \\ &= q(1 - t_{n+1})^{-1}t_n t_{n-1} \\ &= qv_n v_{n-1}. \end{aligned}$$

Donc, en appliquant l'hypothèse de récurrence,

$$\begin{aligned} F_{n+1} &:= \left(1 - \left(1 - \left(1 - \dots (1 - t_{n+1})^{-1}t_n\right)^{-1} \dots t_2\right)^{-1} t_1\right)^{-1} \\ &= \left(1 - \left(1 - \left(1 - \dots (1 - v_n)^{-1}v_{n-1}\right)^{-1} \dots v_2\right)^{-1} v_1\right)^{-1} \\ &= \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) v_n^{\alpha_n} \dots v_1^{\alpha_1}. \end{aligned}$$

On a

$$v_n^{\alpha_n} = [(1 - t_{n+1})^{-1} t_n]^{\alpha_n},$$

et, par récurrence sur k , on montre que

$$[(1 - t_{n+1})^{-1} t_n]^k = (1 - t_{n+1})^{-1} \dots (1 - q^{k-1} t_{n+1})^{-1} t_n^k.$$

Ceci vient de la relation

$$(1 - t_{n+1}) t_n^{-k} = t_n^{-k} (1 - q^k t_{n+1}).$$

Donc,

$$\begin{aligned} F_{n+1} &= \left(1 - \left(1 - \left(1 - \dots (1 - t_{n+1})^{-1} t_n \right)^{-1} \dots t_2 \right)^{-1} t_1 \right)^{-1} \\ &= \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) [(1 - t_{n+1})^{-1} t_n]^{\alpha_n} \dots t_1^{\alpha_1} \\ &= \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) (1 - t_{n+1})^{-1} \dots (1 - q^{\alpha_n-1} t_{n+1})^{-1} t_n^{\alpha_n} \dots t_1^{\alpha_1}. \end{aligned}$$

On utilise ensuite la relation classique :

$$\prod_{s=0}^{n-1} (1 - q^s t)^{-1} = \sum_{k \geq 0} \begin{bmatrix} n+k-1 \\ k \end{bmatrix} t^k,$$

pour obtenir :

$$\begin{aligned} F_{n+1} &= \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \left(\sum_{\alpha_{n+1}} \begin{bmatrix} \alpha_n + \alpha_{n+1} - 1 \\ \alpha_n \end{bmatrix} t_{n+1}^{\alpha_{n+1}} \right) t_n^{\alpha_n} \dots t_1^{\alpha_1} \\ &= \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}} F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}) t_{n+1}^{\alpha_{n+1}} \dots t_1^{\alpha_1}. \end{aligned}$$

□

De la même façon, on montrerait la proposition suivante :

Proposition É2.2 *Soit q une indéterminée, et $A = \mathbb{C}[q, q^{-1}]$. Alors, dans $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}/J_n$, où J_n est l'idéal engendré par les éléments $t_{i+1}t_i - qt_it_{i+1}$ pour $i \in \{1, \dots, n\}$ et les $t_it_j - t_jt_i$ pour $|i - j| \geq 2$, on a :*

$$\begin{aligned} \left(1 - t_1 \left(1 - t_2 \left(\dots (1 - t_n)^{-1} \right)^{-1} \dots \right)^{-1} \right)^{-1} \\ = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) t_1^{\alpha_1} \dots t_n^{\alpha_n}. \end{aligned}$$

É3 Action de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ sur les $u_i, 1 \leq i \leq 2n$

Tout est résumé dans la proposition suivante :

Proposition É3.1 *Pour tout $i \in \{1, \dots, 2n\}$, on a :*

$$k.u_i = qu_i, \quad (\text{É3.1})$$

$$e_+.u_i = \sum_{r+s=i} u_r u_s, \quad (\text{É3.2})$$

$$e_-.u_i = q^{-1} \delta_i^1. \quad (\text{É3.3})$$

Démonstration.

La première égalité est triviale puisque $\partial^o u_i = 1$.

Pour la démonstration des deux autres égalités nous aurons besoin en particulier du lemme suivant :

Lemme É3.1 *Pour tous N, a_1, \dots, a_{2N}, k tels que $k \in \{1, \dots, N+1\}$, on pose :*

$$Y_N(k, a_1, \dots, a_{2N}) = k - 1 + \sum_{j=1}^{2k-2} (-1)^j a_j$$

et

$$\begin{aligned} \Phi_N(k, a_1, \dots, a_{2N}) &= q^{Y_N(k, a_1, \dots, a_{2N})} (q^{-(a_{2k-2}+1)} - q^{-a_{2k-1}}) \\ &\times F_q(a_1 - 1, a_2 + 1, \dots, a_{2k-2} + 1, a_{2k-1}, \dots, a_{2N}). \end{aligned} \quad (\text{É3.4})$$

avec la convention que $a_0 = a_{2N+1} = 0$. Alors,

$$\sum_{k=1}^{N+1} \Phi_N(k, a_1, \dots, a_{2N}) = 0.$$

Preuve. La démonstration se fait par récurrence sur N .

- Si $N = 1$, et si $(a_1, a_2) \in \mathbb{N}^2 - \{0\}$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^2 \Phi(k, a_1, a_2) &= (q^{-1} - q^{-a_1}) F_q(a_1, a_2) \\ &\quad + q^{-a_1+a_2+1} (q^{-(a_2+1)} - 1) F_q(a_1 - 1, a_2 + 1) \end{aligned}$$

soit

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^2 \Phi(k, a_1, a_2) &= (q - 1) q^{-a_1} \times \\ &\quad \times ([a_1 - 1] F_q(a_1, a_2) - [a_2 + 1] F_q(a_1 - 1, a_2 + 1)). \end{aligned}$$

L'assertion découle alors de l'identité suivante :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{N}^2 - \{0\}, \quad [x - 1] F_q(x, y) = [y + 1] F_q(x - 1, y + 1).$$

• Supposons la propriété vraie jusqu'au rang $N - 1$, avec $N \geq 2$.
Soit $(a_1, \dots, a_{2N}) \in \mathbb{N}^{2N} - \{0\}$. On a

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{N+1} \Phi_N(k, a_1, \dots, a_{2N}) = \\ & \sum_{k=1}^{N-1} \Phi_N(k, a_1, \dots, a_{2N}) + \Phi_N(N, a_1, \dots, a_{2N}) + \Phi_N(N + 1, a_1, \dots, a_{2N}) \end{aligned} \quad (\acute{E}3.5)$$

De plus, on note que pour $k \in \{1, \dots, N - 1\}$, on a

$$\Phi_N(k, a_1, \dots, a_{2N}) = \Phi_{N-1}(k, a_1, \dots, a_{2N-2}) F_q(a_{2N-2}, a_{2N-1}, a_{2N})$$

Donc, l'hypothèse de récurrence nous montre que

$$\sum_{k=1}^{N-1} \Phi_N(k, a_1, \dots, a_{2N}) = -\Phi_{N-1}(N, a_1, \dots, a_{2N-2}) F_q(a_{2N-2}, a_{2N-1}, a_{2N})$$

d'où

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{N-1} \Phi_N(k, a_1, \dots, a_{2N}) &= q^{Y_N} F_q(a_1 - 1, a_2 + 1, \dots, a_{2N-2} + 1) \\ &\times (1 - q^{-(a_{2N-2}+1)}) F_q(a_{2N-2}, a_{2N-1}, a_{2N}) \end{aligned} \quad (\acute{E}3.6)$$

Par ailleurs, on a également

$$\begin{aligned} \Phi_N(N, a_1, \dots, a_{2N}) &= q^{Y_N} F_q(a_1 - 1, \dots, a_{2N-2} + 1) \\ &\times (q^{-(a_{2N-2}+1)} - q^{-a_{2N-1}}) F_q(a_{2N-2} + 1, a_{2N-1}, a_{2N}) \end{aligned} \quad (\acute{E}3.7)$$

et

$$\begin{aligned} \Phi_N(N + 1, a_1, \dots, a_{2N}) &= q^{Y_N} F_q(a_1 - 1, a_2 + 1, \dots, a_{2N-2} + 1) \\ &\times q^{-a_{2N-1}+a_{2N}+1} (q^{-(a_{2N}+1)} - 1) F_q(a_{2N-2} + 1, a_{2N-1} - 1, a_{2N} + 1). \end{aligned} \quad (\acute{E}3.8)$$

Donc, en rassemblant (É3.5), (É3.6), (É3.7) et (É3.8), on obtient

$$\sum_{k=1}^{N+1} \Phi_N(k, a_1, \dots, a_{2N}) = q^{Y_N} F_q(a_1 - 1, a_2 + 1, \dots, a_{2N-2} + 1) \times A$$

avec

$$\begin{aligned} A &= (1 - q^{-(a_{2N-2}+1)}) F_q(a_{2N-2}, a_{2N-1}, a_{2N}) \\ &\quad + (q^{-(a_{2N-2}+1)} - q^{-a_{2N-1}}) F_q(a_{2N-2} + 1, a_{2N-1}, a_{2N}) \\ &\quad + q^{-a_{2N-1}+a_{2N}+1} (q^{-(a_{2N}+1)} - 1) F_q(a_{2N-2} + 1, a_{2N-1} - 1, a_{2N} + 1) \end{aligned}$$

Si $a_{2N-1} = 0$, le résultat est clair.

Sinon, on a

$$q^{-(a_{2N}+1)} - 1 = -q^{-(a_{2N}+1)} [a_{2N} + 1] (q - 1)$$

et

$$[a_{2N} + 1] F_q(a_{2N-1} - 1, a_{2N} + 1) = [a_{2N-1} - 1] F_q(a_{2N-1}, a_{2N}).$$

Posons $x = a_{2N-2}$, $y = a_{2N-1}$ et $z = a_{2N}$. Alors, $A = F_q(y, z)B$, avec

$$\begin{aligned} B &= (1 - q^{-(x+1)}) \begin{bmatrix} x + y - 1 \\ y \end{bmatrix} + (q^{-(x+1)} - q^{-y}) \begin{bmatrix} x + y \\ y \end{bmatrix} \\ &\quad - q^{-y} (q^{y-1} - 1) \begin{bmatrix} x + y - 1 \\ y - 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

En utilisant la relation

$$\begin{bmatrix} x + y \\ y \end{bmatrix} = q^y \begin{bmatrix} x + y - 1 \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x + y - 1 \\ y - 1 \end{bmatrix},$$

on obtient

$$B = q^{-(x+1)} (q^y - 1) \begin{bmatrix} x + y - 1 \\ y \end{bmatrix} - q^{-(x+1)} (q^x - 1) \begin{bmatrix} x + y - 1 \\ y - 1 \end{bmatrix}.$$

Le lemme découle alors de la simple égalité :

$$[y] \begin{bmatrix} x + y - 1 \\ y \end{bmatrix} = [x] \begin{bmatrix} x + y - 1 \\ y - 1 \end{bmatrix}.$$

Démonstration de l'égalité (É3.3) :

Preuve.

Soit $k \in \{1, \dots, 2n\}$. Nous allons calculer $e_{-..}u_k$.

- Si $k = 1$, le calcul est immédiat.
- Supposons $k \geq 2$. On a :

$$e_{-..}u_k = \frac{1}{q-1} \sum_{|\alpha|=k-1} F_q(\alpha_{2n-1}, \dots, \alpha_1) U(\underline{\alpha}),$$

avec

$$U(\underline{\alpha}) = \Sigma^{-} (x_1 y_1)^{-\alpha_1} \dots (x_n y_n)^{-\alpha_{2n-1}} y_n^{-1} \\ - q^{-1} (x_1 y_1)^{-\alpha_1} \dots (x_n y_n)^{-\alpha_{2n-1}} y_n^{-1} \Sigma^{-}.$$

En adoptant la convention $\alpha_{2n} = 1$, et en utilisant les règles de commutation entre les x_i et les y_j , on a d'abord :

$$U(\underline{\alpha}) = \sum_{j=1}^n (q^{-\alpha_{2j-1}} - q^{-\alpha_{2j}}) (x_1 y_1)^{-\alpha_1} \dots (x_j y_j)^{-\alpha_{2j-1}} \times \\ y_j (y_j x_{j+1})^{-\alpha_{2j}} \dots (x_n y_n)^{-\alpha_{2n-1}} y_n^{-1}.$$

Puis, toujours à l'aide des relations de commutation,

$$U(\underline{\alpha}) = \sum_{j=1}^n q^{X_{j,\underline{\alpha}}} (q^{-\alpha_{2j-1}} - q^{-\alpha_{2j}}) (x_1 y_1)^{-\alpha_1} \dots (x_j y_j)^{-\alpha_{2j-1}} \times \\ (y_j x_{j+1})^{-(\alpha_{2j}-1)} (x_{j+1} y_{j+1})^{-(\alpha_{2j+1}+1)} \dots (x_n y_n)^{-(\alpha_{2n-1}+1)}$$

avec pour notation $\{x\} = 1 + 2 + \dots + x$, et :

$$X_{j,\underline{\alpha}} = \{\alpha_1\} + \dots + \{\alpha_{2n-1}\} \\ - (\{\alpha_1\} + \dots + \{\alpha_{2j-1}\} + \{\alpha_{2j} - 1\} + \{\alpha_{2j+1} + 1\} + \dots + \{\alpha_{2n-1} + 1\}) \\ = \alpha_{2j} - (\alpha_{2j+1} + 1) + \dots - (\alpha_{2n-1} + 1) \\ = j - n + \sum_{k=2j}^{2n-j} (-1)^k \alpha_k$$

Donc, $e_{-} . u_k$ est une combinaison linéaire de termes de la forme

$$(x_1 y_1)^{-\beta_1} \dots (x_n y_n)^{-\beta_{2n-1}}$$

tels que

$$\beta_1 + \dots + \beta_{2n-1} = k - 1.$$

Le coefficient correspondant est obtenu en regroupant tous les entiers $j, \alpha_1, \dots, \alpha_{2n-1}$ tels que :

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 = \beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_{2j-1} = \beta_{2j-1} \\ \alpha_{2j} - 1 = \beta_{2j} \\ \vdots \\ \alpha_{2n-1} + 1 = \beta_{2n-1} \end{array} \right.$$

On a :

$$\begin{aligned} j - n + \sum_{k=2j}^{2n-1} (-1)^k \alpha_k &= j - n + \sum_{k=2j}^{2n-1} (-1)^k (\beta_k + (-1)^k) \\ &= n - j + \sum_{k=2j}^{2n-1} (-1)^k \beta_k. \end{aligned}$$

Par suite, ce coefficient A vaut

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{q-1} \sum_{j=1}^n q^{X'_j} (q^{-\beta_{2j-1}} - q^{-(\beta_{2j}+1)}) \times \\ &\quad F_q(\beta_{2n-1} - 1, \beta_{2n-2} + 1, \dots, \beta_{2j+1} - 1, \beta_{2j} + 1, \beta_{2j-1}, \dots, \beta_1), \end{aligned}$$

avec

$$X'_j = n - j + \sum_{k=2j}^{2n-1} (-1)^k \beta_k.$$

Posons $\gamma_j = \beta_{2n-j}$ pour $j \in \{1, \dots, 2n-1\}$, et $\gamma_0 = 0$. Alors,

$$X'_j = n - j + \sum_{k=1}^{2(n-j)} (-1)^k \gamma_k$$

et

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{q-1} \sum_{j=1}^n q^{X'_j} (q^{-\gamma_{2(n-j)+1}} - q^{-(\gamma_{2(n-j)}+1)}) \times \\ &\quad F_q(\gamma_1 - 1, \gamma_2 + 1, \dots, \gamma_{2(n-j)-1} - 1, \gamma_{2(n-j)} + 1, \gamma_{2(n-j)+1}, \dots, \gamma_1). \end{aligned}$$

Soit, après le changement de variables $s = n - j$,

$$\begin{aligned} A &= -\frac{1}{q-1} \sum_{s=0}^{n-1} q^{Y_{s+1}} (q^{-(\gamma_{2s}+1)} - q^{-(\gamma_{2s+1})}) \times \\ &\quad F_q(\gamma_1 - 1, \gamma_2 + 1, \dots, \gamma_{2s-1} - 1, \gamma_{2s} + 1, \gamma_{2s+1}, \dots, \gamma_{2n-1}), \end{aligned}$$

avec

$$Y_{s+1} = s + \sum_{t=1}^{2s} (-1)^t \gamma_t.$$

Supposons que $\gamma_{2n-1} \geq 2$. Alors, pour tout $s \in \{0, \dots, n-1\}$, on a :

$$F_q(\gamma_1 - 1, \gamma_2 + 1, \dots, \gamma_{2s-1} - 1, \gamma_{2s} + 1, \gamma_{2s+1}, \dots, \gamma_{2n-1}) = 0.$$

En effet, sinon, il existe $s \in \{0, \dots, n-1\}$ tel que

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma_1 - 1 \geq 1 \\ \gamma_3 - 1 \geq 1 \\ \vdots \\ \gamma_{2s-1} - 1 \geq 1 \\ \gamma_{2s+1} \geq 1 \\ \vdots \\ \gamma_{2n-2} \geq 1 \end{array} \right.$$

Donc,

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma_1 + \dots + \gamma_{2s-1} \geq 2s \\ \gamma_{2s+1} + \dots + \gamma_{2n-2} \geq 2n - 2 - (2s + 1) + 1 = 2n - 2s - 2 \\ \gamma_{2n-1} \geq 2 \end{array} \right.$$

D'où

$$k - 1 = \gamma_1 + \dots + \gamma_{2n-1} \geq 2n$$

ce qui est impossible, vu que $k \leq 2n$. Par suite, $\gamma_{2n-1} \leq 1$, et, en posant $\gamma_{2n} = 0$, on a :

$$F_q(\gamma_1 - 1, \gamma_2 + 1, \dots, \gamma_{2n-1} - 1, \gamma_{2n} + 1) = 0$$

et

$$\begin{aligned} & F_q(\gamma_1 - 1, \gamma_2 + 1, \dots, \gamma_{2s-1} - 1, \gamma_{2s} + 1, \gamma_{2s+1}, \dots, \gamma_{2n-1}) \\ &= F_q(\gamma_1 - 1, \gamma_2 + 1, \dots, \gamma_{2s-1} - 1, \gamma_{2s} + 1, \gamma_{2s+1}, \dots, \gamma_{2n-1}, \gamma_{2n}). \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned} A &= -\frac{1}{q-1} \sum_{s=0}^n q^{Y_{s+1}} (q^{-(\gamma_{2s}+1)} - q^{-(\gamma_{2s+1})}) \times \\ & \quad F_q(\gamma_1 - 1, \gamma_2 + 1, \dots, \gamma_{2s-1} - 1, \gamma_{2s} + 1, \gamma_{2s+1}, \dots, \gamma_{2n-1}, \gamma_{2n}). \end{aligned}$$

On utilise ensuite le lemme É3.1 pour conclure : $A = 0$.

Pour la démonstration de l'égalité (É3.2), nous aurons besoin des deux lemmes supplémentaires suivants :

Lemme É3.2 *Soient t_1, \dots, t_n les variables q -commutatives définis dans la proposition É2.2 et B l'algèbre qu'elles engendrent. Alors,*

1. *L'algèbre B est un $\mathbb{C}[q, q^{-1}]$ -module libre dont une base est donnée par la famille $t_1^{\alpha_1} \dots t_n^{\alpha_n}$, avec $\forall i, \alpha_i \in \mathbb{N}$.*

2. Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, l'application

$$\phi_k : B \longrightarrow B$$

$$t_i \longmapsto \begin{cases} t_i, & \text{si } i \neq k; \\ qt_k, & \text{si } i = k. \end{cases}$$

est un morphisme d'algèbres graduées.

3. Pour tout $u \in B$, on posera

$$\phi_k(u) = u(t_1, \dots, qt_k, \dots, t_n),$$

et

$$\partial_k u = \frac{1}{q-1} [u(t_1, \dots, qt_k, \dots, t_n) - u(t_1, \dots, t_k, \dots, t_n)].$$

Alors, pour tous u et v dans B , on a :

$$\partial_k 1 = 0 \quad (\acute{E}3.9)$$

$$\partial_k(t_1^{\alpha_1} \dots t_n^{\alpha_n}) = [\alpha_k] t_1^{\alpha_1}, \dots, t_n^{\alpha_n} \quad (\acute{E}3.10)$$

$$\partial_k(u+v) = \partial_k(u) + \partial_k(v) \quad (\acute{E}3.11)$$

$$\partial_k(uv) = (\partial_k u)v + u(t_1, \dots, qt_k, \dots, t_n) \partial_k v. \quad (\acute{E}3.12)$$

De plus, si u est inversible, alors

$$\partial_k(u^{-1}) = -u^{-1}(t_1, \dots, qt_k, \dots, t_n) (\partial_k u) u^{-1}(t_1, \dots, t_k, \dots, t_n). \quad (\acute{E}3.13)$$

Démonstration. Pour le point 1, on utilise l'appendice avec q changé en q^{-1} . Pour le reste, il suffit d'effectuer les calculs. En particulier, les égalités $\acute{E}3.9$ et $\acute{E}3.10$ montrent que l'expression $\partial_k u$ a bien un sens, i.e., que l'on peut légitimement diviser par $q-1$. \square

Lemme $\acute{E}3.3$ Pour toute suite d'entiers $\underline{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, on a :

$$[\alpha_1 + 1] F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum_{\substack{\underline{\beta}, \underline{\gamma} \\ \underline{\beta} + \underline{\gamma} = \underline{\alpha}}} q^{\beta_1 + \beta_2 \gamma_1 + \dots + \beta_n \gamma_{n-1}} F_q(\underline{\beta}) F_q(\underline{\gamma}).$$

Preuve.

Dans le cas classique, en posant

$$f(t_1, \dots, t_n) = \frac{1}{1 - \frac{t_1}{1 - \frac{t_2}{1 - \frac{t_{n-1}}{1 - t_n}}}}$$

la relation signifie simplement que $\partial_1(t_1 f) = f^2$.

Dans le cas général, posons

$$f := \left(1 - t_1 \left(1 - t_2 \left(\dots \left(1 - t_n\right)^{-1} \dots\right)^{-1}\right)^{-1}\right)^{-1} = (1 - t_1 g)^{-1} = h^{-1},$$

avec $h = 1 - t_1 g$. Alors, par (É3.13),

$$\partial_1 f = -f(qt_1, t_2, \dots, t_n)(\partial_1 h)f(t_1, \dots, t_n).$$

D'après le lemme et du fait que g ne dépend pas de t_1 , on a :

$$\begin{aligned} \partial_1 h &= -(\partial_1 t_1)g - (qt_1)(\partial_1 g) \\ &= -t_1 g \\ &= h - 1. \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned} \partial_1 f &= -f(qt_1, t_2, \dots, t_n)(h - 1)f \\ &= -f(qt_1, t_2, \dots, t_n)(1 - f(t_1, \dots, t_n)) \\ &= -f(qt_1, t_2, \dots, t_n) + f(qt_1, t_2, \dots, t_n)f(t_1, \dots, t_n). \end{aligned}$$

D'où,

$$t_1(\partial_1 f) + t_1 f(qt_1, t_2, \dots, t_n) = t_1 f(qt_1, t_2, \dots, t_n)f(t_1, \dots, t_n). \quad (\text{É3.14})$$

Par ailleurs, d'après la proposition É2.2, on a :

$$f(t_1, \dots, t_n) = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) t_1^{\alpha_1} \dots t_n^{\alpha_n}.$$

Donc, l'application de dérivation ∂_1 étant continue pour la graduation définie par la valuation sur B , on a :

$$\begin{aligned} t_1(\partial_1 f) + t_1 f(qt_1, t_2, \dots, t_n) &= t_1 \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} [\alpha_1] F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) t_1^{\alpha_1} \dots t_n^{\alpha_n} \\ &\quad + \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} q^{\alpha_1} F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) t_1^{\alpha_1+1} \dots t_n^{\alpha_n} \\ &= \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} [\alpha_1 + 1] F_q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) t_1^{\alpha_1+1} \dots t_n^{\alpha_n}. \end{aligned} \quad (\text{É3.15})$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} f(qt_1, t_2, \dots, t_n)f(t_1, \dots, t_n) &= \left\{ \sum_{\underline{\beta}} F_q(\underline{\beta}) q^{\beta_1} t_1^{\beta_1} \dots t_n^{\beta_n} \right\} \times \\ &\quad \times \left\{ \sum_{\underline{\gamma}} F_q(\underline{\gamma}) t_1^{\gamma_1} \dots t_n^{\gamma_n} \right\} \end{aligned}$$

Soit,

$$f(qt_1, t_2, \dots, t_n) f(t_1, \dots, t_n) = \sum_{\underline{\beta}, \underline{\gamma}} F_q(\underline{\beta}) F_q(\underline{\gamma}) q^{\beta_1} t_1^{\beta_1} \dots t_n^{\beta_n} t_1^{\gamma_1} \dots t_n^{\gamma_n}.$$

Mais, vu les relations de commutativité entre les t_i , on a :

$$t_{i+1}^m t_i^n = q^{mn} t_i^n t_{i+1}^m.$$

Donc,

$$\begin{aligned} f(qt_1, t_2, \dots, t_n) f(t_1, \dots, t_n) \\ = \sum_{(\underline{\beta}, \underline{\gamma})} F_q(\underline{\beta}) F_q(\underline{\gamma}) q^{\beta_1} \times q^{\beta_2 \gamma_1} \times \dots \times q^{\beta_n \gamma_{n-1}} t_1^{\beta_1 + \gamma_1} \dots t_n^{\beta_n + \gamma_n}. \end{aligned}$$

Soit,

$$\begin{aligned} t_1 f(qt_1, t_2, \dots, t_n) f(t_1, \dots, t_n) = \\ \sum_{\underline{\alpha}} \left\{ \sum_{\substack{(\underline{\beta}, \underline{\gamma}) \\ \underline{\beta} + \underline{\gamma} = \underline{\alpha}}} q^{\beta_1 + \beta_2 \gamma_1 + \dots + \beta_n \gamma_{n-1}} F_q(\underline{\beta}) F_q(\underline{\gamma}) \right\} t_1^{\alpha_1 + 1} \dots t_n^{\alpha_n}. \quad (\acute{E}3.16) \end{aligned}$$

Il suffit ensuite d'identifier (É3.15) et (É3.16) à l'aide de (É3.14) pour obtenir le résultat.

Démonstration de l'égalité (É3.2) :

Soit $k \in \{1, \dots, 2n\}$. On a ;

$$\begin{aligned} e_+ . u_k = \frac{1}{q-1} \sum_{\substack{(\alpha_1, \dots, \alpha_{2n-1}) \\ \alpha_1 + \dots + \alpha_{2n-1} = k-1}} F_q(\alpha_{2n-1}, \dots, \alpha_1) \times \\ \sum_{i=1}^n x_i (x_1 y_1)^{-\alpha_1} \dots (x_n y_n)^{-\alpha_{2n-1}} y_n^{-1} - q (x_1 y_1)^{-\alpha_1} \dots (x_n y_n)^{-\alpha_{2n-1}} y_n^{-1} x_i. \end{aligned}$$

Les relations de commutation entre les x_i et y_i montrent que x_i commute avec $(y_{j-1} x_j)^{-\alpha_{2j-2}}$ et $(x_j y_j)^{-\alpha_{2j-1}}$, pour $j \neq i$. De plus,

$$\begin{cases} q y_n^{-1} x_i = x_i y_n^{-1} \\ x_i (y_{i-1} x_i)^{-\alpha_{2i-2}} = q^{-\alpha_{2i-2}} (y_{i-1} x_i)^{-\alpha_{2i-2}} x_i \\ (x_i y_i)^{-\alpha_{2i-1}} x_i = q^{-\alpha_{2i-1}} x_i (x_i y_i)^{-\alpha_{2i-1}} \end{cases}$$

Donc,

$$\begin{aligned} e_+ . u_k = \frac{1}{q-1} \sum_{\substack{(\alpha_1, \dots, \alpha_{2n-1}) \\ \alpha_1 + \dots + \alpha_{2n-1} = k-1}} F_q(\alpha_{2n-1}, \dots, \alpha_1) \times \\ \sum_{i=1}^n (q^{-\alpha_{2i-2}} - q^{-\alpha_{2i-1}}) (x_1 y_1)^{-\alpha_1} \dots (y_{i-1} x_i)^{-\alpha_{2i-2}} x_i (x_i y_i)^{-\alpha_{2i-1}} \dots \\ \dots (x_n y_n)^{-\alpha_{2n-1}} y_n^{-1} \end{aligned}$$

En notant $\{x\} = \frac{x(x+1)}{2} = \sum_{t=1}^x t$, et en utilisant plusieurs fois les relations

$$\begin{cases} (x_j y_j)^{-n} = q^{\{n\}} x_j^{-n} y_j^{-n} \\ (y_{j-1} x_j)^{-n} = q^{\{n\}} y_{j-1}^{-n} x_j^{-n} \end{cases}$$

valables pour tous j et n , on obtient :

$$\begin{aligned} e_+.u_k &= \frac{1}{q-1} \sum_{\substack{(\alpha_1, \dots, \alpha_{2n-1}) \\ \alpha_1 + \dots + \alpha_{2n-1} = k-1}} F_q(\alpha_{2n-1}, \dots, \alpha_1) \times \\ &\sum_{i=1}^n q^{\{\alpha_1\} + \dots + \{\alpha_{2n-1}\} - (\{\alpha_1\} + \dots + \{\alpha_{2i-2}\} + \{\alpha_{2i-1}-1\} + \{\alpha_{2i}+1\} + \dots + \{\alpha_{2n-1}-1\})} \times \\ &(q^{-\alpha_{2i-2}} - q^{-\alpha_{2i-1}})(x_1 y_1)^{-\alpha_1} \dots (y_{i-1} x_i)^{-\alpha_{2i-2}} \times \\ &(x_i y_i)^{-(\alpha_{2i-1}-1)} (y_i x_{i+1})^{-(\alpha_{2i}+1)} \dots (x_n y_n)^{-(\alpha_{2n-1}-1)} y_n^{-2} \end{aligned}$$

Il s'ensuit que $e_+.u_k$ est une combinaison linéaire de termes de la forme

$$(x_1 y_1)^{-\beta_1} \dots (x_n y_n)^{-\beta_{2n-1}} y_n^{-2},$$

avec,

$$\beta_1 + \dots + \beta_{2n-1} = \alpha_1 + \dots + \alpha_{2n-1} - 1 = k - 2.$$

Le coefficient de $(x_1 y_1)^{-\beta_1} \dots (x_n y_n)^{-\beta_{2n-1}} y_n^{-2}$ est obtenu pour chaque multi-indice $\underline{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_{2n-1})$ et chaque $i \in \{1, \dots, n\}$ tels que :

$$\begin{cases} \alpha_1 = \beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_{2i-2} = \beta_{2i-2} \\ \alpha_{2i-1} = \beta_{2i-1} + 1 \\ \alpha_{2i} = \beta_{2i} - 1 \\ \vdots \\ \alpha_{2n-2} = \beta_{2n-2} - 1 \\ \alpha_{2n-1} = \beta_{2n-1} + 1 \end{cases}$$

Par suite,

$$\begin{aligned} e_+.u_k &= \frac{1}{q-1} \sum_{|\underline{\beta}|=k-2} \sum_{i=1}^n q^{n-i+1 + \sum_{t=2i-1}^{2n-1} (-1)^{t+1} \beta_t} (q^{-\beta_{2i-2}} - q^{-(\beta_{2i-1}+1)}) \times \\ &F_q(\beta_{2n-1} + 1, \beta_{2n-2} - 1, \dots, \beta_{2i} - 1, \beta_{2i-1} + 1, \beta_{2i-2}, \dots, \beta_1) \\ &(x_1 y_1)^{-\beta_1} \dots (x_n y_n)^{-\beta_{2n-1}} y_n^{-2}, \end{aligned}$$

avec la notation que $|\underline{\alpha}| = \sum \alpha_i$.

Le lemme É3.1 appliqué à $a_1 = 2$ et $\forall i \in \{2, \dots, 2n\}$, $a_i = \alpha_{2n-i+1}$ entraîne :

$$\begin{aligned} & (q^{\alpha_{2n-1}+1} - 1)F_q(\alpha_{2n-1}, \dots, \alpha_1) \\ &= \sum_{i=1}^n q^{n-i+1 + \sum_{t=2i-1}^{2n-1} (-1)^{t+1} \alpha_t} (q^{-\alpha_{2i-2}} - q^{-(\alpha_{2i-1}+1)}) \times \\ & F_q(\alpha_{2n-1} + 1, \alpha_{2n-2} - 1, \dots, \alpha_{2i} - 1, \alpha_{2i-1} + 1, \alpha_{2i-2}, \dots, \alpha_1) \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned} e_+.u_k &= \sum_{\substack{(\underline{\alpha}) \\ |\underline{\alpha}|=k-2}} [\alpha_{2n-1} + 1] F_q(\alpha_{2n-1}, \dots, \alpha_1) \times \\ & (x_1 y_1)^{-\alpha_1} \dots (x_n y_n)^{-\alpha_{2n-1}} y_n^{-2}. \end{aligned}$$

D'où à l'aide du lemme É3.3,

$$\begin{aligned} e_+.u_k &= \sum_{i+j=k} \sum_{\substack{(\underline{\beta}, \underline{\gamma}) \\ |\underline{\beta}|=i-1; |\underline{\gamma}|=j-1}} q^{\beta_2 \gamma_1 + \dots + \beta_{2n-1} \gamma_{2n-2} + \gamma_{2n-1}} \times \\ & F_q(\beta_{2n-1}, \dots, \beta_1) F_q(\gamma_{2n-1}, \dots, \gamma_1) \times \\ & (x_1 y_1)^{-(\beta_1 + \gamma_1)} \dots (x_n y_n)^{-(\beta_{2n-1} + \gamma_{2n-1})} y_n^{-2}. \end{aligned}$$

Or, d'après les relations de commutation entre les x_i et y_j , on vérifie sans problème que

$$\begin{aligned} & (x_1 y_1)^{-\beta_1} \dots (x_n y_n)^{-\beta_{2n-1}} y_n^{-1} (x_1 y_1)^{-\gamma_1} \dots (x_n y_n)^{-\gamma_{2n-1}} y_n^{-1} \\ &= q^{\beta_2 \gamma_1 + \dots + \beta_{2n-1} \gamma_{2n-2} + \gamma_{2n-1}} \times \\ & (x_1 y_1)^{-(\beta_1 + \gamma_1)} \dots (x_n y_n)^{-(\beta_{2n-1} + \gamma_{2n-1})} y_n^{-2} \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned} e_+.u_k &= \sum_{i+j=k} \left[\sum_{\substack{\underline{\beta} \\ |\underline{\beta}|=i-1}} F_q(\beta_{2n-1}, \dots, \beta_1) (x_1 y_1)^{-\beta_1} \dots (x_n y_n)^{-\beta_{2n-1}} y_n^{-1} \right] \\ & \times \left[\sum_{\substack{\underline{\gamma} \\ |\underline{\gamma}|=j-1}} F_q(\gamma_{2n-1}, \dots, \gamma_1) (x_1 y_1)^{-\gamma_1} \dots (x_n y_n)^{-\gamma_{2n-1}} y_n^{-1} \right] \end{aligned}$$

Soit, finalement :

$$e_+.u_k = \sum_{i+j=k} u_i^{(n)} u_j^{(n)}.$$

□

É4 Le morphisme d'algèbres de $\mathcal{A}_q^{(n)}$ dans $A_q^{(n)}$

Bien que cette section soit courte, nous voulons mettre en évidence le morphisme de $\mathcal{A}_q^{(n)}$ dans $A_q^{(n)}$ dont la restriction donne le plongement de $\mathcal{U}_q^{(n)}$ dans $A_q^{(n)}$.

Vu l'isomorphisme (1.14) entre $U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)$ et \mathcal{A}_q , de manière groupique, les morphismes φ_i et ψ_i de 1.4 sont les suivants :

$$\begin{aligned} \varphi_i : \mathcal{A}_q &\longrightarrow A_q^{(n)} \\ \mathcal{L}(\lambda) &\longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda x_i & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

et :

$$\begin{aligned} \psi_i : \mathcal{A}_q &\longrightarrow A_q^{(n)} \\ \mathcal{L}(\lambda) &\longmapsto \begin{pmatrix} 1 & y_i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Donc, par composition, et en utilisant (1.1), le morphisme φ de (1.5) n'est autre que :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{A}_q &\longrightarrow A_q^{(n)} \\ \mathcal{L}(\lambda) &\longmapsto \prod_{i=1}^n \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda x_i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y_i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{É4.1})$$

Il apparaît que φ est l'analogue quantique de l'application φ_{cl} classique de É1.3, rendant naturel son introduction.

Il est clair que pour $k > n$, $a_{1,1}^{(k-1)}$, $a_{1,2}^{(k-1)}$, $a_{2,1}^{(k)}$, $a_{2,2}^{(k)}$ appartiennent à $\ker \varphi$. De plus,

$$\begin{aligned} \varphi(a_{1,1}^{(n-1)}) &= y_1 x_2 \dots y_{n-1} x_n, \\ \varphi(a_{1,2}^{(n-1)}) &= y_1 x_2 \dots y_{n-1} x_n y_n, \\ \varphi(a_{2,1}^{(n)}) &= x_1 y_1 \dots x_{n-1} y_{n-1} x_n, \\ \varphi(a_{2,2}^{(n)}) &= x_1 y_1 \dots x_{n-1} y_{n-1} x_n y_n, \end{aligned}$$

et chacun des termes de droite est inversible dans $A_q^{(n)}$. Par suite, d'après 1.8, on en déduit l'existence d'un morphisme que l'on note encore φ par abus de notation :

$$\varphi : \mathcal{A}_q^{(n)} \longrightarrow A_q^{(n)}$$

Contrairement au cas classique, on ne sait pas si cette application est injective.

É5 Relations de commutations entre les u_i

Dans le cas quantique, par restriction du morphisme φ précédent à $\mathcal{U}_q^{(n)}$, on a un diagramme commutatif équivalent à (É1.12), sauf que l'on ne sait pas que les flèches en diagonales sont injectives (mais nous montrerons que celle de gauche l'est effectivement) :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}_q^{(n)} & \longrightarrow & \mathcal{A}_q^{(n)} \\ & \searrow & \swarrow \\ & & A_q^{(n)} \end{array} \quad (\text{É5.1})$$

Soit λ une indéterminée, et $v(\lambda^{-1}) = a_{2,2}(\lambda)^{-1}a_{2,1}(\lambda)$. Par analogie avec le cas classique, on posera :

$$v(\lambda^{-1}) = \sum_{i=0}^{+\infty} (-1)^i \alpha_{i+1} \lambda^{-i} \quad (\text{É5.2})$$

avec $\forall i \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_i \in \mathcal{A}_q^{(n)}$ et $\forall i \in \{1, \dots, 2n\}$, $\alpha_i \in \mathcal{U}_q^{(n)}$. L'algèbre $\mathcal{U}_q^{(n)}$ est par définition l'algèbre engendrée par les α_i , $1 \leq i \leq 2n$ (voir 1.9 et la fin de É1.3 pour le cas classique).

Nous allons établir une relation de commutation entre $v(\lambda^{-1})$ et $v(\mu^{-1})$ qui n'est autre que l'analogie quantique de (É1.13), pour λ et μ deux indéterminées. Celle-ci nous fournira les relations de commutations voulues entre les u_i pour $1 \leq i \leq 2n$, en utilisant le morphisme φ .

Proposition É5.1 *L'égalité suivante est vérifiée dans $\mathcal{A}_q^{(n)}((\lambda^{-1}, \mu^{-1}))$:*
 $q(\lambda - \mu)[v(\lambda^{-1}), v(\mu^{-1})] = (q - 1)(\mu v(\lambda^{-1}) - \lambda v(\mu^{-1}))(v(\lambda^{-1}) - v(\mu^{-1})).$

Démonstration. On a :

$$\begin{aligned} [v(\lambda^{-1}) - v(\mu^{-1})] &= [a_{2,2}(\lambda)^{-1}a_{2,1}(\lambda), a_{2,2}(\mu)^{-1}a_{2,1}(\mu)] \\ &= [a_{2,2}(\lambda)^{-1}a_{2,1}(\lambda), a_{2,2}(\mu)^{-1}] a_{2,1}(\mu) \\ &\quad + a_{2,2}(\mu)^{-1} [a_{2,2}(\lambda)^{-1}a_{2,1}(\lambda), a_{2,1}(\mu)] \\ &= a_{2,2}(\lambda)^{-1} [a_{2,1}(\lambda), a_{2,2}(\mu)^{-1}] a_{2,1}(\mu) \\ &\quad + [a_{2,2}(\lambda)^{-1}, a_{2,2}(\mu)^{-1}] a_{2,1}(\lambda) a_{2,1}(\mu) \\ &\quad + a_{2,2}(\mu)^{-1} a_{2,2}(\lambda)^{-1} [a_{2,1}(\lambda), a_{2,1}(\mu)] \\ &\quad + a_{2,2}(\mu)^{-1} [a_{2,2}(\lambda)^{-1}, a_{2,1}(\mu)] a_{2,1}(\lambda) \end{aligned}$$

Mais, $[a_{2,1}(\lambda), a_{2,1}(\mu)] = [a_{2,2}(\lambda)^{-1}, a_{2,2}(\mu^{-1})] = 0$ d'après (1.11). Donc,

$$\begin{aligned} [v(\lambda^{-1}) - v(\mu^{-1})] &= a_{2,2}(\lambda)^{-1} [a_{2,1}(\lambda), a_{2,2}(\mu)^{-1}] a_{2,1}(\mu) \\ &\quad + a_{2,2}(\mu)^{-1} [a_{2,2}(\lambda)^{-1}, a_{2,1}(\mu)] a_{2,1}(\lambda) \\ &= -a_{2,2}(\lambda)^{-1} a_{2,2}(\mu)^{-1} [a_{2,1}(\lambda), a_{2,2}(\mu)] a_{2,2}(\mu)^{-1} a_{2,1}(\mu) \\ &\quad + a_{2,2}(\lambda)^{-1} a_{2,2}(\mu)^{-1} [a_{2,1}(\mu), a_{2,2}(\lambda)] a_{2,2}(\lambda)^{-1} a_{2,1}(\lambda) \end{aligned}$$

Or, on peut montrer que (1.11) conduit aux relations :

$$\begin{aligned} [a_{2,1}(\lambda), a_{2,2}(\mu)] &= [a_{2,1}(\mu), a_{2,2}(\lambda)] \\ q(\lambda - \mu)[a_{2,1}(\lambda), a_{2,2}(\mu)] &= (q - 1)(\mu a_{2,2}(\mu) a_{2,1}(\lambda) - \lambda a_{2,2}(\lambda) a_{2,1}(\mu)) \end{aligned}$$

Par suite, on obtient :

$$\begin{aligned} [v(\lambda^{-1}) - v(\mu^{-1})] &= a_{2,2}(\lambda)^{-1} a_{2,2}(\mu)^{-1} [a_{2,1}(\lambda), a_{2,2}(\mu)] \\ &\quad \times (a_{2,2}(\lambda)^{-1} a_{2,1}(\lambda) - a_{2,2}(\mu)^{-1} a_{2,1}(\mu)) \end{aligned}$$

En utilisant la relation :

$$a_{2,2}(\lambda) a_{2,2}(\mu) = a_{2,2}(\mu) a_{2,2}(\lambda),$$

qui provient de (1.11), on obtient le résultat. \square

De la proposition précédente, nous pouvons en déduire les lois de commutation dans $\mathcal{U}_q^{(n)}$. Le corollaire suivant est l'analogie quantique de (É1.15) :

Corollaire É5.1 *Soient $1 \leq i < j \leq 2n$ deux entiers. On a :*

$$q[\alpha_i, \alpha_j] = (q - 1) \sum_{k=i}^{j-1} \alpha_k \alpha_{i+j-k}.$$

Démonstration. Soient k et l deux entiers positifs. En prenant le coefficient de $\lambda^{k-1} \mu^{l-1}$ dans chacun des membres de l'égalité exprimée par la proposition É5.1, on obtient :

$$q([\alpha_{k+1}, \alpha_l] - [\alpha_k, \alpha_{l+1}]) = (q - 1)(-\alpha_k \alpha_{l+1} - \alpha_l \alpha_{k+1}). \quad (\text{É5.3})$$

En faisant $k = l$, on voit que :

$$\forall i \in \mathbb{N}^*, q[\alpha_i, \alpha_{i+1}] = (q - 1)\alpha_i \alpha_{i+1}. \quad (\text{É5.4})$$

ce qui est le résultat demandé avec $j - i = 1$. La formule générale se prouve alors par récurrence sur $j - i$ à l'aide de (É5.3). \square

Relions maintenant les α_i aux u_i . Le lemme suivant généralise l'égalité classique (É1.11) :

Lemme É5.1 *Pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, $\varphi(\alpha_i) = u_i$. Autrement dit,*

$$\varphi(v(\lambda^{-1})) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k u_{k+1} \lambda^{-k}.$$

Démonstration. Posons :

$$L_n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix} := \prod_{i=1}^n \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda x_i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y_i \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

et $U_n := d_n^{-1}c_n$.

• Dans le cas où $n = 1$, on vérifie sans problème que $d_1 = \lambda(x_1y_1)$ est inversible, et :

$$U_1 = (1 + (\lambda x_1 y_1)^{-1})^{-1} y_1^{-1}.$$

Le résultat en découle.

• Supposons $n > 1$. On a :

$$L_n = L_{n-1} \begin{pmatrix} 1 & y_n \\ \lambda x_n & \lambda x_n y_n + 1 \end{pmatrix}.$$

Donc,

$$\begin{cases} c_n = c_{n-1} + \lambda d_{n-1} x_n \\ d_n = c_{n-1} y_n + d_{n-1} (\lambda x_n y_n + 1) \end{cases}$$

Donc, $d_n \in \mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}]_q[\lambda]$ et son coefficient dominant ω_n vérifie :

$$\omega_n = \omega_{n-1}(x_n y_n).$$

Une récurrence immédiate nous prouve alors que $\omega_n \in \mathbb{C}[x_i^{\pm 1}, y_i^{\pm 1}]_q$ est inversible. Par suite, d_n est inversible. De plus,

$$\begin{aligned} U_n &= (c_{n-1} y_n + d_{n-1} (\lambda x_n y_n + 1))^{-1} (c_{n-1} + \lambda d_{n-1} x_n) \\ &= \left((c_{n-1} + \lambda d_{n-1} x_n)^{-1} (c_{n-1} y_n + d_{n-1} (\lambda x_n y_n + 1)) \right)^{-1} \\ &= \left((c_{n-1} + \lambda d_{n-1} x_n)^{-1} (d_{n-1}^{-1})^{-1} d_{n-1}^{-1} (c_{n-1} y_n + d_{n-1} (\lambda x_n y_n + 1)) \right)^{-1} \\ &= \left((d_{n-1}^{-1} c_{n-1} + \lambda x_n)^{-1} (d_{n-1}^{-1} c_{n-1} y_n + \lambda x_n y_n + 1) \right)^{-1} \\ &= \left(y_n (d_{n-1}^{-1} c_{n-1} y_n + \lambda x_n y_n)^{-1} (d_{n-1}^{-1} c_{n-1} y_n + \lambda x_n y_n + 1) \right)^{-1} \\ &= \left((d_{n-1}^{-1} c_{n-1} y_n + \lambda x_n y_n)^{-1} (d_{n-1}^{-1} c_{n-1} y_n + \lambda x_n y_n + 1) \right)^{-1} y_n^{-1} \\ &= \left(1 + (d_{n-1}^{-1} c_{n-1} y_n + \lambda x_n y_n)^{-1} \right)^{-1} y_n^{-1} \\ &= \left(1 + (d_{n-1}^{-1} c_{n-1} \lambda^{-1} x_n^{-1} (\lambda x_n y_n) + (\lambda x_n y_n))^{-1} \right)^{-1} y_n^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(1 + (\lambda x_n y_n)^{-1} (1 + d_{n-1}^{-1} c_{n-1} \lambda^{-1} x_n^{-1})^{-1}\right)^{-1} y_n^{-1} \\
&= \left(1 + (\lambda x_n y_n)^{-1} (1 + d_{n-1}^{-1} c_{n-1} y_{n-1} \lambda^{-1} y_{n-1}^{-1} x_n^{-1})^{-1}\right)^{-1} y_n^{-1} \\
&= \left(1 + (\lambda x_n y_n)^{-1} (1 + q^{-1} (d_{n-1}^{-1} c_{n-1} y_{n-1}) (\lambda y_{n-1} x_n)^{-1})^{-1}\right)^{-1} y_n^{-1}
\end{aligned}$$

car

$$y_{n-1}^{-1} x_n^{-1} = q^{-1} (y_{n-1} x_n)^{-1}.$$

Donc, en posant $V_n = U_n y_n$, et $W_n^{(k)} = (1 + q^k V_{n-1} (\lambda y_{n-1} x_n)^{-1})^{-1}$, on voit que

$$V_n = (1 + (\lambda x_n y_n)^{-1} W_n^{(-1)})^{-1}.$$

De là, on en déduit par récurrence que $\forall k > n$, $(x_k y_k)$ et V_n commutent. Puis,

$$\forall p \in \mathbb{N}, (\lambda x_n y_n)^{-p} W_n^{(k)} = W_n^{(k+p)} (\lambda x_n y_n)^{-p}.$$

D'où :

$$\begin{aligned}
V_n &= (1 + W_n^{(0)} (\lambda x_n y_n)^{-1})^{-1} \\
&= \left(1 + (1 + V_{n-1} (\lambda y_{n-1} x_n)^{-1})^{-1} (\lambda x_n y_n)^{-1}\right)^{-1}.
\end{aligned}$$

Soit, à la suite d'une nouvelle récurrence,

$$\begin{aligned}
V_n &= \left(1 + \left(1 + \left(1 + \dots \left(1 + (\lambda x_1 y_1)^{-1}\right)^{-1} (\lambda y_1 x_2)^{-1}\right)^{-1} \dots \right. \right. \\
&\quad \left. \left. \dots (\lambda y_{n-1} x_n)^{-1}\right)^{-1} (\lambda x_n y_n)^{-1}\right)^{-1}
\end{aligned}$$

Le résultat découle alors de T1 et de (É4.1). \square

Corollaire É5.2 Soient $1 \leq i < j \leq 2n$ deux entiers. On a :

$$q[u_i, u_j] = (q-1) \sum_{k=i}^{j-1} u_k u_{i+j-k}.$$

Démonstration. Il suffit d'appliquer le corollaire É5.1, le lemme É5.1 et le morphisme d'algèbres φ . \square

É6 Démonstration de T2 et de T3

D'ores et déjà, d'après la proposition É3.1 et le corollaire É5, nous savons que $U_q^{(n)}$ est une sous $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -algèbre-module de $A_q^{(n)}$. Il faut voir que les relations du corollaire É5 sont les seules entre les u_i , $1 \leq i \leq 2n$.

Soit $N \in \mathbb{N}^*$, et considérons $\mathcal{M}_q^{(N)}$ l'algèbre engendrée sur $\mathbb{C}[q, q^{-1}]$ par générateurs : t_1, \dots, t_N et relations :

$$\forall i < j, \quad q[t_i, t_j] = (q-1) \sum_{k=i}^{j-1} t_k t_{i+j-k}.$$

Alors, d'après le corollaire É5, il existe un morphisme d'algèbres noté ϕ_{2n} :

$$\begin{aligned} \phi_{2n} : \quad \mathcal{M}_q^{(2n)} &\longrightarrow A_q^{(n)} \\ t_i &\longmapsto u_i \end{aligned}$$

Considérons également la simple application linéaire entre espace vectoriels :

$$\begin{aligned} \psi_N : \quad \mathbb{C}[X_1, \dots, X_N] &\longrightarrow \mathcal{M}_q^{(N)} \\ \sum_{\underline{\alpha}} a_{\underline{\alpha}} X_1^{\alpha_1} \dots X_N^{\alpha_N} &\longmapsto \sum_{\underline{\alpha}} a_{\underline{\alpha}} \text{cl}(t_1^{\alpha_1} \dots t_N^{\alpha_N}) \end{aligned}$$

Posons $i_{2n} = \phi_{2n} \circ \psi_{2n}$. Le diagramme suivant est évidemment commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}[X_1, \dots, X_{2n}] & \xrightarrow{\psi_{2n}} & \mathcal{M}_q^{(2n)} \\ & i_{2n} \searrow & \swarrow \phi_{2n} \\ & & A_q^{(n)} \end{array} \quad (\text{É6.1})$$

Lemme É6.1 *Pour tout N , l'application ψ_N est surjective.*

Démonstration. Par récurrence sur $j - i$, en utilisant plusieurs fois la formule :

$$\forall k < l, \quad q[t_k, t_l] = (q-1) \sum_{\alpha=k}^{l-1} t_{\alpha} t_{k+l-\alpha},$$

on montre que si $i < j$, alors $t_j t_i$ est une combinaison linéaire de termes de la forme $t_u t_v$ avec $i \leq u \leq v \leq j$. D'où le résultat. En particulier, remarquons que l'on a l'égalité :

$$\forall i, \quad t_i t_{i+1} = q t_{i+1} t_i \quad (\text{É6.2})$$

□

Proposition É6.1 *L'application i_{2n} est injective.*

Démonstration. Pour $k \in \{1, \dots, 2n\}$, notons $\mathbb{C}[x_k^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q$ la sous-algèbre de $A_q^{(n)}$ engendrée par $x_k^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}$. De même, $\mathbb{C}[y_k^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q$ désigne la sous-algèbre de $A_q^{(n)}$ engendrée par $y_k^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}$. Alors, d'après 1.1, la sous-algèbre $\mathbb{C}[x_k^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q$ est un $\mathbb{C}[y_k^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q$ -module libre (à gauche ou à droite) dont une base est donnée par la famille $(x_k^p)_{p \in \mathbb{N}}$. De même, la sous-algèbre $\mathbb{C}[y_k^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q$ est un $\mathbb{C}[x_{k+1}^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q$ -module libre (à gauche ou à droite) dont une base est donnée par la famille $(y_k^p)_{p \in \mathbb{N}}$.

Toujours pour $k \in \{1, \dots, 2n\}$, notons j_k la restriction de l'application i_{2n} à $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_k]$, et montrons par récurrence sur k que j_k est injective.

- Si $k = 1$, c'est clair car $i_1(X_1) = u_1 = y_n^{-1}$ et la famille $(y_n^{-k})_{k \in \mathbb{N}}$ est libre dans $A_q^{(n)}$.
- Soit $k \geq 2$, et supposons le résultat vrai jusqu'au rang $k - 1$. Pour fixer les idées, supposons k pair, $k = 2r$. Prenons :

$$x \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_k] \setminus \mathbb{C}[X_1, \dots, X_{k-1}],$$

et montrons que $j_k(x) \neq 0$. Posons $\alpha = \partial_k^q x$. Il existe des polynômes P_0, \dots, P_α dans $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_{k-1}]$ tels que $P_\alpha(X_1, \dots, X_{k-1}) \neq 0$ et :

$$x = P_0(X_1, \dots, X_{k-1}) + \dots + P_\alpha(X_1, \dots, X_{k-1})X_k^\alpha. \quad (\text{É6.3})$$

Par ailleurs, en examinant la forme des u_i , on constate que :

$$\forall i \in \{1, \dots, k-1\}, \quad u_i \in \mathbb{C}[y_{n-r+1}^{-1}, \dots, x_n^{-1}, y_n^{-1}]_q,$$

et,

$$u_k = v + (x_{n-r+1}y_{n-r+1})^{-1} \dots (x_n y_n)^{-1} y_n^{-1} \quad (\text{É6.4})$$

avec $v \in \mathbb{C}[y_{n-r+1}^{-1}, \dots, x_n^{-1}, y_n^{-1}]_q$. Donc, par (É6.3),

$$j_k(x) = i_{2n}(x) \in \mathbb{C}[x_{n-r+1}^{-1}, \dots, x_n^{-1}, y_n^{-1}]_q,$$

et le coefficient de $j_k(x)$ sur $x_{n-r+1}^{-\alpha}$ dans $\mathbb{C}[x_{n-r+1}^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q$ considéré comme $\mathbb{C}[y_{n-r+1}^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q$ -module est $j_{k-1}(P_\alpha(X_1, \dots, X_{k-1}))$ qui est non nul d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, $j_k(x) \neq 0$. Le même raisonnement s'adaptant au cas k impair, on en déduit que j_k est injective. Puisque $j_{2n} = i_{2n}$, la proposition est démontrée. \square

Corollaire É6.1 *L'application ϕ_{2n} est injective.*

Démonstration. La surjectivité de ψ_{2n} , l'injectivité de i_{2n} et la commutativité du diagramme (É6.1) entraîne immédiatement l'injectivité de ϕ_{2n} . \square

Corollaire É6.2 *Pour tout N , l'application ψ_N est un isomorphisme de \mathbb{C} -espace vectoriel.*

Démonstration. Le même raisonnement que précédemment montre que ψ_{2n} est bijectif.

Reste à montrer que ψ_{2n-1} est bijectif pour $n \geq 1$. Soit $n \geq 1$. On a un morphisme d'algèbres :

$$\begin{array}{ccc} r : \mathcal{M}_q^{(2n-1)} & \longrightarrow & \mathcal{M}_q^{(2n)} \\ & & t_i \longmapsto t_i \end{array}$$

ce qui nous permet de définir le morphisme d'algèbres :

$$\phi_{2n-1} : \mathcal{M}_q^{(2n-1)} \longrightarrow \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q$$

par $\phi_{2n-1} := \phi_{2n} \circ r$. Alors, clairement, $r \circ \psi_{2n-1}$ est la restriction de ψ_{2n} à $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_{2n-1}]$. De plus, en notant comme dans la démonstration précédente j_{2n-1} la restriction de i_{2n} à $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_{2n-1}]$, on a le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{C}[X_1, \dots, X_{2n-1}] & \xrightarrow{\psi_{2n-1}} & \mathcal{M}_q^{(2n-1)} & \xrightarrow{r} & \mathcal{M}_q^{(2n)} \\ & \searrow j_{2n-1} & \downarrow \phi_{2n-1} & \swarrow \phi_{2n} & \\ & & \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q & & \end{array} \quad (\text{É6.5})$$

Par suite, l'injectivité de j_{2n-1} entraîne celle de ψ_{2n-1} . D'où le résultat. \square

Etant donné que l'image de $\mathcal{M}_q^{(2n)}$ par ϕ_{2n} n'est autre que $U_q^{(n)}$, nous avons presque démontré T2. Il nous reste à voir que $U_q^{(n)}$ a le même corps de fractions que $A_q^{(n)}$. Ceci découle du lemme suivant :

Lemme É6.2 *Pour tout $k \in \{1, \dots, 2n\}$, le corps de fractions de l'algèbre engendrée par u_1, \dots, u_k est le même que celui de $\mathbb{C}[x_{n-r+1}^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q$ si $k = 2r$ et $\mathbb{C}[y_{n-r}^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q$ si $k = 2r + 1$.*

Démonstration. Cela découle de la formule (É6.4) si $k = 2r$ et d'une relation analogue si $k = 2r + 1$. \square

Par suite, T2 est démontré. De plus, d'après le corollaire É6.2, on voit qu'une base de $U_q^{(n)}$ est donnée par la famille $\prod_{i=1}^{2n} u_i^{\alpha_i}$, $\alpha_i \in \mathbb{N}$.

Il nous reste à vérifier T3.

Proposition É6.2 *La restriction de φ à $\mathcal{U}_q^{(n)}$ est un isomorphisme de $\mathcal{U}_q^{(n)}$ sur $U_q^{(n)}$.*

Démonstration. D'après le corollaire É5.1 et le fait que ϕ_{2n} soit un isomorphisme de $\mathcal{M}_q^{(2n)}$ sur $U_q^{(n)}$, on a un morphisme d'algèbres :

$$\begin{array}{ccc} \psi : U_q^{(n)} & \longrightarrow & \mathcal{U}_q^{(n)} \\ & & u_i \longmapsto \alpha_i \end{array}$$

Ce morphisme ψ n'est autre que l'inverse recherché. □

Ainsi, une base de $\mathcal{U}_q^{(n)}$ est donnée par la famille $\prod_{i=1}^{2n} \alpha_i^{a_i}$, avec $a_i \in \mathbb{N}$. Le corollaire É5.1 et la formule (É1.15) donnant le crochet de Poisson sur $\mathcal{U}^{(n)}$ achève la preuve de T3.

É7 Fin de la démonstration

Dorénavant, q désignera un nombre complexe non nul, non racine de l'unité, et $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ désignera l'algèbre obtenue à partir de l'"ancienne" algèbre de Hopf $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ en adjoignant une racine carrée de $k : k^{\frac{1}{2}}$, ainsi que son inverse $k^{-\frac{1}{2}}$.

Alors, $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ reste une algèbre de Hopf en posant :

$$k^{\frac{1}{2}} e_{\pm} k^{-\frac{1}{2}} = q^{\pm \frac{1}{2}} e_{\pm},$$

et $A_q^{(n)}$ reste une $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -algèbre de Hopf en posant :

$$k^{\pm \frac{1}{2}} . P = q^{\pm \frac{1}{2} \partial^o P} P,$$

pour P homogène.

Par ailleurs, pour $(i, j) \in \{1, \dots, 2n\}^2$, avec $i < j$, nous noterons par $\mathbb{C}[u_i, \dots, u_j]_q$ la sous-algèbre de $A_q^{(n)}$ engendrée par u_k pour $i \leq k \leq j$. C'est une $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -sous-algèbre-module de $U_q^{(n)}$.

É7.1 Graduation principale sur $A_q^{(n)}$ et $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$.

En plus de la graduation utilisée jusqu'ici, nous disposons d'une graduation principale sur $A_q^{(n)}$ et $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ définie de la façon suivante :

$$\partial_p^o x_i = \partial_p^o y_i = 1,$$

et :

$$\partial_p^o e_{\pm} = 1, \quad \partial_p^o k^{\pm \frac{1}{2}} = 0.$$

Cette graduation (principale) est intéressante car l'action de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ sur $A_q^{(n)}$ est graduée (pour cette graduation comme pour l'autre).

Il est facile de voir que :

$$\forall i \in \{1, \dots, 2n\}, \quad \partial^o u_i = 1 \text{ et } \partial_p^o u_i = 1 - 2i.$$

Par suite, en posant $\partial_1^o = \partial^o$, et $\partial_2^o = \frac{1}{2}(\partial^o - \partial_p^o)$, on obtient deux graduations sur $U_q^{(n)}$ et $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ telles que :

$$\forall i \in \{1, \dots, 2n\}, \quad \partial_1^o u_i = 1 \text{ et } \partial_2^o u_i = i,$$

et :

$$\partial_1^o e_{\pm} = \pm 1, \quad \partial_2^o e_+ = 0, \quad \partial_2^o e_- = -1, \quad \partial_1^o k^{\pm \frac{1}{2}} = \partial_2^o k^{\pm \frac{1}{2}} = 0.$$

Lemme É7.1 Soient $k \in \{1, \dots, 2n\}$ et $P \in \mathbb{C}[u_1, \dots, u_k]_q$ homogène. Alors,

$$\partial_1^o P \leq \partial_2^o P \leq k \partial_1^o P.$$

Démonstration. C'est clair, car si $P = u_1^{\alpha_1} \dots u_k^{\alpha_k}$, alors :

$$\begin{aligned} \partial_1^o P &= \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k, \\ \text{et} \quad \partial_2^o P &= \alpha_1 + 2\alpha_2 + \dots + k\alpha_k. \end{aligned}$$

□

É7.2 L'idéal $I_q^{(n)}$.

Nous cherchons à généraliser l'isomorphisme (É1.17) qui provient du couplage non-dégénérée (É1.16). Nous sommes donc amenés à considérer l'idéal à droite $I_q^{(n)}$ de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ défini par :

$$I_q^{(n)} := \{x \in U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-) / \varepsilon(x.P) = 0 \quad \forall P \in U_q^{(n)}\},$$

où ε désigne l'évaluation du terme constant dans $A_q^{(n)}$ comme dans $U_q^{(n)}$ (c'est la même chose). Notons que la fonction ε est un morphisme d'algèbres et que si $P \in U_q^{(n)}$ est homogène pour ∂_1^o ou ∂_2^o de degré strictement positif, alors $\varepsilon(P) = 0$.

L'idéal à droite $I_q^{(n)}$ se décrit difficilement dans l'algèbre $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$. Par contre, nous allons voir qu'il s'exprime aisément comme idéal de $\mathbb{C}[\widehat{B}_+]_q$ ainsi qu'en termes de nouvelles réalisations de Drinfeld.

É7.3 Définition de $\mathbb{C}[B+]_q$.

C'est l'algèbre engendrée sur $\mathbb{C}[q^{\frac{1}{2}}, q^{-\frac{1}{2}}]$ par les générateurs : $a_{i,j}^{(k)}$ et les relations :

$$R(\lambda, \mu) \mathcal{L}_1(\lambda) \mathcal{L}_2(\mu) = \mathcal{L}_2(\mu) \mathcal{L}_1(\lambda) R(\lambda, \mu), \quad (\text{É7.1})$$

où $R(\lambda, \mu)$ est la R -matrice de (1.10), et :

$$a_{2,1}^{(0)} = 0, \quad (\text{É7.2})$$

ainsi que :

$$a_{1,1}(q\lambda) [a_{2,2}(\lambda) - a_{2,1}(\lambda) a_{1,1}(\lambda)^{-1} a_{1,2}(\lambda)] = 1. \quad (\text{É7.3})$$

La dernière relation est celle du déterminant quantique. On a en particulier :

$$a_{1,1}^{(0)} a_{2,2}^{(0)} = a_{2,2}^{(0)} a_{1,1}^{(0)} = 1 \quad (\text{É7.4})$$

$$\forall i, j, \alpha, \beta, \quad a_{i,j}^{(\alpha)} a_{i,j}^{(\beta)} = a_{i,j}^{(\beta)} a_{i,j}^{(\alpha)} \quad (\text{É7.5})$$

On peut également définir une antipode qui ne nous sera pas utile ici. On montre que l'on obtient une algèbre de Hopf. La comultiplication est donnée par :

$$\begin{aligned} \Delta : \quad \mathbb{C}[B+]_q &\longrightarrow \mathbb{C}[B+]_q \\ \mathcal{L}(\lambda) &\longmapsto \mathcal{L}(\lambda) \otimes \mathcal{L}(\lambda) \end{aligned}$$

L'algèbre $\mathbb{C}[\widehat{B}_+]_q$ est bigraduée naturellement :

- par $\partial^o(a_{i,j}^{(k)}) = k$ correspondant à la dérivation :

$$d(L(\lambda)) = \lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} L(\lambda)$$

- par $\partial^o(a_{i,j}^{(k)}) = 2(j - i)$ correspondant à la dérivation :

$$d'(L(\lambda)) = \text{ad}(h)(L(\lambda)).$$

Nous poserons $\partial_1^o = -\frac{1}{2}\partial^o$ et $\partial_2^o = -\frac{1}{2}\partial^o - \partial^o$. Donc,

$$\forall i, j, k, \quad \partial_1^o(a_{i,j}^{(k)}) = i - j \quad \text{et} \quad \partial_2^o(a_{i,j}^{(k)}) = i - j - k. \quad (\text{É7.6})$$

Nous admettrons la proposition :

Proposition É7.1 *L'application suivante entre $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ et $\mathbb{C}[\widehat{B}_+]_q$ est un isomorphisme d'algèbres de Hopf bigradué pour ∂_1^o et ∂_2^o :*

$$\begin{aligned} U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-) &\longrightarrow \mathbb{C}[\widehat{B}_+]_q \\ e_+ &\longrightarrow a_{2,1}^{(1)} a_{2,2}^{(0)} \\ e_- &\longrightarrow a_{1,2}^{(0)} a_{1,1}^{(0)} \\ k^{\frac{1}{2}} &\longrightarrow a_{2,2}^{(0)} \\ k^{-\frac{1}{2}} &\longrightarrow a_{1,1}^{(0)} \end{aligned}$$

Nous allons maintenant nous intéresser à l'action de $\mathbb{C}[\widehat{B}_+]_q$ sur $U_q^{(n)}$ via l'isomorphisme de la proposition précédente. Commençons par calculer l'action des $a_{i,j}^{(k)}$ sur $U_q^{(n)}$.

É7.4 Action de $a_{2,1}^{(k)}$ sur $U_q^{(n)}$.

Soit $k \geq 1$. On a $\partial_1^o(a_{2,1}^{(k)}) = 1$. Donc, si $P \in A_q^{(n)}$ est homogène pour ∂_1^o , $a_{2,1}^{(k)}.P$ est homogène de degré strictement positif pour ∂_1^o . Par suite, $a_{2,1}^{(k)} \in I_q^{(n)}$.

É7.5 Action de $a_{1,1}^{(1)}$ et $a_{2,2}^{(1)}$ sur les u_i , $1 \leq i \leq 2n$.

On a $\partial_1^0(a_{1,1}^{(1)}) = 0$ et $\partial_2^0(a_{1,1}^{(1)}) = -1$. Donc, $a_{1,1}^{(1)} \in I_q^{(n)}$ et :

$$\forall i, \exists \alpha_i, \quad a_{1,1}^{(1)}.u_i = \alpha_i u_{i-1}.$$

Notons ϕ l'isomorphisme de la proposition É7.1. Il est bigradué. Donc,

$$\exists \lambda, \mu, r, s, \quad a_{1,1}^{(1)} = \phi[\lambda k^r e_+ e_- + \mu k^s e_- e_+].$$

Par suite, α_i est indépendant de i . Notons que (É5.4) peut se réécrire :

$$\forall k, \quad u_k u_{k+1} = q u_{k+1} u_k. \quad (\text{É7.7})$$

En appliquant $a_{1,1}^{(1)}$ aux deux membres de l'égalité précédente pour $k = 1$, et en utilisant la structure de $\mathbb{C}[\widehat{B}_+]_q$ algèbre-module, on constate que $\alpha_i = \alpha \neq 0$.

De la même façon, on prouve que $a_{2,2}^{(1)} \in I_q^{(n)}$ et que :

$$\exists \beta \neq 0 \forall i, \quad a_{2,2}^{(1)}.u_i = \beta u_{i-1}.$$

Le calcul montre que $\alpha = \frac{q^{-\frac{1}{2}}}{q-1}$ et $\beta = -\frac{q^{-\frac{1}{2}}}{q-1}$.

É7.6 Action de $a_{1,2}^{(k-1)}$, $k > 2n$ sur $U_q^{(n)}$.

Soit $k > 2n$. On a $\partial_1^0 a_{1,2}^{(k-1)} = -1$ et $\partial_2^0 a_{1,2}^{(k-1)} = -k$. Donc,

$$\forall j \in \{1, \dots, 2n\}, \quad a_{1,2}^{(k-1)}.u_j = 0.$$

Par ailleurs, si P et Q sont homogènes dans $U_q^{(n)}$, alors :

$$\varepsilon \left[a_{1,2}^{(k-1)}. (PQ) \right] = \sum_{\alpha+\beta=k-1} \varepsilon [a_{1,1}^{(\alpha)}.P] \varepsilon [a_{1,2}^{(\beta)}.Q] + \sum_{\alpha+\beta=k-1} \varepsilon [a_{1,2}^{(\alpha)}.P] \varepsilon [a_{2,2}^{(\beta)}.Q].$$

Or, si $k > 0$, $a_{1,1}^{(k)} \in I_q^{(n)}$ et $a_{2,2}^{(k)} \in I_q^{(n)}$. Ceci vient du fait que $\partial_1^0(a_{1,1}^{(k)}) = 0$ et $\partial_2^0(a_{1,1}^{(k)}) = -k$.

Donc,

$$\varepsilon \left[a_{1,2}^{(k-1)}. (PQ) \right] = \varepsilon [a_{1,1}^{(0)}.P] \varepsilon [a_{1,2}^{(k-1)}.Q] + \varepsilon [a_{1,2}^{(k-1)}.P] \varepsilon [a_{2,2}^{(0)}.Q].$$

Par suite, on montre par récurrence sur $\partial_1^0 P$, que si P est homogène, alors $\varepsilon [a_{1,2}^{(k-1)}.P] = 0$ d'où l'on déduit que $a_{1,2}^{(k-1)} \in I_q^{(n)}$.

É7.7 Action de $a_{1,2}^{(k-1)}$, $k \leq 2n$ sur $U_q^{(n)}$.

Soit $k \leq 2n$. On a toujours $\partial_1^o a_{1,2}^{(k-1)} = -1$ et $\partial_2^o a_{1,2}^{(k-1)} = -k$. Donc,

$$\exists C_k \forall i, \quad a_{1,2}^{(k-1)}.u_i = C_k \delta_i^k. \quad (\text{É7.8})$$

D'après les propositions É3.1 et É7.1, on a $C_1 \neq 0$. De plus, en appliquant $a_{1,2}^{(k)}$ à (É7.7), on constate que :

$$\exists r \neq 0 \forall k, \quad C_{k+1} = r C_k.$$

Par suite, $C_k \neq 0$. En particulier, $a_{1,2}^{(k-1)} \notin I_q^{(n)}$. Le calcul montre que

$$r = -\frac{1}{(q-1)^2} \quad \text{et} \quad C_1 = q^{-\frac{1}{2}}.$$

É7.8 Action de $a_{1,1}^{(k)}$ et $a_{2,2}^{(k)}$, $k \geq 1$ sur $U_q^{(n)}$.

Soit $k \geq 1$. Comme on l'a déjà remarqué précédemment, on a $\partial_1^o(a_{1,1}^{(k)}) = 0$ et $\partial_2^o(a_{1,1}^{(k)}) = -k$. Donc, $a_{1,1}^{(k)} \in I_q^{(n)}$ et :

$$\forall i \exists \lambda_{i,k}, \quad a_{1,1}^{(k)}.u_i = \lambda_{i,k} u_{i-k}.$$

En appliquant $a_{1,1}^{(1)}$ aux deux membres de l'équation et en utilisant (É7.5), on constate que $\lambda_{i,k}$ est une constante λ_k indépendante de i . Par ailleurs, en appliquant $a_{1,1}^{(k)}$ à (É7.7), et en regardant le coefficient devant $u_1 u_k$ suivant la base $\prod_{i=1}^{2n} u_i^{\alpha_i}$, $\alpha_i \in \mathbb{N}$ de $U_q^{(n)}$, on peut calculer cette constante, et on constate

$$\text{que } \lambda_k = \frac{C_k}{q-1} \neq 0.$$

De la même façon, on montre que $a_{2,2}^{(k)} \in I_q^{(n)}$ et que :

$$\exists \mu_k \neq 0 \forall i, \quad a_{2,2}^{(k)}.u_i = \mu_k u_{i-k},$$

$$\text{avec } \mu_k = -\frac{C_k}{q-1} \neq 0.$$

É7.9 Calcul de $I_q^{(n)}$.

Notons I_0 l'idéal à droite engendré par les éléments :

$$a_{1,1}^{(0)} - 1, a_{2,2}^{(0)} - 1, a_{2,1}^{(\alpha)}, \alpha > 0, a_{1,2}^{(\beta)}, \beta \geq 2n.$$

D'après ce qui précède, on a $I_0 \subset I_q^{(n)}$. Nous allons montrer qu'en fait, $I_0 = I_q^{(n)}$. Pour cela, nous aurons besoin de la série de lemmes suivants :

Lemme É7.2 Pour $r \in \{1, \dots, 2n\}$, $(i, j) \in \{1, 2\}^2$, et $k \in \mathbb{N}$, on a :

$$\forall P \in \mathbb{C}[u_1, \dots, u_r]_q, a_{i,j}^{(k)}.P \in \mathbb{C}[u_1, \dots, u_r]_q.$$

Démonstration. Cela veut juste dire que $\mathbb{C}[u_1, \dots, u_r]_q$ est un $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -module. \square

Lemme É7.3 $\forall k \in \{1, \dots, 2n\}, \forall P \in \mathbb{C}[u_{k+1}, \dots, u_{2n}]_q, a_{1,2}^{(k-1)}.P = 0.$

Démonstration. Par récurrence sur $\partial_1^q P$, et en utilisant la formule :

$$a_{1,2}^{(k-1)}.PQ = \sum_{u=1}^k (a_{1,1}^{(k-u)}.P)(a_{1,2}^{(u-1)}.Q) + \sum_{u=1}^k (a_{1,2}^{(u-1)}.P)(a_{2,2}^{(k-u)}.Q).$$

\square

Lemme É7.4 Pour $r \in \mathbb{N}, k \in \{1, \dots, 2n\}, \alpha \in \{1, \dots, k-1\}$ et $i \in \{0, \dots, r-1\}$, il existe $P_{i,\alpha} \in \mathbb{C}[u_1, \dots, u_{k-1}]_q$ tel que :

$$a_{2,2}^{(\alpha)}.u_k^r = \sum_{i=0}^{r-1} P_{i,\alpha} u_k^i.$$

Démonstration. La démonstration se fait par récurrence sur r . Soit $k \in \{1, \dots, 2n\}$, et $\alpha \in \{1, \dots, k-1\}$. On a :

$$\begin{aligned} a_{2,2}^{(\alpha)}.u_k^{r+1} &= a_{2,2}^{(\alpha)}.(u_k u_k^r) \\ &= \sum_{u+v=\alpha} (a_{2,1}^{(u)}.u_k)(a_{1,2}^{(v)}.u_k^r) + \sum_{u+v=\alpha} (a_{2,2}^{(u)}.u_k)(a_{2,2}^{(v)}.u_k^r) \end{aligned}$$

Donc, d'après le lemme précédent, le fait que $a_{2,1}^{(0)} = 0$, et l'hypothèse de récurrence, on a avec les notations de la section É7.8,

$$a_{2,2}^{(\alpha)}.u_k^{r+1} = q^{\frac{r}{2}} \mu_\alpha u_{k-\alpha} u_k^r + \sum_{x=1}^{\alpha} \mu_{\alpha-x} u_{k+x-\alpha} \sum_{i=0}^{r-1} P_{i,x} u_k^i.$$

Il suffit ensuite d'utiliser les relations de commutation entre u_k et u_i , $i < k$ (lorsque $x = \alpha$) pour obtenir le résultat. \square

Lemme É7.5 Pour $k \in \{1, \dots, 2n\}, j \in \{1, \dots, k-1\}, r \in \mathbb{N}$, et $P \in \mathbb{C}[u_1, \dots, u_{k-1}]_q$, ils existent des $P_i \in \mathbb{C}[u_1, \dots, u_{k-1}]_q$ tels que :

$$a_{1,2}^{(j-1)}.P u_k^r = \sum_{i=0}^r P_i u_k^i.$$

Ces P_i sont uniques. De plus, $P_r = q^{\frac{r}{2}} a_{1,2}^{(j-1)}.P$.

Démonstration. On a :

$$a_{1,2}^{(j-1)}.(Pu_k^r) = \sum_{\alpha+\beta=j-1} (a_{1,2}^{(\alpha)}.P)(a_{2,2}^{(\beta)}.u_k^r) + \sum_{\alpha+\beta=j-1} (a_{1,1}^{(\alpha)}.P)(a_{1,2}^{(\beta)}.u_k^r).$$

La dernière somme est nulle en vertu du lemme É7.3. Donc,

$$a_{1,2}^{(j-1)}.(Pu_k^r) = (a_{1,2}^{(j-1)}.P)q^{\frac{r}{2}}u_k^r + \sum_{p=1}^{j-1} (a_{1,2}^{(j-1-p)}.P)(a_{2,2}^{(p)}.u_k^r).$$

Il suffit ensuite d'appliquer les lemmes É7.4 et É7.2 pour obtenir l'existence des P_i . L'unicité est claire car $\mathbb{C}[u_1, \dots, u_k]_q$ est un $\mathbb{C}[u_1, \dots, u_{k-1}]_q$ -module libre. \square

Lemme É7.6 $\forall k \in 1, \dots, 2n \forall l \in \mathbb{N}^* \exists C_{k,l} \neq 0 \quad a_{1,2}^{(k-1)}.u_k^l = C_{k,l}u_k^{l-1}$.

Démonstration. On a $\Delta^{(l-1)}(a_{1,2}^{(k-1)}) = \sum a_{i_1, i_2}^{(\alpha_1)} \otimes \dots \otimes a_{i_l, i_{l+1}}^{(\alpha_l)}$, la somme portant sur les indices $i_1, \dots, i_{l+1}, \alpha_1, \dots, \alpha_l$ tels que $i_1 = 1, i_{l+1} = 2$ et $\sum \alpha_i = k - 1$.

Soient $i_1, \dots, i_{l+1}, \alpha_1, \dots, \alpha_l$ de tels indices, et notons r le plus petit entier vérifiant $i_r = 2$, de telle sorte que $i_u = 1$ si $u < r$. D'après (É7.8), on a $a_{i_{r-1}, i_r}^{(\alpha_{r-1})}.u_k = a_{1,2}^{(\alpha_{r-1})}.u_k = 0$ sauf si $\alpha_{r-1} = k - 1$, auquel cas on a $\forall j \neq r - 1, \alpha_j = 0$ car $\sum_v \alpha_v = k - 1$. Faisons l'hypothèse qu'il existe $s \geq r$ tel que $i_s = 1$, et soit s_0 le plus petit entier $\geq r$ vérifiant cette propriété. Alors, on a $s_0 > r$, et $a_{i_{s_0-1}, i_{s_0}}^{(\alpha_{s_0-1})} = a_{2,1}^{(0)} = 0$. Par suite, pour calculer $a_{1,2}^{(k-1)}.(u_k^l)$, on peut se restreindre à sommer sur les indices $i_1, \dots, i_{l+1}, \alpha_1, \dots, \alpha_l$ tels qu'il existe $r \in \{1, \dots, l\}$ vérifiant :

$$i_1 = \dots = i_r = 1; \quad i_{r+1} = \dots = i_l = 2; \quad \alpha_r = k - 1 \quad \text{et} \quad \forall j \neq r, \quad \alpha_j = 0.$$

Donc, avec les notations de la sous-section É7.7,

$$\begin{aligned} a_{1,2}^{(k-1)}.u_k^l &= \sum_{r=1}^l (a_{1,1}^{(0)}.u_k) \dots (a_{1,1}^{(0)}.u_k) \underbrace{a_{1,2}^{(k-1)}.u_k}_{r^{\text{ème}} \text{ t\^erme}} (a_{2,2}^{(0)}.u_k) \dots (a_{2,2}^{(0)}.u_k) \\ &= \sum_{r=1}^l \left(q^{-\frac{r-1}{2}} u_k^{r-1} \right) C_k \left(q^{\frac{1}{2}(l-r)} u_k^{l-r} \right) \\ &= q^{\frac{(l+1)}{2}} \left(\sum_{r=1}^l q^{-r} \right) C_k u_k^{l-1} \end{aligned} \tag{É7.9}$$

D'où le résultat, car q n'est pas une racine de l'unité. \square

Lemme É7.7 Soit $k \in \{1, \dots, 2n\}$. Alors, $\forall \alpha_k \exists \Lambda_{\alpha_k} \neq 0$ tel que :

$$\forall \beta_k \forall P \in \mathbb{C}[u_1, \dots, u_{k-1}]_q, \quad \varepsilon \left[(a_{1,2}^{(k-1)})^{\alpha_k} \cdot (Pu_k^{\beta_k}) \right] = \Lambda_{\alpha_k} \varepsilon(P) \delta_{\alpha_k}^{\beta_k}.$$

Démonstration. On peut supposer que P est un monôme en les u_i , $1 \leq i \leq k-1$. Posons $n_i = \partial_i^\circ P$, $i \in \{1, 2\}$. Si $\varepsilon \left[(a_{1,2}^{(k-1)})^{\alpha_k} \cdot (Pu_k^{\beta_k}) \right] \neq 0$, alors :

$$\partial_i^\circ a_{1,2}^{(k-1)\alpha_k} + \partial_i^\circ Pu_k^{\beta_k} = 0,$$

pour $i \in \{1, 2\}$. Donc,

$$\begin{aligned} n_1 + \beta_k &= \alpha_k \\ n_2 + k\beta_k &= k\alpha_k \end{aligned}$$

D'où $n_2 = kn_1$. Mais d'après le lemme É7.1, ceci entraîne $n_1 = n_2 = 0$. Donc P est une constante et $\alpha_k = \beta_k$. Réciproquement, si $\alpha_k = \beta_k$ et $P = \varepsilon(P)$, en utilisant plusieurs fois le lemme É7.6, on a :

$$\varepsilon \left[(a_{1,2}^{(k-1)})^{\alpha_k} \cdot (Pu_k^{\alpha_k}) \right] = \varepsilon(P) \varepsilon \left[(a_{1,2}^{(k-1)})^{\alpha_k} \cdot u_k^{\alpha_k} \right] = \varepsilon(P) \Lambda_{\alpha_k},$$

avec $\Lambda_{\alpha_k} \neq 0$. □

Idéalement, on aimerait obtenir une base duale dans l'algèbre engendrée par les $a_{1,2}^{(k-1)}$, (avec $k \in \{1, \dots, 2n\}$) aux $\prod_{i=1}^{2n} u_i^{\alpha_i}$ pour la forme bilinéaire :

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[\widehat{B}_+]_q / I_0 \times U_q^{(n)} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (\bar{x}, P) &\longmapsto \varepsilon(x.P). \end{aligned}$$

Mais ceci n'est pas tout à fait évident car on a par exemple les égalités :

$$\varepsilon \left[(a_{1,2}^{(2)})^2 \cdot (u_2 u_4) \right] \neq 0$$

et

$$\varepsilon \left[(a_{1,2}^{(1)} a_{1,2}^{(3)}) \cdot (u_2 u_4) \right] \neq 0.$$

Donc, il serait illusoire de croire que les $\prod_{i=1}^{2n} (a_{1,2}^{(i-1)})^{\alpha_i}$ est la base duale des

$\prod_{i=1}^{2n} u_i^{\alpha_i}$ comme pourrait nous le laisser supposer la formule (É7.8).

Pour se tirer d'affaires, considérons \leq la relation d'ordre lexicographique naturelle sur \mathbb{N}^{2n} , R le "renversement" de suites :

$$\begin{aligned} R : \quad \mathbb{N}^{2n} &\longrightarrow \mathbb{N}^{2n} \\ (a_i) &\longmapsto (a_{2n-i+1}) \end{aligned}$$

et \preceq la relation d'ordre lexicographique inversée définie par :

$$\forall (\underline{a}, \underline{b}) \in (\mathbb{N}^{2n})^2, \quad \underline{a} \preceq \underline{b} \iff R(\underline{a}) \leq R(\underline{b}).$$

Prenons l'exemple $n = 2$. La suite des coefficients correspondant à u_2u_4 est $\beta = (0, 1, 0, 1) : u_2u_4 = u_1^0u_2^1u_3^0u_4^1$. La suite des coefficients correspondant à $(a_{1,2}^{(2)})^2$ est $\alpha = (0, 0, 2, 0) : (a_{1,2}^{(2)})^2 = (a_{1,2}^{(0)})^0 (a_{1,2}^{(1)})^0 (a_{1,2}^{(2)})^2 (a_{1,2}^{(3)})^0$. On a $\alpha \prec \beta$ et $\varepsilon \left[\prod (a_{1,2}^{(i-1)})^{\alpha_i} \cdot \prod u_i^{\beta_i} \right] \neq 0$

Le lemme suivant montre que ce genre de choses ne peut pas se produire si $\beta \preceq \alpha$.

Lemme É7.8 Soient $k \in \{1, \dots, 2n\}$ et $\alpha \in \mathbb{N}^k$. Alors, il existe $M_\alpha \in \mathbb{C}^*$ tel que :

$$\forall \beta \preceq \alpha, \quad \varepsilon \left[\prod_{i=1}^k (a_{1,2}^{(i-1)})^{\alpha_i} \cdot \prod_{i=1}^k u_i^{\beta_i} \right] = M_\alpha \delta_\alpha^\beta.$$

Démonstration. Par récurrence sur k . Si $k = 1$, on applique le lemme É7.7 avec $P = 1$ et $k = 1$. Supposons le résultat vrai jusqu'à l'ordre $k - 1 \geq 1$. Soient α et β deux suites finies dans \mathbb{N}^k , tels que $\beta \preceq \alpha$. Posons :

$$P = u_1^{\beta_1} \dots u_{k-1}^{\beta_{k-1}}.$$

En vertu du lemme É7.5, on a :

$$a_{1,2}^{(0)}(Pu_k^{\beta_k}) = \sum_{i=0}^{\beta_k} P_{i,0} u_k^i,$$

avec $P_{i,0} \in \mathbb{C}[u_1, \dots, u_{k-1}]_q$ et $P_{\beta_k,0} = q^{\frac{\beta_k}{2}} a_{1,2}^{(0)}.P$.

En appliquant de manière répétée $a_{1,2}^{(0)}, \dots, a_{1,2}^{(k-2)}$ autant de fois qu'il le faut aux deux membres de l'équation précédente, et en utilisant les lemmes É7.2 et É7.5, on voit qu'ils existent des Q_i uniques tels que :

$$Q_i \in \mathbb{C}[u_1, \dots, u_{k-1}]_q, \\ Q_{\beta_k} = q^{\frac{\beta_k}{2}(\alpha_1 + \dots + \alpha_{k-1})} (a_{1,2}^{(0)})^{\alpha_1} \dots (a_{1,2}^{(k-2)})^{\alpha_{k-1}} .P$$

et :

$$(a_{1,2}^{(0)})^{\alpha_1} \dots (a_{1,2}^{(k-2)})^{\alpha_{k-1}} .(Pu_k^{\beta_k}) = \sum_{i=0}^{\beta_k} Q_i u_k^i.$$

D'après (É7.5), les $a_{1,2}^{(k-1)}$ commutent entre eux. Donc, en reprenant la notation de la constante $\Lambda_{\alpha_k} \neq 0$ introduite dans le lemme É7.7, on a :

$$\begin{aligned} \varepsilon \left[\prod_{i=1}^k (a_{1,2}^{(i-1)})^{\alpha_i} \cdot \prod_{i=1}^k u_i^{\beta_i} \right] &= \varepsilon \left[(a_{1,2}^{(k-1)})^{\alpha_k} (a_{1,2}^{(0)})^{\alpha_1} \dots (a_{1,2}^{(k-2)})^{\alpha_{k-1}} \cdot (Pu_k^{\beta_k}) \right] \\ &= \sum_{i=0}^{\beta_k} \varepsilon \left[(a_{1,2}^{(k-1)})^{\alpha_k} \cdot (Q_i u_k^i) \right] \\ &= \Lambda_{\alpha_k} \varepsilon(Q_i) \delta_i^{\alpha_k}. \end{aligned}$$

Or, $\beta \preceq \alpha$. Donc, $\beta_k \leq \alpha_k$. Donc,

$$\begin{aligned} \varepsilon \left[\prod_{i=1}^k (a_{1,2}^{(i-1)})^{\alpha_i} \cdot \prod_{i=1}^k u_i^{\beta_i} \right] &= \Lambda_{\alpha_k} \varepsilon(Q_{\beta_k}) \delta_{\alpha_k}^{\beta_k} \\ &= q^{\frac{\beta_k}{2}(\alpha_1 + \dots + \alpha_{k-1})} \Lambda_{\alpha_k} \varepsilon \left[\prod_{i=1}^{k-1} (a_{1,2}^{(i-1)})^{\alpha_i} \cdot \prod_{i=1}^{k-1} u_i^{\beta_i} \right] \delta_{\alpha_k}^{\beta_k} \end{aligned}$$

Si $\alpha_k \neq \beta_k$, cette quantité est nulle comme attendue. Sinon, on a :

$$(\beta_1, \dots, \beta_{k-1}) \preceq (\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}),$$

et on applique l'hypothèse de récurrence. \square

Nous pouvons à présent en déduire la proposition :

Proposition É7.2 *L'idéal à droite $I_q^{(n)}$ est engendré (à droite) par les éléments : $a_{1,1}^{(\alpha)}, a_{2,2}^{(\alpha)}, a_{2,1}^{(\alpha)}, a_{1,2}^{(2n-1+\alpha)}, a_{1,1}^{(0)} - 1, a_{2,2}^{(0)} - 1$, avec $\alpha > 0$. Autrement dit, $I_q^{(n)} = I_0$.*

Démonstration. Soit $x \in I_q^{(n)}$. Montrons que $x \in I_0$. Pour tous entiers $(i, j, k, l) \in \mathbb{N}^4$, et toutes suites d'entiers $\alpha = (\alpha_r)$, $0 \leq r \leq i$, $\beta = (\beta_s)$, $0 \leq s \leq j$, $\gamma = (\gamma_t)$, $0 \leq t \leq k$, $\delta = (\delta_u)$, $0 \leq u \leq l$, on pose :

$$x_{\alpha, \beta, \gamma, \delta}^{i, j, k, l} = \prod_{r=1}^i (a_{2,1}^{(r)})^{\alpha_r} \prod_{s=0}^j (a_{1,1}^{(s)})^{\beta_s} \prod_{t=0}^k (a_{2,2}^{(t)})^{\gamma_t} \prod_{u=0}^l (a_{1,2}^{(u)})^{\delta_u}.$$

D'après la définition de $\mathbb{C}[\widehat{B}_+]_q$, on peut voir que x est combinaison linéaire de termes de cette forme. Etant donné $i, j, k, l, \alpha, \beta, \gamma, \delta$, chacun des cas suivants entraîne $x_{\alpha, \beta, \gamma, \delta}^{i, j, k, l} \in I_0$:

- Il existe r tel que $\alpha_r > 0$,
- Il existe s tel que $s\beta_s > 0$,

– Il existe t tel que $t\gamma_t > 0$,

– Il existe $u \in \{2n, \dots, l\}$ tel que $\delta_u \neq 0$.

Par ailleurs, si $i \in \{1, 2\}$, $a_{i,i}^{(0)} - 1 \in I_0$. Donc, la formule du binôme montre que l'on peut supposer que x est en fait une combinaison linéaire de termes

de la forme $\prod_{i=1}^{2n} (a_{1,2}^{(i-1)})^{\alpha_i}$. Pour conclure, il suffit de montrer que $x = 0$.

Supposons le contraire, et posons :

$$x = \sum_{\alpha \in E} \lambda_\alpha \prod_{i=1}^{2n} (a_{1,2}^{(i-1)})^{\alpha_i},$$

où E est un ensemble fini non vide tel que $\forall \alpha \in E \lambda_\alpha \neq 0$. Soit α le plus petit élément de l'ensemble E pour la relation d'ordre \preceq . Alors, en utilisant le lemme É7.8, et en regardant l'action de x sur $\prod_{i=1}^{2n} u_i^{\alpha_i}$, on constate que $\lambda_\alpha = 0$. Contradiction. \square

Remarques :

1. Sous forme ramassée, l'action de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ sur les U_i est la suivante :

$$\begin{aligned} e_+.u(\lambda) &= -\lambda^{-1}u^2(\lambda), \\ e_-.u(\lambda) &= q^{-1}, \\ k.u(\lambda) &= qu(\lambda). \end{aligned}$$

$$\text{avec } u(\lambda) = \sum_{i=0}^{+\infty} (-1)^i u_{i+1} \lambda^{-i}.$$

2. Soit

$$\begin{aligned} T : \quad \mathbb{C}[u_1, \dots, u_{2n-1}]_q &\longrightarrow \mathbb{C}[u_1, \dots, u_{2n}]_q = U_q^{(n)} \\ u_i &\longrightarrow u_{i+1} \end{aligned}$$

l'application de translation sur $U_q^{(n)}$. On peut vérifier que T est bien un morphisme d'algèbres.

Alors, pour $i \in \{1, 2\}$, $k \in \{1, \dots, 2n\}$ et $x \in \mathbb{C}[u_k, \dots, u_{2n-1}]_q$ on a

$$a_{i,i}^{(k-1)} \circ T.x = T \circ a_{i,i}^{(k-1)}.x$$

De plus, en reprenant la constante r de É7.7, on montre que si $k \in \{1, \dots, 2n-1\}$ et $x \in \mathbb{C}[u_k, \dots, u_{2n-1}]_q$, alors :

$$a_{1,2}^{(k)} \circ T.x = r T \circ a_{1,2}^{(k-1)}.x$$

3. On doit pouvoir remplacer \preceq par \leq dans le lemme É7.8
4. En reprenant la formule (É7.9), il semblerait que lorsque q est une racine primitive l -ième de l'unité, l'idéal I soit engendré par I_0 et les $(a_{1,2}^{(k)})^l$, avec $k \in \mathbb{N}$.

É7.10 Le couplage non dégénéré.

Nous allons nous intéresser à présent au couplage :

$$B : \begin{array}{ccc} U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)/I_q^{(n)} \times U_q^{(n)} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ (\bar{x}, P) & \longmapsto & \varepsilon(x.P) \end{array}$$

D'après la forme de $I_0 = I_q^{(n)}$, il est clair que $I_q^{(n)}$ est un idéal de Hopf bigradué. Or, l'action de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ sur $U_q^{(n)}$ est bigraduée. Donc, $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)/I_q^{(n)}$ est bigradué, ainsi que le couplage B . De plus, la structure de $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)$ -algèbre-module sur $U_q^{(n)}$, et le fait que ε soit un morphisme d'algèbres entraîne que l'application provenant de B :

$$\xi : \begin{array}{ccc} U_q^{(n)} & \longrightarrow & (U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)/I_q^{(n)})^* \\ P & \longmapsto & [x \rightarrow \varepsilon(x.P)] \end{array}$$

est un morphisme d'algèbres.

Proposition É7.3 *L'application ξ est injective.*

Démonstration. Soit $P \in U_q^{(n)}$, $P \neq 0$. Alors, nous avons vu qu'il existe F un ensemble fini non vide tel que :

$$P = \sum_{\beta \in F} \lambda_\beta \prod_{i=1}^{2n} u_i^{\beta_i},$$

avec $\forall \beta \in F$, $\lambda_\beta \neq 0$. Soit $\alpha \in F$ le plus grand élément de F pour la relation \preceq , et posons :

$$x = \prod_{i=1}^{2n} (a_{1,2}^{(i-1)})^{\alpha_i}.$$

Alors, le lemme É7.8 montre que :

$$\begin{aligned} \xi(P).x &= \varepsilon(x.P) \\ &= \sum_{\beta \in F} \lambda_\beta \varepsilon \left[x. \prod_{i=1}^{2n} u_i^{\beta_i} \right] \\ &= \lambda_\alpha M_\alpha \neq 0 \end{aligned}$$

ce qui prouve l'injectivité. □

Proposition É7.4 *L'application linéaire :*

$$l : \begin{array}{ccc} U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)/I_q^{(n)} & \longrightarrow & U_q^{(n)*} \\ \bar{x} & \longmapsto & \varepsilon(x.) \end{array}$$

est injective.

Démonstration. Cela découle de la définition même de $I_q^{(n)}$! □

Le couplage B étant (bi)gradué, on peut remplacer le dual normal utilisé jusqu'ici par le dual restreint (ou gradué). De plus, toutes les composantes graduées sont de dimension finie. Les deux propositions précédentes entraînent alors immédiatement que :

$$U_q^{(n)} = (U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)/I_q^{(n)})'$$

et :

$$U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)/I_q^{(n)} = (U_q^{(n)})',$$

en notant par ' le dual restreint. Notons qu'une base du \mathbb{C} espace vectoriel $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)/I_q^{(n)}$ est donnée par les cl $\left[\prod_{i=1}^{2n} (a_{1,2}^{(i-1)})^{\alpha_i} \right]$. Comme espace-vectoriel,

$U_q^{(n)}$ et $U_q(\widehat{\mathfrak{b}}_-)/I_q^{(n)}$ sont tous les deux isomorphes à $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_{2n}]$.

Ceci achève la démonstration de T4. En ce qui concerne T5, il suffit d'appliquer la proposition É7.2 ainsi que l'isomorphisme entre $\mathbb{C}[\widehat{B}_+]_q$ et les nouvelles réalisations mis en évidence dans [13].

RETOUR SUR $\mathcal{A}_q^{(n)}$

De la même façon que $\mathcal{U}_q^{(n)}$ est une déformation quantique de $\mathcal{U}^{(n)}$, on aimerait pouvoir affirmer que $\mathcal{A}_q^{(n)}$ est une déformation quantique de $\mathcal{A}^{(n)}$. Comme nous l'avons déjà remarqué, il faudrait imposer en plus les relations entre les $a_{i,j}^{(k)}$ et $a_{1,1}^{(n-1)'}$, $a_{1,2}^{(n-1)'}$, $a_{2,1}^{(n)'}$, $a_{2,2}^{(n)'}$. Mais même après cela, on ne voit pas trop comment on pourrait démontrer que $\mathcal{A}_q^{(n)}$ est une déformation quantique de $\mathcal{A}^{(n)}$, et que l'application φ de É4 est injective (comme c'est le cas dans le cas classique).

Cela dit, par analogie avec le cas classique, il est plus naturel d'introduire $\mathcal{A}_q^{(n)}$ comme un localisé de $\bar{\mathcal{A}}_q^{(n)}$: le localisé suivant la partie multiplicative S engendrée par $a_{1,1}^{(n-1)}, \dots, a_{2,2}^{(n)}$. Mais, pour pouvoir localiser dans un anneau non commutatif, il faut réunir trois conditions exprimées dans [14]. Les deux premières sont facilement vérifiées sauf la troisième qui exprime que S ne contient pas de diviseurs de 0.

Par ailleurs, on peut voir que l'application :

$$\varphi : \bar{\mathcal{A}}_q^{(n)} \longrightarrow \mathcal{A}_q^{(n)}$$

définie en É4 est injective si $\bar{\mathcal{A}}_q^{(n)}$ est intègre. Il est donc naturel de conjecturer que $\bar{\mathcal{A}}_q^{(n)}$ est intègre.

Etant donné l'isomorphisme entre $U_q(\widehat{\mathfrak{n}}_-)$ et \mathcal{A}_q , dire que $\bar{\mathcal{A}}_q$ est intègre, c'est dire que l'algèbre engendrée par les opérateurs d'écrants Σ^+ et Σ^- est isomorphe à $\bar{\mathcal{A}}_q^{(n)}$.

D'autre part, notons que l'application :

$$\begin{aligned} \iota : \mathcal{A}^{(n)} &\longrightarrow \mathbb{C}^{2n-2} \times (\mathbb{C}^*)^2 \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &\longmapsto (c_1, \dots, c_{n-1}, d_1, \dots, d_{n-1}, c_n, d_n) \end{aligned}$$

est injective car (a, b) est le couple de Bezout unique tel que $du - cv = 1$ et $\partial^o u < \partial^o c$, $\partial^o v < \partial^o d$. De plus, l'image de $\mathcal{A}^{(n)}$ par ι est $\text{Res}^{<-1>}(\mathbb{C}^*)$ où Res est l'application Résultant :

$$\begin{aligned} \text{Res} : \mathbb{C}^{2n-2} \times (\mathbb{C}^*)^2 &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (c_1, \dots, c_{n-1}, d_1, \dots, d_{n-1}, c_n, d_n) &\longmapsto \text{Res}(c, d), \end{aligned}$$

avec $c = \sum_{i=1}^n c_i \lambda^i$, et $d = 1 + \sum_{i=1}^n d_i \lambda^i$. Par suite, $\mathbb{C}[\mathcal{A}^{(n)}]$ s'identifie au localisé :

$$\mathbb{C}[\mathcal{A}^{(n)}] = \mathbb{C}[c_i, d_i, 1 \leq i \leq n-1][c_n^{\pm 1}, d_n^{\pm 1}]_{(\text{Res})} \quad (\text{É7.10})$$

où (Res) est l'idéal engendré par le résultant "générique" de c et de d . En outre, il est facile de voir que la restriction de φ à la sous algèbre de $\bar{\mathcal{A}}_q^{(n)}$ engendré par les $a_{2,1}^{(k)}$, $i \in \{1, 2\}$, $k \in \mathbb{N}$ est injective. Donc l'analogie quantique $\mathbb{C}[c_i, d_i, 1 \leq i \leq n]_q$ est intègre. Il serait donc satisfaisant de pouvoir introduire un résultant quantique pour généraliser (É7.10), et décrire la cellule de Schubert quantique.

De manière générale, on conjecture que si \widehat{N}_+ est la partie nilpotente positive de $\widehat{\text{SL}}_n$, et si p est un entier positif, alors le quotient de $\mathbb{C}[\widehat{N}_+]_q$ par l'idéal engendré par les $a_{i,j}^{(k)}$ pour $k \geq p$ est intègre.

REMERCIEMENTS

Tous mes remerciements vont à mon directeur de thèse B. Enriquez.

APPENDICE

A Sur l'algèbre A_n de la proposition É2.1

Rigoureusement les algèbres $A\{t_1, \dots, t_n\}/I$ et $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}/I$ sont les suivantes :

- L'espace $A\{t_1, \dots, t_n\}$ est par définition le A -module libre dont une base est donnée par l'ensemble S des suites finies à valeurs dans $\{1, \dots, n\}$. Si s et s' sont dans S , on définit de manière évidente le produit de s avec s' que l'on note ss' , et qui n'est rien d'autre que la juxtaposition de s avec s' .

Fait 1 : $\forall t \in S, \{(s, s') \in S^2 / t = ss'\}$ est un ensemble fini.

On peut donc étendre sans problème le produit dans S à un produit dans $A\{t_1, \dots, t_n\}$ par :

$$\forall x = \sum_{s \in S} a_s s, \forall x' = \sum_{s' \in S} a'_{s'} s', \quad xx' := \sum_{t \in S} \left(\sum_{ss'=t} a_s a'_{s'} \right) t.$$

L'unité de $A\{t_1, \dots, t_n\}$ est la suite vide \emptyset . Le A -module $A\{t_1, \dots, t_n\}$ muni de ce produit est une algèbre. C'est l'algèbre (libre) engendrée par la suite $\emptyset (= 1)$ et les suites élémentaires $t_i = (i)$.

L'ensemble des graduations sur $A\{t_1, \dots, t_n\}$ est en bijection avec \mathbb{Z}^n . Nous considérerons celle définie par :

$$\forall i, \quad \partial^o t_i = 1.$$

Elle munit $A\{t_1, \dots, t_n\}$ d'une structure d'algèbre valuée. On note v la valuation.

- On montre facilement que l'algèbre quotient $A\{t_1, \dots, t_n\}/I$ est un A -module libre dont une base est donnée par la famille $t_1^{\alpha_1} \dots t_n^{\alpha_n}$ avec $\alpha_i \in \mathbb{N}$. C'est donc le A -module libre dont une base est donnée par l'ensemble N des n -uplets à valeurs dans \mathbb{N} .

Dans cette identification, la suite élémentaire t_i correspond au n -uplet :

$$(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0),$$

où le 1 est en $i^{\text{ème}}$ position, et le produit de deux n -uplets $\underline{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ avec $\underline{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ est défini par :

$$\underline{\alpha} \cdot \underline{\beta} = q^{-(\alpha_2 \beta_1 + \dots + \alpha_n \beta_{n-1})} \underline{\alpha + \beta},$$

avec

$$\underline{\alpha + \beta} = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n).$$

La graduation introduite précédemment sur $A\{t_1, \dots, t_n\}$ passe au quotient, faisant de $A\{t_1, \dots, t_n\}/I$ une algèbre valuée. De plus, la surjection canonique :

$$\pi : A\{t_1, \dots, t_n\} \longrightarrow A\{t_1, \dots, t_n\}/I$$

est telle que si $x \in A\{t_1, \dots, t_n\}$, alors, $v(\pi(x)) \geq v(x)$. Donc, π est continue.

• L'espace $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$ est par définition, le A -module formé par les fonctions de S dans A . Si f et g sont dans $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$, on définit le produit fg par :

$$\begin{aligned} fg : S &\longrightarrow A \\ t &\longmapsto \sum_{ss'=t} f(s)g(s'). \end{aligned}$$

Ceci définit une structure d'algèbre sur $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$. De plus, l'application :

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow A\{\{t_1, \dots, t_n\}\} \\ s &\longmapsto \delta_s = \begin{cases} S &\longrightarrow A \\ t &\longmapsto \delta_s^t \end{cases} \end{aligned}$$

où δ_s^t est le symbole de Kronecker s'étend en un monomorphisme d'algèbres de $A\{t_1, \dots, t_n\}$ dans $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$ car $\forall s, s' \in S$, $\delta_s \delta_{s'} = \delta_{ss'}$ et de plus, l'unité de $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$ est clairement δ_\emptyset . Ceci nous permet d'identifier $A\{t_1, \dots, t_n\}$ à la sous-algèbre de $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$ formée par les fonctions à support fini.

On peut étendre à $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$ la valuation définie sur $A\{t_1, \dots, t_n\}$ par :

$$\forall f \in A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}, \quad v(f) = \text{Inf}\{v(s) \mid s \in S \text{ et } f(s) \neq 0\},$$

avec la convention que $\text{Inf}\emptyset = 0$. Le plongement précédent est valué. On montre que $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$ est la complétion formelle de $A\{t_1, \dots, t_n\}$.

Notons les résultats suivants :

Fait 2 : Soit $f \in A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$, $v(f) \geq 1$. Alors, $1 - f$ est inversible, et $(1 - f)^{-1} = 1 + f + \dots + f^n + \dots$

La série est bien convergente, car $\forall n$, $v(f^n) \geq n$.

Fait 3 : $\forall s \in S \exists ! n_s \in A \exists ! n_s =: \underline{\alpha} \in N / s = \lambda_s t_1^{\alpha_1} \dots t_n^{\alpha_n} \pmod{I}$.

Fait 4 : $\forall \underline{\alpha} \in N$, $\{s \in S, n_s = \underline{\alpha}\}$ est fini.

Fait 5 : L'application :

$$\begin{aligned} N &\longrightarrow S \\ \underline{\alpha} &\longmapsto (\underbrace{1, \dots, 1}_{\alpha_1 \text{ fois}}, \dots, \underbrace{i, \dots, i}_{\alpha_i \text{ fois}}, \dots, \underbrace{n, \dots, n}_{\alpha_n \text{ fois}}) \end{aligned}$$

est injective.

Fait 6 : $\forall \underline{\alpha} \in N, \{(\underline{\beta}, \underline{\gamma}) \in N^2 / \underline{\beta} + \underline{\gamma} = \underline{\alpha}\}$ est fini.

Ceux-ci sont utiles pour le point suivant.

- L'algèbre $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}/I$ est par définition le quotient de l'algèbre $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$ par l'idéal engendré par I dans $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$, via le plongement :

$$A\{t_1, \dots, t_n\} \hookrightarrow A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}.$$

L'idéal engendré par I est fermé dans $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}$. Ceci nous permet de définir une valuation quotiente (notée encore v) par :

$$\forall x \in A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}, \quad v(\bar{x}) = \sup \{v(x + a), a \in I\}.$$

On montre que $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}/I$ est la complétion formelle de l'algèbre $A\{t_1, \dots, t_n\}/I$.

Par ailleurs, considérons $\mathcal{F}(N, A)$, le A -module des fonctions de N dans A . Si f et g sont dans $\mathcal{F}(N, A)$, on définit le produit de f avec g comme étant :

$$\begin{aligned} f \cdot g : N &\longrightarrow A \\ \underline{\alpha} &\longmapsto \sum_{\substack{\underline{\beta}, \underline{\gamma} \\ \underline{\beta} + \underline{\gamma} = \underline{\alpha}}} q^{-(\beta_2 \gamma_1 + \dots + \beta_n \gamma_{n-1})} f(\underline{\beta}) g(\underline{\gamma}). \end{aligned}$$

L'expression a bien un sens d'après le fait 6. Muni de ce produit, $\mathcal{F}(N, A)$ est une A -algèbre.

D'après le fait 5, N se voit comme une partie de S . Notons χ_N , la fonction caractéristique de N dans S . Alors, l'application :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(N, A) &\longrightarrow A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}/I \\ f &\longmapsto \text{cl}(g) \end{aligned}$$

où g est la fonction :

$$\begin{aligned} g : S &\longrightarrow A \\ s &\longmapsto \chi_N(s) f(s) \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'algèbres. Son inverse est l'application :

$$\begin{aligned} A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}/I &\longrightarrow \mathcal{F}(N, A) \\ \text{cl}(f) &\longmapsto g \end{aligned}$$

où g est la fonction :

$$\begin{aligned} g : N &\longrightarrow A \\ \underline{\alpha} &\longmapsto \sum_{n_s = \underline{\alpha}} \lambda_s f(s). \end{aligned}$$

D'après le fait 4, ceci a bien un sens. Ainsi, $A\{\{t_1, \dots, t_n\}\}/I$ s'identifie à $\mathcal{F}(N, A)$ comme algèbre.

B Comultiplication tordue

Nous rappelons la définition du produit tensoriel tordu d'algèbres graduées. Dans toute la suite, k désignera un anneau commutatif unitaire et k^* l'ensemble de ses éléments inversibles.

Rappel :

Soient A_1, A_2 , deux k -algèbres graduées et $q \in k^*$. Notons i_1 (resp. i_2) l'injection canonique de A_1 (resp. A_2) dans $A_1 \times A_2$ défini par $\forall a_1 \in A_1$ (resp. $\forall a_2 \in A_2$), $i_1(a_1) = (a_1, 1)$ (resp. $i_2(a_2) = (1, a_2)$). Il existe à isomorphisme gradué près, une et une seule algèbre graduée (A, δ) et une unique application bilinéaire $f : A_1 \times A_2 \rightarrow A$ qui vérifient la propriété universelle suivante :

Soient B une k -algèbre graduée et $\varphi : A_1 \times A_2 \rightarrow B$ une application bilinéaire balancée (i.e., $\forall \lambda \in k \forall (a_1, a_2) \in A_1 \times A_2$, $\varphi(\lambda a_1, a_2) = \varphi(a_1, \lambda a_2) = \lambda \varphi(a_1, a_2)$) qui satisfait les deux conditions suivantes :

(1) Pour tout $k \in \{1, 2\}$, l'application $\varphi \circ i_k$ est un morphisme d'algèbres graduées de A_k vers B .

(2) Pour tout $(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2$, avec a_i homogène de degré α_i ($i \in \{1, 2\}$), on a

$$\begin{aligned} (\varphi \circ i_1)(a_1)(\varphi \circ i_2)(a_2) &= \varphi(a_1, a_2) \\ \text{et } (\varphi \circ i_2)(a_2)(\varphi \circ i_1)(a_1) &= q^{\alpha_1 \alpha_2} \varphi(a_1, a_2) \end{aligned}$$

Alors, il existe un unique morphisme gradué $\widehat{\varphi} : A \rightarrow B$ tel que le diagramme suivant soit commutatif :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\widehat{\varphi}} & B \\ f \searrow & & \nearrow \varphi \\ & A_1 \times A_2 & \end{array}$$

Comme espace vectoriel, A est isomorphe à $A_1 \otimes_k A_2$. La structure d'algèbre sur A se définit par : pour tous couples (a_1, a_2) et (a'_1, a'_2) dans $A_1 \times A_2$ constitués d'éléments homogènes, on pose :

$$(a_1 \otimes a_2) \cdot (a'_1 \otimes a'_2) = q^{(\partial^\circ a'_1)(\partial^\circ a_2)} a_1 a'_1 \otimes a_2 a'_2.$$

La graduation sur A est alors donnée par l'endomorphisme diagonalisable : $\delta = \delta_1 \otimes Id_{A_1} + Id_{A_2} \otimes \delta_2$, δ_i désignant la dérivation donnant la graduation sur A_i .

On notera $A_1 \otimes_q A_2$ le produit tensoriel q -tordu de A_1 et de A_2 , et $A_1 \bar{\otimes} A_2$ le produit tensoriel q^{-1} -tordu de A_1 et A_2 , c'est à dire $A_1 \otimes_{q^{-1}} A_2$.

Par associativité, on montre également que l'on peut définir le produit tensoriel q -tordu de plusieurs algèbres graduées. Si $n \in \mathbb{N}^*$, si A_i , $i \in \{1, \dots, n\}$ est une algèbre graduée, et si $a_i \in A_i$ est homogène de degré α_i , alors $a_1 \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} a_n$ est homogène de degré $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$.

Soient maintenant A, B, C, D quatre algèbres graduées, $g : C \times D \rightarrow C \otimes_q D$ l'application bilinéaire naturelle, et $u : A \rightarrow C$ et $v : B \rightarrow D$ deux morphismes gradués. alors, $g \circ (u \times v) : A \times B \rightarrow C \otimes_q D$ est une application bilinéaire satisfaisant les deux propriétés requises de la proposition précédente. Par la propriété universelle du produit tensoriel q -tordu, on en déduit l'existence d'un morphisme gradué noté

$$u \otimes_q v : A \otimes_q B \rightarrow C \otimes_q D$$

tel que

$$\forall (a, b) \in A \times B, (u \otimes_q v)(a \otimes_q b) = u(a) \otimes_q v(b).$$

Par associativité, on peut également définir le produit tensoriel q -tordu de plusieurs morphismes gradués.

Exemples :

- Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, on définit une graduation sur $k[x_i, x_i^{-1}]$ et $k[y_i, y_i^{-1}]$, en décrétant que $\partial^o x_i = 1$ et $\partial^o y_i = -1$.

Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, on a deux morphismes gradués :

$$u_i : \begin{array}{ccc} k[x_i, x_i^{-1}] & \longrightarrow & k[x_1^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q \\ x_i^{\pm 1} & \longmapsto & x_i^{\pm 1} \end{array}$$

et :

$$v_i : \begin{array}{ccc} k[y_i, y_i^{-1}] & \longrightarrow & k[x_1^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q \\ y_i^{\pm 1} & \longmapsto & y_i^{\pm 1} \end{array}$$

- Sur l'ensemble $E := \{u_i, v_i; i, j \in \{1, \dots, n\}\}$, on a une relation d'ordre total défini par : Pour $(\alpha, \beta) \in E^2$, $\alpha \prec \beta$ si et seulement si on est dans l'un des quatres cas suivants :

1. $\alpha = u_i, \beta = u_j$ et $i < j$
2. $\alpha = u_i, \beta = v_j$ et $i \leq j$
3. $\alpha = v_i, \beta = u_j$ et $i < j$
4. $\alpha = v_i, \beta = v_j$ et $i < j$.

On montre facilement que si $(\alpha, \beta) \in E^2$, alors

$$\alpha \prec \beta \implies \forall x, y, \beta(y)\alpha(x) = q^{-(\partial^o x)(\partial^o y)} \alpha(x)\beta(y).$$

Par suite, il existe un morphisme gradué :

$$\phi : \begin{array}{ccc} k[x_1, x_1^{-1}] \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} k[y_n, y_n^{-1}] & \longrightarrow & k[x_1^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q \\ u_1 \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} v_n & \longmapsto & u_1 \dots v_n \end{array} \quad (\text{B.1})$$

- Il existe sur $k\{x_1^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}\}$, une graduation telle que :

$$\partial^o x_i^{\pm 1} = \pm 1 \quad \text{et} \quad \partial^o y_i^{\pm 1} = \mp 1.$$

Le morphisme :

$$\begin{aligned} \widehat{\psi} : k\{x_1^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}\} &\longrightarrow k[x_1, x_1^{-1}] \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} k[y_n, y_n^{-1}] \\ x_i^{\pm 1} &\longmapsto 1 \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} x_i^{\pm 1} \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} 1 \\ y_j^{\pm 1} &\longmapsto 1 \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} y_j^{\pm 1} \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} 1 \end{aligned}$$

est gradué et se factorise en un morphisme gradué :

$$\begin{aligned} \psi : k[x_1^{\pm 1}, \dots, y_n^{\pm 1}]_q &\longrightarrow k[x_1, x_1^{-1}] \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} k[y_n, y_n^{-1}] \\ x_i^{\pm 1} &\longmapsto 1 \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} x_i^{\pm 1} \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} 1 \\ y_j^{\pm 1} &\longmapsto 1 \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} y_j^{\pm 1} \bar{\otimes} \dots \bar{\otimes} 1 \end{aligned}$$

• Il est facile de voir ϕ et ψ sont inverses l'une de l'autre. Par suite, ϕ et ψ sont des isomorphismes gradués.

Revenons à l'algèbre \mathcal{A}_q de 1.7.

• On pose : $\mathcal{L}(\lambda) = [a_{i,j}(\lambda)] \in M_2(\mathcal{A}_q)$. On a :

$$R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \mathcal{L}^1(\lambda) H \mathcal{L}^2(\mu) = \mathcal{L}^2(\mu) H \mathcal{L}^1(\lambda) R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right). \quad (\text{B.2})$$

Les deux matrices $\mathcal{L}^1(\lambda)$ et $\mathcal{L}^2(\mu)$ ne commutent pas dans $M_4(\mathcal{A}_q)$.

• L'algèbre \mathcal{A}_q étant graduée, considérons les deux morphismes d'algèbres suivants :

$$\begin{aligned} g : \mathcal{A}_q &\longrightarrow \mathcal{A}_q \bar{\otimes} \mathcal{A}_q & \text{et} & & d : \mathcal{A}_q &\longrightarrow \mathcal{A}_q \bar{\otimes} \mathcal{A}_q \\ x &\longrightarrow x \bar{\otimes} 1 & & & x &\longrightarrow 1 \bar{\otimes} x \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'application g (resp. d) se prolonge en un morphisme d'algèbres de $M_n(\mathcal{A}_q)$ dans $M_n(\mathcal{A}_q \bar{\otimes} \mathcal{A}_q)$. On notera M^g (resp. M^d) l'image de M par ce morphisme.

• Il est clair que

$$\forall i \in \{1, 2\} \forall x \in \{g, d\} \quad (\mathcal{L}^i(\lambda))^x = (\mathcal{L}^x(\lambda))^i.$$

Par suite, on notera $\mathcal{L}^{i,x}(\lambda)$ pour $(\mathcal{L}^i(\lambda))^x$.

La relation B.2 entraîne immédiatement les deux relations suivantes :

$$R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \mathcal{L}^{1g}(\lambda) H \mathcal{L}^{2g}(\mu) = \mathcal{L}^{2g}(\mu) H \mathcal{L}^{1g}(\lambda) R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \quad (\text{B.3})$$

$$R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \mathcal{L}^{1d}(\lambda) H \mathcal{L}^{2d}(\mu) = \mathcal{L}^{2d}(\mu) H \mathcal{L}^{1d}(\lambda) R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \quad (\text{B.4})$$

Les matrices $\mathcal{L}^{1g}(\lambda)$ et $\mathcal{L}^{2d}(\mu)$ ne commutent pas dans $M_4(\mathcal{A}_q)$, pas plus que $\mathcal{L}^{1d}(\lambda)$ et $\mathcal{L}^{2g}(\mu)$. Cependant, on a le lemme suivant :

Lemme B.1 *Les relations suivantes sont vérifiées dans $M_4(\mathcal{A}_q)$:*

$$Ad(H)(\mathcal{L}^{1g}(\lambda))\mathcal{L}^{2d}(\mu) = \mathcal{L}^{2d}(\mu)Ad(H)(\mathcal{L}^{1g}(\lambda)) \quad (\text{B.5})$$

$$Ad(H)(\mathcal{L}^{2g}(\lambda))\mathcal{L}^{1d}(\mu) = \mathcal{L}^{1d}(\mu)Ad(H)(\mathcal{L}^{2g}(\lambda)) \quad (\text{B.6})$$

$$Ad(H)\left(R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\right) = R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \quad (\text{B.7})$$

Démonstration. La dernière égalité est claire d'après (1.10) et (1.9). Les deux autres relations se vérifient matriciellement. Par exemple,

$$\begin{aligned} & Ad(H)(\mathcal{L}^{2g}(\lambda)) \\ &= \begin{pmatrix} a_{1,1}(\lambda)\bar{\otimes}1 & q^{-\frac{1}{2}}a_{1,2}(\lambda)\bar{\otimes}1 & 0 & 0 \\ q^{\frac{1}{2}}a_{2,1}(\lambda)\bar{\otimes}1 & a_{2,2}(\lambda)\bar{\otimes}1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{1,1}(\lambda)\bar{\otimes}1 & q^{\frac{1}{2}}a_{1,2}(\lambda)\bar{\otimes}1 \\ 0 & 0 & q^{-\frac{1}{2}}a_{2,1}(\lambda)\bar{\otimes}1 & a_{2,2}(\lambda)\bar{\otimes}1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

et

$$\mathcal{L}^{1d}(\mu) = \begin{pmatrix} 1\bar{\otimes}a_{1,1}(\mu) & 0 & 1\bar{\otimes}a_{1,2}(\mu) & 0 \\ 0 & 1\bar{\otimes}a_{1,1}(\mu) & 0 & 1\bar{\otimes}a_{1,2}(\mu) \\ 1\bar{\otimes}a_{2,1}(\mu) & 0 & 1\bar{\otimes}a_{2,2}(\mu) & 0 \\ 0 & 1\bar{\otimes}a_{2,1}(\mu) & 0 & 1\bar{\otimes}a_{2,2}(\mu) \end{pmatrix}.$$

Le fait que ces deux matrices commutent est une conséquence de l'égalité :

$$(1\bar{\otimes}a_{i,j}(\mu))(a_{k,l}(\lambda)\bar{\otimes}1) = q^{-(i-j)(k-l)}(a_{k,l}(\lambda)\bar{\otimes}1)(1\bar{\otimes}a_{i,j}(\mu)),$$

pour $i, j, k, l \in \{1, 2\}$. □

Nous pouvons à présent en déduire l'existence d'une comultiplication tordue sur \mathcal{A}_q .

Proposition B.1 *Soit $\bar{\Delta}$ l'application suivante :*

$$\begin{aligned} \bar{\Delta} : \mathcal{A} &\longrightarrow \mathcal{A}_q\bar{\otimes}\mathcal{A}_q \\ \mathcal{L}(\lambda) &\longrightarrow \mathcal{L}(\lambda)\bar{\otimes}\mathcal{L}(\lambda) = \mathcal{L}^g(\lambda)\mathcal{L}^d(\lambda) \end{aligned}.$$

Alors, $\bar{\Delta}$ définit un morphisme d'algèbres graduées tel que $I_q \subset \ker \bar{\Delta}$. D'où l'on en déduit un morphisme d'algèbres graduées noté encore $\bar{\Delta}$:

$$\begin{aligned} \bar{\Delta} : \mathcal{A}_q &\longrightarrow \mathcal{A}_q\bar{\otimes}\mathcal{A}_q \\ \mathcal{L}(\lambda) &\longrightarrow \mathcal{L}(\lambda)\bar{\otimes}\mathcal{L}(\lambda) \end{aligned}$$

Démonstration. Le fait que $\bar{\Delta}$ soit gradué est clair. Pour montrer qu'il définit un morphisme d'algèbres de \mathcal{A}_q dans $\mathcal{A}_q\bar{\otimes}\mathcal{A}_q$, il faut voir que

$$\bar{\Delta}\left(R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\mathcal{L}^1(\lambda)H\mathcal{L}^2(\mu)\right) = \bar{\Delta}\left(\mathcal{L}^2(\mu)H\mathcal{L}^1(\lambda)R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\right).$$

L'application $\bar{\Delta}$ étant un morphisme d'algèbres, on a :

$$\begin{aligned}
\bar{\Delta}\left(R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\mathcal{L}^1(\lambda)H\mathcal{L}^2(\mu)\right) &= R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\bar{\Delta}(\mathcal{L}^1(\lambda))H\bar{\Delta}(\mathcal{L}^2(\mu)) \\
&= R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\mathcal{L}^{1g}(\lambda)\mathcal{L}^{1d}(\lambda)H\mathcal{L}^{2g}(\mu)\mathcal{L}^{2d}(\mu) \\
&= R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\mathcal{L}^{1g}(\lambda)HH^{-1}\mathcal{L}^{1d}(\lambda)H\mathcal{L}^{2g}(\mu)\mathcal{L}^{2d}(\mu) \\
&= R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\mathcal{L}^{1g}(\lambda)H\left(Ad(H^{-1})(\mathcal{L}^{1d}(\lambda))\mathcal{L}^{2g}(\mu)\right)\mathcal{L}^{2d}(\mu)
\end{aligned}$$

Soit, d'après (B.6),

$$\begin{aligned}
\bar{\Delta}\left(R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\mathcal{L}^1(\lambda)H\mathcal{L}^2(\mu)\right) &= R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\mathcal{L}^{1g}(\lambda)H\left(\mathcal{L}^{2g}(\mu)Ad(H^{-1})(\mathcal{L}^{1d}(\lambda))\right)\mathcal{L}^{2d}(\mu) \\
&= \left(R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\mathcal{L}^{1g}(\lambda)H\mathcal{L}^{2g}(\mu)\right)H^{-1}(\mathcal{L}^{1d}(\lambda)H\mathcal{L}^{2d}(\mu))
\end{aligned}$$

Puis, d'après (B.3) et (B.7),

$$\begin{aligned}
\bar{\Delta}\left(R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\mathcal{L}^1(\lambda)H\mathcal{L}^2(\mu)\right) &= (\mathcal{L}^{2g}(\mu)H\mathcal{L}^{1g}(\lambda)R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right))H^{-1}\mathcal{L}^{1d}(\lambda)H\mathcal{L}^{2d}(\mu) \\
&= \mathcal{L}^{2g}(\mu)H\mathcal{L}^{1g}(\lambda)H^{-1}\left(R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\mathcal{L}^{1d}(\lambda)H\mathcal{L}^{2d}(\mu)\right)
\end{aligned}$$

En utilisant ensuite (B.4) et (B.5), on obtient :

$$\begin{aligned}
\bar{\Delta}\left(R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\mathcal{L}^1(\lambda)H\mathcal{L}^2(\mu)\right) &= \mathcal{L}^{2g}(\mu)H\mathcal{L}^{1g}(\lambda)H^{-1}\left(\mathcal{L}^{2d}(\mu)H\mathcal{L}^{1d}(\lambda)R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\right) \\
&= \mathcal{L}^{2g}(\mu)(HL^{1g}(\lambda)H^{-1}\mathcal{L}^{2d}(\mu))H\mathcal{L}^{1d}(\lambda)R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \\
&= \mathcal{L}^{2g}(\mu)\left(Ad(H)(\mathcal{L}^{1g}(\lambda))\mathcal{L}^{2d}(\mu)\right)H\mathcal{L}^{1d}(\lambda)R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \\
&= \mathcal{L}^{2g}(\mu)\left(\mathcal{L}^{2d}(\mu)Ad(H)(\mathcal{L}^{1g}(\lambda))\right)H\mathcal{L}^{1d}(\lambda)R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \\
&= \mathcal{L}^{2g}(\mu)(\mathcal{L}^{2d}(\mu)H\mathcal{L}^{1g}(\lambda)H^{-1})H\mathcal{L}^{1d}(\lambda)R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \\
&= \mathcal{L}^{2g}(\mu)\mathcal{L}^{2d}(\mu)H\mathcal{L}^{1g}(\lambda)\mathcal{L}^{1d}(\lambda)R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \\
&= \bar{\Delta}(\mathcal{L}^2(\mu))H\bar{\Delta}(\mathcal{L}^1(\lambda))R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \\
&= \bar{\Delta}\left(\mathcal{L}^2(\mu)H\mathcal{L}^1(\lambda)R\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)\right).
\end{aligned}$$

□

RÉFÉRENCES

- [1] P. Bouwknegt, J. McCarthy, K. Pilch, *Quantum group structure in the Fock space resolutions of $\widehat{\mathfrak{sl}}_n$ representations*, Comm. Math. Phys. **131** (1990), n°1, 125-155.
- [2] B. Enriquez, B. Feigin, *Integrals of motion of classical lattice sine-Gordon system*, Theor.Math.Phys. **103** (1995) 738-756.
- [3] A.G. Izergin, V.E. Korepin, *The lattice sine-Gordon model* Lett.Math. Phys. **5** (1981),199-205.
- [4] A.G. Izergin, V.E. Korepin, *Lattice versions of quantum field theory models in two dimensions* Nucl.Phys. B **205** (1985),401-413.
- [5] L. Faddeev, A. Volkov, *Quantum inverse scattering method on a space-time lattice*, Theor.Math.Phys. **92** (1992), 207-214.
- [6] A. Bobenko, N. Kutz, U. Pinkall, *The discrete quantum pendulum*, Physics Letters A **177** (1993), 399-404.
- [7] N. Reshetikhin, *Integrable Systems with Discrete Time*, International Conference of mathematical physics, 1994, Paris.
- [8] V. Bazhanov, A. Bobenko, N. Reshetikhin, *Quantum Discrete Sine-Gordon Model at roots of 1 : Integrable Quantum System on the Integrable Classical Background*, Comm. Math. Phys. **175** (1996), n°2,377-400.
- [9] C. Kassel, *Quantum groups*, Springer-Verlag 1994 p.15.
- [10] V. Drinfeld, *A new realizations of Yangians and quantized affine algebras*, Soviet. Math. Dokl., **36** :2 (1988), 212-216.
- [11] C. DeConcini, V.G. Kac, C. Procesi, *Some quantum analogues of solvable Lie groups*, Oxford University Press.Stud.Math., Tata Inst. Fundam. Res. 13,41-65 (1995).
- [12] M. Semenov-Tian-Shansky, *Dressing action transformations and Poisson-Lie group actions*, Publ. Math. RIMS **21** (1985), 1237-1260.
- [13] E. Frenkel, N. Reshetikhin, *Quantum Affine Algebras and Deformations of the Virasoro and W-algebras*, Comm. Math. Phys. **178** (1996), n°1, 237-264.
- [14] J. Dixmier, *Algèbres enveloppantes*, Gauthier-Villards 1974 p.116.

Cyril Grunspan
Ecole Polytechnique
Centre de Mathématiques
UMR 7640 du CNRS
F-91128 PALAISEAU Cedex
courriel: grunspan@math.polytechnique.fr